

ВНИМАНИЕ !

Амброзия полыннолистная – опасный карантинный сорняк



Амброзия полыннолистная (*Ambrosia artemisiifolia* L.) – карантинный сорняк, включен в Перечень карантинных объектов (вредителей, возбудителей болезней растений и сорных растений (сорняков)) как вид, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации.

Очаги Амброзии полыннолистной имеются на территории трех районов Калужской области: в Дзержинском, Ферзиковском и Юхновском. Карантинный сорняк завезен в охотничьи хозяйства области с фуражным зерном для подкормки диких животных.

Возможные пути распространения:

1. с помощью плодов-семянков;
2. с семенным материалом;
3. с переработанной растительной продукцией;
4. с почвой, грунтами;
5. с сеном, соломой;
6. с удобрениями растительного происхождения;
7. с шерстью и шкурами животных;
8. с зерновыми смесями для домашних животных и птиц;
9. естественными путями – ветром, водой, птицами, на колесах машин и других транспортных средств, на обуви людей.



Проведение обследований на выявление очага (очагов) амброзии полыннолистной

1. Ежегодному обследованию подлежат территории предприятий, перерабатывающих подкарантинную продукцию, засоренную семянками амброзии полыннолистной.
2. Ежегодному контрольному обследованию подлежат площади, на которых ликвидированы очаги амброзии полыннолистной, с целью проверки эффективности проведенных ликвидационных мероприятий.
3. Не реже одного раза в два года проводят контрольное обследование территорий распространения амброзии полыннолистной (где засоренные площади выявлены и учтены) для уточнения изменений размеров засоренных площадей.
4. Не реже одного раза в два года обследованию подлежат сельскохозяйственные культуры и насаждения, посев и посадка которых проведены импортным материалом.



Амброзия полыннолистная

**Пыльца амброзии вызывает сенную лихорадку.
Амброзия полыннолистная — один из наиболее
опасных сорняков-аллергенов.
Амброзия полыннолистная засоряет все полевые
культуры, приводит к иссушению почвы; резко
снижает плодородие почвы.**

Как правильно бороться с амброзией

В этом году аллергенный сорняк на Кубани зацветет до 15 августа – раньше обычного срока

АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ

Происхождение: Северная Америка
Традиционный период цветения:
с 15 августа по 15 сентября

Чем опасна: угнетает соседние культурные растения, забирая воду и питательные вещества, обедняет почвы, крайне аллергенна.



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВЫКОРЧЕВАТЬ АМБРОЗИЮ НА СВОЕМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ



1 ЗАЩИТИТЕ ЛИЦО И ТЕЛО

потребуется: респиратор, плотные рукавицы, одежда с длинными рукавами и штаны



2 ВЫРЫВАЙТЕ РАСТЕНИЕ С КОРНЕМ

остатки стебля хорошо прорастают, вместо одного сорняка появится 3-5 новых



3 НЕ ХРАНИТЕ ВО ДВОРЕ ВЫРВАННУЮ ИЗ ЗЕМЛИ АМБРОЗИЮ – СЖИГАЙТЕ СТЕБЛИ

иначе пыльца растения будет распространяться



4 УНИЧОЖАЙТЕ СОРНЯК ДО НАЧАЛА ЕГО ЦВЕТЕНИЯ (НО И НЕ В ПЕРИОД РОСТА, А В ПЕРИОД БУТОНИЗАЦИИ)

если не успели – убирайте осторожно, чтобы не растрясать пыльцу



5 ПОСЛЕ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УМОЙТЕ ЛИЦО, ПРОПОЛОЩИТЕ РОТ, ГОРЛО И НОС, ПРИМИТЕ ДУШ, ПЕРЕОДЕНЬТЕСЬ, А ОДЕЖДУ ПОСТИРАЙТЕ

Каждый год из-за амброзии «армия» аллергиков на Кубани увеличивается на 3 тысячи человек

Источники: Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, Администрация Краснодара, Администрация Краснодарского края

Редактор: Елена Шумовская
Дизайнер: Григорий Белозеров

АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ КUBAN.AIR.RU