

**ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧПОУ «СМК № 1»

М. Н. Трошина

№30-УД от 15.05.2024 г.

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

для проведения промежуточной аттестации

**приложение к
рабочей программе
учебной дисциплины**

ОП. 06 ФАРМАКОЛОГИЯ

по специальности

34.02.01 Сестринское дело

Квалификация – медицинская сестра/ медицинский брат

Форма обучения - очная

Ставрополь, 2024

Тестовые вопросы для проведения промежуточной аттестации

1. Фармакокинетика изучает:

- А) Метаболизм ЛС и их последующее выведение из организма
- В) Всасывание, распределение, механизм действия и метаболизм ЛС
- С) Влияние генетических факторов на фармакологический ответ
- Д) Всасывание, распределение, побочные эффекты ЛС
- Е) Всасывание, распределение, депонирование и элиминацию ЛС**

2. К энтеральным путям введения относятся:

- А) Ректальный, назальный, пероральный
- В) Сублингвальный, трансбуккальный**
- С) Пероральный, ректальный, трансдермальный
- Д) Ингаляционный,
- пероральный Е) Все неверно

3. Агонист - это ...

- А) Вещество, обладающее аффинитетом
- В) Вещество, обладающее внутренней активностью
- С) Вещество, обладающее аффинитетом, но не обладающее внутренней активностью
- Д) Вещество, обладающее аффинитетом и внутренней активностью**
- Е) Вещество, обладающее внутренней активностью, но не обладающее аффинитетом
- Г) Секретция и фильтрация снижены, период полувыведения уменьшается
- Г) Все неверно

4. Лекарственное средство, блокирующее рецептурное образование

Это _____ Антагонист

5. Фармакодинамика изучает:

- А) Фармакологические эффекты, механизм действия, локализацию действия ЛС**
- В) Абсорбцию, распределение, депонирование, метаболизм ЛС
- С) Экскрецию ЛС
- Д) Роль генетических факторов в формировании фармакологического ответа
- Е) Все верно

6. Лекарственное средство, стимулирующее один вид рецепторов и угнетающее другой вид это ...

Частичный агонист

7. Биодоступность - это ...

- A) Время за которое концентрация ЛВ в плазме крови снижается в 2 раза
- B) Объем плазмы крови, очищающийся от ЛВ за единицу времени
- C) Параметр, демонстрирующий какая часть ЛВ элиминируется в единицу времени**
- D) % ЛВ, достигшего системного кровотока в неизмененном виде

8. Агонист-антагонист - это ...

- A) Вещество, обладающее аффинитетом менее, чем максимальным
- B) Вещество, обладающее внутренней активностью менее, чем максимальной
- C) Вещество, обладающее аффинитетом, но не обладающее внутренней активностью
- D) Вещество, обладающее аффинитетом и менее чем максимальной внутренней активностью
- E) Вещество, стимулирующее один подтип и блокирующее другой подтип одних и тех же рецепторов**

9. Не синтетические реакции метаболизма УБРАТЬ НЕ правильный

- A) Окисление
- B) Конъюгация**
- C) Восстановление
- D) Гидролиз
- E) Деметилирование

10. Высшая суточная доза – это ...

- A) Максимальное количество ЛС, вводимое в организм за один прием
- B) Максимальное количество ЛС, вводимое в организм за сутки**
- C) Доза, вызывающая минимальный терапевтический эффект
- D) Доза, рассчитанная на курс лечения
- E) Доза, оказывающая у большинства больных необходимое терапевтическое действие

11. Курсовая доза – это ...

- A) Максимальное количество ЛС, вводимое в организм за один прием
- B) Максимальное количество ЛС, вводимое в организм за сутки
- C) Доза, вызывающая минимальный терапевтический эффект
- D) Доза, рассчитанная на курс лечения**
- E) Доза, оказывающая у большинства больных необходимое терапевтическое действие

12. Какое ЛС рефлекторно восстанавливает функцию дыхательного центра?

- A) Никетамид (кордиамин)
- B) Морфин**

- С) Налоксон
- Д) Раствор аммиака**

13. Для повышения АД возможно использовать:

- А) Адреналин**
- В) Доксазозин
- С) Тамсулозин
- Д) Азаметония бромид
- Е) Тропикамид

14. Какой препарат вызывает ортостатическую гипотензию?

- А) Атропин
- В) Тамсулозин
- С) Сальбутамол
- Д) Фенилэфрин
- Е) Бензогексоний**

15. Для пролонгирования эффекта артикаина его целесообразно комбинировать с:

- А) Лидокаином
- В) Галантамином
- С) Атропином
- Д) Адреналином**
- Е) Пилокарпином

16. В виде назального спрея при ринитах применяют:

- А) Атропин
- В) Сальбутамол
- С) Оксиметазолин**
- Д) Галантамин
- Е) Азаметония бромид

17. В виде глазных капель при аллергическом конъюнктивите (в качестве сосудосуживающего средства) применяют:

- А) Атропин
- В) Тропикамид
- С) Пилокарпин
- Д) Капли с дексаметазоном**
- Е) Неостигмина метилсульфат

18. При острой сердечной недостаточности применяют:

- A) Кардиамин**
- В) Метопролол
- С) Атропин
- Д) Сальбутамол
- Е) Доксазозин

19. При бронхиальной астме применяют:

- А) Сальбутамол
- В) Фенотерол
- С) Ипратропия бромид
- Д) Эфедрин
- Е) Все верно**

20. Для исследования глазного дна применяют:

- A) Тропикамид (группа атропина)**
- В) Неостигмина метилсульфат
- С) Азаметония бромид
- Д) Тамсулозин
- Е) Сальбутамол