

## **Осторожно – КГЛ!**



Иксодовые клещи являются источником повышенной опасности, поскольку после присасывания могут заразить человека не только Крымской геморрагической лихорадкой, но и иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), эрлихиозом, листериозом, туляремией и другими инфекционными заболеваниями. Ставропольский край относится к территориям повышенного риска заражения особо опасной инфекцией - **Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ).**

Заражение людей возможно при укусе клеща, его раздавливании (при снятии их с животных и людей), а также через кровь зараженного человека или заклещеванных домашних и сельскохозяйственных животных, птиц.

**Инкубационный (скрытый) период:** 1-14 дней, в среднем 4-6 дней.

**Первые признаки заболевания:** озноб, жар, повышение температуры тела до 39-41 градусов, сильная головная боль, боли в пояснице, суставах, мышцах, ломота во всем теле, нередко тошнота, общая слабость. Возможно возникновение кровотечений из носа, десен и внутренних органов.

**Основные меры профилактики заболевания:**

- Ограничить свое пребывание в природных условиях (пастбища, луга, опушки лесов и лесопосадок), выбирать места для отдыха с учетом исключения контактов с клещами;
- При работе в огороде одеваться так, чтобы одежда плотно прилегала к телу, не позволяя клещам заползать под нее, волосы должны быть заправлены под косынку, брюки желательно заправить в носки. Одежду целесообразно обрабатывать специальными веществами, отпугивающими клещей – репеллентами («Пикник-Антиклещ», «Торнадо-Антиклещ» и др.);
- Проводить осмотры на наличие клещей себя и животных после сельхозработ, возвращения с прогулок на природе;
- Не допускать выпас скота в местах массового обитания грызунов и высокой заклещеванности;
- Регулярно проводить противоклещевые обработки животных;
- Не допускать самовольный забой скота без ветеринарного освидетельствования; при забое заклещеванного скота имеется большая опасность заразиться КГЛ;
- Снимать клещей с животных только в перчатках или пинцетом или обращаться к ветеринарным специалистам.

**При обнаружении укуса или присосавшегося к телу клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение. После удаления клеща в течение 14 дней ежедневно 2 раза в день измерять температуру тела и при ее повышении, срочно обращаться к врачу и сообщить об укусе клеща.**