

ДИФТЕРИЯ

Пути заражения:



- Воздушно-капельный



- Контактно-бытовой

Симптомы:




- Повышенная температура
- Общая слабость
- Боль в горле



- Затрудненное дыхание
- Отек и характерные пленки на слизистой
- Отек шеи

Осложнения:



- Тяжелые поражения сердца и почек
- Поражение нервной системы (параличи, парезы)



- Инфекционно-токсический шок
- Летальный исход

Чтобы избежать заражения:

1. Пройти обследование, чтобы определить иммунитет к дифтерии
2. Делать прививки детям, согласно календарю прививок, и прививаться каждые 10 лет.



ДИФТЕРИЯ

СИМПТОМЫ

- Наиболее характерный симптом – серо-белые пленочные налёты на нёбе, миндалинах, задней стенке глотки.
- Боль при глотании
- Повышение температуры
- Увеличение миндалин или лимфоузлов
- Отёчность шеи
- Специфический запах изо рта



Лечение

Антитоксическая противодифтерийная сыворотка + приём антибиотиков

ОСЛОЖНЕНИЯ

- Инфекционно-токсический шок
- Поражение нервных окончаний
- Параличи, преимущественно нёба, голосовых связок, дыхательных путей, шеи
- Почечная недостаточность
- Сердечная недостаточность
- Летальный исход



ПРОФИЛАКТИКА

- Прививка АКДС, АДС, АДС-М
- Детям в 2, 4, 6 месяцев, затем в 18 месяцев, в 6 и в 16 лет
- Взрослым – каждые 10 лет

ЕСТЬ ВАКЦИНА! ДИФТЕРИЯ



Дифтерия -
инфекционное
заболевание
с летальностью до

10%

даже в случае
правильного лечения

Осложнения:
асфиксия вследствие
закрытия просвета
дыхательных путей
отеком
и пленками,
миокардит,
полинейропатия,
паралич, почечная
недостаточность



Эпидемия дифтерии
среди непривитого
населения России
привела к смерти

>4000

человек в 90-е годы
XX века

Симптомы:
повышение
температуры,
сухой кашель,
охриплость голоса,
боли в горле,
образование
пленчатых налётов на
миндалинах и нёбе



Необходима
ревакцинация против
дифтерии взрослых
каждые

10

лет



Вакцинация - самая
эффективная мера
профилактики
дифтерии;
проводится
трехкратно детям в 3,
4,5 и 6 месяцев с
ревакцинациями в
18, 6-7 и 14 лет