

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ»**

(для медицинских сестёр (участковых) педиатрических участков, прошедших обучение по циклам 16.8 "Первичная медико-санитарная помощь детям", профессиональной переподготовки по специальности «Сестринское дело в педиатрии»)

- 1 Обработка пупочной ранки производится:
 - а) 3% раствором пероксида водорода
 - б) раствором фукоцина
 - в) 2% раствором перманганата калия
 - г) 5% раствором перманганата калия
- 2 Симптомы энтеробиоза:
 - а) боли в животе, отеки
 - б) зуд в области ануса
 - в) стул с прожилками крови
 - г) беспокойный сон
- 3 Причины диабетической комы:
 - а) пропуск инъекции инсулина
 - б) длительный промежуток между инъекцией и приемом пищи
 - в) физические нагрузки
 - г) передозировка инсулина
- 4 Эпидемический паротит в дальнейшем может привести к:
 - а) Бесплодие;
 - б) Цистит;
 - в) Пиелонефрит
- 5 Основные симптомы менингококцемии:
 - а) налеты в зеве
 - б) бледность кожи, интоксикация
 - в) геморрагическая сыпь
 - г) сухой кашель
- 6 Фальсифицированное лекарственное средство – это:
 - а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.
 - б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе.
 - в) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.
 - г) лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства

- 7 Подсчет числа дыхательных движений у детей проводят:
- а) за 30 секунд
 - б) за 60 секунд
 - в) в покое
 - г) после кормления
- 8 Клинические симптомы дифтерии зева:
- а) белый творожистый налет в зеве
 - б) налеты в зеве серо-белые, плотно лежат на слизистой миндалин
 - в) увеличение периферических лимфоузлов
 - г) увеличение верхне-шейных лимфоузлов, интоксикация
- 9 Факторы риска рождения недоношенного ребёнка:
- а) внутриутробные инфекции
 - б) многоплодная беременность
 - в) интервалы между родами 5 лет
 - г) возраст матери 20-25 лет
- 10 Медицинский работник к пациенту должен обращаться:
- а) по имени
 - б) по имени и отчеству
 - в) по фамилии
 - г) «больной»
- 11 Проба Манту проводится 2 раза в год:
- а) Всем вакцинированным против туберкулеза
 - б) Детям с врожденными заболеваниями сердца
 - в) Детям с родовой травмой
 - г) Детям с хроническими неинфекционными заболеваниями легких, сахарным диабетом
- 12 Детей социального риска относят к группе риска:
- а) I
 - б) V
 - в) II
 - г) III
- 13 Вторая ревакцинация против полиомиелита проводится:
- а) в 18 месяцев
 - б) в 24 месяца
 - в) в 36 месяцев
 - г) в 20 месяцев
- 14 Физиологический гипертонус мышц-сгибателей у грудного ребёнка сохраняется до возраста:
- а) 1-2 месяцев жизни
 - б) 5-6 месяцев жизни
 - в) 3-4 месяцев жизни
 - г) 4-6 месяцев жизни
- 15 Прогноз больных, страдающих бронхиальной астмой зависит от:
- а) возраста
 - б) нервно-психического развития
 - в) длительности заболевания
 - г) физического развития

- 16 Инородные тела у детей чаще обнаруживают:
- а) в правом главном бронхе
 - б) в левом главном бронхе
 - в) в трахее
 - г) в гортани
- 17 Ранние симптомы туберкулеза:
- 1. постоянный кашель в течение 3-х и более недель
 - 2. потеря веса
 - 3. повышение аппетита
 - 4. субфебрильная температура
 - 5. повышение работоспособности
- а) 1, 2, 4
 - б) 1, 2, 3
 - в) 3, 4, 5
 - г) 2, 3, 4
 - д) 1, 4, 5
- 18 Укажите симптом скрытой спазмофилии:
- а) Бабинского
 - б) Хвостека
 - в) Моро
 - г) Бауэра
- 19 Общие водные процедуры:
- а) ручные и ножные ванны
 - б) душ
 - в) плавание в бассейне
 - г) подмывани
- 20 Смена молочных зубов на постоянные происходит в возрасте:
- а) 5-5,5 лет
 - б) 6-6,5 лет
 - в) 7-7,5 лет
 - г) 7,5-8 лет
- 21 Симптомы скарлатины:
- а) ангина, интоксикация
 - б) мелкоточечная сыпь
 - в) спазматический кашель
 - г) пятнисто-папулезная сыпь
- 22 Основным критерием недоношенности является:
- а) масса тела
 - б) наличие малого родничка
 - в) длина тела
 - г) гестационный возраст
- 23 Диспансеризация при сахарном диабете требует осмотра:
- а) психиатра
 - б) эндокринолога
 - в) окулиста
 - г) гематолога

- 24 Профессиональная компетентность – это:
- а) степень развития личности
 - б) степень обученности
 - в) совокупность профессиональных и личностных качеств
 - г) вид профессиональной деятельности
- 25 После проведения прививки ребенок должен находиться под наблюдением медсестры:
- а) 10 минут
 - б) 15 минут
 - в) 20 минут
 - г) 30 минут
- 26 Укажите соотношение окружности головы и грудной клетки здорового новорожденного ребёнка:
- а) окружность головы равна окружности груди
 - б) окружность грудной клетки больше окружности головы на 1-2 см
 - в) окружность головы больше окружности груди на 1-2 см
 - г) окружность головы больше окружности груди на 2-4 см
- 27 Карантин при вирусном гепатите А:
- а) 35 дней
 - б) 45 дней
 - в) 60 дней
 - г) 180 дней
- 28 Здорового новорожденного рекомендуется прикладывать к груди после рождения:
- а) Не позже 15 минут
 - б) Не позже 30 минут
 - в) Не позже 1 часа
 - г) Не позже 2 часов
- 29 Причины возникновения врожденных пороков сердца:
- а) заболевания беременной вирусными инфекциями
 - б) родовая травма
 - в) профессиональные вредности, курение
 - г) несовместимость крови по R-фактору
- 30 Вакцинация против дифтерии проводится в возрасте:
- а) с 3 месяцев
 - б) с 6 месяцев
 - в) с 10 месяцев
 - г) с 1 года
- 31 Физиологическая потеря массы тела у новорожденных от массы тела при рождении составляет (в %):
- а) 3-5
 - б) 5-8
 - в) 3-10
 - г) 6-12
- 32 Приготовленную смесь для вскармливания ребенка первого года жизни можно использовать:
- а) Однократно
 - б) В течение суток
 - в) В течение 2 суток
 - г) Зависит от вида смеси

- 33 Зависимые вмешательства медсестры:
- а) смена повязок
 - б) промывание желудка
 - в) кормление
 - г) подмывание
- 34 Сестринский процесс при врожденном пороке сердца:
- а) рекомендовать ежедневные прогулки в зеленой зоне
 - б) обеспечить постельный режим с постоянной опекой больного
 - в) проветривать помещение, избегать контактов с больными ОРВИ
 - г) повышать калораж пищи за счет животных жиров
- 35 К симптомам экзикоза относятся:
- а) жажда, сухость кожи и слизистых
 - б) полиурия
 - в) олигурия, потеря массы тела
 - г) повышение аппетита
- 36 Ребёнок хорошо держит голову в вертикальном положении в возрасте:
- а) 1 месяца
 - б) 2 месяца
 - в) 3 месяца
 - г) 4 месяца
- 37 Купание в открытых водоемах возможно с:
- а) 1 года
 - б) 5-6 лет
 - в) 3-4 лет
 - г) 6-7 лет
- 38 Особенности дыхания новорожденного ребёнка:
- а) поверхностное
 - б) ритмичное
 - в) глубокое
 - г) аритмичное
- 39 Сестринский уход при кори:
- а) постельный режим, питье, витаминизированное питание
 - б) туалет носа, глаз, полости рта
 - в) ограничение питья, измерение диуреза
 - г) изоляция больного на 30 дней
- 40 Фебрильные судороги — это судороги, возникающие у детей в результате:
- а) заболевания нервной системы
 - б) высокой температуры
 - в) родовой травмы
 - г) недостатка в организме витамина D
 - д) длительного пребывания на солнце
- 41 Сколько групп здоровья выделяют у детей:
- а) 3
 - б) 4
 - в) 5
 - г) 2

- 42 Условия проведения гигиенической ванны ребёнку 7-ми дней жизни:
- а) температура воды 36-37 градусов
 - б) температура воды 38-39 градусов
 - в) добавление отвара трав
 - г) добавление раствора перманганата калия
- 43 Причины Д-витаминной недостаточности у детей:
- а) недоношенность
 - б) нарушенная осанка
 - в) грудное вскармливание
 - г) отсутствие прогулок
- 44 Сестринский процесс при потнице и опрелостях 1 степени:
- а) воздушные ванны
 - б) обработка кожи хлорофиллиптом
 - в) исключение купания
 - г) адекватная одежда
- 45 Сестринский процесс при ОРВИ:
- а) постельный режим, теплое щелочное питье, дробное питание
 - б) измерение суточного диуреза, АД
 - в) туалет полости рта, носа, глаз
 - г) постановка горчичников и банок на грудную клетку
- 46 Начальные проявления рахита:
- а) искривление конечностей
 - б) потливость, чуткий сон
 - в) экзикоз
- 47 Причинами вторичной гипогалактии являются:
- а) раннее прикладывание к груди
 - б) позднее прикладывание к груди
 - в) необоснованное введение другой пищи, питья
 - г) свободный ритм кормления
- 48 Преддошкольный период - это возраст детей от:
- а) 1 месяца до 1 года
 - б) 1 года до 3-х лет
 - в) 3-х до 7-ми лет
 - г) 0 до 3-х лет
- 49 Профилактическая доза витамина D ребенку составляет (МЕ):
- а) 200
 - б) 400
 - в) 600
 - г) 800
- 50 Изменения в моче при пиелонфрите:
- а) бактериурия
 - б) гематурия
 - в) лейкоцитурия
 - г) глюкозурия
- 51 Минимальный срок введения 1 прикорма здоровому ребёнку:
- а) 3 месяца
 - б) 4 месяца
 - в) 5 месяцев
 - г) 6 месяцев

- 52 Источником инфекции при туберкулезе могут быть:
- а) человек
 - б) насекомое
 - в) животное
 - г) рыба
- 53 При закаливании ребёнка необходимо:
- а) добиваться положительных эмоциональных реакций
 - б) учитывать национальность
 - в) учитывать пол ребёнка
 - г) подходить индивидуально к каждому ребёнку
- 54 Генетически детерминированным признаком является:
- а) длина
 - б) масса
 - в) окружность головы
 - г) массово-ростовой показатель
- 55 Ребёнок старше 1 года в первую очередь посещает кабинет:
- а) педиатра
 - б) КЗР
 - в) Прививочный
 - г) кабинет инфекционных заболеваний
- 56 Специфической профилактикой туберкулеза является:
- а) изоляция больных
 - б) текущая и заключительная дезинфекция
 - в) сан-просвет работа среди населения
 - г) вакцинация и ревакцинация здоровых детей вакциной БЦЖ
 - д) проведение пробы Манту
- 57 Пути оздоровления детей с врожденными пороками сердца:
- а) режим, закаливание
 - б) бициллино – профилактика
 - в) диета, ограничение физической нагрузки
 - г) физиотерапия
- 58 Характер сыпи при скарлатине:
- а) везикулы
 - б) геморрагическая сыпь
 - в) пятнисто-папулезная сыпь
 - г) мелкоточечная сыпь на розовом фоне кожи
 - д) розеолезная
- 59 Вирус краснухи опасен беременным женщинам в сроке беременности:
- а) 8-9 месяцев
 - б) 5-6 месяцев
 - в) 2-3 месяца
 - г) 4-6 месяцев
- 60 С помощью пробы по Зимницкому можно определить:
- а) Цвет, объем, плотность мочи;
 - б) Глюкозу в моче;
 - в) Концентрационную функцию почек

- 61 Приоритетом в борьбе с инфекциями в системе первичной медико-санитарной помощи детям является:
- а) диагностика инфекционных заболеваний
 - б) лечение инфекционных заболеваний
 - в) применение средств иммунопрофилактики
 - г) карантинные мероприятия
- 62 Здорового ребёнка на первом году жизни необходимо взвешивать:
- а) 1 раз в месяц
 - б) 1 раз в квартал
 - в) 2 раза в месяц
 - г) 2 раза в квартал
- 63 Сестринское вмешательство осуществляется на этапе:
- а) сбора информации
 - б) планирования сестринского ухода
 - в) реализации плана
 - г) оценки эффективности ухода
- 64 Когда делают специфическую профилактику при ветряной оспе?
- а) в 12 месяцев
 - б) в 18 месяцев
 - в) не проводится
 - г) в 3 года
 - д) в роддоме
- 65 Профилактика коклюша:
- а) карантин 21 день в очаге
 - б) карантин 15 дней в очаге
 - в) вакцинация
 - г) изоляция больного на 10 дней
- 66 Назовите размеры большого родничка в норме у новорождённого:
- а) 2-2,5 см
 - б) 1-1,5 см
 - в) 3-3,5 см
 - г) 3-4,5 см
- 67 К симптомам вегето-сосудистой дистонии относятся:
- а) головокружение, мигрень
 - б) диспепсия
 - в) снижение гемоглобина
 - г) гипотензия или гипертензия
- 68 Назовите срок проведения второго дородового патронажа участковой медсестры:
- а) 30-32 недели
 - б) 36 недель
 - в) 40 недель
 - г) 27 недель
- 69 Первая ревакцинация против полиомиелита проводится:
- а) в 18 месяцев
 - б) в 24 месяца
 - в) в 15 месяцев
 - г) не проводится

- 70 Частота мочеиспусканий детей к первому месяцу:
- а) 4-6
 - б) 8-10
 - в) 10-15
 - г) 20-25
- 71 Сестринский процесс при коклюше:
- а) изоляция больного, аэротерапия
 - б) горчичники на грудную клетку
 - в) назначение либексина
 - г) питание полужидкое, дробное
- 72 Укажите правила введения прикорма:
- а) давать из бутылочки
 - б) начинать только здоровому ребёнку
 - в) можно ввести два вида прикорма сразу
 - г) начинать постепенно с малых доз
- 73 Этические нормы медицинского работника определяются:
- а) умениями и навыками
 - б) законами и приказами
 - в) этническими особенностями региона
 - г) моральной ответственностью
- 74 Смешанным называется вскармливание, если:
- а) смеси составляют более $1/5$ суточного количества пищи
 - б) смеси составляют более $2/3$ суточного количества пищи
 - в) смеси составляют более $4/5$ суточного количества пищи
 - г) смеси составляют более $1/2$ суточного количества пищи
- 75 Характеристике недоношенного новорожденного ребёнка соответствует:
- а) мягкие ушные раковины
 - б) физиологический гипертонус
 - в) срединное положение пупочного кольца
 - г) положение пупочного кольца ближе к лону
- 76 Жаропонижающий препарат выбора для детей:
- а) анальгин
 - б) амидопирин
 - в) аспирин
 - г) парацетамол
- 77 Сестринский уход при гипотрофии 1 степени:
- а) адекватное вскармливание
 - б) проводить коррекцию и расчет питания
 - в) рекомендовать прогулки, массаж, гимнастику
 - г) измерять суточный водный баланс
- 78 Первичная профилактика заболеваний у детей включает:
- а) иммунопрофилактику
 - б) ортопедическую коррекцию
 - в) коррекция зрения
 - г) рациональное питание
- 79 Преджелтушный период при гепатите - это период:
- а) разгара
 - б) инкубационный
 - в) продромальный
 - г) реконвалесценции

- 80 Работа по антенатальной охране плода на педиатрическом участке:
- а) выполнение дородовых патронажей
 - б) контроль за питанием детей 1-ого года жизни
 - в) контроль за выполнением назначений гинекологом беременной
 - г) вакцинация
- 81 Смешанное вскармливание - это:
- а) грудное молоко и прикорм
 - б) грудное молоко и докорм
 - в) молочные смеси и прикорм
 - г) разнообразные молочные смеси
- 82 Для создания пассивного иммунитета применяется:
- а) живая вакцина
 - б) бактериофаг
 - в) иммуноглобулин
 - г) анатоксин
- 83 Сестринский процесс при скарлатине исключает:
- а) изоляцию больного, постельный режим в острый период
 - б) витаминизированное питание, дополнительное питьё
 - в) текущую дезинфекцию, полоскание зева
 - г) измерение суточного водного баланса
- 84 Цель первичного патронажа новорожденного:
- а) провести антропометрию
 - б) оказать консультативную помощь
 - в) пригласить в поликлинику
 - г) оказать практическую помощь матери в уходе за ребёнком
- 85 Основные симптомы кори в продромальном периоде:
- а) ринит, конъюнктивит
 - б) спазматический кашель
 - в) везикулезная сыпь
 - г) пятна Филатова-Коплика
- 86 К дополнительным исследованиям физического развития детей относятся:
- а) измерение роста
 - б) определение жизненной емкости легких
 - в) определение массы тела
 - г) определение мышечной силы кисти
- 87 Для функциональных признаков недоношенного ребёнка характерно:
- а) склонность к гипотермии
 - б) громкий крик
 - в) отсутствие сосательного рефлекса
 - г) ритмичное дыхание
- 88 Характер сыпи при краснухе:
- а) геморрагическая звездчатая
 - б) пятнисто- папулёзная, мягкая на обычном фоне кожи
 - в) мелкоточечная на гиперемированном фоне кожи
 - г) везикуло-папулёзная
- 89 Укажите симптомы, характерные для диабетической комы:
- а) сухость кожи, слизистых
 - б) гипертонус мышц, судороги
 - в) ригидность мышц, тризм жевательной мускулатуры

- 90 Частые срыгивания у детей обусловлены слабым развитием:
- а) кардиального сфинктера желудка
 - б) пилорического отдела желудка
 - в) дна желудка
 - г) секреторных желез
- 91 При каком заболевании с диагностической целью проводится соскоб с перинатальных складок:
- а) Энтеробиоз;
 - б) Аскаридоз;
 - в) Трихоцефалез
- 92 Наблюдение в эпидемическом очаге заканчивается:
- а) сразу после госпитализации больного
 - б) по истечению срока максимальной инкубации у контактных лиц
 - в) немедленно после заключительной дезинфекции
 - г) после введения контактным лицам иммуноглобулина, вакцин
- 93 Ранние осложнения после внутривенного введения лекарственного препарата:
- а) гепатит В
 - б) анафилактический шок
 - в) инфильтрат
 - г) сепсис
- 94 Профилактика гельминтозов включает в себя:
- а) вакцинопрофилактику
 - б) обследование на яйца гельминтов
 - в) прием вермокса
 - г) соблюдение личной гигиены
- 95 Пути распространения инфекции при дизентерии являются:
- а) фекально-оральный
 - б) парентеральный
 - в) воздушно-капельный
 - г) через укусы насекомых
 - д) водный путь
- 96 Ребёнок с железодефицитной анемией относится к группе здоровья:
- а) 1
 - б) 2
 - в) 4
 - г) 3
- 97 При врожденном вывихе бедра применяется пеленание:
- а) широкое
 - б) с использованием подгузников
 - в) тугое
 - г) с использованием только памперсов
- 98 Число мочеиспусканий в сутки грудном периоде равно:
- а) 15 раз
 - б) 25 раз
 - в) 10 раз
 - г) 7 раз

- 99 К третьей группе здоровья относят детей:
- а) здоровых
 - б) часто болеющих
 - в) с рахитом
 - г) с врожденным пороком сердца
- 100 Комплексная оценка состояния здоровья ребёнка на 1 году жизни проводится:
- а) ежемесячно
 - б) раз в квартал
 - в) 1 раз в 6 месяцев
 - г) 1 раз в год в эпикризе годовика
- 101 Профилактика кишечных инфекций предусматривает:
- а) карантин 14 дней
 - б) карантин 7 дней, обследование контактных
 - в) вакцинацию
 - г) изоляцию больного, текущую дезинфекцию
- 102 Особенности диеты больных с сахарным диабетом:
- а) увеличение жиров животного происхождения
 - б) исключение легкоусвояемых углеводов
 - в) употребление растительных жиров
 - г) исключение аллергенов
- 103 Факторы риска развития пиелонефрита у детей:
- а) аномалии мочевыводящих путей
 - б) перегревание
 - в) наличие кариеса, хронического тонзиллита
 - г) аскаридоз
- 104 Противопоказания к ревакцинации БЦЖ:
- а) реконвалесцент ОРВИ
 - б) туберкулез
 - в) положительная реакция Манту
 - г) ушиб нижней конечности
- 105 Зрелые аскариды обитают:
- а) В тонком кишечнике
 - б) В толстом кишечнике
 - в) В желчном пузыре
 - г) В легких
- 106 Характер кашля при коклюше:
- а) сухой, «лающий»
 - б) спазматический, приступообразный
 - в) влажный
 - г) характерны «репризы»
- 107 Возбудителем эшерихиоза является:
- а) стрептококк
 - б) пневмококк
 - в) палочка Леффлера
 - г) патогенная кишечная палочка
- 108 Частота сердечных сокращений у новорожденного составляет в 1 минуту:
- а) 80-100
 - б) 140-180
 - в) 120-140
 - г) 100-120

- 109 Возбудителем шигеллеза является:
- а) микобактерия
 - б) палочка Зонне
 - в) вирус
 - г) грибки
- 110 Мероприятия при критическом падении температуры:
- а) тщательно следить за состоянием сердечно-сосудистой системой (частота пульса, уровень АД)
 - б) проводить профилактику пролежней
 - в) следить за состоянием полости рта
 - г) раскрыть больного
 - д) холодный компресс на лоб
- 111 Профилактика краснухи:
- а) вакцинация в 1 год жизни и ревакцинация в 6 лет
 - б) карантин 10 дней
 - в) карантин 21 день
 - г) взятие мазка из зева на бакпосев
- 112 Первая ревакцинация АКДС-вакциной проводится в возрасте:
- а) в 6-12 месяцев
 - б) в 18 месяцев
 - в) в 24 месяца
 - г) с 1 года
- 113 Назовите показания для госпитализации новорожденного ребёнка:
- а) судорожный синдром
 - б) потница
 - в) аллергическая сыпь
 - г) опрелость
- 114 Что нужно в очаге гриппа?
- а) больного не изолировать, проводить влажную уборку
 - б) проводить проветривание, кварцевание, водно-чайная пауза
 - в) больного не изолировать, проводить лечение по назначению врача
 - г) изолировать больного, проводить влажную уборку, проветривание помещения
 - д) обязательная госпитализация больного ребенка
- 115 Клинические признаки, которые позволяют заподозрить менингит:
- а) интоксикация, лихорадка, повышение АД, головные боли в области затылка, мелькание «мушек» перед глазами
 - б) интоксикация, лихорадка, снижение АД, тахикардия, головокружение
 - в) интоксикация, лихорадка, парез лицевого нерва, нарушение артикуляции
 - г) интоксикация, лихорадка, судорожный синдром, нарушение сознания
 - д) лихорадка, интоксикация, тоническое напряжение мышц шеи и туловища, появление внезапной рвоты после перемены положения тела
- 116 Максимальной длительностью инкубационного периода при вирусном гепатите В является:
- а) 21 день
 - б) 3 месяца
 - в) 7 дней
 - г) 6 месяцев
 - д) 7 дней

- 117 При каком заболевании нет специфической профилактики:
- а) Ветряная оспа
 - б) Полиомиелит
 - в) Краснуха
 - г) Скарлатина
- 118 Каким путем происходит распространение инфекции при менингите?
- а) воздушно-капельный
 - б) парентеральный
 - в) фекально-оральный
 - г) трансмиссивный
 - д) половой
- 119 Больные с хроническим гломерулонефритом (смешанная форма) наблюдаются:
- а) 1 год
 - б) 3 года
 - в) 5 лет
 - г) до передачи во взрослую службу
- 120 Сестринский процесс при atopическом дерматите:
- а) вести пищевой дневник
 - б) применять антигистаминные препараты
 - в) ограничить прогулки
 - г) обучать родителей уходу за кожей
- 121 Температура смеси для вскармливания ребенка первого года жизни (в градусах):
- а) 18-20
 - б) 25-30
 - в) 37-38
 - г) 40-42
- 122 Причины возникновения хронических гастродуоденитов:
- а) заражение *Helicobacter pylori*
 - б) молочно-растительная пища
 - в) нарушение экологии
 - г) вегетососудистая дистония
- 123 Мероприятия, для повышения иммунной прослойки в очаге дифтерии:
- а) иммунизация детей
 - б) иммунизация взрослых
 - в) бактериологический анализ кала
 - г) бак посев из носоглотки
- 124 Профилактика скарлатины:
- а) изоляция больного
 - б) карантин в очаге инфекции 7 дней
 - в) вакцинация
 - г) взятие кала на бакпосев
- 125 Симптомы ветряной оспы:
- а) мелкопятнистая сыпь
 - б) везикулезная сыпь
 - в) ангина
 - г) зуд кожи, интоксикация

- 126 Наиболее важным объективным симптомом для начального периода вирусного гепатита А у детей является:
- а) увеличение размеров и болезненность печени
 - б) появление катаральных явлений
 - в) появление диспепсических явлений
 - г) наличие симптомов интоксикации
- 127 Причины развития физиологической желтухи:
- а) распад эритроцитов
 - б) родовая травма
 - в) незрелость печени
 - г) гемолитическая болезнь
- 128 Вакцина БЦЖ вводится:
- а) подкожно
 - б) внутривенно
 - в) внутримышечно
 - г) эндоназально
- 129 Сроки карантина при гепатите А (в днях):
- а) 60
 - б) 35
 - в) 180
 - г) 30
- 130 Назовите норму здорового ребёнка по шкале Апгар:
- а) 8-10
 - б) 7-6
 - в) 5-6
 - г) 4-6
- 131 Первый этап скрининг-программы диспансеризации проводится:
- а) медсестрой и педиатром
 - б) медсестрой
 - в) педиатром
 - г) узкими специалистами
- 132 Основные симптомы гломерулонефрита:
- а) отеки, олигурия
 - б) полиурия, жажда
 - в) артериальная гипотензия
 - г) гематурия, протеинурия
- 133 Для лечения рахита используют:
- а) холе- эрго-кальциферол
 - б) адсорбенты
 - в) ферменты
 - г) противосудорожные препараты
- 134 Какие заболевания из перечисленных передаются воздушно-капельным путём:
- а) вирусный гепатит
 - б) дизентерия
 - в) дифтерия
 - г) менингококковая инфекция

- 135 При Пиелонефрите в моче ребенка обнаруживается:
- а) Бактериурия;
 - б) Гематурия;
 - в) Кристаллурия
- 136 Потемнение мочи у детей, больных вирусным гепатитом А, отмечается к концу периода:
- а) преджелтушного
 - б) разгара
 - в) постжелтушного
 - г) реконвалесценции
- 137 Пути оздоровления детей с гломерулонефритом:
- а) щадящий режим, диета
 - б) противорецидивное лечение 2 раза в год
 - в) массаж
 - г) лечебные ванны
- 138 Осложнением краснухи чаще может быть:
- а) гастродуоденит
 - б) энцефалит
 - в) цистит
 - г) пневмония
- 139 Профилактическим осмотрам в поликлинике подлежат дети:
- а) до 3 лет не посещающие дошкольные учреждения
 - б) до 7 лет не посещающие дошкольные учреждения
 - в) все дошкольного возраста
 - г) школьник
- 140 Особенности пневмонии у детей раннего возраста:
- а) периоральный цианоз, усиливающийся при беспокойстве
 - б) спазматический кашель
 - в) патологическое дыхание типа Куссмауля
 - г) втяжение уступчивых мест грудной клетки
- 141 Клинические проявления паротитной инфекции:
- а) серозный менингит, панкреатит
 - б) орхит, паротит
 - в) лимфаденит
 - г) миокардит
- 142 Вакцина БЦЖ содержит:
- а) живые микобактерии
 - б) убитые микобактерии
 - в) не содержит бактерий
 - г) фрагменты оболочки бактерий
- 143 Появление «заедов» в уголках рта, может быть причиной патологического состояния:
- а) Пневмония;
 - б) Железодефицитная анемия;
 - в) Атопический дерматит

- 144 При гипертермии у детей раннего возраста используют:
- а) аспирин
 - б) парацетамол
 - в) анальгин
 - г) амидопирин
 - д) можно любой
- 145 Для раннего выявления туберкулеза используют методы:
- а) томографию
 - б) туберкулинодиагностику
 - в) флюорографию
 - г) вакцинацию
- 146 Докорм применяют при вскармливании:
- а) естественном
 - б) смешанном
 - в) до кормления грудью
 - г) после кормления грудью
- 147 Нужно при подозрении на энтеробиоз:
- а) анализ мочи
 - б) анализ крови
 - в) анализ кала на яйца глистов
 - г) соскоб с перианальных складок
 - д) бактериологический посев кала
- 148 Не присуще кори:
- а) мелкоточечная сыпь
 - б) пятнисто-папулезная сыпь
 - в) пятна Филатова — Бельского
 - г) кашель, насморк
 - д) высокая температура
- 149 Адаптационный период новорожденного ребёнка длится:
- а) 2 недели
 - б) 5 недель
 - в) 2 месяца
 - г) 4 недели
- 150 Противокоревая вакцина вводится:
- а) внутримышечно
 - б) подкожно
 - в) внутрикожно
 - г) эндоназально
- 151 Какое количество заболеваний охватывает неонатальный скрининг:
- а) 6
 - б) 5
 - в) 4
 - г) 3
- 152 Цианоз кожных покровов и слизистых оболочек при ВПС усиливается:
- а) только ночью
 - б) только днём
 - в) при крике, плаче ребёнка
 - г) во время сна

- 153 Неонатальный период охватывает возраст ребенка:
- а) С рождения до 7 дней
 - б) С рождения до 28 дня
 - в) С 7 по 28 день
 - г) Первый месяц жизни
- 154 Медицинская психология – это:
- а) психопатология
 - б) отрасль клинической медицины, изучающая клиническое и душевное состояние пациента
 - в) отрасль психологической науки, изучающая психологические аспекты гигиены, профилактики, диагностики, лечения, экспертизы и реабилитации пациентов
 - г) отрасль медицины, изучающая душевное состояние пациентов при различных заболеваниях
- 155 Укажите независимое сестринское вмешательство при гипогликемическом состоянии у ребенка с сахарным диабетом
- а) успокоить ребенка
 - б) ввести внутривенно 20 - 80 мл 40% глюкозы
 - в) дать сладкий чай
 - г) ввести инсулин
- 156 Новорождённого ребенка нельзя кормить грудным молоком при:
- а) Асфиксии
 - б) Сепсисе
 - в) Фенилкетонурии
 - г) Врожденном гипотиреозе
- 157 Метод лечения с пребыванием в микроклимате соляных пещер называется:
- а) талассотерапия
 - б) физиотерапия
 - в) галотерапия
 - г) климатотерапия
- 158 Сестринские рекомендации при язвенной болезни желудка:
- а) соблюдать диету и ритм питания
 - б) избегать тяжелой физической нагрузки
 - в) вводить в рацион мясные бульоны
 - г) назначать витаминотерапию
- 159 Контрольное кормление ребёнка проводят с целью определения:
- а) количества высосанного молока
 - б) массы ребёнка
 - в) количества выпитой воды
 - г) динамики отеков
- 160 Профилактика гриппа включает в себя:
- а) прием антибиотиков
 - б) изоляция больных
 - в) исследование крови
 - г) сезонную вакцинопрофилактику
- 161 Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются:
- а) генетические
 - б) уровень и образ жизни населения
 - в) уровень, качество и доступность медицинской помощи
 - г) все вышеперечисленное

- 162 Специальная подготовка детей к поступлению в детские дошкольные учреждения (ДДУ) - это:
- а) проведение прививок за 1 месяц до поступления в ДДУ
 - б) оформление специальной документации и осмотр специалистов
 - в) проведение общепринятых мероприятий по обслуживанию детей
 - г) искоренение вредных привычек
- 163 Реакция на ректальное введение препаратов:
- а) рвота
 - б) тошнота
 - в) зуд, жжение в заднем проходе
 - г) жидкий стул
- 164 Причиной частых срыгиваний у детей является слабое развитие:
- а) кардиального сфинктера желудка
 - б) пилорического отдела желудка
 - в) дна желудка
 - г) секреторных желез
- 165 Основные симптомы краснухи:
- а) везикулезная сыпь
 - б) мелкопятнистая сыпь
 - в) пятна Филатова
 - г) увеличение лимфатических узлов
- 166 К симптомам сахарного диабета относятся:
- а) глюкозурия, гипергликемия
 - б) протеинурия, оксалурия
 - в) сухость кожи, фурункулез
 - г) крапивница
- 167 При какой болезни проявляются пятна Бельского — Филатова — Коплика у детей?
- а) краснухе
 - б) кори
 - в) скарлатине
 - г) афтозном стоматите
 - д) ветряной оспе
- 168 Факторами развития рахита являются:
- а) недостаток витамина С
 - б) быстрый рост ребёнка на первом году жизни
 - в) дефицит инсулина
 - г) отсутствие массажа и гимнастики
- 169 Профилактика менингококковой инфекции:
- а) взятие мазка из зева на посев у контактных
 - б) взятие крови на посев у контактных
 - в) карантин в очаге 10 дней, осмотр ЛОР-врачом контактных
 - г) карантин 21 день, наблюдение за контактными
- 170 Миграционная фаза аскаридоза протекает под маской:
- а) острого респираторного заболевания
 - б) неврологических расстройств
 - в) дизурических расстройств
 - г) диспепсических расстройств

- 171 На ребёнка при рождении заводятся следующие документы:
- а) история развития ребёнка
 - б) карта профилактических прививок
 - в) экстренное извещение
 - г) статистический талон
- 172 Преимущества грудного молока:
- а) содержит аминокислоту-таурин
 - б) способствует развитию дисбактериоза кишечника
 - в) содержит иммуноглобулины
 - г) содержит мало лактозы
- 173 Причина спазмофилии:
- а) гипервитаминоз Д
 - б) гипокальциемия
 - в) гиперкальциемия
 - г) гипергликемия
- 174 Симптомы атопического дерматита:
- а) гнейс, себорея, упорные опрелости
 - б) тахикардия, повышение АД
 - в) диспептические расстройства
 - г) фебрильная температура тела
- 175 Назовите нормальные сроки заживления пупочной ранки:
- а) 5 дней
 - б) 10 дней
 - в) 2 дня
 - г) до 14 дней
- 176 Антрометрические показатели физического развития:
- а) длина туловища
 - б) форма грудной клетки
 - в) окружность головы
 - г) осанка
- 177 Отказ от проведения профилактических прививок подписывается:
- а) медицинским работником
 - б) двумя медицинскими работниками
 - в) берут подписку от родителей
 - г) медицинским работником и родителями
- 178 Причины развития железодефицитной анемии:
- а) недоношенность
 - б) родовая травма
 - в) врожденный порок сердца
 - г) нерациональное вскармливание
- 179 К симптомам дыхательной недостаточности относятся:
- а) одышка, периоральный цианоз
 - б) гипертермия
 - в) западение межреберных промежутков
 - г) кашель
- 180 Контрастные ножные ванны проводятся с:
- а) 1 года
 - б) 1,5-2 лет
 - в) 6 месяцев
 - г) 3 лет

- 181 Основными показателями физического развития являются все кроме
- а) рост
 - б) вес
 - в) окружность головы
 - г) окружность грудной клетки
 - д) тургор тканей и эластичность кожи
- 182 Детская поликлиника обеспечивает в районе внебольничную помощь детям от рождения до:
- а) 15 лет
 - б) 16 лет
 - в) 17 лет
 - г) 18 лет
- 183 Причинами развития хронического гастрита у детей могут быть:
- а) отказ от профилактических прививок
 - б) пищевая аллергия, стрессовые ситуации
 - в) кратковременный прием салицилатов
 - г) неполноценное по составу и нерегулярное питание
- 184 Минимальный срок введения прикорма здоровому ребенку:
- а) 3 месяца
 - б) 4 месяца
 - в) 5 месяцев
 - г) 6 месяцев
- 185 К особенностям клиники коклюша у детей первых месяцев жизни относятся:
- а) отсутствие репризов, развитие апноэ
 - б) лихорадка, везикулезная сыпь
 - в) лихорадка, пустулезная сыпь
 - г) омфалит, снижение массы тела
- 186 Острый гломерулонефрит чаще развивается после перенесенной инфекции:
- а) вирусной
 - б) стрептококковой
 - в) грибковой
 - г) микоплазменной
- 187 Мероприятия, выполняемые в очаге сальмонеллеза в отношении контактных:
- а) текущая и заключительная дезинфекция
 - б) вакцинация или введение иммуноглобулина
 - в) наблюдение в течение максимального инкубационного периода
 - г) проведение дезинсекции
- 188 Сестринский процесс при пиелонефрите:
- а) режим «принудительного мочеиспускания»
 - б) ограничение питьевого режима
 - в) профилактика обострений болезни назначением фурагина
 - г) контроль за соблюдением молочно-растительной диеты
- 189 Основные симптомы кори в период разгара болезни:
- а) пятнисто – папулезная сыпь, высыпает сверху вниз
 - б) мелкоточечная сыпь, высыпает одновременно
 - в) интоксикация сохраняется
 - г) интоксикация отсутствует

- 190 Условия обследования на энтеробиоз:
- а) соскоб с перианальных складок
 - б) утром, не подмывая ребёнка
 - в) сбор кала в ёмкость
 - г) утром, после предварительного подмывания ребёнка
- 191 Назовите минимальные данные роста при рождении доношенного ребёнка:
- а) 50 см
 - б) 45 см
 - в) 40 см
 - г) 35 см
- 192 Сестринский процесс при диффузном гломерулонефрите:
- а) контроль за АД
 - б) соблюдение диеты с ограничением соли
 - в) антропометрия
 - г) массаж
- 193 Сестринский процесс при кандидозном стоматите:
- а) кормление из бутылочки
 - б) свободное кормление из груди, соблюдение гигиены
 - в) обработка полости рта бриллиантовым зеленым
 - г) обработка слизистой рта флуконазолом по назначению врача
- 194 Что наблюдают при критическом падении температуры тела у ребенка?
- а) сухой кашель
 - б) падение АД
 - в) боли в животе
 - г) легочное кровотечение
 - д) рвота
- 195 Улучшить отхождение мокроты при продуктивном кашле возможно, если:
- а) Провести вибрационный массаж;
 - б) Поставить горчичники;
 - в) Ввести антибиотики
- 196 Показателями оценки уровня сформированности компетенций являются:
- а) знания
 - б) умения
 - в) способы деятельности
 - г) знания, умения, способы деятельности
- 197 Неспецифическая постнатальная профилактика рахита включает:
- а) сбалансированное питание
 - б) витамин Д
 - в) массаж и гимнастика
 - г) профилактические прививки
- 198 К заменимым нутриентам относятся:
- а) пищевые волокна
 - б) полиненасыщенные жирные кислоты
 - в) углеводы
 - г) аминокислоты

- 199 Учет пробы Манту проводится через:
- а) 96 часов
 - б) 72 часа
 - в) 24 часа
 - г) неделю
- 200 Вакцинацию против паротита проводят в возрасте:
- а) в 18 месяцев
 - б) в 12 месяцев
 - в) в 24 месяца
 - г) с 20 месяцев
- 201 Среднее число детей на педиатрическом участке:
- а) 300-500
 - б) 750-800
 - в) 1000-1200
 - г) 1500-2000
- 202 Термически плохо обработанное мясо может быть источником гельминтоза:
- а) Энтеробиоза
 - б) Трихинеллеза
 - в) Трихоцефалеза
 - г) Аскаридоза
- 203 Первая ревакцинация против полиомиелита проводится:
- а) однократно
 - б) двукратно
 - в) трёхкратно
 - г) не проводится
- 204 Сестринский процесс при гастропатологии предполагает:
- а) осмотр стоматологом и ЛОР - врачом 2 раза в год
 - б) соблюдение диеты, прием пищи 4-6 раз в сутки
 - в) ограничение питьевого режима
 - г) наблюдение в эндокринологическом центре
- 205 К достоверным признакам гипогалактии относятся:
- а) беспокойный сон
 - б) низкая прибавка в массе тела
 - в) редкие мочеиспускания
 - г) диарея
- 206 Профилактика дифтерии:
- а) введение антитоксической сыворотки
 - б) вакцинация АКДС и АДС
 - в) карантин в очаге инфекции 10 дней
 - г) вакцинация ЖКВ
- 207 Факторы риска развития сепсиса у новорожденных:
- а) омфалит
 - б) асфиксия
 - в) везикулопустулез
 - г) резус-конфликт крови плода и матери
- 208 Характеристике доношенного новорожденного ребёнка соответствует:
- а) пушковые волосы по всему телу
 - б) срединное расположение пупочного кольца
 - в) мягкие ушные раковины
 - г) ногти, достигающие до конца ногтевого ложа

- 209 Для периода новорожденности характерны заболевания:
- а) опрелости
 - б) пиодермия
 - в) рахит
 - г) бронхиальная астма
- 210 Для выявления туберкулеза у детей не применяется:
- а) Рентгеноскопия
 - б) Рентгенография
 - в) Реакция Манту
 - г) Диаскинтест
- 211 Причиной полового криза у новорожденного является:
- а) гемолитическая болезнь новорожденных
 - б) поступление гормонов ребёнку от матери
 - в) травма во время родов
 - г) воспалительный процесс в области грудных желез
- 212 Для переносенного новорожденного характерно:
- а) увеличение подкожного жирового слоя
 - б) отсутствие казеозной смазки
 - в) кожа нежная, бархатистая
 - г) мацерация кожи – «рука прачки»
- 213 Профилактика менингококковой инфекции:
- а) взятие мазка из зева на посев у контактных
 - б) взятие крови на посев у контактных
 - в) карантин в очаге 10 дней, осмотр ЛОР-врачом контактных
 - г) карантин 21 день, наблюдение за контактными
- 214 Сестринский процесс при гипотрофии I степени включает:
- а) введение антибиотиков
 - б) контроль за массой тела
 - в) организацию адекватного питания
 - г) контроль за температурой тела
- 215 Ребёнок отличает своих от чужих в возрасте:
- а) 4 месяца
 - б) 5 месяцев
 - в) 6 месяцев
 - г) 7 месяцев
- 216 Пути передачи острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ):
- а) при чихании, кашле
 - б) через продукты питания
 - в) через воду
 - г) при разговоре
- 217 Назовите минимальные данные массы при рождении доношенного ребёнка:
- а) 1 кг 500 г
 - б) 2 кг
 - в) 2 кг 500 г
 - г) 3 кг

- 218 Причина затруднения дыхания при остром ларингите у детей:
- а) отек и воспаление подсвязочного пространства +
 - б) резкая гиперемия зева, отек миндалин
 - в) гнойные налеты в лакунах миндалин
 - г) спазм бронхов
 - д) заложенность и отек слизистой носа
- 219 Сыпь при ветряной оспе в течение болезни меняется следующим образом:
- а) пятно – папула – пузырек – корочка
 - б) пятно – пузырек – корочка
 - в) пятно – пузырек – гнойничок – рубчик
 - г) пузырек – папула – корочка
- 220 Массаж здоровому ребёнку начинают проводить в возрасте:
- а) 2 месяцев
 - б) 1 года
 - в) 3 недель
 - г) 1 месяца
- 221 Что может быть в клинике экссудативно-катарального диатеза?
- а) позднее развитие вторичных половых признаков
 - б) кожный зуд, опрелости, гнейс, молочный струп
 - в) мочекаменная болезнь, подагра
 - г) задержка нервно-психического развития
 - д) задержка физического развития
- 222 Пути оздоровления детей с острой пневмонией включают:
- а) профилактическое назначение антибиотиков
 - б) кислородно-витаминные коктейли
 - в) ЛФК и массаж
 - г) введение иммуноглобулинов
- 223 Критерием эффективности вводимых продуктов или блюд в детском возрасте является:
- а) снижение аппетита, срыгивания, метеоризм
 - б) аллергические проявления
 - в) положительная динамика весо-ростовых показателей
 - г) положительный эмоциональный тонус
- 224 Поздний неонатальный период длится от:
- а) 0 до 28 дня жизни
 - б) 0 до 7 дня жизни
 - в) 8 до 28 дня жизни
 - г) 5 до 28 дня жизни
- 225 Ребёнок до 1 года посещает в первую очередь кабинет:
- а) прививочный
 - б) педиатра
 - в) кабинет здорового ребенка
 - г) кабинет инфекционных заболеваний
- 226 Анатомо-физиологические особенности кожи у детей раннего возраста:
- а) плохо развит роговой слой
 - б) недостаточное кровоснабжение
 - в) хорошо развиты потовые железы
 - г) хорошо развиты сальные железы

- 227 Специфическую профилактику рахита доношенный ребёнок получает с:
- а) рождения
 - б) 3 недель
 - в) 2 месяцев
 - г) 3 месяцев
- 228 Физиологическая потеря массы новорожденного ребёнка составляет в норме не более:
- а) 2-3%
 - б) 3-5%
 - в) 5-10%
 - г) 10-15%
- 229 Количество физкультурных групп:
- а) 2
 - б) 3
 - в) 4
 - г) 5
- 230 В какие сроки проводится первый дородовой патронаж медсестры:
- а) в течение 10 дней после поступления данных их женской консультации
 - б) в течение 1 месяца после поступления данных их женской консультации
 - в) в течение 15 дней после поступления данных их женской консультации
 - г) в течение 2 месяцев после поступления данных их женской консультации
- 231 У ребенка с атопическим дерматитом следует исключить из питания:
- а) красную и черную икру, клубнику, куриное мясо
 - б) капусту, кабачки
 - в) отварную говядину
 - г) зеленые яблоки, белую смородину
- 232 Сколько родничков можно определить у новорождённого:
- а) 2
 - б) 3
 - в) 1
 - г) нет
- 233 Профилактика гельминтозов включает в себя:
- а) вакцинопрофилактику
 - б) обследование на яйца гельминтов
 - в) прием вермокса
 - г) соблюдение личной гигиены
- 234 Форма 112 это:
- а) Дневник группы;
 - б) История развития ребенка;
 - в) Журнал изолятора
- 235 Ребенку с диабетической комой применяют:
- а) инсулин
 - б) пенициллин
 - в) глюкозу
 - г) глюкокортикоиды
- 236 Независимые сестринские вмешательства при рахите:
- а) обучение мамы приемам общего массажа и гимнастики
 - б) назначение витамина Д
 - в) организация рационального питания ребёнка
 - г) назначение лечебных солевых ванн

- 237 Признак не присущий для «белой» лихорадки:
- а) кожа на ощупь холодная, бледная
 - б) кожа на ощупь теплая, розовая
 - в) озноб
 - г) конечности синюшные
 - д) головная боль
- 238 Сестринский уход при ветряной оспе:
- а) контроль за массой тела, АД
 - б) обработка кожи бриллиантовым зеленым, остричь ногти
 - в) туалет полости рта
 - г) изоляция больного на 30 дней
- 239 Сестринский уход при гипотрофии 1 степени:
- а) адекватное вскармливание
 - б) проведение коррекции и расчета питания
 - в) рекомендации прогулок, массажа, гимнастики
 - г) измерение суточного водного баланса
- 240 Основные задачи кабинета здорового ребёнка:
- а) выполнение инъекций
 - б) пропаганда здорового образа жизни
 - в) обучение родителей правилам режима, питания ребёнка
 - г) проведение клинико-лабораторных исследований
- 241 Новорожденного ребенка следует кормить:
- а) через 2,5 часа
 - б) Через 3 часа
 - в) Через 3,5 часа
 - г) По требованию
- 242 Сестринский процесс при железодефицитной анемии:
- а) прогулки на воздухе, хороший гигиенический уход
 - б) прием витамина Д, препаратов кальция
 - в) прием препаратов железа по назначению врача, контроль за питанием
 - г) применение фитотерапии
- 243 Возбудитель туберкулеза:
- а) Вирус
 - б) Микобактерии
 - в) Клостридии
 - г) Рикетсии
- 244 Третья ревакцинация против полиомиелита проводится:
- а) в 6 лет
 - б) в 7 лет
 - в) в 7-8 лет
 - г) в 14 лет
- 245 Особенности костной системы у детей раннего возраста:
- а) в скелете много хрящевой ткани
 - б) много минеральных солей
 - в) склонность к переломам
 - г) относительно толстая надкостница

- 246 Укажите симптомы, характерные для гипогликемической комы
- а) сухость кожных покровов и слизистых
 - б) бледность, потливость
 - в) судороги
 - г) мышечная гипотония
- 247 Не присуще для налетов при локализованной форме дифтерии зева:
- а) налеты имеют серо-белый цвет с перламутровым оттенком
 - б) налеты плохо снимаются шпателем
 - в) налеты легко растираются между шпателями
 - г) при снятии налетов слизистая оболочка кровоточит
 - д) налеты плохо растираются между шпателями
- 248 У ребёнка отмечается «комплекс оживления» в возрасте:
- а) 2 месяца
 - б) 3 месяца
 - в) 4 месяца
 - г) 5 месяца
- 249 Вакцинация против полиомиелита проводится в возрасте:
- а) с 3 месяцев
 - б) с 6 месяцев
 - в) с 10 месяцев
 - г) с 1 года
- 250 Особенности сахарного диабета у детей:
- а) инсулинонезависимый
 - б) инсулинозависимый
 - в) легкое течение заболевания
 - г) часто осложнения в виде комы
- 251 Характерные симптомы рахита в период разгара:
- а) мышечный гипертонус
 - б) мышечная гипотония
 - в) деформация костей
 - г) сухость кожи, чуткий сон
- 252 Сестринский процесс при сахарном диабете:
- а) наблюдение по Ф-30, соблюдение диеты
 - б) обучение правилам введения инсулина
 - в) контроль за суточным диурезом
 - г) назначение фитотерапии, витаминотерапии
- 253 Туберкулинодиагностика проводится:
- а) для выявления инфицированных
 - б) для лечения туберкулеза
 - в) ежегодно, с 1-го года жизни
 - г) 1 раз в 7 лет
- 254 Стул в виде «болотной тины» характерен для:
- а) шигеллеза
 - б) эшерихиоза
 - в) сальмонеллеза
 - г) листериоза

- 255 На первом году жизни ребёнок должен посетить КЗР не менее:
- а) 6 раз
 - б) 5 раз
 - в) 4 раза
 - г) 2 раза
- 256 Первые молочные зубы у здоровых детей появляются:
- а) в 4-5 месяцев
 - б) в 5-6 месяцев
 - в) в 6-7 месяцев
 - г) в 8-9 месяцев
- 257 Интервал между постановкой пробы Манту и ревакцинацией БЦЖ должен быть:
- а) не менее 3 дней и не более 1 месяца
 - б) не менее 2 дней и не более 2 недель
 - в) не менее 3 дней и не более 2 недель
 - г) не менее 5 дней и не более 3 недель
- 258 Специфическая профилактика туберкулеза проводится:
- а) вакциной БЦЖ
 - б) туберкулином
 - в) подкожно
 - г) внутрикожно
- 259 Основные направления деятельности детской поликлиники – работа:
- а) профилактическая
 - б) лечебная
 - в) административно-хозяйственная
 - г) противоэпидемическая
- 260 Профилактика рахита должна начинаться:
- а) в антенатальном периоде
 - б) с 2-3 недель жизни
 - в) с 3 месяцев жизни
 - г) с первых дней жизни
- 261 Возбудитель скарлатины:
- а) стафилококк
 - б) стрептококк
 - в) вирус
 - г) менингококк
- 262 Энтеробиоз вызывается заражением:
- а) трихинеллами
 - б) власоглавом
 - в) острицами
 - г) эхинококком
- 263 Потовые железы начинают функционировать к:
- а) 1 месяцу жизни
 - б) 2 месяцам жизни
 - в) 3-4 месяцам жизни
 - г) 5-6 месяцам жизни

- 264 Ребёнок поворачивается с живота на спину в возрасте:
- а) 4 месяца
 - б) 5 месяцев
 - в) 6 месяцев
 - г) 7 месяцев
- 265 Ребёнок начинает гулить в возрасте:
- а) 2 месяца
 - б) 3 месяца
 - в) 4 месяца
 - г) 5 месяцев
- 266 Для субфебрильной лихорадки присуща температура:
- а) выше 41 С
 - б) 38 — 39 С
 - в) 39 — 41 С
 - г) 37 — 38 С
 - д) 36 — 37 С
- 267 Механизм передачи скарлатины:
- а) воздушно-капельный
 - б) парэнтеральный
 - в) фекально-оральный
 - г) трансмиссивный
- 268 Вакцина против кори проводится:
- а) в 12-15 месяцев
 - б) в 15-18 месяцев
 - в) в 12 месяцев
 - г) по показаниям
- 269 Особенности костной системы у детей раннего возраста:
- а) много хрящевой ткани
 - б) много минеральных солей
 - в) склонность к переломам
 - г) относительно толстая надкостница
- 270 Ревакцинация против кори проводится:
- а) в 6 лет
 - б) в 5-6 лет
 - в) в 6-7 лет
 - г) не проводится
- 271 Что делать при уходе за больным в первой стадии лихорадки?
- а) напоить горячим чаем, тепло укрыть больного
 - б) напоить горячим чаем раскрыть больного
 - в) растереть водой комнатной температуры
 - г) холодный компресс на лоб
- 272 Каковы сроки карантина для контактных детей при эпидемическом паротите:
- а) 17 дней
 - б) 7дней
 - в) 21 день
 - г) 14 дней

- 273 По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье — это:
- а) отсутствие болезней
 - б) нормальное функционирование систем организма
 - в) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
 - г) состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения
- 274 Температура воды для обтирания снижается:
- а) каждые 5-7 дней
 - б) ежедневно
 - в) 1 раз в 2 недели
 - г) 1 раз в месяц
- 275 Что нужно при уходе за больным ветряной оспой:
- а) отсасывать слизь из дыхательных путей
 - б) обрабатывать высыпания раствором бриллиантовой зелени
 - в) производить катетеризацию мочевого пузыря
 - г) строго придерживаться диеты № 1
 - д) периодически давать увлажненный кислород
- 276 Спейсер- это:
- а) порошковый ингалятор
 - б) туманообразователь
 - в) приспособление в виде камер емкостью от 0,3 до 1 м
 - г) ингалятор легкое дыхание
- 277 Ведущий признак крупы:
- а) Инспираторная одышка;
 - б) Повышение температуры;
 - в) Покраснение лица
- 278 Сестринский процесс при пиелонефрите:
- а) стол № 9
 - б) ограничение жидкости
 - в) увеличение питьевого режима
 - г) соблюдение личной гигиены
- 279 Сестринский процесс при эпидемическом паротите:
- а) постельный режим, теплое питье, пища гомогенизированная
 - б) контроль за массой тела, суточным диурезом
 - в) сухое тепло на околоушную область
 - г) масляный компресс на околоушную область
- 280 Для пубертатного периода характерно:
- а) «юношеская» гипертония
 - б) гиперфункция щитовидной железы
 - в) кариес
 - г) тонзиллит
- 281 Дородовые патронажи проводятся на:
- а) 10-12 недели беременности
 - б) 22-24 недели беременности
 - в) 32-34 недели беременности
 - г) 40-42 недели беременности

- 282 Изменения в моче при пиелонефрите:
- а) гематурия
 - б) лейкоцитурия
 - в) глюкозурия
- 283 Сколько признаков являются обязательными по шкале Апгар:
- а) 2
 - б) 3
 - в) 5
 - г) 4
- 284 Дети с хроническим гастроудоденитом наблюдаются в течение:
- а) 2 лет
 - б) 1 года
 - в) 5 лет
 - г) 3 лет
- 285 Рахит – это заболевание, характерное для:
- а) новорожденных
 - б) детей раннего возраста
 - в) всех возрастов
 - г) периода вытяжения
- 286 Для обработки естественных складок кожи используют:
- а) раствор фурацилина 1:5000
 - б) 3% раствор йода
 - в) стерильное растительное масло
 - г) кипячёную воду
- 287 Для грудного возраста характерны заболевания:
- а) ветряная оспа
 - б) тонзиллит
 - в) гипотрофия
 - г) анемия
- 288 Укажите, сколько раз проводят диагностику НПР у ребёнка до 1 года жизни:
- а) 14
 - б) 12
 - в) 6
 - г) 2
- 289 Для подтверждения фенилкетонурии исследованию подлежит:
- а) Кровь;
 - б) Моча;
 - в) Кал
- 290 Мероприятия в очаге инфекции вирусного гепатита А:
- а) карантин 35 дней
 - б) карантин 15 дней
 - в) заключительная дезинфекция
 - г) взятие мазка из зева на бак посев
- 291 Диспансеризация при остром гломерулонефрите предусматривает:
- а) контроль за анализами мочи и крови, АД, соблюдением диеты
 - б) осмотр стоматологом, ЛОР-врачом, окулистом, нефрологом
 - в) исследование функции внешнего дыхания
 - г) исследование сахара в крови

- 292 Область потери подкожно-жировой клетчатки при гипотрофии 2 степени:
- а) конечности
 - б) лицо
 - в) комочки Биша
 - г) шея
- 293 Проба Сулковича проводится для определения:
- а) сахара в моче
 - б) сахара в крови
 - в) кальция в моче
 - г) ацетона в моче
- 294 Пути передачи вирусного гепатита В:
- а) воздушно-капельный
 - б) парэнтеральный
 - в) пищевой
 - г) трансплацентарный
- 295 У новорождённых выделяют группы риска:
- а) 2
 - б) 4
 - в) 5
 - г) 6
- 296 Стресс – это:
- а) нервное напряжение
 - б) вид дистресса
 - в) неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему требование
 - г) состояние организма, возникающее в результате воздействия различных факторов и характеризующееся напряжением неспецифических адаптационных механизмов
- 297 Соки и фруктовое пюре вводятся при естественном вскармливании с (в месяцах):
- а) 3-4
 - б) 2-3
 - в) 4-5
 - г) 5-6
- 298 Нормальный уровень глюкозы в крови натощак составляет:
- а) 1,2 – 3,2 ммоль/л
 - б) 3,3 -5,5 ммоль/л
 - в) 5,6 – 7,2 ммоль/л
 - г) 7,3 – 8,5 ммоль/л
- 299 Ревакцинация против туберкулёза проводится:
- а) 1 ревакцинация в 7 лет, 2 ревакцинация в 14 лет
 - б) 1 ревакцинация в 6-7 лет, 2 ревакцинация в 15-16 лет
 - в) 1 ревакцинация в 7-8 лет, 2 ревакцинация в 14-15 лет
 - г) в 7 лет
- 300 Неонатальный скрининг проводится для выявления:
- а) Лейциноза
 - б) Гемолитической болезни новорожденного
 - в) Галактоземии
 - г) Гипертиреоза