

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ  
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ»  
(для медицинских сестёр детских хирургических отделений и кабинетов, прошедших  
обучение по циклам 16.4 "Сестринское дело в детской хирургии",  
профессиональной переподготовки по специальности  
"Сестринское дело в педиатрии")**

- 1 Указать хирургические инструменты, которые относятся группе разъединяющих тканей:
  - а) Скальпели
  - б) Жомы желудочные
  - в) Ложки острые
- 2 Характерным признаком вывиха является:
  - а) отек мягких тканей
  - б) кровоподтек в области сустава
  - в) ограничение движений в суставе из-за боли
  - г) отсутствие движений в суставе
- 3 Характерный признак рака прямой кишки:
  - а) тошнота, рвота
  - б) отсутствие аппетита
  - в) патологические выделения из прямой кишки
  - г) диарея
- 4 Экзогенный путь проникновения инфекции в рану из:
  - а) разрушенных кариесом зубов
  - б) внешней среды
  - в) воспаленных миндалин
  - г) пораженных почек
- 5 Причина обтурационной острой кишечной недостаточности:
  - а) каловые камни
  - б) спазм кишечника
  - в) ущемлённая грыжа
  - г) парез кишечника
- 6 Положение больного в постели до выхода из наркоза:
  - а) Фовлера
  - б) Тренделенбурга
  - в) горизонтальное на спине, голова на подушке, повернута на бок
  - г) горизонтальное на спине без подушки, голова повернута на бок
- 7 Репозиция проводится при:
  - а) всех переломах
  - б) при переломах без смещения
  - в) при переломах со смещением отломков
  - г) не проводится
- 8 Основной метод лечения доброкачественных опухолей:
  - а) оперативное лечение
  - б) химиотерапия
  - в) лучевая терапия
  - г) комплексное лечение

- 9 Возможные общие реакции организма на травму:
- а) боль
  - б) деформация
  - в) отёк
  - г) коллапс
- 10 Характерный признак термического ожога 2 степени:
- а) отек и гиперемия кожи
  - б) обугливание
  - в) появление пузырей и раневой поверхности с сохранением болевой чувствительности
  - г) появление пузырей и раневой поверхности с отсутствием болевой чувствительности
- 11 Смена нательного и постельного белья пациента проводится:
- а) по мере загрязнения
  - б) через каждые 7 дней
  - в) по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 10 дней
  - г) по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 дней
- 12 Дренирование ран лежит в основе антисептики:
- а) химической
  - б) физической
  - в) механической
  - г) биологической
- 13 У пациента с термическим ожогом после вскрытия пузырей прикосновение к ожоговой поверхности вызывает резкую боль. Какая степень ожога у пациента:
- а) 1 степень
  - б) 2 степень
  - в) 3 Б степень
  - г) 4 степень
- 14 Площадь ладонной поверхности кисти человека составляет (в %):
- а) 1
  - б) 2
  - в) 9
  - г) 10
- 15 При подозрении на прободение язвы медицинская сестра:
- а) вводит метамизол натрия
  - б) обеспечивает полный покой пациенту
  - в) промывает желудок
  - г) кладет грелку на живот
- 16 При наборе лекарственных средств игла во флакон вводится под углом \_\_\_\_ градусов:
- а) 60
  - б) 90
  - в) 45
  - г) 30

- 17 Физический метод остановки кровотечения - это:
- а) пальцевое прижатие сосуда
  - б) лазерный луч
  - в) максимальное сгибание
  - г) пузырь со льдом
- 18 У пациентов с травматическим шоком показатели гемодинамики будут:
- а) АД повышено, брадикардия
  - б) АД понижено, тахикардия
  - в) АД понижено, брадикардия
  - г) показатели гемодинамики не изменены
- 19 Приоритетная потенциальная проблема у пациента в первые сутки после наложения циркулярной гипсовой повязки:
- а) риск развития мышечных атрофий
  - б) боль в области травмы
  - в) риск развития контрактур
  - г) риск нарушения кровоснабжения конечности из-за сдавления повязкой
- 20 Операция удаления части органа называется:
- а) резекция
  - б) эктомия
  - в) ампутация
  - г) экстирпация
- 21 Функциональное назначение окклюзионной повязки:
- а) герметизация раны
  - б) защита раны от инфицирования
  - в) устранение деформации
  - г) воздействие лекарственных веществ
- 22 При обнаружении повязки, пропитанной кровью, действия медицинской сестры начинаются с:
- а) подбинтования повязки
  - б) вызова врача
  - в) измерения АД
  - г) введения викасола
- 23 Условия для заживления раны первичным натяжением:
- а) края ровные, хорошо соприкасаются
  - б) края раны неровные, рана зияет
  - в) рана нагноилась
  - г) наличие инородного тела в ране
- 24 Для дезинфекции и стерилизации применяется раствор перекиси водорода:
- а) 6%
  - б) 1%
  - в) 2%
  - г) 3%

- 25 При переломе плеча активные движения в суставе:
- а) отсутствуют
  - б) возможны, резко болезненны
  - в) в полном объеме, безболезненны
  - г) в полном объеме, умеренно болезненны
- 26 У пациентов с геморрагическим шоком (торпидная фаза) показатели гемодинамики будут:
- а) АД повышено, брадикардия
  - б) АД понижено, тахикардия
  - в) АД понижено, брадикардия
  - г) показатели гемодинамики не изменены
- 27 Терминальные состояния - это:
- а) обморок, коллапс, клиническая смерть
  - б) преагония, агония, клиническая смерть
  - в) агония, клиническая смерть, биологическая смерть
- 28 Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием:
- а) личность;
  - б) индивид;
  - в) человек;
  - г) индивидуальность;
  - д) субъект
- 29 Применение перекиси водорода относится к методу антисептики
- а) физическому
  - б) химическому
  - в) механическому
  - г) биологическому
- 30 Протяженность транспортной иммобилизации при переломе бедра:
- а) пальцы-крыло подвздошной кисти
  - б) пальцы-тазобедренный сустав
  - в) пальцы-верхняя треть бедра
  - г) пятка-треть бедра
- 31 Перед введением любого лекарственного средства медицинская сестра обязательно:
- а) проверяет срок годности
  - б) подогревает лекарственное средство
  - в) проводит пробу на наличие аллергической реакции
  - г) разводит лекарственное средство физиологическим раствором
- 32 Вид повязки при переломе плеча со смещением:
- а) торакобрахиальная
  - б) кокситная
  - в) лонгетная
  - г) створчатая

- 33 К предоперационным факторам риска госпитальных хирургических раневых инфекций относятся все указанные, кроме:
- а) продолжительность предоперационного пребывания в стационаре,
  - б) отсутствие или неадекватность предоперационной антибиотикопрофилактики,
  - в) квалификация хирурга,
  - г) неадекватное бритье кожи в области хирургического вмешательства
- 34 Бритье операционного поля проводится:
- а) вечером накануне операции
  - б) утром в день операции
  - в) непосредственно перед операцией
  - г) время бритья не имеет значения
- 35 Открытый пневмоторакс - это:
- а) скопление воздуха в плевральной полости, попавшего туда при ранении
  - б) свободное движение воздуха через рану при вдохе и выдохе
  - в) поступление воздуха в плевральную полость при вдохе
  - г) скопление крови в плевральной полости
- 36 Мелена является признаком кровотечения из:
- а) прямой кишки
  - б) желудка
  - в) тонкого кишечника
  - г) толстого кишечника
- 37 Активное ведение послеоперационного периода применяют для:
- а) профилактики нарушений дыхания после операции
  - б) профилактики послеоперационных тромбозов и тромбоэмболий
  - в) профилактики пролежней
  - г) верно все вышеперечисленное
- 38 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие пульса на:
- а) локтевой артерии
  - б) лучевой артерии
  - в) сонной артерии
  - г) бедренной артерии
- 39 После переливания эритроцитарной массы у пациента появилась моча бурого цвета. Это свидетельствует о развитии:
- а) сывороточного гепатита
  - б) острого гемолиза
  - в) анафилактического шока
  - г) острой сердечно-сосудистой недостаточности
- 40 Премедикация перед наркозом включает в себя:
- а) местный анестетик, антигистаминный препарат, атропин
  - б) наркотический анальгетик, антигистаминный препарат, атропин
  - в) наркотический анальгетик, антигистаминный препарат, адреналин
  - г) периферический анальгетик, антигистаминный препарат, адреналин

- 41 Транспортная шина для фиксации перелома бедра:
- а) Еланского
  - б) Дитерихса
  - в) Белера
  - г) ЦИТО
- 42 Реанимацию обязаны проводить:
- а) только врачи и медсестры реанимационных отделений
  - б) все специалисты, имеющие медицинское образование
  - в) все взрослое население
- 43 Термометрия проводится:
- а) через 30 минут после сна
  - б) через 120 минут после сна
  - в) сразу после сна
  - г) сразу после еды
- 44 Пациент имеет право на:
- а) на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья;
  - б) соблюдение режима лечения, в том числе определенного на период временной нетрудоспособности;
  - в) выбор врача и выбор медицинской организации;
  - г) осуществление рекламы лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания
- 45 Длительная рвота при пилоростенозе у новорожденного приводит к развитию:
- а) пневмонии
  - б) токсикоза
  - в) эксикоза
  - г) гипертрофии
- 46 При оказании неотложной помощи пациенту с прободной язвой желудка следует:
- а) применить теплую грелку на живот
  - б) по назначению врача ввести анальгетики
  - в) по назначению врача ввести спазмолитики
  - г) обеспечить пациенту покой и удобное положение при транспортировке в стационар
- 47 Боль при остром аппендиците в начале заболевания может возникнуть:
- а) в эпигастральной области
  - б) в левой подвздошной области
  - в) в правой подвздошной области
  - г) в любой части живота
- 48 Вздутие живота, отсутствие отхождения стула и газов у пациента после операции на брюшной полости являются симптомами:
- а) внутреннего кровотечения
  - б) кишечной инфекции
  - в) дисбактериоза кишечника
  - г) пареза кишечника

- 49 Смена спецодежды хирургического персонала должна осуществляться:
- а) ежедневно
  - б) 2 раза в неделю
  - в) по мере загрязнения
  - г) ежедневно и по мере загрязнения
- 50 Инкубационный период ботулизма составляет:
- а) 4-6 часов
  - б) 4-6 дней
  - в) 40-60 минут
  - г) 24 часа
- 51 Эндогенный путь проникновения инфекции в рану
- а) воздушно-капельный
  - б) контактный
  - в) воздушно-пылевой
  - г) лимфогенный
- 52 Признак нагноения послеоперационной раны:
- а) гиперемия и отек кожи вокруг раны
  - б) цианоз кожи вокруг раны
  - в) бледность кожи вокруг раны
  - г) промокание повязки кровью
- 53 Участниками обязательного медицинского страхования являются:
- а) застрахованные лица;
  - б) страховые медицинские организации;
  - в) страхователи;
  - г) федеральный фонд.
- 54 Соотношение компрессий на грудину и искусственных вдохов при проведении реанимации:
- а) 2:15
  - б) 3:6
  - в) 30:2
  - г) 1:5
- 55 При ущемленной грыже необходимо:
- а) вправить грыжу в брюшную полость
  - б) готовить пациента к операции
  - в) ввести обезболивающее
  - г) ввести спазмолитик
- 56 После гемотрансфузии медсестра следит за:
- а) пульсом
  - б) пульсом и АД
  - в) пульсом, АД, температурой тела и диурезом
  - г) диурезом
- 57 Устранить повышенное газообразование в послеоперационный период возможно с помощью:
- а) назначения активированного угля и газоотводной трубки;
  - б) очистительной клизмы;
  - б) Приема атропина

- 58 Если повязка после операции быстро намокает, медсестра должна:
- а) Вызвать врача
  - б) Заменить повязку на новую
  - в) Убрать все слои старой повязки
- 59 Первая помощь больному с носовым кровотечением начинается с:
- а) придания нужного положения
  - б) наложения пращевидной повязки
  - в) переливания крови
  - г) введения викасола
- 60 Волосистой фолликул воспаляется при:
- а) флегмоне
  - б) фурункуле
  - в) гидрадените
  - г) лимфадените
- 61 Симптом перемежающейся хромоты - основной признак:
- а) лимфангита
  - б) облитерирующего эндартериита
  - в) варикозной болезни вен нижних конечностей
  - г) лимфостаза нижних конечностей
- 62 Срок сохранения стерильности стерильного стола:
- а) 3 часа
  - б) 6 часов
  - в) 12 часов
  - г) 24 часа
- 63 Показания к введению антирабической сыворотки:
- а) рана укушенная
  - б) рана колотая
  - в) рана огнестрельная
  - г) рана любого происхождения
- 64 Наиболее опасное осложнение геморроя:
- а) кровотечение
  - б) выпадение геморроидальных узлов
  - в) кровопотеря вследствие кровотечения
  - г) дерматит
- 65 Выберите компоненты пробы на индивидуальную совместимость по системе АВО:
- а) сыворотка реципиента и кровь донора
  - б) плазма донора и сыворотка реципиента
  - в) плазма реципиента и сыворотка донора
  - г) сыворотка донора и кровь реципиента
- 66 Факторами свидетельствующими о ранении сердца являются
- а) локализация раны
  - б) резкое снижение АД и тахикардия
  - в) внешний вид больного
  - г) брадикардия и снижение АД



- 67 Симптомы, характерные для нарушения венозного оттока крови от конечности:
- а) бледность и похолодание кожи
  - б) цианоз и отек конечности
  - в) атрофия мышц
  - г) отсутствие периферического пульса на артериях
- 68 Здоровый образ жизни включает в себя:
- а) благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе поведенческой, гигиенические навыки
  - б) состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
  - в) принятие мер, направленных на снижение влияния вредных факторов на организм человека
  - г) привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом
- 69 Операцию трепанация черепа выполняют при:
- а) линейных переломах свода черепа
  - б) сдавлениях головного мозга гематомой
  - в) переломах основания черепа
  - г) ушибе головного мозга
- 70 Положение больного в постели для профилактики метеоризма:
- а) горизонтальное на спине
  - б) Тренделенбурга
  - в) Фаулера
  - г) не имеет значения
- 71 Для контроля стерильности хирургического инструментария используют:
- а) термовременные индикаторы
  - б) фенолфталеиновую пробу
  - в) азопирамовую пробу
  - г) бактериологический контроль
- 72 Одной из причин кровопотери является:
- а) длительно кровоточащая язва желудка
  - б) подкожная гематома
  - в) разрыв селезенки
  - г) трещина заднего прохода
- 73 Экстренная профилактика столбняка проводится при:
- а) любых ожогах
  - б) электротравмах
  - в) случайных ранах
  - г) любой хирургической инфекции
- 74 Причины развития трофических язв:
- а) сахарный диабет
  - б) повреждение магистрального сосуда
  - в) тромбоз бедренной вены
  - г) облитерирующий атеросклероз
  - д) варикозная болезнь

- 75 Опасным осложнением тромбоза вен нижних конечностей является тромбоэмболия:
- а) сосудов мозга
  - б) коронарных артерий
  - в) легочной артерии
  - г) легочных вен
- 76 Кровоизлияние - это:
- а) скопление крови в тканях
  - б) диффузное пропитывание тканей кровью
  - в) скопление крови в плевральной полости
  - г) скопление крови в полости сустава
- 77 Антисептика - это:
- а) уничтожение болезнетворных микробов
  - б) уничтожение всего живого
  - в) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, в организме
  - г) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану, в организм
- 78 К факторам риска пациента при развитии госпитальных хирургических раневых инфекций относится:
- а) характер основного и сопутствующих заболеваний,
  - б) длительность операции,
  - в) продолжительность предоперационного пребывания пациента в стационаре,
  - г) степень чистоты операционной раны
- 79 Инкубационный период вирусного гепатита В составляет (в днях):
- а) 1-3
  - б) 7-70
  - в) 35
  - г) 120-180
- 80 Закрытый пневмоторакс - это:
- а) скопление воздуха в плевральной полости, попавшего туда при ранении
  - б) свободное движение воздуха через рану при вдохе и выдохе
  - в) постоянное поступление воздуха в плевральную полость при вдохе
  - г) скопление крови в плевральной полости
- 81 Злокачественная опухоль:
- а) растет медленно
  - б) не прорастает в окружающие ткани
  - в) не метастазирует
  - г) рецидивирует
- 82 От ребенка с гипергликемической комой чувствуется запах:
- а) сладковатый
  - б) «мышинный»
  - в) аммиака
  - г) ацетона

- 83 Выберите устные средства санитарного просвещения:
- а) беседа, лекция
  - б) фотография, плакат
  - в) брошюра, журнал
  - г) бюллетень, буклет
- 84 Использование протеолитических ферментов лежит в основе антисептики:
- а) механической
  - б) физической
  - в) химической
  - г) биологической
- 85 Хирургический метод лечения облитерирующего эндартериита:
- а) симпатэктомия
  - б) флебэктомия
  - в) аутопластика
  - г) ПХО (первичная хирургическая обработка)
- 86 Наиболее часто выполняемая операция при доброкачественной гиперплазии предстательной железы:
- а) трансуретральная электрорезекция (ТУР)
  - б) эпицистостомия
  - в) открытая аденомэктомия
  - г) стентирование
- 87 Воспаление лимфатических сосудов называется:
- а) абсцесс
  - б) лимфаденит
  - в) гидраденит
  - г) лимфангит
- 88 Яркая краснота с четкой границей характерна для:
- а) сепсиса
  - б) остеомиелита
  - в) рожистого воспаления
  - г) лимфаденита
- 89 Способ окончательной остановки паренхиматозного кровотечения:
- а) переливание крови
  - б) антикоагулянты
  - в) холод на живот
  - г) операция
- 90 Текущая уборка в перевязочном кабинете проводится:
- а) в течение всего рабочего дня
  - б) в начале рабочего дня
  - в) в конце рабочего дня
  - г) 1 раз в неделю
- 91 Плановая вакцинация осуществляется для предупреждения заболеваний:
- а) сальмонеллеза
  - б) столбняка
  - в) спленита
  - г) скарлатины

- 92 Биологическая антисептика предусматривает применение
- а) гипериммунной плазмы
  - б) первичной хирургической обработки ран
  - в) дренирования ран
  - г) раствора перекиси водорода
- 93 При оказании неотложной помощи пациентам с термическими ожогами охлаждение непосредственно ожоговой поверхности холодной водой применяется при ожогах:
- а) 2 степени с не вскрывшимися пузырями
  - б) 3 степени со вскрывшимися пузырями
  - в) 4 степени
  - г) 5 степени
- 94 Первичная хирургическая обработка раны подразумевает:
- а) Удаление гноя
  - б) Остановку кровотечения
  - в) Иссечение краев и стенок раны
- 95 Вид санитарной обработки пациента перед экстренной операцией:
- а) частичная санитарная обработка
  - б) полная санитарная обработка
  - в) гигиеническая ванна
  - г) обработка не проводится
- 96 К осложнениям вирусного гепатита С относится:
- а) дисбактериоз
  - б) цирроз печени
  - в) миокардит
  - г) спланхоптоз
- 97 Абсолютным признаком вывиха является:
- а) пружинящая фиксация
  - б) нарушение функции
  - в) боль
  - г) отек
- 98 Приказ МЗ СССР «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране»:
- а) № 720
  - б) № 408
  - в) № 249
  - г) № 490
- 99 Специфическая профилактика проводится при гепатите:
- а) А
  - б) С
  - в) Е
  - г) F

- 100 При оказании неотложной помощи пациентам с химическими ожогами первоочередным мероприятием является:
- а) наложение стерильной повязки
  - б) проведение нейтрализации
  - в) промывание ожоговой раны под проточной водой в течение 20-30 минут
  - г) обезболивание
- 101 Пациенту с хронической почечной недостаточностью
- а) следует ограничивать употребление продуктов богатых:
  - б) белками
  - в) углеводами
  - г) клетчаткой
  - д) калием
- 102 Факторы, определяющие длительность предоперационного периода:
- а) характер заболевания
  - б) вид обезболивания
  - в) состояние больного
  - г) срочность выполнения операции
- 103 Подготовка к операции на прямой кишке включает:
- а) легкий завтрак
  - б) промывание желудка
  - в) очистительная клизма накануне операции
  - г) очистительные клизмы накануне и в день операции
- 104 В операционном блоке посевы воздуха производят
- а) 4 раза в месяц
  - б) 1 раз в месяц
  - в) 1 раз в 3 месяца
  - г) 1 раз в 2 месяца
- 105 Показание для ампутации конечностей:
- а) сухой некроз
  - б) влажный некроз
  - в) обширная венозная язва
  - г) атеросклеротическая язва
- 106 Для промывания ран применяется раствор перекиси водорода:
- а) 6%
  - б) 1%
  - в) 2%
  - г) 3%
- 107 К психическим процессам относятся:
- а) воля
  - б) память
  - в) характер
  - г) темперамент
  - д) способности

- 108 Физиологическая проблема пациента в послеоперационном периоде:
- а) дефицит знаний
  - б) беспокойство по поводу исхода операции
  - в) чувство одиночества
  - г) боль в области послеоперационной раны
- 109 Медицинские работники имеют право на:
- а) оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
  - б) совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях;
  - в) соблюдение врачебной тайны;
  - г) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя
- 110 При подготовке к операции на прямой кишке очистительная клизма ставится:
- а) вечером накануне операции
  - б) утром в день операции
  - в) накануне вечером и утром в день операции
  - г) утром накануне операции
- 111 При облитерирующем атеросклерозе наблюдается:
- а) расширение подкожных вен
  - б) лимфатические отеки
  - в) чувство жара в конечности
  - г) симптом «перемежающейся хромоты»
- 112 Первоочередной эвакуации подлежат пораженные сортировочной группы:
- а) первой
  - б) второй
  - в) третьей
  - г) четвертой
- 113 Повторный осмотр на педикулез в отделении проводится:
- а) ежедневно
  - б) через 10 дней
  - в) через 14 дней
  - г) при выписке
- 114 Указать одно из условий для развития хирургической инфекции:
- а) Сохранение целостности кожных покровов
  - б) Снижение резистентности бактерий
  - в) Наличие «входных ворот» для возбудителей
- 115 Опасность кровотечения заключается в возникновении следующих состояний:
- а) Шок, лейкопения
  - б) Шок, коллапс, анемия
  - в) Лейкоцитоз, ацидоз

- 116 При оказании неотложной помощи больному с обмороком его укладывают:
- а) строго горизонтально
  - б) с приподнятым головным концом
  - в) с приподнятым ножным концом
  - г) на бок
- 117 Подсчёт дыхательных движений у грудного ребёнка оптимально проводить:
- а) после сна
  - б) после кормления
  - в) при пеленании
  - г) во время сна
- 118 Устройством, предназначенным для введения в организм лекарственных средств аэрозольным способом, является:
- а) небулайзер
  - б) кислородная лицевая маска
  - в) мешок Амбу
  - г) носовая канюля
- 119 Тактика медсестры при обнаружении у новорожденного ребёнка мelenы предполагает:
- а) вызов врача, пеленки с меленой сохранить
  - б) проведение гемостатической терапии, вызов врача
  - в) отсасывание слизи, вызов врача
  - г) промывание желудка, вызов врача
- 120 Сотрясение головного мозга от ушиба мозга отличается:
- а) наличием "светлого промежутка"
  - б) нарушением сна
  - в) наличием повышенного АД
  - г) отсутствием очаговой симптоматики
- 121 Независимое сестринское вмешательство в предоперационном периоде:
- а) проведение премедикации
  - б) введение антибиотиков
  - в) постановка мочевого катетера
  - г) психологическая подготовка пациента
- 122 Оказание помощи при анафилактическом шоке начинается с:
- а) прекращения введения аллергена
  - б) предания дренажного положения пострадавшему
  - в) введения адреналина
  - г) применения холода на место инъекции
- 123 Кровотечение по направлению тока крови:
- а) явное
  - б) внутреннее
  - в) паренхиматозное
  - г) наружное
- 124 Симптомами желудочного кровотечения является:
- а) дегтеобразный стул
  - б) стул с алой кровью
  - в) стул «болотной тины»
  - г) стул по типу «рисового отвара»

- 125 Через какое время микроорганизмы в ране начинают проявлять свою активность:
- а) 14 часов
  - б) 6-8 часов
  - в) 24 часа
- 126 В каком случае для временной остановки кровотечения применяется наложение жгута:
- а) при ранении бедренной артерии
  - б) при капиллярном кровотечении
  - в) при ранении вен голени
  - г) при паренхиматозном кровотечении
- 127 Гидрофобия - это основной клинический признак:
- а) ботулизма
  - б) бешенства
  - в) газовой гангрены
  - г) отравления угарным газом
- 128 Время постановки очистительной клизмы перед плановыми операциями:
- а) вечером накануне операции
  - б) за сутки до операции
  - в) утром в день операции
  - г) клизма не ставится
- 129 Местный симптом эритематозной формы рожистого воспаления:
- а) разлитая гиперемия кожи
  - б) гиперемия и отек кожи с четкими границами
  - в) появление пузырей
  - г) размягчение инфильтрата
- 130 Источником бешенства являются:
- а) дикие животные
  - б) дикие птицы
  - в) домашние птицы
  - г) насекомые
- 131 Метод окончательной остановки кровотечения при повреждении аорты:
- а) Наложение сосудистого шва
  - б) Перевязка сосуда на протяжении
  - в) Тампонада раны
- 132 Характер боли при нагноении послеоперационной раны:
- а) пульсирующая, дергающая боль в области раны
  - б) несильная боль при движениях в области раны
  - в) постоянная тянущая боль в области раны
  - г) боль в ране, возникающая при ходьбе
- 133 Типичное расположение аппендикса:
- а) в эпигастральной области
  - б) в левой подвздошной области
  - в) в правой подвздошной области
  - г) в правом подреберье



- 134 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и прогноза исхода, пораженные выделяются в группы:
- а) две
  - б) три
  - в) четыре
  - г) пять
- 135 Дренаж в гнойную рану вводят для:
- а) ускорения эпителизации
  - б) остановки кровотечения
  - в) обеспечения оттока отделяемого
  - г) проведения тампонады
- 136 Виды сестринских вмешательств :
- а) Независимые
  - б) Зависимые
  - в) Взаимозависимые
  - г) все ответы верны
- 137 Неотложная доврачебная помощь при перегревании ребёнка:
- а) укутывание ребёнка
  - б) помещение ребёнка в тень на открытую площадку
  - в) введение преднизолона
  - г) проведение сердечно-легочной реанимации
- 138 Кратковременная, бурно протекающая, чрезвычайно интенсивная эмоциональная реакция:
- а) фрустрация
  - б) аффект
  - в) настроение
  - г) депрессия
  - д) стресс
- 139 При проведении гемотрансфузии во время биологической пробы:
- а) обязательно присутствие врача
  - б) не обязательно присутствие врача
  - в) медсестра может проводить биологическую пробу самостоятельно
  - г) биологическая проба при гемотрансфузии не проводится
- 140 Цель применения холода на рану после операции:
- а) предупреждение развития инфекции в ране
  - б) предупреждение расхождения швов
  - в) предупреждение кровотечения
  - г) уменьшение боли
- 141 Первая порция воды для промывания желудка детям составляет \_\_\_\_ мл на кг веса:
- а) 50
  - б) 5
  - в) 15
  - г) 25

- 142 Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции включают:
- а) вакцинацию населения
  - б) антибиотикотерапию
  - в) санитарно - просветительную работу среди населения
  - г) изоляцию больных и инфицированных
- 143 Дезинфицирующие средства должны храниться:
- а) в шкафу общего списка лекарств
  - б) отдельно от лекарств
  - в) в шкафу для наружных лекарственных средств
  - г) в шкафу по списку «В»
- 144 Стерильные перчатки требуются для выполнения:
- а) забора внутривенной крови для биохимического исследования,
  - б) внутримышечной инъекции,
  - в) катетеризации мочевого пузыря,
  - г) забора крови из пальца
- 145 Метод переливания компонентов крови при проведении биологической пробы:
- а) струйно
  - б) капельно- 10-20 капель в минуту
  - в) капельно- 40-60 капель в минуту
  - г) капельно-20-30 капель в минуту
- 146 При аутоиммунном гепатите у детей в крови повышается уровень:
- а) протромбина
  - б) непрямого билирубина
  - в) общего белка
  - г) прямого билирубина
- 147 Гипертонический раствор хлорида натрия в лечении гнойных ран применяется с целью:
- а) уничтожения микрофлоры в ране
  - б) дренирования ран
  - в) стимуляции роста грануляций
  - г) удаления некротических тканей
- 148 Возможные послеоперационные осложнения после операции на брюшной полости
- а) развитие межкишечных свищей
  - б) перитонит
  - в) развитие острой кишечной непроходимости
- 149 Характерный признак геморроя:
- а) хронические запоры
  - б) дегтеобразный стул
  - в) наличие параректальных свищей
  - г) выделение алой крови при дефекации

- 150 Характерным (достоверным) признаком проникающего ранения живота является:
- а) истечение крови из раны
  - б) выпадение внутренних органов в рану
  - в) зияние раны
  - г) боль в области раны
- 151 Возбудителем бешенства являются:
- а) простейшие
  - б) бактерии
  - в) грибы
  - г) вирусы
- 152 Премедикация перед полостной операцией под местной анестезией включает в себя:
- а) местный анестетик, антигистаминный препарат, атропин
  - б) наркотический анальгетик, антигистаминный препарат, атропин
  - в) наркотический анальгетик, антигистаминный препарат, адреналин
  - г) периферический анальгетик, антигистаминный препарат, адреналин
- 153 При оказании неотложной помощи пациенту с ущемленной грыжей следует:
- а) попытаться вправить грыжу
  - б) по назначению врача ввести анальгетики
  - в) по назначению врача ввести спазмолитики
  - г) обеспечить пациенту покой и удобное положение при транспортировке в стационар
- 154 Правила применения грелки:
- а) температура воды в грелке 60-70°C
  - б) температура воды в грелке 70-80°C
  - в) температура воды в грелке 40-50°C
  - г) температура воды в грелке 36-37°C
- 155 Чем отличается первичная хирургическая обработка раны от вторичной:
- а) техникой
  - б) сроком выполнения
  - в) числом перевязок
- 156 Протеолитические ферменты в лечении гнойных ран применяются с целью:
- а) обезболивания
  - б) улучшения кровоснабжения
  - в) стимуляции роста грануляций
  - г) удаления некротических тканей
- 157 Алая кровь в стуле наблюдается при кровотечении из:
- а) пищевода
  - б) желудка
  - в) печени
  - г) прямой кишки

- 158 Одноразовые лицевые маски с влагонепроницаемым слоем защищают участок операции в течении:
- а) 20 минут на 60%
  - б) 1 часа на 70%
  - в) 4 часов на 99,8%
- 159 Одноразовую систему после инфузионной терапии необходимо
- а) выбросить сразу
  - б) разрезать, замочить в дезрастворе
  - в) сдать старшей медсестре
  - г) промыть проточной водой
- 160 Ботулизм - это:
- а) острая форма отравления
  - б) острая бактериальная инфекция
  - в) острое вирусное заболевание
  - г) зоонозное инфекционно-аллергическое заболевание
- 161 Планирование сестринского ухода осуществляется на этапе:
- а) первом
  - б) втором
  - в) третьем
  - г) четвёртом
- 162 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
- а) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
  - б) лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей,
  - в) в целях проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях;
  - г) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучени
- 163 Самым частым возбудителем хирургической инфекции является:
- а) стрептококк
  - б) стафилококк
  - в) палочка Коха
  - г) вирус гепатита В
- 164 Классификация кровотечения по анатомической классификации:
- а) артериальное, венозное, капиллярное, паренхиматозное
  - б) Наружное, внутреннее
  - в) Первичное, вторичное

- 165 Цель санитарного просвещения:
- а) формирование высокой санитарной культуры, сознательного гигиенического поведения граждан
  - б) нетерпимое и критичное отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к условиям окружающей среды, наносящим ущерб здоровью
  - в) правильное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленное на выздоровление
  - г) овладение знаниями, необходимыми для соблюдения правил гигиенического поведения
- 166 Для местной инфильтрационной анестезии применяется раствор новокаина:
- а) 5%
  - б) 1%
  - в) 2%
  - г) 0,25%
- 167 Признаки сдавления конечности гипсовой повязкой с нарушением венозного оттока крови:
- а) кожа дистальной части конечности бледная, холодная
  - б) периферический артериальный пульс отсутствует
  - в) дистальная часть конечности отечная
  - г) дистальная часть конечности отечная и синюшная
- 168 Показания для гастроскопии:
- а) непроходимость пищевода
  - б) язва желудка
  - в) кишечное кровотечение
  - г) рак прямой кишки
- 169 Температурный режим, который необходим для определения группы крови:
- а) 15-25 градусов
  - б) 35 градусов
  - в) 10-25 градусов
- 170 Диагностический признак ранения почек:
- а) кровотечение
  - б) падение АД
  - в) тахикардия
  - г) запах мочи из раны
- 171 Функциональное назначение защитной повязки:
- а) остановка кровотечения
  - б) постоянный доступ лекарственного вещества
  - в) профилактика вторичного инфицирования
  - г) герметизация раны
- 172 При размягчении воспалительного инфильтрата применяется:
- а) компресс с мазью Вишневского
  - б) вскрытие и дренирование гнойника
  - в) теплая грелка
  - г) пузырь со льдом

- 173 Для контроля на скрытую кровь берется:
- а) 5-6 изделий
  - б) 1% обработанных изделий
  - в) не менее 50% обработанных изделий
  - г) не более 1 изделия
- 174 Повторный осмотр на педикулез в отделении проводится:
- а) ежедневно
  - б) через 10 дней
  - в) через 14 дней
  - г) при выписке
- 175 Понятие «здоровья»:
- а) состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов
  - б) состояние полного физического, психического и социального благополучия
  - в) состояние, сопровождающееся получением удовольствия от жизни
- 176 К операционным факторам риска госпитальных хирургических раневых инфекций относится:
- а) характер основного и сопутствующих заболеваний пациента,
  - б) нарушение правил асептики и антисептики при обработке дренажей,
  - в) степень чистоты операционной раны,
  - г) организация перевязок в послеоперационном периоде
- 177 Как называется операция, которая проводится для облегчения состояния пациента:
- а) диагностическая
  - б) радикальная
  - в) паллиативная
  - г) плановая
- 178 Критерии правильности наложения артериального жгута:
- а) отсутствие пульсации на артерии ниже жгута
  - б) отсутствие пульсации на артерии выше жгута
  - в) сохранение слабой пульсации на артериях выше жгута
  - г) сохранение слабой пульсации на артериях ниже жгута
- 179 Основная жалоба при остром аппендиците:
- а) слабость и холодный пот
  - б) боли в животе
  - в) язык с коричневым налётом
  - г) тахикардия и падение АД
- 180 Гематома - это скопление крови в:
- а) полости сустава
  - б) мягких тканях
  - в) плевральной полости
  - г) околосердечной сумке

- 181 Вид санитарной обработки пациента перед плановой операцией:
- а) обтирание кожи и смена белья
  - б) гигиеническая ванна или душ со сменой постельного и нательного белья
  - в) гигиеническая ванна
  - г) обработка не проводится
- 182 Колотая рана наносится:
- а) топором
  - б) саблей
  - в) шилом
  - г) стеклом
- 183 Резиновый трубчатый дренаж в ране – вид антисептики:
- а) Химическая;
  - б) Физическая;
  - в) Механическая.
- 184 После вскрытия подкожного панариция накладывают повязку с:
- а) раствором перекиси водорода
  - б) мазью Вишневского
  - в) преднизолоновой мазью
  - г) гипертоническим раствором хлорида натрия
- 185 Причины нарушения дыхания у послеоперационных пациентов:
- а) неэффективное обезболивание послеоперационной раны
  - б) выраженный метеоризм
  - в) длительный постельный режим
  - г) верно все вышеперечисленное
- 186 На голень накладывается повязка:
- а) циркулярная
  - б) спиральная с перегибами
  - в) восьмиобразная
  - г) спиральная
- 187 После вскрытия флегмоны накладывают повязку с:
- а) раствором перманганата калия
  - б) мазью Вишневского
  - в) мазью «Солкосерил»
  - г) гипертоническим раствором хлорида натрия
- 188 Выберите правильное соотношение антигенов и антител в крови 4 группы:
- а) 0, анти-А, анти-В
  - б) А, анти-В
  - в) В, анти-А
  - г) АВ, 0
- 189 Осложнение, возможное в позднем послеоперационном периоде:
- а) внутреннее кровотечение
  - б) развитие тошноты и рвоты
  - в) нагноение послеоперационной раны
  - г) нарушение дыхания на фоне угнетения сознания

- 190 Геморрой - это:
- а) гипертрофия кавернозных телец прямой кишки
  - б) воспаление слизистой прямой кишки
  - в) воспаление околопрямокишечной клетчатки
  - г) воспаление кожи анальной области
- 191 При проникающих ранениях живота нельзя:
- а) спешить с госпитализацией
  - б) покрывать выпавшие органы салфеткой
  - в) вправлять выпавшие органы
  - г) накладывать асептическую повязку
- 192 При оказании неотложной помощи при переломе бедра надо обеспечить иммобилизацию:
- а) коленного сустава
  - б) коленного и тазобедренного суставов
  - в) голеностопного, коленного и тазобедренного суставов
  - г) только места перелома
- 193 Для контроля стерильности операционного белья используют:
- а) термовременные индикаторы
  - б) фенолфталеиновую пробу
  - в) азипирамовую пробу
  - г) бактериологический контроль
- 194 Подсчёт числа дыхательных движений у детей проводят в течение (время в секундах):
- а) 30
  - б) 60
  - в) 90
  - г) 130
- 195 Эзофагогастродуоденоскоп применяется для осмотра слизистой оболочки:
- а) мочевого пузыря
  - б) пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
  - в) прямой кишки
  - г) ободочной, сигмовидной и прямой кишки
- 196 Для наркоза используются препараты:
- а) анальгетики
  - б) местные анестетики
  - в) общие анестетики
  - г) наркотические анальгетики
- 197 Для лечебной иммобилизации используется:
- а) шина Крамера
  - б) аутоиммобилизация
  - в) гипсовая повязка
  - г) шина Дитерихса
- 198 Тризм жевательных мышц характерен для:
- а) ботулизма
  - б) газовой гангрены
  - в) столбняка
  - г) энцефалита



- 199 При уходе за назогастральным зондом, его промывание осуществляется каждые \_\_\_\_ часа (по назначению врача):
- а) 3
  - б) 4
  - в) 5
  - г) 6
- 200 При оказании неотложной помощи при переломе голени надо обеспечить иммобилизацию:
- а) коленного сустава
  - б) коленного и голеностопного суставов
  - в) голеностопного, коленного и тазобедренного суставов
  - г) только места перелома
- 201 К анаэробной хирургической инфекции относится:
- а) костный туберкулез
  - б) септикопиемия
  - в) столбняк
  - г) остеомиелит
- 202 Осложнением желудочного кровотечения является:
- а) коллапс
  - б) повышение кислотности желудочного сока
  - в) болевой шок
  - г) лейкоцитоз и ускоренная СОЭ
- 203 При врожденном вывихе бедра применяется пеленание:
- а) широкое
  - б) с использованием подгузников
  - в) тугое
  - г) с использованием только памперсов
- 204 При попадании масляных растворов и суспензий в кровеносный сосуд возможно развитие:
- а) флегмоны
  - б) кровотечения
  - в) эмболии
  - г) спазма сосуда
- 205 Абсолютный признак вывиха:
- а) пружинящая фиксация
  - б) нарушение функции
  - в) боль
  - г) отёк
- 206 Для мытья рук по Спасокукоцкому-Кочергину используют раствор нашатырного спирта
- а) 0,5%
  - б) 1%
  - в) 1,5%
  - г) 2%
- 207 Какие повязки называются иммобилизирующими:
- а) исправляющие неправильное положение конечности
  - б) обеспечивающие неподвижное положение конечности
  - в) обеспечивающие вытяжение поврежденной конечности
  - г) закрепляющие лекарственные средства на ране

- 208 Динамическая кишечная непроходимость - это:
- а) нарушение проходимости содержимого по кишечнику вследствие механического препятствия в просвете кишки
  - б) нарушение проходимости содержимого по кишечнику вследствие сдавления кишки извне
  - в) нарушение проходимости содержимого по кишечнику вследствие нарушения иннервации кишечной стенки
  - г) нарушение проходимости содержимого по кишечнику вследствие заворота кишки
- 209 Причины образования инфильтратов при внутримышечных инфекциях:
- а) применение длинной иглы
  - б) применение короткой иглы
  - в) обработка инъекционного поля 1 ватным тампоном с 40% спиртом
  - г) обработка инъекционного поля 2-мя ватными тампонами с 70% спиртом
- 210 Основным назначением компрессной повязки является:
- а) согреть пациента
  - б) удлинить срок действия препарата
  - в) защитить рану от инфицирования
  - г) остановить кровотечение
- 211 Комплекс мероприятий по профилактике попадания инфекции в рану называется:
- а) антисептика
  - б) асептика
  - в) дезинфекция
  - г) стерилизация
- 212 К ятрогенным относятся заболевания:
- а) обусловленные вредными факторами производства
  - б) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
  - в) с неблагоприятным прогнозом
  - г) наследственного генеза
- 213 Основной целью премедикации является:
- а) предупреждение распространения инфекции
  - б) выявление противопоказаний
  - в) сведение до минимума послеоперационных осложнений
- 214 После гемотрансфузии медсестра измеряет температуру тела пациента:
- а) однократно, через час
  - б) трижды в течение 3 часов
  - в) через 12 часов
  - г) через 24 часа
- 215 Число пораженных при территориальных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах):
- а) 10-50 пораженных
  - б) 50-500 пораженных
  - в) свыше 500 пораженных
  - г) до 10 пораженных

- 216 Сестринское вмешательство при экзикозе включает:
- а) оральную регидратацию
  - б) форсированный диурез
  - в) промывание желудка
  - г) постановку очистительной клизмы
- 217 Колосовидная повязка накладывается на:
- а) коленный и локтевой суставы
  - б) грудную клетку
  - в) стопу
  - г) плечевой и тазобедренный суставы
- 218 Антисептик, применяемый для обработки операционного поля
- а) хлоргексидина биглюконат
  - б) перекись водорода
  - в) фурацилин
  - г) нашатырный спирт
- 219 Нарушение асептики выполнения инъекции может привести к
- а) воздушной эмболии
  - б) аллергической реакции
  - в) абсцессу
  - г) липодистрофии
- 220 Характер боли при обтурационной острой кишечной непроходимости:
- а) сильная постоянная в правой подвздошной области
  - б) сильная постоянная в правом подреберье
  - в) сильная опоясывающая боль
  - г) схваткообразная боль
- 221 После выписки, смерти или перевода пациента в другое отделение проводят:
- а) текущую дезинфекцию
  - б) предварительную дезинфекцию
  - в) профилактическую дезинфекцию
  - г) заключительную очаговую дезинфекцию
- 222 Для обработки ран применяется раствор перекиси водорода:
- а) 6%
  - б) 1%
  - в) 2%
  - г) 3%
- 223 Симптомы нарушения лимфообращения:
- а) гиперемия кожи
  - б) бледность кожи
  - в) выраженный цианоз кожи
  - г) плотный отёк
  - д) мягкий отёк
- 224 Повязка на пальцы кисти:
- а) варежка
  - б) спиральная
  - в) рыцарская перчатка
  - г) циркулярная

- 225 Вирус бешенства поражает:
- а) дыхательную систему
  - б) сердечно - сосудистую систему
  - в) нервную систему
  - г) костную систему
- 226 Стерильные перчатки не требуются для проведения:
- а)ухода за подключичным сосудистым катетером,
  - б)забора внутривенной крови для биохимического исследования,
  - в)перевязки в первые 48 часов послеоперационного периода,
  - г)катетеризации мочевого пузыря
- 227 Положение больного в постели до выхода из наркоза:
- а) Фаулера
  - б) Транделенбурга
  - в) горизонтальное на спине, голова на подушке
  - г) горизонтальное на спине, без подушки
- 228 Первая помощь при носовом кровотечении:
- а)наклонить голову больного, подбородком прижать к груди, холод на переносицу
  - б)наклонить голову больного, крылья носа плотно прижать пальцами
  - в)запрокинуть голову больного назад
- 229 Как часто проводится генеральная уборка в перевязочном кабинете:
- а)1 раз в месяц
  - б)1 раз в 2 недели
  - в)1 раз в неделю
  - г)ежедневно
- 230 Механические методы остановки кровотечения - это:
- а)наложение жгута
  - б)электрокоагуляция
  - в)пальцевое прижатие
  - г)пузырь со льдом
- 231 Срок сохранения стерильности после вскрытия бикса:
- а) 6 часов
  - б)12 часов
  - в)3 суток
  - г)20 суток
- 232 Инвентарь для уборки перевязочного кабинета должен храниться:
- а)в самом помещении
  - б)в специальном помещении или шкафу вне рабочего помещения
  - в)вид хранения не имеет значения
  - г)не требуется специальный инвентарь для уборки перевязочного кабинета
- 233 Физиологическое положение для локтевого сустава при наложении повязок будет:
- а) сгибание до 90 градусов
  - б) сгибание до 45 градусов
  - в) сгибание до 30 градусов
  - г) разгибание до 180 градусов

- 234 Подготовка к проведению внутривенной урографии предполагает:
- а) очистительную клизму вечером и утром за 2 дня до исследования
  - б) прием мочегонных средств
  - в) исключение из рациона продуктов вызывающих метеоризм в течение 2-3 дней
  - г) приготовление емкости для сбора мочи
- 235 Реакция Грегерсена выявляет в кале:
- а) простейших
  - б) скрытую кровь
  - в) гельминтов
  - г) микробов
- 236 Операция, которая проводится для облегчения состояния пациента, называется:
- а) паллиативная
  - б) радикальная
  - в) диагностическая
  - г) малоинвазивная
- 237 К достоверным признакам внезапной остановки сердечной деятельности не относится:
- а) отсутствие пульса на сонных артериях
  - б) внезапная потеря сознания
  - в) отсутствие самостоятельного дыхания
  - г) отсутствие тонов сердца
  - д) все вышеперечисленное
- 238 Активные движения в суставе при переломе плеча:
- а) отсутствуют
  - б) возможны, резко болезненные
  - в) в полном объеме, безболезненные
  - г) в полном объеме, умеренно болезненные
- 239 Какие повязки называются окклюзионными:
- а) исправляющие неправильное положение тела
  - б) создающие неподвижность части тела
  - в) герметические повязки, закрывающие сообщение с окружающей средой
  - г) повязки, создающие вытяжение части тела
- 240 Для неингаляционного наркоза используется:
- а) эфир
  - б) закись азота
  - в) фторотан
  - г) кетамин
- 241 Показание для ампутации конечностей:
- а) сухой некроз
  - б) влажный некроз
  - в) обширная венозная язва
  - г) атеросклеротическая язва

- 242 Степень нарушения сознания оценивается по шкале:
- а) Глазго
  - б) Роттердам
  - в) Росс
  - г) Апгар
- 243 Стерильные перчатки необходимы для проведения:
- а) ухода за дренажами,
  - б) забора внутривенной крови для биохимического исследования,
  - в) забора крови из пальца,
  - г) ухода за полостью рта тяжело больного пациента
- 244 Проникающее ранение груди - это ранение с повреждением:
- а) кожи
  - б) подкожно-жировой клетчатки
  - в) межреберных мышц
  - г) пристеночной плевры
- 245 Осложнением вирусного гепатита С является:
- а) энтероколит
  - б) цирроз печени
  - в) сплениит
  - г) спленомегалия
- 246 Наиболее полный и правильный ответ: кровотечение – это излияние крови:
- а) В ткани организма
  - б) Полость тканей
  - в) В ткани, полости организма и во внешнюю среду
- 247 Признаком клинической смерти является:
- а) гипертермия
  - б) полиурия
  - в) отсутствие пульса и дыхания
  - г) симптом «кошачьего глаза»
- 248 Что такое аутогемотрансфузия:
- а) непосредственное переливание крови без консерванта от донора к реципиенту
  - б) переливание консервированной крови
  - в) переливание свежесцитратной крови
  - г) переливание собственной крови пациента, взятой заранее
- 249 Признаки сдавления конечности гипсовой повязкой с нарушением артериального притока крови:
- а) кожа дистальной части конечности гиперемирована
  - б) кожа бледная, периферический артериальный пульс отсутствует
  - в) дистальная часть конечности отечная
  - г) дистальная часть конечности отечная и синюшная
- 250 Боль при остром аппендиците в начале заболевания может возникнуть:
- а) в эпигастриальной области
  - б) в левой подвздошной области
  - в) в правой подвздошной области
  - г) в любой части живота

- 251 Способность понимания психологических состояний других людей и сопереживание им, умение посмотреть на ситуацию глазами другого - это качество личности:
- а) доброжелательность
  - б) открытость
  - в) конфронтация
  - г) эмпатия
  - д) аутентичность
- 252 В каком случае имеется опасность воздушной эмболии:
- а) при ранении сонной артерии
  - б) при ранении вен шеи
  - в) при ранении вен голени
  - г) при паренхиматозном кровотечении
- 253 При оказании неотложной помощи при травматическом пневмотораксе необходимо наложение повязки:
- а) асептической
  - б) окклюзионной (воздухонепроницаемой)
  - в) дез
- 254 Сестринское вмешательство, выполняемое по назначению врача, является:
- а) независимым
  - б) зависимым
  - в) взаимозависимым
  - г) обязательным
- 255 Срок сохранения стерильности бикса без фильтра:
- а) 6 часов
  - б) 12 часов
  - в) сутки
  - г) 3 суток
- 256 Рубленые раны часто осложняются:
- а) обильным наружным кровотечением
  - б) повреждением костей
  - в) повреждением внутренних органов
  - г) бешенством
- 257 Сестринский процесс включает следующие этапы, кроме:
- а) сестринское обследование
  - б) выявление медико-санитарных проблем и потребности в уходе
  - в) планирование и выполнение сестринских вмешательств
  - г) лечение заболеваний
- 258 При прободной язве желудка:
- а) живот напряжен, «доскообразный»
  - б) не изменен
  - в) втянут
  - г) вздут, часто ассиметрично
- 259 Премедикация перед операцией под наркозом включает в себя:
- а) местный анестетик, антигистаминный препарат, атропин
  - б) наркотический анальгетик, антигистаминный препарат, атропин
  - в) наркотический анальгетик, антигистаминный препарат, адреналин
  - г) наркотический анальгетик, антигистаминный препарат, антибиотик

- 260 Достоверная диагностика в онкологии обеспечивается исследованием:
- а) ультразвуковым
  - б) радиоизотопным
  - в) гистологическим
  - г) рентгенологическим
- 261 Пациента с кровопотерей транспортируют в положении:
- а) сидя
  - б) лежа с приподнятым головным концом
  - в) лежа с приподнятым ножным концом
  - г) лежа на боку
- 262 Политравма - это:
- а) перелом голени
  - б) вывих плеча
  - в) совокупность повреждающих факторов
  - г) совокупность двух и более повреждений
- 263 Операция удаления органа вместе с окружающими тканями называется:
- а)резекция
  - б)эктомия
  - в)ампутация
  - г)экстирпация
- 264 Условия для заживления раны вторичным натяжением:
- а) края ровные
  - б) края раны сопоставлены и послойно ушиты
  - в) края раны зияют
  - г) отсутствуют инородные тела в ране
- 265 Профилактика тяжелой реакции на госпитализацию у ребёнка 1 года жизни:
- а) раздельное пребывание матери и ребёнка
  - б) отвлечение игрушкой
  - в) госпитализация матери с ребёнком
  - г) медицинская сестра чаще подходит к ребёнку
- 266 Отвращение к мясной пище характерно для язвы:
- а)малигнизированной
  - б)прободной
  - в)неосложнённой
  - г)стенозирующей
- 267 Причины развития гипогликемии:
- а) булимия
  - б) передозировка инсулина
  - в) полидипсия
  - г) недостаточная доза инсулина
- 268 Лимфаденит – это воспаление:
- а)потовых желез
  - б)лимфатических узлов
  - в)сальных желез
  - г)лимфатических сосудов



- 269 Протяжённость транспортной иммобилизации при переломе бедра:
- а) пальцы – крыло подвздошной кости
  - б) пальцы – тазобедренный сустав
  - в) пальцы – верхняя треть бедра
  - г) пятка – треть бедра
- 270 Цель хирургической обработки рук медперсонала:
- а) обеспечение кратковременной стерильности
  - б) создание продолжительной стерильности
  - в) профилактика профессионального заражения
  - г) удаление бытового загрязнения
- 271 Всем детям с высоким риском развития повторного образования камней рекомендуется:
- а) увеличение потребления молочных продуктов
  - б) увеличенное количество белка
  - в) потребление жидкости в большом количестве
  - г) снижение потребления углеводов
- 272 Эвентрация - это:
- а) расхождение краев раны
  - б) выпадение внутренних органов через послеоперационную рану
  - в) воспаление послеоперационной раны
  - г) нагноение послеоперационной раны
- 273 Одним из принципов медицинской морали является принцип исключения должностных преступлений, который означает:
- а) «делать добро» пациенту
  - б) «не навреди» пациенту
  - в) сообщение правды пациенту
  - г) получение согласия пациента на обследование и лечение
- 274 Отграниченное гнойное воспаление называется:
- а) абсцесс
  - б) флегмона
  - в) гидраденит
  - г) панариций
- 275 После дезинфекции места венепункции антисептическим раствором медицинская сестра:
- а) протирает место венепункции сухим ватным тампоном
  - б) ждет полного самостоятельного высыхания
  - в) протирает место венепункции сухим марлевым тампоном
  - г) дует на место венепункции для быстрого высыхания
- 276 Для борьбы с парезом кишечника применяют:
- а) прозерин
  - б) спазмолитики
  - в) слабительные
  - г) антигистаминные
- 277 Возможное осложнение варикозного расширения вен:
- а) сухая гангрена
  - б) образование трофической язвы
  - в) влажная гангрена
  - г) развитие инфаркта

- 278 Обязательное медицинское страхование - это:
- а) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи;
  - б) страховой риск, связанный с возникновением страхового случая;
  - в) обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи;
  - г) обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, целевым назначением которых является обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения
- 279 Рубленые раны часто осложняются:
- а) обильным наружным кровотечением
  - б) повреждением костей
  - в) повреждением внутренних органов
  - г) бешенством
- 280 Лучшее запоминание предметов, изображений, звука, цвета и т.п. свидетельствует о преобладании у человека:
- а) наглядно-образной памяти
  - б) словесно-абстрактной памяти
  - в) кратковременной памяти
  - г) промежуточной памяти
  - д) долговременной памяти
- 281 Классификация кровотечений по времени возникновения:
- а) Острое, хроническое
  - б) Длительное, недлительное
  - в) Первичное, вторичное ранее, вторичное позднее
- 282 В материальное обеспечение при проведении любой инъекции обязательно входит:
- а) жгут венозный
  - б) подушечка из влагостойкого материала
  - в) кожный антисептик
  - г) стойка-штатив
- 283 Препараты, повышающие свертываемость крови:
- а) виферон
  - б) викасол
  - в) вермокс
  - г) винталин
- 284 В какой ране вероятность развития инфекции максимальна:
- а) Укушенной
  - б) Рубленой
  - в) Скальпированной
- 285 Для местной поверхностной анестезии применяется:
- а) хлорэтил
  - б) 1 % раствор лидокаина
  - в) 0,5% раствор новокаина
  - г) 0,25% раствор новокаина

- 286 Алая пульсирующая струя крови характерна для \_\_\_\_\_ кровотечения:
- а) венозного
  - б) смешанного
  - в) капиллярного
  - г) артериального
- 287 Асептика - это:
- а) уничтожение болезнетворных микробов
  - б) уничтожение всего живого
  - в) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране
  - г) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- 288 Уничтожение всех форм микроорганизмов, в том числе спорообразующих, называется:
- а) стерилизация
  - б) антисептика
  - в) асептика
  - г) дезинфекция
- 289 Характерным признаком перелома является:
- а) отек мягких тканей
  - б) кровоподтек в области сустава
  - в) костная крепитация
  - г) отсутствие движений в суставе
- 290 Подготовка больного к экстренной операции:
- а) полная санитарная обработка
  - б) частичная санитарная обработка
  - в) премедикация по схеме
- 291 Срочную помощь в первую очередь следует оказать пораженным с :
- а) остановленным кровотечением
  - б) касательным ранением черепа
  - в) осколочным ранением нижних конечностей
  - г) проникающим (не сквозным) ранением полости живота и груди
- 292 Показанием к наложению окклюзионной повязки является:
- а) ранение груди
  - б) ушиб грудной клетки
  - в) гемоторакс
  - г) закрытый перелом ребер
- 293 Для временной остановки наружного венозного кровотечения применяют:
- а) наложение жгута
  - б) максимальное сгибание конечности в суставе
  - в) наложение давящей повязки
  - г) пальцевое прижатие артерии на протяжении
- 294 Материалы и инструменты, загрязненные кровью в перевязочной, относятся к классу отходов:
- а) А, неопасные
  - б) Б, опасные
  - в) В, чрезвычайно опасные
  - г) Г, близкие к промышленным

- 295 Применение лазера в хирургии относится к антисептике
- а) механической
  - б) физической
  - в) биологической
  - г) химической
- 296 Гнойное воспаление потовых желез - это:
- а) гидраденит
  - б) карбункул
  - в) флегмона
  - г) абсцесс
- 297 По анатомической классификации различают следующие виды кровотечений:
- а) носовое
  - б) легочное
  - в) желудочное
  - г) артериальное, венозное
- 298 Какие повязки называются корригирующими:
- а) исправляющие неправильное положение конечности
  - б) обеспечивающие неподвижное положение конечности
  - в) обеспечивающие вытяжение поврежденной конечности
  - г) закрепляющие лекарственные средства на ране
- 299 Осложнение, возможное в раннем послеоперационном периоде:
- а) нагноение послеоперационной раны
  - б) внутреннее кровотечение
  - в) развитие послеоперационной грыжи
  - г) образование лигатурного свища
- 300 Условия проведения очистительной клизмы ребёнку 2-х лет:
- а) объем воды 100 мл, температурой 18 оС
  - б) объем воды 200 мл, температурой 22оС
  - в) объем воды 2000 мл, температурой 22оС
  - г) объем воды 1000 мл, температурой 18 оС