

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ»**

(для медицинских сестёр детских соматических отделений, прошедших обучение по
циклам 16.2 "Сестринская помощь детям",
профессиональной переподготовки по специальности
«Сестринское дело в педиатрии»)

- 1 Особенности ребенка грудного возраста:
 - а) зависим от взрослых
 - б) страх перед госпитализацией
 - в) испытывает дефицит общения со сверстниками
 - г) испытывает страх смерти
- 2 При асфиксии у новорожденных пульс в 1 минуту:
 - а) 120 ударов
 - б) 80 ударов
 - в) 140 ударов
 - г) менее 60 ударов
- 3 Симптомы сахарного диабета у детей:
 - а) боли в животе опоясывающего характера
 - б) сухость кожи, отеки
 - в) жажда, полиурия, сухость кожи
 - г) снижение общего иммунитета
- 4 При врожденных пороках сердца нарушается деятельность:
 - а) дыхательной системы
 - б) эндокринной системы
 - в) нервной системы
 - г) сердечно-сосудистой системы
- 5 Первый шаг при асфиксии у новорожденных:
 - а) проведение оксигенотерапии
 - б) проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
 - в) санация верхних дыхательных путей
 - г) проведение непрямого массажа сердца
- 6 При хроническом гастрите прием пищи должен быть:
 - а) через каждые 3 часа небольшими порциями
 - б) 3-4 раза в день
 - в) 5-6 раз в день небольшими порциями
 - г) по аппетиту
- 7 Подготовка к эндоскопическому исследованию при подозрении на хронический гастрит предусматривает:
 - а) провести беседы с пациентом и родителями
 - б) ввести контрастное вещество
 - в) не кормить утром накануне исследования
 - г) измерить суточный диурез

- 8 Осложнения при скарлатине:
- а) миокардит
 - б) панкреатит
 - в) гломерулонефрит
 - г) орхит
- 9 Среднюю порцию мочи собирают для исследования по методу:
- а) Амбурже
 - б) Нечипоренко
 - в) Зимницкому
 - г) Аддис-Каковскому
- 10 Симптомы железодефицитной анемии:
- а) бледность кожи и слизистых
 - б) снижение гемоглобина менее 110г/л
 - в) цианоз кожных покровов
 - г) снижение тромбоцитов в крови
- 11 Ребёнку с ОРВИ для уменьшения симптомов интоксикации применяют:
- а) оксигенотерапию
 - б) обильное тёплое питье
 - в) калорийную диету
 - г) горчичники
- 12 В коже у детей вырабатывается:
- а) витамин Е
 - б) провитамин Д
 - в) витамин С
 - г) каротин
- 13 Симптомы продромального периода при кори:
- а) кашель, насморк, конъюнктивит
 - б) геморрагическая сыпь
 - в) пятна Филатова-Бельского
 - г) ангина
- 14 Какова концентрация спирта для обработки инъекционного поля:
- а) 96%
 - б) 50%
 - в) 70%
 - г) 40 %
- 15 Факторы риска возникновения аллергозов:
- а) аномалия конституции
 - б) резус-конфликт
 - в) недостаток витаминов
 - г) воздействие табачного дыма
- 16 Причины развития железодефицитной анемии у детей:
- а) вскармливание парным коровьим молоком
 - б) обилие каш в рационе
 - в) недостаток УФО
 - г) длительное пребывание на свежем воздухе
- 17 При гипотрофии 1 ст. отмечается снижение массы тела ребенка на:
- а) 5-10%
 - б) 10-20%
 - в) 20-30%
 - г) 30-40%

- 18 Контрольное кормление проводится при:
- а) гипогалактии
 - б) гипотрофии
 - в) рахите
 - г) анемии
- 19 При попадании масляных растворов и суспензий в кровеносный сосуд возможно развитие:
- а) эмболии
 - б) флегмоны
 - в) кровотечения
 - г) спазма сосуда
- 20 Сестринский уход при остром миокардите:
- а) постельный режим, температура в палате 20-22 градусов, частое проветривание
 - б) палатный режим
 - в) контроль за пульсом, дыханием, температурой тела, суточным диурезом
 - г) диета № 7
- 21 Правила оценки пробы Манту:
- а) через 24 часа
 - б) через 72 часа
 - в) папулу измеряют перпендикулярно оси предплечья
 - г) папулу измеряют вдоль оси предплечья
- 22 Смешанное вскармливание предполагает использование:
- а) грудного молока и овощного пюре
 - б) овощного пюре и адаптированной смеси
 - в) грудного молока и каши
 - г) грудного молока и адаптированной смеси
- 23 Сестринский уход при гломерулонефрите в острый период:
- а) контроль за диурезом
 - б) режим палатный
 - в) контроль за температурой тела, артериальным давлением (АД)
 - г) введение мясных и рыбных бульонов
- 24 Виды докорма на первом году жизни:
- а) каши
 - б) овощное пюре
 - в) адаптированные смеси
 - г) мясное гаше
- 25 Прогнозирование стенозирующего ларингита возможно у детей с:
- а) рахитом
 - б) анемией
 - в) ВПС
 - г) гломерулонефритом
- 26 Основные жизненные потребности недоношенного ребёнка:
- а) обильное питье
 - б) естественное вскармливание
 - в) согревание
 - г) тугое пеленание

- 27 Наиболее частые осложнения при острых кишечных инфекциях:
- а) менингит
 - б) эксикоз
 - в) дисбактериоз
 - г) сепсис
- 28 Оценка по шкале Апгар у здорового ребёнка составляет (в баллах):
- а) 5-7
 - б) 10-12
 - в) 6-7
 - г) 8-10
- 29 Зуд в перианальной области у ребёнка характерен при:
- а) аскаридозе
 - б) энтеробиозе
 - в) трихоцефаллезе
 - г) описторхозе
- 30 Для организации питания в стационаре чаще используют метод:
- а) Индивидуальный
 - б) Групповой
 - в) Целевой
 - г) Выборочный
- 31 Сестринские рекомендации при сухом кашле на фоне ОРВИ:
- а) постуральный дренаж
 - б) прием мукалтина
 - в) теплое щелочное питье
 - г) паровые ингаляции
- 32 Вакцина для профилактики коклюша:
- а) АДС
 - б) ОПВ
 - в) АКДС
 - г) БЦЖ
- 33 Цвет кожных покровов при асфиксии:
- а) розовый
 - б) иктеричный
 - в) цианотичный
 - г) бледный
- 34 Для профилактики рецидивов ревматизма используют препараты:
- а) Гамма-глобулин
 - б) Преднизазол
 - в) Бифидум-бактерин
 - г) Пролонгированные пенициллины
- 35 Клинические признаки гипотиреоза:
- а) тахикардия
 - б) экзофтальм
 - в) низкая масса при рождении
 - г) большая масса при рождении
- 36 Пробы Зимницкого собирается в течение:
- а) суток в одну посуду
 - б) 3 часов в одну посуду
 - в) суток каждые 3 часа в отдельную посуду
 - г) в разовой порции мочи

- 37 Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются:
- а) генетические
 - б) уровень и образ жизни населения
 - в) уровень, качество и доступность медицинской помощи
 - г) все вышеперечисленное
- 38 Возбудителем энтеробиоза являются:
- а) лямблии
 - б) острицы
 - в) аскариды
 - г) власоглав
- 39 При язвенной болезни желудка боль локализуется:
- а) в левой подреберной области
 - б) в левой подвздошной области
 - в) в правой подвздошной области
 - г) в эпигастриальной области
- 40 Уход при остром панкреатите предусматривает:
- а) дробное кормление
 - б) исключение энтерального питания
 - в) грелку на живот
 - г) помощь при рвоте
- 41 Признаки дыхательных расстройств при пневмонии:
- а) влажный кашель
 - б) цианоз носогубного треугольника
 - в) озноб
 - г) одышка
- 42 Инфекционный миокардит чаще может быть осложнением после:
- а) скарлатины
 - б) коклюша
 - в) ангины
 - г) паротита
- 43 Детей с пороками сердца следует оберегать от контакта с детьми, болеющими:
- а) Подобными заболеваниями
 - б) ОРВИ
 - в) Гипотрофией
 - г) Рахитом
- 44 Укажите длительность в/у периода доношенного ребенка:
- а) 36-40 нед.
 - б) 38-39 нед.
 - в) 38-41 нед.
 - г) 40-44 нед.
- 45 Основным элементом при ветряной оспе:
- а) папула
 - б) пустула
 - в) везикула
 - г) макула

- 46 Количество водного раствора лекарственного вещества в одной чайной ложке (в мл):
- а) 1
 - б) 5
 - в) 10
 - г) 8
- 47 Подмывание детей раннего возраста осуществляют:
- а) кипяченой водой
 - б) раствором фурацилина
 - в) проточной водой
 - г) 0,05% раствором перманганата калия
- 48 Факторы риска развития дефицитных анемий у детей:
- а) заболевание матери в первом триместре беременности
 - б) позднее введение прикормов
 - в) редкие приемы пищи
 - г) использование прикормов промышленного производства
- 49 Извращение вкуса характерно для заболевания:
- а) анемия
 - б) лейкоз
 - в) гемофилия
 - г) геморрагический васкулит
- 50 Роль медсестры в организации лечебного питания в стационаре:
- а) Контролировать передачи (набор продуктов)
 - б) Назначать лечебный стол
 - в) Отменять назначенную диету
 - г) Снимать пробу
- 51 Показателями оценки уровня сформированности компетенций являются:
- а) знания
 - б) умения
 - в) способы деятельности
 - г) знания, умения, способы деятельности
- 52 Растворы, применяемые для оральной регидратации:
- а) гемодез
 - б) регидрон
 - в) реополиглюкин
 - г) оралит
- 53 Основные симптомы менингококкового менингита:
- а) ригидность мышц затылка
 - б) энантема зева
 - в) конъюнктивит
 - г) рвота, судороги
- 54 Ежегодная прибавка массы тела со 2 года жизни ребёнка в среднем составляет:
- а) 1 кг
 - б) 3 кг
 - в) 2 кг
 - г) 4 кг

- 55 Профилактика ветряной оспы:
- а) карантин 21 день
 - б) изоляция больного
 - в) вакцинация
 - г) взятие слизи из носоглотки на бакпосев
- 56 Симптомы вирусного крупа:
- а) влажный кашель
 - б) сухой, «лающий» кашель
 - в) инспираторная одышка
 - г) дыхание Кусмауля
- 57 Медицинский работник к пациенту должен обращаться:
- а) по имени
 - б) по имени и отчеству
 - в) по фамилии
 - г) «больной»
- 58 Потенциальной проблемой у ребенка, больного дифтерией, являются:
- а) нарушение суточного диуреза
 - б) риск развития истинного крупа
 - в) риск развития ложного крупа
 - г) риск развития энуреза
- 59 Симптомы шигеллеза:
- а) стул с прожилками крови, тенезмы
 - б) стул обильный, водянистый
 - в) стул в виде «болотной тины»
 - г) лихорадка, боли в животе
- 60 Основные симптомы менингококцемии:
- а) бледность кожных покровов
 - б) диарея
 - в) геморрагическая сыпь
 - г) склерит
- 61 Болезни, сопровождающиеся кровоточивостью:
- а) гемофилия
 - б) гипотрофия
 - в) капилляротоксикоз
 - г) краснуха
- 62 Здоровых новорожденных после рождения прикладывают к груди матери не позднее чем через:
- а) 15 мин
 - б) 1 час
 - в) 6 часов
 - г) сутки
- 63 Наиболее частый возбудитель пиелонефрита:
- а) кишечная палочка
 - б) стафилококк
 - в) стрептококк
 - г) протей

- 64 Сестринские рекомендации при железодефицитной анемии:
- а) полноценное питание, прогулки
 - б) контроль за диурезом
 - в) контроль за анализом крови
 - г) контроль за артериальным давлением (АД)
- 65 Сестринские рекомендации ребёнку с сахарным диабетом:
- а) соблюдать диету
 - б) научить вводить инсулин
 - в) заниматься спортом
 - г) охлаждать инсулин перед введением
- 66 Отеки почечного происхождения появляются:
- а) утром на ногах
 - б) утром на лице
 - в) вечером на ногах
 - г) вечером на лице
- 67 Противоэпидемические мероприятия при возникновении дифтерийной инфекции в детском соматическом отделении:
- а) бактериологическое обследование контактных
 - б) карантин 10 дней
 - в) введение противодифтерийной сыворотки
 - г) карантин 35 дней
- 68 Адаптационный период у новорожденного ребёнка длится от:
- а) 7 до 28 дней жизни
 - б) 0 до 7 дней жизни
 - в) 0 до 28 дней жизни
 - г) 0 до 21 дня жизни
- 69 При железодефицитной анемии медсестра рекомендует пациенту в больших количествах употреблять:
- а) кашу
 - б) молоко
 - в) мясо
 - г) овощи
- 70 Кожные покровы при сепсисе у новорожденного:
- а) розовые
 - б) цианотичные
 - в) бледно-серые
 - г) гиперемированы
- 71 Уход при тяжелой внутричерепной родовой травме:
- а) раннее прикладывание к груди
 - б) кормление через зонд
 - в) наблюдение за дыханием, пульсом, температурой тела
 - г) выкладывать на живот
- 72 Правила применения грелки детям:
- а) температура воды 60-70 градусов
 - б) заполнение водой на 2/3 объема
 - в) температура воды в грелке 40-50 градусов
 - г) заполнение водой на 1/3 объема

- 73 Причины рахита:
- а) недостаток витамина Д
 - б) недостаток витамина С
 - в) нарушение режима кормления
 - г) недостаток железа
- 74 При проведении пробы по Зимницкому необходимо собрать мочу:
- а) суточную в одну посуду
 - б) 8 порций через каждые 3 часа
 - в) за 3 часа в любое время суток
 - г) утреннюю
- 75 Вероятность развития ожирения у ребенка, если один из родителей страдает этим заболеванием:
- а) 20%
 - б) 30%
 - в) 40%
 - г) 70%
- 76 Принципы лечебного питания при острых кишечных инфекциях:
- а) дробное, дозированное питание
 - б) свежие овощи и фрукты
 - в) кондитерские изделия, молочнокислые смеси
 - г) слизистые супы и каши
- 77 Симптомы приступного периода бронхиальной астмы:
- а) инспираторная одышка
 - б) экспираторная одышка
 - в) свистящее дыхание
 - г) «лающий» кашель
- 78 Сестринский процесс при сахарном диабете:
- а) соблюдать диету № 9
 - б) научить вводить инсулин
 - в) измерять температуру тела
 - г) измерять диурез
- 79 Побочное действие антиколвальных:
- а) Гипокалиемия
 - б) Анемия
 - в) Гипокальциемия
 - г) Гипомагниемия
- 80 Здоровых новорожденных после рождения прикладывают к груди матери через:
- а) 15 мин
 - б) 1 час
 - в) 6 часов
 - г) Сутки
- 81 Сестринские рекомендации родителям ребёнка, перенесшего гломерулонефрит:
- а) заниматься спортом
 - б) обучить приемам психологической поддержки
 - в) рекомендовать фитотерапию
 - г) наблюдаться у нефролога по Ф-30

- 82 Варианты течения эпидемического паротита:
- а) орхит
 - б) панкреатит
 - в) артрит
 - г) лимфаденит
- 83 Исход сыпи при скарлатине:
- а) крупнопластинчатое шелушение
 - б) пигментация
 - в) бесследно исчезает
 - г) отрубевидное шелушение
- 84 Докорм вводится при вскармливании:
- а) естественном
 - б) искусственном
 - в) смешанном
 - г) любом
- 85 Источник инфекции гепатита А:
- а) больной человек
 - б) больное животное
 - в) грязный мед. инструментарий
 - г) всё вышеперечисленное
- 86 Причины возникновения врождённых пороков сердца:
- а) быстрые роды
 - б) отягощённая наследственность
 - в) резус-конфликт
 - г) анемия матери
- 87 Этические нормы медицинского работника определяются:
- а) умениями и навыками
 - б) законами и приказами
 - в) этническими особенностями региона
 - г) моральной ответственностью
- 88 Сестринский уход при кори:
- а) витаминизированное питание, теплое питье
 - б) ограничение жидкости
 - в) туалет кожи и слизистых
 - г) ежедневный контроль за массой тела
- 89 После введения вакцины вырабатывается иммунитет:
- а) искусственный
 - б) естественный
 - в) активный
 - г) пассивный
- 90 Клинические симптомы гипокалиемии:
- а) Брадикардия, аритмия
 - б) Олигурия
 - в) Метеоризм
 - г) Полиурия
- 91 При дискинезии желчевыводящих путей из диеты исключают:
- а) творог
 - б) рыбные консервы
 - в) бананы
 - г) жареное мясо, грибы

- 92 После введения инсулина больного необходимо покормить через:
- а) 20 минут
 - б) 30 минут
 - в) 45 минут
 - г) 1 час
- 93 Боли в эпигастральной области при язвенной болезни желудка обычно бывают:
- а) ранними
 - б) поздними
 - в) ночными
 - г) голодными
- 94 Хлороз у детей – это:
- а) симптом наследственной гемолитической анемии
 - б) проявление гемолитической болезни новорожденного
 - в) симптом железодефицитной анемии
 - г) форма анемии у девочек пубертатного возраста
- 95 Для выявления энтеробиоза исследуют:
- а) мочу
 - б) кал
 - в) перианальный соскоб
 - г) кровь
- 96 Сестринский процесс при кишечных инфекциях:
- а) полоскание зева
 - б) контроль за оральной дегидратацией
 - в) текущая дезинфекция
 - г) коррекции антибиотикотерапии
- 97 Причиной развития рахита является дефицит:
- а) витамина Д
 - б) селена, цинка
 - в) кальция, фосфора
 - г) железа, магния
- 98 Причиной полового криза у новорожденных детей является:
- а) родовая травма
 - б) поступление эстрогенов во время родов от матери к плоду
 - в) гемолитическая болезнь новорожденных
 - г) истинный узел пуповины
- 99 Обструктивный бронхит чаще развивается:
- а) у детей до 4-х лет
 - б) у подростков
 - в) на фоне аскаридоза
 - г) на фоне острой респираторной инфекции
- 100 Возбудителем коклюша является:
- а) палочка Борде-Жангу
 - б) бацилла Леффлера
 - в) вирус
 - г) шигелла
- 101 Мясное пюре вводится детям с возраста (в месяцах):
- а) 6
 - б) 7
 - в) 8
 - г) 10

- 102 Специфическая профилактика туберкулеза проводится:
- а) туберкулином
 - б) антитоксической сывороткой
 - в) вакциной БЦЖ
 - г) вакциной ОПВ 152.
- 103 Клинические симптомы при пиелонефрите:
- а) гипертензия
 - б) дизурия
 - в) анурия
 - г) лихорадка
- 104 Основные симптомы вирусного гепатита:
- а) иктеричность кожи и слизистых
 - б) нейротоксикоз с эксикозом
 - в) обесцвеченный кал, темная моча
 - г) олигурия, бактериурия
- 105 Заключительная дезинфекция в случае инфекционного заболевания проводится:
- а) в очаге после изоляции больного в стационар
 - б) после выписки реконвалесцента из стационара
 - в) 1 раз в день утром
 - г) в конце дня
- 106 При лечении ревматизма постепенной отмены требуют препараты:
- а) Ацетилсалициловая кислота
 - б) Пенициллин
 - в) Преднизазол
 - г) Супрастин
- 107 Основные симптомы кори:
- а) пятна Филатова-Коплика
 - б) геморрагическая сыпь
 - в) пятнисто-папулезная сыпь
 - г) ангина
- 108 Клинические симптомы энтеробиоза:
- а) Расчесы перианальных складок
 - б) «тенезмы»
 - в) Извращение аппетита
 - г) Боли в животе вокруг пупка
- 109 Профилактика тяжелой реакции на госпитализацию у ребёнка 1 года жизни:
- а) раздельное пребывание матери и ребёнка
 - б) отвлечение игрушкой
 - в) госпитализация матери с ребёнком
 - г) медицинская сестра чаще подходит к ребёнку
- 110 Симптомы аденовирусной инфекции:
- а) ринит, конъюнктивит
 - б) спазматический приступообразный кашель
 - в) лихорадка
 - г) диарея, олигурия
- 111 Возникновение потницы у детей связано с:
- а) инфицированием кожи
 - б) дефектами ухода
 - в) применением памперсов
 - г) охлаждением

- 112 Вторичная профилактика заболеваний органов пищеварения не предусматривает:
- а) «Д» наблюдение
 - б) санацию хронических очагов инфекции
 - в) противорецидивное лечение
 - г) антибактериальную терапию
- 113 При подготовке пациента к желудочному зондированию очистительная клизма:
- а) ставится вечером накануне исследования
 - б) ставится утром в день исследования
 - в) ставится вечером и утром
 - г) не ставится
- 114 Факторы риска возникновения пиелонефрита у детей:
- а) несоблюдение правил гигиены, охлаждение
 - б) нерациональное питание
 - в) аномалии развития мочевыводящих путей
 - г) вакцинация согласно календарю прививок
- 115 Причиной транзиторной лихорадки у новорожденного является:
- а) распад клеточных элементов
 - б) переход гормонов матери в организм ребенка
 - в) разрушение эритроцитов
 - г) потеря жидкости
- 116 Карантинные мероприятия в очаге вирусного гепатита:
- а) дезинфекция не проводится
 - б) карантин 35 дней
 - в) обследование контактных
 - г) соблюдение диеты № 5
- 117 Особенности внутрибольничной пневмонии:
- а) возбудители пневмонии устойчивы к антибиотикам
 - б) течение болезни более легкое
 - в) течение болезни более тяжелое
 - г) осложнения редки
- 118 Сестринский процесс при бронхиальной астме включает в себя:
- а) контроль за назначениями врача
 - б) частое проветривание
 - в) выбор медикаментозного лечения
 - г) увеличение физической нагрузки
- 119 Жидкие лекарственные средства (настои, отвары) должны храниться:
- а) в морозильном отделении холодильника
 - б) в холодильнике при температуре +4+6°C
 - в) при комнатной температуре
 - г) при температуре 0°C
- 120 Причины развития гипогликемии:
- а) перекармливание
 - б) передозировка инсулина
 - в) физическое переутомление
 - г) недостаточная доза инсулина

- 121 Причины возникновения сепсиса у новорожденных:
- а) пиодермия
 - б) кефалогематома
 - в) родовая опухоль
 - г) омфалит
- 122 Причины гемолитической болезни новорожденных:
- а) дефект плаценты
 - б) резус-конфликт
 - в) гестоз
 - г) групповая несовместимость крови
- 123 Признаки внутричерепной родовой травмы:
- а) пронзительный крик
 - б) судороги
 - в) иктеричность кожи
 - г) диарея
- 124 Симптомы ларингоспазма:
- а) Гиперемия
 - б) «лающий» кашель
 - в) «петушиный» крик
 - г) Лихорадка
- 125 Характер сыпи при кори:
- а) геморрагическая, звездчатая
 - б) пятнисто-папулезная
 - в) высыпает поэтапно, сверху вниз
 - г) высыпает одномоментно
- 126 В функциональные обязанности палатной медицинской сестры входит:
- а) выполнение независимых вмешательств
 - б) отмена болезненных процедур
 - в) назначение лечебной диеты
 - г) выполнение назначений врача
- 127 Профилактика кори:
- а) вакцинация
 - б) карантин для контактных 10 дней
 - в) изоляция больного на 30 дней
 - г) карантин для контактных 21 день
- 128 Симптомы одышечно-цианотических приступов:
- а) бледность кожи
 - б) усиление цианоза кожи и слизистых
 - в) гиперемия кожи
 - г) вынужденное положение больного
- 129 К развитию ревматизма предрасполагает:
- а) нерациональное питание
 - б) гиподинамия
 - в) экстрасистолия
 - г) очаг хронической инфекции
- 130 Неотложная помощь при анафилактическом шоке начинает оказываться:
- а) в процедурном кабинете
 - б) в отделении реанимации
 - в) в палате интенсивной терапии
 - г) на месте развития

- 131 Причиной развития эпилепсии не является:
- а) родовая травма
 - б) наследственность
 - в) инфекции нервной системы
 - г) нарушение обмена веществ
- 132 Сестринский процесс при гипотрофии предполагает:
- а) проведение коррекции питания
 - б) строгий постельный режим
 - в) поддержание эмоционального тонуса, прогулки
 - г) ежедневное взвешивание
- 133 Причины образования инфильтратов при внутримышечных инфекциях:
- а) применение длинной иглы
 - б) применение короткой иглы
 - в) обработка инъекционного поля 1 ватным тампоном с 96% спиртом
 - г) обработка инъекционного поля 2-мя ватными тампонами с 70% спиртом
- 134 Злокачественное заболевание крови - это:
- а) гемофилия
 - б) тромбоцитопения
 - в) лейкоз
 - г) капилляротоксикоз
- 135 При вирусном гепатите желтушный период — это период:
- а) инкубационный
 - б) продромальный
 - в) разгара
 - г) выздоровления
- 136 Проба Манту проводится:
- а) для лечения туберкулеза
 - б) туберкулином
 - в) для диагностики
 - г) вакциной БЦЖ-м
- 137 Профилактика вирусного гепатита В:
- а) карантин 180 дней
 - б) вакцинация
 - в) контроль за стерилизацией медицинских инструментов
 - г) бактериологическое исследование кала
- 138 Кал на яйца глистов берут:
- а) с поверхности каловых масс
 - б) из глубины каловых масс
 - в) из прямой кишки
 - г) после акта дефекации
- 139 Частота сердечных сокращений 110 уд/мин для подростка:
- а) брадикардия
 - б) тахикардия
 - в) экстрасистолия
 - г) очаг хронической инфекции

- 140 Правила введения внутримышечной инъекции детям с гипотрофией:
- а) кожу в месте инъекции растянуть
 - б) кожу в месте инъекции собрать в складку
 - в) инъекционное поле обработать 96% спиртом
 - г) инъекционное поле обработать 70% спиртом
- 141 Стафилококковая инфекция является причиной возникновения:
- а) везикулопустулеза
 - б) атопического дерматита
 - в) омфалита
 - г) физиологической эритемы
- 142 Пути передачи инфекции при гепатите А:
- а) контактно-бытовой
 - б) трансмиссивный
 - в) водно-пищевой
 - г) парентеральный
- 143 Наиболее информативный метод диагностики пневмонии:
- а) анализ крови
 - б) анализ мокроты
 - в) плевральная пункция
 - г) рентгенография органов грудной клетки
- 144 К заменимым нутриентам относятся:
- а) пищевые волокна
 - б) полиненасыщенные жирные кислоты
 - в) углеводы
 - г) аминокислоты
- 145 Одышечно-цианотические приступы характерны при:
- а) врожденных пороках сердца синего типа
 - б) врожденных пороках сердца бледного типа
 - в) аномалиях развития верхнего неба
 - г) железодефицитной анемии
- 146 Генерализованные формы менингококковой инфекции:
- а) менингит
 - б) миастения
 - в) эзофагит
 - г) сепсис
- 147 Сестринский процесс при афтозном стоматите:
- а) применение противовирусных препаратов по назначению врача
 - б) обучение адекватному питанию, правилам личной гигиены
 - в) проведение промывания желудка
 - г) взятие кала для исследования на яйца глистов
- 148 Гестационный возраст доношенного ребёнка (в неделях):
- а) 34-37
 - б) 38-43
 - в) 37-42
 - г) 40-42

- 149 Вирусный круп — это:
- а) острый ринофарингит
 - б) острый стенозирующий ларингит
 - в) истинный круп
 - г) крупозная пневмония
- 150 Причинами возникновения сепсиса могут быть заболевания:
- а) омфалит
 - б) анемия
 - в) пиодермия
 - г) рахит
- 151 Характер сыпи при скарлатине:
- а) везикулезная
 - б) геморрагическая, звездчатая
 - в) мелкоточечная на гиперемизированном фоне кожи
 - г) пятнисто-папулезная
- 152 Основные симптомы дифтерии гортани:
- а) отсутствие интоксикации
 - б) выражена интоксикация
 - в) сухой кашель, афония
 - г) отеки, повышение артериального давления (АД)
- 153 При применении сердечных гликозидов следует следить за:
- а) температурой тела
 - б) частотой пульса
 - в) цветом мочи
 - г) сном
- 154 Функциональное состояние почек оценивается по анализу мочи методом:
- а) Нечипоренко
 - б) Зимницкому
 - в) Амбурже
 - г) общего анализа
- 155 Здоровый новорожденный по шкале Апгар оценивается:
- а) 3-4 балла
 - б) 5-6 баллов
 - в) 8-10 баллов
 - г) 11-12 баллов
- 156 Клинические симптомы сахарного диабета у детей первого года жизни:
- а) сухость кожи, румянец на щеках
 - б) фебрильная температура тела
 - в) эффект «крахмальной» пеленки
 - г) анорексия
- 157 Ежедневная влажная уборка в палатах проводится не реже:
- а) 4 раза
 - б) 3 раза
 - в) 2 раза
 - г) 1 раз
- 158 Основные симптомы ветряной оспы:
- а) пятнисто-папулезная сыпь
 - б) сыпь полиморфная: пятно-папула-везикула-корочка
 - в) интоксикация, зуд кожи
 - г) увеличение периферических лимфоузлов

- 159 Атопический дерматит чаще развивается при:
- а) естественном вскармливании
 - б) искусственном вскармливании
 - в) отягощенной наследственности
 - г) длительном пребывании на свежем воздухе
- 160 Дискинезия желчевыводящих путей – это:
- а) расстройство двигательной функции отдельных частей желчевыводящей системы
 - б) воспаление слизистой оболочки желчного пузыря
 - в) скопление лямблий в желчном пузыре
 - г) обтурация желчных протоков
- 161 Какой из предложенных механизмов развития анемии чаще всего встречается у детей 1-го года жизни:
- а) постгеморрагический
 - б) врожденный
 - в) инфекционный
 - г) алиментарный
- 162 Характер болей при гастродуодените с гиперсекрецией:
- а) дневные
 - б) постоянные
 - в) голодные
 - г) ночные
- 163 Наиболее часто возникающие осложнения при ОРВИ:
- а) синуситы
 - б) гломерулонефрит
 - в) гастродуоденит
 - г) пневмония
- 164 Подготовка пациента к желудочному зондированию:
- а) вечером – лёгкий ужин, утром - натощак
 - б) вечером – очистительная клизма
 - в) вечером и утром – очистительная клизма
 - г) утром – сифонная клизма
- 165 Инсулин рекомендуется хранить:
- а) в морозильном отделении холодильника
 - б) при комнатной температуре
 - в) в холодильнике при температуре +4⁰+6⁰С
 - г) не имеет значения, где хранить
- 166 Симптомы кандидозного стоматита:
- а) герпетические высыпания на слизистой полости рта
 - б) множественные язвы на слизистой полости рта
 - в) гиперемия и сухость слизистой
 - г) белый творожистый налет
- 167 После перенесенного инфекционного заболевания у ребёнка вырабатывается иммунитет:
- а) естественный
 - б) искусственный
 - в) активный
 - г) пассивный

- 168 Механизм передачи ротавирусной инфекции:
- а) трансмиссивный
 - б) парэнтеральный
 - в) трансплацентарный
 - г) фекально-оральный
- 169 Начальные проявления рахита:
- а) потливость
 - б) искривление ног
 - в) чуткий сон
 - г) мышечная гипотония
- 170 Анализ мочи на диастазу берут для выявления патологии со стороны:
- а) печени
 - б) желудка
 - в) почек
 - г) поджелудочной железы
- 171 Сестринский процесс при коклюше:
- а) аэротерапия, температура в палате 18-20 градусов
 - б) витаминизированное дробное питание, жидкое и пюрированное
 - в) активные, подвижные игры
 - г) строгий постельный режим
- 172 Профилактика краснухи:
- а) анализ крови на антитела
 - б) вакцинация по возрасту
 - в) мазок из зева на бакпосев
 - г) карантин 21 день для контактных
- 173 Сестринский процесс при краснухе:
- а) бакпосев слизи из носоглотки
 - б) изоляция больных, карантин для контактных на 21 день
 - в) постельный режим в острый период
 - г) соблюдение диеты № 1
- 174 К обменным нефропатиям относятся:
- а) глюкозурия
 - б) оксалатурия
 - в) уратурия
 - г) кетонурия
- 175 Клинические симптомы аскаридоза:
- а) зуд вокруг ануса
 - б) тенезмы
 - в) расчёсы перианальных складок
 - г) боли в животе вокруг пупка
- 176 Противовирусные препараты:
- а) амоксиклав
 - б) ацикловир
 - в) аугментин
 - г) арбидол

- 177 Условия проведения очистительной клизмы ребёнку 2-х лет:
- а) объём воды 100 мл, температурой 18°C
 - б) объём воды 200 мл, температурой 22°C
 - в) лежа на правом боку
 - г) лежа на левом боку
- 178 Особенности ухода при врожденном пороке сердца:
- а) отвлечь от переживаний, контроль за диетой № 10
 - б) положение в кровати без подушки
 - в) контролировать прием жидкости и массу тела
 - г) поддерживать температуру в палате 26-28°C
- 179 Проявления спазмофилии (гипокальциемии)
- а) Ложный круп
 - б) Острый ларингит
 - в) «четки», браслеты
 - г) Ларингоспазм
- 180 Возбудитель эпидемического паротита:
- а) бактерия
 - б) грибок
 - в) микоплазма
 - г) вирус
- 181 К антигистаминным препаратам относятся:
- а) клемастин
 - б) кларитин
 - в) клотримазол
 - г) каптоприл
- 182 Для диагностики врожденного гипотиреоза используют:
- а) УЗИ щитовидной железы
 - б) Неонатальный скрининг
 - в) Рентгенограмму кисти
 - г) Остеоденситометрию
- 183 Подсчет дыхательных движений у грудного ребёнка оптимально проводить:
- а) после сна
 - б) после кормления
 - в) при пеленании
 - г) во время сна
- 184 Дошкольный период включает возраст:
- а) от 0 до 1 года
 - б) от 1 до 3 лет
 - в) от 3 до 7 лет
 - г) от 7 до 12 лет
- 185 Профилактика гельминтозов включает в себя все, кроме:
- а) регулярное обследование детей на гельминты
 - б) соблюдение правил личной гигиены
 - в) контроль за экологической обстановкой
 - г) контроль за анализами мочи
- 186 Особенности сахарного диабета у детей:
- а) инсулинозависимый
 - б) инсулинонезависимый
 - в) быстрое развитие осложнений
 - г) легкие формы болезни

- 187 Основные симптомы энтеробиоза:
- а) вульвовагинит у девочек
 - б) боли в животе, беспокойный сон
 - в) судороги, невротические реакции
 - г) кашель, повышение температуры тела
- 188 Основные симптомы дифтерии зева:
- а) налеты в зеве серо-белого цвета
 - б) интоксикация
 - в) увеличение затылочных лимфоузлов
 - г) спазматический кашель
- 189 Набор продуктов, рекомендуемых при диете № 9:
- а) хлеб с отрубями, овощи, отварное мясо
 - б) крепкие мясные и рыбные бульоны, фрукты
 - в) кондитерские изделия, виноград, инжир
 - г) гречневая, овсяная каши
- 190 Сестринский процесс при скарлатине:
- а) постельный режим, текущая дезинфекция
 - б) ограничение питья
 - в) введение антитоксической сыворотки
 - г) полоскание зева, теплое питье, витаминизированное питание
- 191 Научной основой сестринского дела является:
- а) сестринский диагноз
 - б) сестринское обследование
 - в) сестринский процесс
 - г) философия сестринского дела
- 192 Подготовка к проведению внутривенной урографии:
- а) очистительная клизма вечером и утром за 2 часа до исследования
 - б) прием мочегонных средств
 - в) в течение 2-3 дней исключить из рациона продукты, вызывающие метеоризм
 - г) приготовить емкость для сбора мочи
- 193 Клиническими симптомами энтеробиоза являются:
- а) лихорадка, боли в животе
 - б) зуд в области ануса
 - в) мигрень
 - г) беспокойный сон
- 194 Стресс – это:
- а) нервное напряжение
 - б) вид дистресса
 - в) неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему требование
 - г) состояние организма, возникающее в результате воздействия различных факторов и характеризующееся напряжением неспецифических адаптационных механизмов

- 195 Осложнением язвенной болезни желудка могут быть:
- а) желудочное кровотечение
 - б) кишечное кровотечение
 - в) рак желудка
 - г) сахарный диабет
- 196 Сестринский процесс при кишечной инфекции:
- а) проведение текущей дезинфекции
 - б) постановка очистительной клизмы
 - в) контроль за регидратацией
 - г) забор кала на яйца глистов
- 197 Основные симптомы дифтерии зева:
- а) налеты перламутровые, фибринозные
 - б) белый творожистый налет
 - в) боли в горле, регионарный лимфаденит
 - г) отсутствие болей в горле
- 198 Спазмофилия бывает:
- а) явная и скрытая
 - б) острая и хроническая
 - в) подострая и рецидивирующая
 - г) врожденная и приобретенная
- 199 Сестринский процесс при пиелонефрите включает все, кроме:
- а) соблюдения повышенного питьевого режима
 - б) соблюдения режима «принудительного» мочеиспускания
 - в) строго соблюдения гигиены тела
 - г) соблюдения диеты № 9
- 200 Спейсер — это:
- а) порошковый ингалятор
 - б) туманообразователь
 - в) приспособление в виде камеры емкостью от 0,3 до 1 литра
 - г) ингалятор «легкое дыхание»
- 201 Возбудитель туберкулеза:
- а) клебсиелла
 - б) клостридия
 - в) микобактерия Коха
 - г) микопlasма
- 202 Причины возникновения врожденных пороков сердца:
- а) затыжные роды
 - б) стремительные роды
 - в) внутриутробные инфекции
 - г) гемолитическая болезнь новорожденных
- 203 Медицинская психология — это:
- а) психопатология
 - б) отрасль клинической медицины, изучающая клиническое и душевное состояние пациента
 - в) отрасль психологической науки, изучающая психологические аспекты гигиены, профилактики, диагностики, лечения, экспертизы и реабилитации пациентов
 - г) отрасль медицины, изучающая душевное состояние пациентов при различных заболеваниях

- 204 Сестринский процесс при эпидемическом паротите:
- а) сухое тепло на околоушную область
 - б) изоляция на 10 дней, постельный режим
 - в) масляный компресс на околоушную область
 - г) введение сыворотки
- 205 Естественное вскармливание - это вскармливание:
- а) адаптированными смесями и введение прикорма
 - б) грудным молоком и введение прикорма
 - в) грудным молоком и адаптированными молочными смесями
 - г) грудным молоком и кефиром
- 206 Сестринский процесс при пневмонии:
- а) возвышенное положение в постели
 - б) полный покой
 - в) частая смена положения в постели
 - г) температура в палате 24-26 градусов
- 207 При вегетососудистой дистонии медсестра может порекомендовать:
- а) соблюдение режима дня
 - б) активный отдых на свежем воздухе
 - в) освобождение от физкультуры
 - г) иглорефлексотерапию
- 208 Какое мероприятие не является мерой вторичной профилактики бронхиальной астмы:
- а) предупредить приступ
 - б) предупредить заболевание
 - в) предотвратить осложнение
 - г) предотвратить астматический статус
- 209 Для сбора мочи на общий анализ медсестра должна обеспечить пациента:
- а) сухой банкой
 - б) сухой пробиркой
 - в) стерильной банкой
 - г) стерильной пробиркой
- 210 Для диагностики энтеробиоза используют:
- а) бактериологическое исследование кала
 - б) копрологическое исследование кала
 - в) соскоб с перианальных складок
 - г) кал на яйца глистов
- 211 Возбудитель дифтерии:
- а) палочка Борде- Жангу
 - б) вирус
 - в) палочка Леффлера
 - г) палочка Коха
- 212 Причиной родовой травмы может быть:
- а) незапланированная беременность
 - б) стремительные роды
 - в) применение щипцов во время родов
 - г) нарушение асептики

- 213 Осложнения вирусного гепатита С:
- а) дисбактериоз
 - б) цирроз печени
 - в) гломерулонефрит
 - г) миокардит
- 214 При остром гломерулонефрите моча имеет цвет:
- а) бесцветный
 - б) пива
 - в) соломенно-жёлтый
 - г) мясных помоев
- 215 Предвестники приступа бронхиальной астмы:
- а) зуд кожи
 - б) чихание, першение в горле
 - в) тошнота, рвота
 - г) иктеричность кожи
- 216 Основным симптомом при бронхиальной астме:
- а) инспираторная одышка
 - б) кашель с гнойной мокротой
 - в) кровохаркание
 - г) приступ удушья
- 217 Сестринский процесс при анемии:
- а) контроль за анализами мочи
 - б) проветривание помещения, температура 20-22°C, ежедневные прогулки
 - в) полноценное витаминизированное питание
 - г) рекомендовать вегетарианство, молоко
- 218 Основные симптомы коклюша:
- а) боль при жевании
 - б) спазматический кашель
 - в) склерит
 - г) лимфаденит
- 219 Карантинные мероприятия при кишечных инфекциях:
- а) карантин на 21 день
 - б) карантин на 7 дней
 - в) бактериологический анализ кала
 - г) вакцинопрофилактика
- 220 Объем желудка у новорожденного (в мл):
- а) 30-50
 - б) 100
 - в) 120
 - г) 150
- 221 Особенности течения эшерихиоза у детей раннего возраста:
- а) стул с примесью крови, скудный
 - б) рвота, эксикоз
 - в) стул водянистый, обильный
 - г) стул в виде «рисового отвара»

- 222 Фактор риска развития железодефицитной анемии у ребенка:
- а) Однообразное молочное вскармливание
 - б) Редкие приемы пищи
 - в) Использование прикормов промышленного производства
 - г) Легкая анемия у мамы в период беременности
- 223 Спазмофилия проявляется на фоне:
- а) рахита
 - б) анемии
 - в) омфалита
 - г) гипотрофии
- 224 Буквы в обозначении стола означают:
- а) Набор продуктов
 - б) Степень механической обработки
 - в) Температурный режим
 - г) Все перечисленное
- 225 При гемолитической болезни новорожденных желтуха появляется на:
- а) 1 день жизни
 - б) 3 день жизни
 - в) 5 день жизни
 - г) 7 день жизни
- 226 Сестринский процесс при опрелостях, потнице:
- а) воздушные ванны
 - б) температура в палате 24-26°C
 - в) соблюдение правил асептики
 - г) обработка кожи хлорофиллиптом
- 227 Частота дыхания новорождённого в минуту:
- а) 15-20
 - б) 25-30
 - в) 80-100
 - г) 40-60
- 228 Причины физиологической желтухи у новорожденных:
- а) незрелость печени
 - б) резус-конфликт
 - в) распад эритроцитов
 - г) родовая травма
- 229 Наиболее частые осложнения ринита у грудных детей:
- а) ангина
 - б) отит
 - в) гайморит
 - г) пневмония
- 230 Иммунопрофилактика туберкулеза новорожденным детям проводится:
- а) на 3-7 день жизни
 - б) на 10-14 день
 - в) внутрикожно
 - г) подкожно

- 231 Сестринский процесс при аллергическом рините:
- а) гипоаллергенная диета
 - б) применение антигистаминных препаратов
 - в) посещение плавательного бассейна
 - г) контроль за состоянием окружающей среды
- 232 Симптомы гипотрофии у детей раннего возраста:
- а) дефицит массы тела
 - б) инспираторная одышка
 - в) гидроцефалия
 - г) диспептические явления
- 233 Ревматический полиартрит оставляет после себя:
- а) Умеренную деформацию суставов
 - б) Неизменные суставы
 - в) Эритему в области суставов
 - г) Кардит
- 234 Причина развития гипотрофии в раннем возрасте:
- а) синдром мальабсорбции
 - б) нарушение обмена кальция
 - в) недостаток йода
 - г) однообразное вскармливание
- 235 Предрасполагающие факторы для развития гипотрофии у детей раннего возраста:
- а) недостаток витамина А
 - б) однообразное молочное вскармливание
 - в) недостаток витамина Д
 - г) нарушение фосфорно-кальциевого обмена
- 236 Профессиональная компетентность – это:
- а) степень развития личности
 - б) степень обученности
 - в) совокупность профессиональных и личностных качеств
 - г) вид профессиональной деятельности
- 237 Поражение нервной системы при ревматизме:
- а) гидроцефалия
 - б) хорея
 - в) арахноидит
 - г) менингит
- 238 Инсулин хранят:
- а) при комнатной температуре
 - б) при температуре +1°C +10°C
 - в) при температуре -1°C +1°C
 - г) в замороженном виде
- 239 Сестринский процесс при ОРВИ:
- а) постельный режим, смена белья, теплое питье
 - б) измерение диуреза, артериального давления (АД)
 - в) прием противовирусных препаратов
 - г) помощь при гипертермии

- 240 При бронхиальной астме отмечается одышка:
- а) инспираторная
 - б) экспираторная
 - в) респираторная
 - г) смешанная
- 241 Причины возникновения врожденных пороков сердца:
- а) быстрые роды
 - б) наследственная предрасположенность
 - в) асфиксия в родах
 - г) вирусные заболевания во время беременности
- 242 Основные симптомы краснухи:
- а) мелкопятнистая сыпь
 - б) ангина
 - в) увеличение лимфоузлов
 - г) отеки
- 243 К базисному лечению бронхиальной астмы относится:
- а) противовоспалительная терапия
 - б) ферментативная терапия
 - в) элиминационная терапия
 - г) физиотерапия
- 244 Геморрагический синдром характерен для:
- а) менингита
 - б) менинго-энцефалита
 - в) назофарингита
 - г) менингококкемии
- 245 Ранний неонатальный период - это период от:
- а) 0 до 7 дней жизни
 - б) 0 до 14 дней жизни
 - в) 7 до 28 дней жизни
 - г) 5 до 28 дней жизни
- 246 Ревматизм может развиваться после заболевания:
- а) кори
 - б) скарлатины
 - в) ветряной оспы
 - г) дифтерии
- 247 При метеоризме ребёнку грудного возраста применяют:
- а) лекарственную клизму
 - б) газоотводную трубку
 - в) массаж живота по ходу толстого кишечника
 - г) холод на область живота
- 248 После изоляции ребёнка с коклюшем из соматического отделения необходимо:
- а) установить карантин на 21 день
 - б) установить карантин на 15 дней
 - в) взять кал на баканализ
 - г) взять мазок из глотки на бакпосев
- 249 К возникновению ревматизма приводят:
- а) частые бронхиты
 - б) желудочно-кишечные расстройства
 - в) частые ангины
 - г) частые пневмонии

- 250 Симптомы, характерные для пиелонефрита:
- а) дизурия
 - б) лейкоцитурия
 - в) глюкозурия
 - г) уробилинурия
- 251 Для диагностики аскаридоза исследуют:
- а) рвотные массы
 - б) перианальный соскоб
 - в) мочу
 - г) фекалии
- 252 Изменения в моче при гломерулонефрите:
- а) глюкозурия
 - б) гематурия
 - в) бактериурия
 - г) протеинурия
- 253 Проба Манту проводится:
- а) 1 раз в год, начиная с 1-го года жизни
 - б) 0,1мл туберкулина внутрикожно
 - в) каждые 7 лет
 - г) 0,1мл туберкулина подкожно
- 254 К причинам возникновения гастродуоденита относится:
- а) психоэмоциональные нагрузки
 - б) гиподинамия
 - в) заражение геликобактер - пилори
 - г) вакцинопрофилактика
- 255 Симптомы эпидемического паротита:
- а) интоксикация
 - б) увеличение слюнных желез
 - в) диарея
 - г) увеличение лимфатических узлов
- 256 Признаки клинической смерти:
- а) отсутствие диуреза
 - б) отсутствие сознания
 - в) отсутствие пульса и дыхания
 - г) симптом «кошачьего глаза»
- 257 По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье — это:
- а) отсутствие болезней
 - б) нормальное функционирование систем организма
 - в) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
 - г) состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения
- 258 Из диеты больного геморрагическим васкулитом исключают:
- а) кисломолочные продукты
 - б) облигатные аллергены
 - в) глюкозу и другие сахара
 - г) животные жиры

- 259 Частота дыхания в минуту у ребенка в 5 лет составляет:
- а) 16-18
 - б) 20-25
 - в) 30-35
 - г) 35-40
- 260 Стафилококковая инфекция является причиной:
- а) эритемы
 - б) везикулопустулеза
 - в) омфалита
 - г) опрелостей
- 261 Источником заражения туберкулезом могут быть:
- а) человек
 - б) рогатый скот
 - в) рыбы
 - г) насекомые
- 262 Частота дыхания у здорового новорожденного ребёнка в 1 минуту:
- а) 25-30
 - б) 40-60
 - в) 60-80
 - г) 20-25
- 263 К адаптированным смесям относятся:
- а) Кефир
 - б) Фруто-няня
 - в) Агуша
 - г) Нутрилон
- 264 Потенциальная проблема пациента при сахарном диабете:
- а) потеря зрения
 - б) остеопороз
 - в) лёгочное кровотечение
 - г) печёночная кома
- 265 Преджелтушный период при вирусном гепатите:
- а) инкубационный
 - б) продромальный
 - в) разгар
 - г) выздоровление
- 266 Механизм передачи краснухи:
- а) фекально-оральный
 - б) трансплацентарный
 - в) трансмиссивный
 - г) воздушно-капельный
- 267 Причиной развития рахита является дефицит:
- а) витамина Д
 - б) селена, цинка
 - в) кальция, фосфора
 - г) железа, магния
- 268 Основные симптомы скарлатины:
- а) ангина
 - б) диарея
 - в) гипертензия
 - г) мелкоточечная сыпь

- 269 Визуальные изменения мочи при пиелонефрите:
- а) Соломенно-желтая
 - б) Цвета «пива»
 - в) Красного цвета
 - г) Мутная
- 270 Независимые сестринские вмешательства при гломерулонефрите:
- а) обильное витаминизированное питье
 - б) контроль за соблюдением диеты № 7
 - в) контроль за суточным диурезом и массой тела
 - г) коррекция медикаментозного лечения
- 271 Симптомы пневмонии у новорожденных детей:
- а) ригидность мышц затылка
 - б) одышка, апноэ
 - в) раздувание крыльев носа
 - г) гипертермия
- 272 Фальсифицированное лекарственное средство – это:
- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.
 - б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе.
 - в) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.
 - г) лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства
- 273 Условия для проведения термометрии:
- а) в покое, через 30 минут после сна
 - б) длительность термометрии 5 минут
 - в) длительность термометрии 10 минут
 - г) сразу после еды
- 274 Жидкий стул с примесью слизи и крови характерен для:
- а) шигеллеза
 - б) эшерихиоза
 - в) холеры
 - г) сальмонеллеза
- 275 Путь передачи инфекции при эпидемическом паротите:
- а) контактно-бытовой
 - б) парэнтеральный
 - в) воздушно-капельный
 - г) водно-пищевой
- 276 К признакам недоношенности относится:
- а) слабый крик
 - б) большой родничок открыт
 - в) масса тела менее 2500 г
 - г) масса тела более 2500

- 277 Детей с лейкозом необходимо оберегать от:
- а) общения с детьми
 - б) инфекционных заболеваний
 - в) эмоциональных игр
 - г) прогулок
- 278 Потенциальной проблемой у детей, больных скарлатиной, может быть:
- а) ДИСВП и кишечника
 - б) нарушение сна, эмоциональная лабильность
 - в) риск развития пневмонии
 - г) риск развития ревмокардита, заболевания почек
- 279 Путь передачи гельминтозов:
- а) пищевой
 - б) воздушно-капельный
 - в) трансмиссивный
 - г) парентеральный
- 280 Применение грелки предусматривает:
- а) температуру воды в грелке 60-65°C
 - б) температуру воды в грелке 70-80°C
 - в) смену воды в грелке каждые 10 минут
 - г) смену воды в грелке по мере ее остывания
- 281 Обязанности медицинской сестры при искусственном вскармливании грудного ребёнка:
- а) проводить коррекцию питания
 - б) проверять правильность подогрева смесей
 - в) заменять молочные смеси на аналогичные
 - г) держать при кормлении ребёнка на руках
- 282 Клинические симптомы герпетического стоматита:
- а) слюнотечение, отказ от пищи
 - б) брадикардия
 - в) диарея
 - г) лихорадка
- 283 Сестринский процесс при сепсисе:
- а) соблюдение правил асептики
 - б) применение иммуномодуляторов
 - в) контроль за массой тела, измерение температуры тела
 - г) коррекция питания
- 284 Физиологическая потеря массы тела новорожденного составляет:
- а) 5-10%
 - б) 11-15%
 - в) 16-20%
 - г) 21-25%
- 285 Профилактика дифтерии предусматривает:
- а) вакцинацию АКДС и АДС
 - б) введение антитоксической сыворотки
 - в) антибиотикотерапию
 - г) взятие мазка из зева и носа на ВЛ у контактных

- 286 Причины развития кандидозного стоматита:
- а) несоблюдение правил личной гигиены
 - б) кормление из бутылочки
 - в) прием антибиотиков
 - г) смешанное вскармливание
- 287 Клинические симптомы коклюша:
- а) кашель сухой, «лающий»
 - б) кашель спазматический с репризами
 - в) кровоизлияния в склеры
 - г) увеличение лимфатических узлов
- 288 Источник сальмонеллеза:
- а)птицы
 - б)вирусоносители
 - в)домашний скот
 - г)мясо диких животных
- 289 Возбудитель ветряной оспы:
- а) вирус
 - б) шигелла
 - в) палочка Борде-Жангу
 - г) менингококк
- 290 Сестринский процесс при гнойном конъюнктивите в период новорожденности:
- а) соблюдение санитарно – эпидемиологического режима в отделении
 - б) туалет глаз раствором борной кислоты
 - в) промывание глаз 0,05 % раствором перманганата калия
 - г) промывание глаз раствором левомицетина
- 291 Возбудитель кандидозного стоматита:
- а) вирусы
 - б) клостридии
 - в) стафилококки
 - г) грибки
- 292 Для лечения спазмофилии (гипокальциемии) применяют:
- а)антибиотики
 - б)антигистаминные препараты
 - в)сульфаниламиды
 - г)противосудорожные средства
- 293 Ротавирусная инфекция особенно тяжело протекает у:
- а) взрослых
 - б) новорожденных
 - в) дошкольников
 - г) подростков
- 294 Температура гигиенической ванны новорождённому:
- а)28-30 градусов
 - б)36-38 градусов
 - в)40-42 градуса
 - г)22-25 градусов
- 295 К физиологическим состояниям новорожденного относятся:
- а) цианоз
 - б) потница
 - в) мочекислый инфаркт
 - г) половой криз

- 296 Злокачественное заболевание крови - это:
- а) железодефицитная анемия
 - б) гемофилия
 - в) лейкоз
 - г) геморрагический васкулит
- 297 Гнойничковые заболевания кожи новорожденного:
- а) Эритема
 - б) Пузырчатка
 - в) Опрелость
 - г) Потница
- 298 Симптомы рахита в период разгара:
- а) мышечный гипертонус
 - б) мышечная гипотония
 - в) деформация костей
 - г) сухость кожи
- 299 Палочка Борде-Жангу являются возбудителем:
- а) скарлатины
 - б) коклюша
 - в) менингококковой инфекции
 - г) дифтерии
- 300 Кандидозный стоматит возникает при инфицировании:
- а) вирусами
 - б) грибами
 - в) бактериями
 - г) простейшими