

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ  
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

(для участковых медицинских сестёр поликлиник и цеховых врачебных участков,  
прошедших обучение по циклам

**15.1 "Первичная медико-профилактическая помощь населению (для участковых  
медицинских сестер поликлиник и цеховых врачебных участков)",  
профессиональной переподготовки по специальности  
«Сестринское дело»)**

- 1 Заболевания, приводящие к формированию пороков сердца:
  - а) гипертоническая болезнь
  - б) ИБС
  - в) атеросклероз аорты
  - г) ревматизм
- 2 Подготовка пациента к эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) включает:
  - а) голод в течение суток перед обследованием
  - б) натошак, накануне вечером - очистительная клизма
  - в) натошак
  - г) натошак, накануне прием слабительных
- 3 Вид стула при остром энтерите:
  - а) обильный, жидкий
  - б) большое количество слизи в каловых массах
  - в) примесь неизменной крови в каловых массах
  - г) пенистый с неперевавленными кусочками пищи
- 4 Пиелонефрит—это:
  - а) дистрофическое поражение почек
  - б) иммунное воспаление почек
  - в) воспалительное заболевание почек
  - г) воспаление околопочечной клетчатки
- 5 Развитие анафилактического шока через 5 минут после внутривенного введения лекарства является формой:
  - а) молниеносной
  - б) тяжелой
  - в) средней тяжести
  - г) легкой
- 6 Сестринские вмешательства при гипертензивном кризе:
  - а) клофелин под язык
  - б) внутривенно раствор магнезии или внутримышечно раствор дибазола
  - в) горчичники на область затылка и икроножных мышц
  - г) горячие камерные ручные и ножные ванны
- 7 К отходам класса В относят:
  - а) материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекционными болезнями
  - б) пищевые отходы неинфекционных отделений
  - в) органические операционные отходы
  - г) пищевые отходы инфекционных отделений

- 8 При остром пиелонефрите в анализе мочи определяются:
- а) гематурия, протеинурия
  - б) лейкоцитурия, бактериурия
  - в) глюкозурия, цилиндрурия
  - г) глюкозурия, протеинурия
- 9 В момент распыления бронхоспазмолитического средства из баллончика-ингалятора пациент должен:
- а) сделать резкий вдох
  - б) сделать медленный вдох
  - в) задержать дыхание
  - г) резкий выдох
- 10 Правильность постановки полуспиртового компресса контролируют:
- а) через 30 мин – 1 час
  - б) через 1 – 1,5 часа
  - в) через 2 – 2,5 часа
  - г) сразу после постановки
- 11 Заболевания, требующие ограничения потребления жидкости пациентом:
- а) гломерулонефрит
  - б) пиелонефрит
  - в) недостаточность кровообращения
  - г) пневмония
- 12 Болезни легких, сопровождающиеся кровохарканьем:
- а) туберкулез легких
  - б) плеврит
  - в) хронический бронхит
  - г) центральный рак легких
- 13 При отеке легких оксигенотерапия проводится:
- а) увлажненным кислородом
  - б) кислородом, обогащенным углекислым газом
  - в) пеногасителем
  - г) не проводится
- 14 Изменения в общем анализе мочи у пациента с острым гломерулонефритом:
- а) гематурия, протеинурия, цилиндрурия
  - б) гематурия, глюкозурия, цилиндрурия
  - в) лейкоцитурия, протеинурия, цилиндрурия
  - г) лейкоцитурия, протеинурия, бактериурия
- 15 Соотношение компрессий на грудину и искусственных вдохов при проведении реанимации
- а) 2:15
  - б) 3:6
  - в) 30:2
  - г) 1:5
- 16 Каковы действия медицинской сестры при условии, что пациент болен СПИД?
- а) работа в защитном костюме
  - б) работа в обычных условиях, соблюдая меры предосторожности (избегать повреждения перчаток и кожных покровов)
  - в) не предпринимать никаких мер
  - г) не оказывать помощь

- 17 У пациента с ИБС участились приступы стенокардии, увеличилась продолжительность (до 15 мин.) приступов, они стали купироваться большим количеством таблеток нитроглицерина. Такая ситуация характерна для:
- а) стенокардии покоя
  - б) стабильной стенокардии II функционального класса
  - в) стабильной стенокардии IV функционального класса
  - г) нестабильной (прогрессирующей) стенокардии
- 18 Пациентам, принимающим сердечные гликозиды, следует повысить потребление:
- а) мяса
  - б) овощей, фруктов
  - в) растительных жиров
  - г) молочных продуктов
- 19 Осложнением гипертензивного криза 2-го вида является:
- а) ишемический инсульт
  - б) инфаркт миокарда
  - в) отек мозга
  - г) анасарка
- 20 Вариантами систолической артериальной гипертензии является АД:
- а) 150/80 мм.рт.ст
  - б) 135/90 мм.рт.ст
  - в) 160/100 мм.рт.ст
  - г) 170/89 мм.рт.ст
- 21 Положительная реакция Манту у взрослого считается при наличии:
- а) гиперемии 5мм
  - б) папулы 2мм
  - в) папулы 2мм и более
- 22 Азотистые шлаки образуются в организме при распаде:
- а) белков
  - б) витаминов
  - в) жиров
  - г) углеводов
- 23 Бициллино – профилактика проводится больным ревматизмом:
- а) 5 лет – 1 раз в месяц
  - б) 5 лет – 1 раз в квартал
  - в) 5 лет – 2 раза в год - весной и осенью
  - г) пожизненно 2 раза в год
- 24 К клиническим проявлениям крапивницы относится все, кроме:
- а) гиперемии кожи
  - б) уртикарной сыпи
  - в) зуда
  - г) резкого снижения давления
- 25 Температура воды для холодного компресса (в градусах):
- а) 10 – 12
  - б) 18 – 24
  - в) 36 – 37
  - г) 38 – 40

- 26 Гемодиализ применяется для устранения:
- а) гипокалиемии
  - б) гипонатриемии
  - в) гиперкалиемии
  - г) гипернатриемии
- 27 После ингаляции бронхоспазмолитического средства из баллончика - ингалятора следует:
- а) резко выдохнуть
  - б) медленно выдохнуть
  - в) задержать дыхание на 10 с, затем выдохнуть
  - г) задержать дыхание на 5 с
- 28 Рентгенологическое контрастное исследование почек и мочевыводящих путей:
- а) ирригоскопия
  - б) томография
  - в) хромоцистоскопия
  - г) экскреторная урография
- 29 Задержка мочи называется
- а) анурией
  - б) полиурией
  - в) олигурией
  - г) ишурией
- 30 Факторы риска развития хронического бронхита:
- а) курение
  - б) повышенное содержание химических веществ в окружающем воздухе
  - в) переохлаждения, частые вирусные инфекции
  - г) принадлежность к мужскому полу
- 31 «Дефицит пульса» - это:
- а) слабый нитевидный пульс
  - б) резкая брадикардия
  - в) аритмичный пульс
  - г) пульс более редкий, чем число сердечных сокращ
- 32 Ревматизм – заболевание:
- а) инфекционное
  - б) инфекционно – аллергическое
  - в) аллергическое
- 33 К проявлениям гипогликемического состояния относится все, кроме:
- а) влажных кожных покровов
  - б) резкой слабости, тремора конечностей
  - в) сухости кожи
  - г) чувства голода
- 34 Какой путь введения адреналина предпочтителен при оказании первой помощи пациентам с анафилактическим шоком:
- а) внутривенный
  - б) внутримышечный
  - в) подкожный
  - г) ингаляционный

- 35 Поллакиурия - это:
- а) редкое мочеиспускание
  - б) учащённое мочеиспускание
  - в) преобладание ночного диуреза над дневным
  - г) преобладание дневного диуреза над ночным
- 36 Высыпания на кожных покровах при инфекционных заболеваниях называются:
- а) энантема
  - б) экзантема
  - в) эритема
  - г) гиперемия
- 37 Симптомы передозировки сердечных гликозидов:
- а) тошнота, рвота, понос
  - б) тахикардия
  - в) брадикардия
  - г) экстрасистолия на ЭКГ
- 38 Факторы риска гипертонической болезни:
- а) нервно-эмоциональные стрессы
  - б) большая масса тела
  - в) активный образ жизни
  - г) курение
- 39 Реакция Грегерсена основана на определении в кале:
- а) алюминия
  - б) железа
  - в) калия
  - г) магния
- 40 Один из симптомов нефролитиаза:
- а) острые или тупые боли в области почек
  - б) тошнота
  - в) головокружение
  - г) повышение АД
- 41 Нормативный документ МЗ, регламентирующий работу медицинского персонала по профилактике сыпного тифа и борьбе с педикулёзом:
- а) приказ № 490 от 2006г
  - б) приказ № 408 от 1986г
  - в) приказ № 342 от 1998г
  - г) приказ № 170 от 1994г
- 42 Медицинские отходы класса Б и В должны собираться:
- а) в сертифицированную упаковку с цветовой маркировкой
  - б) в сертифицированную герметичную упаковку с цветовой маркировкой
  - в) в мусорные контейнеры
- 43 Выделение большого количества гнойной мокроты («полным ртом») характерно для:
- а) бронхита
  - б) первого периода абсцесса легких
  - в) второго периода абсцесса легких
  - г) очагового туберкулеза легких

- 44 Первичная профилактика ревматизма включает:
- а) прием аспирина весной и осенью в течение 2-х недель
  - б) своевременное лечение инфекций и санация хронических очагов
  - в) введение бициллина весной и осенью
  - г) введение бициллина круглогодично на протяжении 5 лет
- 45 При регистрации ЭКГ на конечности накладываются электроды со следующими маркировками:
- а) на правую руку - черный
  - б) на правую ногу - красный
  - в) на левую руку - желтый
  - г) на левую руку — зеленый
- 46 Нефролитиаз - это:
- а) опущение почки
  - б) почечно — каменная болезнь
  - в) сморщивание почки
  - г) инфекционно-воспалительный процесс в паренхиме почек
- 47 Противорецидивное лечение ревматизма проводится:
- а) 1 год 2 раза
  - б) 3 года 2 раза в год
  - в) 5 лет ежемесячно
  - г) 5 лет 2 раза в год
- 48 Комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций организма, — это:
- а) реформация
  - б) реабилитация
  - в) транслокация
  - г) трансплантация
- 49 Азотистые шлаки образуются в организме при распаде:
- а) белков
  - б) витаминов
  - в) жиров
  - г) углеводов
- 50 Признаки гипогликемической комы:
- а) быстрое развитие, без предкоматозного состояния
  - б) запах ацетона от кожи и слизистых
  - в) влажные, бледные кожные покровы
  - г) сухость кожи
- 51 Отек всего тела называется:
- а) асцит
  - б) анурия
  - в) ан а с арка
  - г) отек Квинке
- 52 Возбудителем туберкулёза является:
- а) пневмококк
  - б) палочка Коха
  - в) палочка Леффлера
  - г) стрептококк

- 53 Осложнением ревматизма может быть:
- а) хроническая недостаточность кровообращения
  - б) хроническая функциональная недостаточность суставов
  - в) только острая недостаточность кровообращения
  - г) острая сосудистая недостаточность
- 54 К заменимым нутриентам относятся:
- а) пищевые волокна
  - б) полиненасыщенные жирные кислоты
  - в) углеводы
  - г) аминокислоты
- 55 Для перелома основания черепа характерен симптом:
- а) "очков"
  - б) Кернига
  - в) Брудзинского
- 56 Охлаждение ожоговой поверхности холодной водой показано:
- а) в первые минуты после ожога в течении 10-15 минут
  - б) не показано
  - в) при ожоге II степени
- 57 АД равное 140/90 мм рт.ст. является:
- а) гипотензией
  - б) вариантом нормы
  - в) гипертензией
  - г) изолированной диастолической гипертензией у лиц пожилого возраста
- 58 Препарат, относящийся к гемостатикам:
- а) аминокaproновая кислота
  - б) фолиевая кислота
  - в) реополиглюкин
  - г) эналаприл
- 59 Основной симптом бронхита:
- а) интоксикация
  - б) кашель
  - в) лихорадка
  - г) кровохарканье
- 60 Влияние инсулина на содержание сахара в крови:
- а) повышает содержание сахара в крови
  - б) понижает содержание сахара в крови
  - в) возможны оба варианта в зависимости от типа инсулина
  - г) не влияет на содержание сахара в крови
- 61 Гормоном щитовидной железы является:
- а) адреналин
  - б) тироксин
  - в) тиреотропный гормон
  - г) инсулин
- 62 С какого момента исчисляется срок наблюдения за эпидемическим очагом:
- а) с момента выявления больного
  - б) с момента изоляции и проведения заключительной дезинфекции с в) момента выхода в очаг
  - г) нет правильного ответа

- 63 Клинические формы бронхиальной астмы:
- а) атопическая
  - б) эмфизематозная
  - в) инфекционно зависимая
  - г) пневмосклерозирующая
- 64 Для сотрясения головного мозга характерно:
- а) кома
  - б) ретроградная амнезия
  - в) антероградная амнезия
  - г) конградная амнезия
- 65 С целью профилактики пролежней по стандарту положение пациента в постели необходимо менять:
- а) каждый час
  - б) каждые 2 часа
  - в) каждые 3 часа
  - г) чем чаще – тем лучше
- 66 Тактика медицинской сестры при острой боли в животе:
- а) дать пациенту обезболивающие средства или спазмолитики
  - б) применить теплую грелку
  - в) местно применить холод
  - г) дать пациенту холодное питье
- 67 Синдром острой сосудистой недостаточности характеризуется:
- а) сердечной астмой, отеком легких
  - б) шоком, коллапсом, обмороком
  - в) гипертермией
  - г) анурией
- 68 Заражение сифилисом не может произойти:
- а) при половом и бытовом контакте
  - б) внутриутробно
  - в) половым путем
  - г) воздушно-капельным путем
- 69 Развитие анафилактического шока через 5 минут после в/в введения лекарства является формой:
- а) молниеносной
  - б) тяжелой
  - в) средней тяжести
  - г) легкой
- 70 Профессиональная компетентность - это:
- а) степень развития личности
  - б) степень обученности
  - в) совокупность профессиональных и личностных качеств
  - г) вид профессиональной деятельности
- 71 Алгоритм медсестринского вмешательства при гипертензивном кризе включает:
- а) назначение транквилизаторов
  - б) назначение клофелина под язык
  - в) отвлекающую терапию (камерные ванночки, горчичники)
  - г) введение спазмолитиков



- 72 В клинической симптоматике астматического статуса характерным является:
- а) дистанционные сухие хрипы
  - б) дистанционные влажные хрипы
  - в) «немое легкое»
  - г) появление пенистой мокроты
- 73 Особенности инфекционных болезней:
- а) скоротечность, сезонность, заразность
  - б) волнообразность, массовость, формирование носительства
  - в) контагиозность, специфичность, цикличность
  - г) высокая летальность, контагиозность, наличие специфических переносчиков
- 74 Переход в хроническую форму характерен для вирусных гепатитов:
- а) А и С
  - б) В, С и Д
  - в) В, А и Е
  - г) А и В
- 75 Острая дыхательная недостаточность при истинном (альвеолярном) отеке легких возникает в результате:
- а) пропотевания плазмы крови в альвеолы
  - б) попадания жидкости в альвеолы (аспирация жидкости)
  - в) пропотевания форменных элементов крови в альвеолы
  - г) бронхоспазма
- 76 Начальными признаками сердечной недостаточности у пожилых является:
- а) отеки
  - б) пароксизмальное нарушение сердечного ритма
  - в) покашливание при разговоре
  - г) проявления гипоксии мозга
- 77 Основными клиническими симптомами пищевых токсикоинфекций являются:
- а) тошнота, многократная рвота, обильный водянистый стул
  - б) длительная лихорадка
  - в) жидкий стул, тенезмы
  - г) слабость, недомогание
- 78 С целью профилактики пролежней следует менять положение пациента в постели:
- а) каждый час
  - б) каждые 2 часа
  - в) каждые 2 – 3 часа
  - г) как можно чаще
- 79 Стресс — это:
- а) нервное напряжение
  - б) вид дистресса
  - в) неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему требование
  - г) состояние организма, возникающее в результате воздействия различных факторов и характеризующееся напряжением неспецифических адаптационных механизмов
- 80 На правую ногу накладывается электрод:
- а) красного цвета
  - б) черного цвета
  - в) желтого цвета
  - г) зеленого цвета

- 81 Осложнения внутривенных инъекций:
- а) абсцесс
  - б) гематома
  - в) воздушная эмболия
  - г) флебит
- 82 Особенности инфекционных болезней:
- а) скоротечность, сезонность, заразность
  - б) волнообразность, массовость, формирование носительства
  - в) контагиозность, специфичность, цикличность
  - г) высокая летальность, контагиозность, наличие специфических переносчиков
- 83 Стерилизационные методы обработки инструментария воздействуют:
- а) на патогенную микрофлору
  - б) на непатогенную микрофлору
  - в) на спорообразующие микроорганизмы
  - г) на все виды микроорганизмов, в том числе и спорообразующие
- 84 Основные симптомы при хроническом гастрите со сниженной секрецией:
- а) изжога, отрыжка кислым, боли в эпигастрии после еды, поносы
  - б) тяжесть в эпигастрии после еды, отрыжка тухлым, метеоризм, поносы
  - в) интенсивные боли в мезогастррии после еды, ночные голодные боли, изжога, запоры
  - г) ноющие, жгучие, интенсивные боли в эпигастрии после еды, уменьшающиеся после еды
- 85 ВИЧ относится к семейству:
- а) рабдовирусов
  - б) гепадновирусов
  - в) ретровирусов
  - г) аденовирусов
- 86 Независимые сестринские вмешательства при гипертермическом синдроме:
- а) холодные компрессы
  - б) пузырь со льдом на область крупных сосудов
  - в) протирание кожи легко испаряющимися жидкостями
  - г) жаропонижающие препараты
- 87 Неотложная м/с помощь пациенту при приступе атонической бронхиальной астмы:
- а) удалить от воздействия аллергена
  - б) введение раствора преднизолона
  - в) введение внутримышечно преднизолона
  - г) ингаляция бронхолитика
- 88 Потенциальная проблема пациента при циррозе печени:
- а) желтуха
  - б) снижение аппетита
  - в) кожный зуд
  - г) кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода
- 89 Осложнение язвенной болезни 12 – перстной кишки:
- а) кровотечение желудочное
  - б) рубцово – язвенный стеноз привратника
  - в) кровотечение кишечное
  - г) перфорация

- 90 Признак, свидетельствующий о неэффективном лечении пневмонии антибиотиком (через 3 дня):
- а) высокая температура
  - б) влажные хрипы в легком
  - в) рентгенологическая картина
  - г) лейкоцитоз
- 91 Срок повторного осмотра пациента после обнаружения педикулеза и обработки волосистой части головы (в днях):
- а) 14
  - б) 7-10
  - в) 5
  - г) 3
- 92 Эффективность диспансеризации оценивается за период диспансерного наблюдения сроком:
- а) 1 год
  - б) 3 года
  - в) 5 лет
  - г) 10 лет
- 93 Разница между частотой сердечных сокращений и частотой периферического пульса называется:
- а) аритмией
  - б) пульсовым давлением
  - в) дефицитом пульса
  - г) тахикардией
- 94 При лечении нагноившихся ран дренаж используется для:
- а) ускорения эпителизации
  - б) остановки кровотечения
  - в) обеспечения оттока отделяемого
  - г) тугой тампонады раны
- 95 Требования к сбору анализа мокроты на ВК:
- а) собирается натощак
  - б) собирается в течение суток три дня подряд
  - в) полость рта прополаскивается после еды кипяченой водой
  - г) полость рта прополоскать перед плевком раствором антисептика
- 96 Осложнение бронхиальной астмы:
- а) пневмосклероз
  - б) эмфизема легких
  - в) хронический обструктивный бронхит
  - г) крупозная пневмония
- 97 Острый гломерулонефрит возникает после ангины через:
- а) 1—2 дня
  - б) 3—4 дня
  - в) 1—2 недели
  - г) 1—2 месяца
- 98 Клапанами сердца, перекрывающими предсердно-желудочковые отверстия являются:
- а) полулунные
  - б) двухстворчатый
  - в) трехстворчатый
  - г) венечные

- 99 Стеаторея - это:
- а) наличие крови в кале
  - б) наличие зерен крахмала в кале
  - в) наличие мышечных волокон в кале
  - г) наличие капель нейтрального жира в кале
- 100 Водный баланс – это:
- а) жидкость потребляемая пациентом за сутки
  - б) суточный диурез
  - в) соотношение потребляемой пациентом за сутки жидкости и суточного диуреза
  - г) преобладание суточного диуреза над потребленной за сутки жидкостью
- 101 Осложнением очаговой пневмонии является:
- а) плеврит
  - б) абсцесс легкого
  - в) дыхательная недостаточность
  - г) бронхиальная астма
- 102 Препарат из группы ингибиторов протонной помпы обкладочных клеток:
- а) гастроцепин
  - б) ранитидин
  - в) фамотидин
  - г) омепрозол
- 103 Продолжительность болевого приступа, характерная для стенокардии:
- а) до 5 минут
  - б) 5 – 10 минут
  - в) до 30 минут
  - г) 30 минут и более
- 104 Приоритетное направление в работе участковой медицинской сестры, в соответствии с приказами МЗ №8 16 и № 490:
- а) организационное
  - б) лечебно-диагностическое
  - в) профилактическое
  - г) повышение профессиональной квалификации
  - д) обеспечение инфекционной безопасности
- 105 Альбуминурия — это:
- а) повышенное содержание белка в моче
  - б) повышенное содержание белка в крови
  - в) примесь крови в моче
  - г) гной в моче
- 106 Существуют следующие формы желтухи:
- а) гемолитическая
  - б) печеночная (паренхиматозная)
  - в) анемическая
  - г) механическая
- 107 Вторичный период сифилиса характеризуется появлением на коже:
- а) эрозии или язвы
  - б) пятнистых и папулезных высыпаний
  - в) бугорковых высыпаний
  - г) узлов

- 108 Критическое снижение температуры характерно для:
- а) мелкоочаговой пневмонии
  - б) крупноочаговой пневмонии
  - в) любой бронхопневмонии
  - г) долевого или крупозной пневмонии
- 109 Оказание первой помощи при химическом ожоге следует начать с:
- а) наложения сухой стерильной повязки
  - б) промывания ожоговой поверхности под проточной водой
  - в) проведения нейтрализации
  - г) местного применения холода
- 110 Мазок из зева на ВЛ берут, чтобы исключить:
- а) дифтерию
  - б) сифилис
  - в) туберкулез
  - г) сальмонеллез
- 111 Гипертензивный криз первого вида может осложниться:
- а) геморролическим инсультом
  - б) отеком мозга
  - в) острой почечной недостаточностью
  - г) ишемическим инсультом
- 112 Осложнение хронического гастрита В:
- а) гепатит
  - б) холецистит
  - в) рефлюкс-эзофагит
  - г) язвенная болезнь
- 113 Неотложное состояние, часто развивающееся, при пневмонии:
- а) инфекционно-токсический шок
  - б) кишечная непроходимость
  - в) астматическое состояние
  - г) кровотечение
- 114 С целью вторичной профилактики ревматизма пациентам назначаются:
- а) аспирин + пенициллин
  - б) только бициллин
  - в) аскорутин + тетрациклин
  - г) аспирин + бициллин + аскорутин
- 115 Для ревматического артрита характерно:
- а) летучесть болей
  - б) поражение мелких суставов
  - в) стойкие изменения в суставах с деформацией и функциональной недостаточностью
  - г) симметричность поражения суставов
- 116 При заборе кала на яйца гельминтов каловые массы следует взять:
- а) из глубины каловых масс
  - б) с поверхности каловых масс
  - в) из различных мест
  - г) петель из прямой кишки

- 117 При ревматизме могут поражаться:
- а) сердце и суставы
  - б) кожа
  - в) ЦНС
  - г) волосы и ногти
- 118 Патогномоничные признаки желудочного кровотечения:
- а) бледность, слабость
  - б) головная боль, головокружение
  - в) рвота «кофейной гущей», дегтеобразный стул
  - г) тахикардия, снижение АД
- 119 К заменимым нутриентам относятся:
- а) пищевые волокна
  - б) полиненасыщенные жирные кислоты
  - в) углеводы
  - г) аминокислоты
- 120 При ревматизме чаще всего поражается:
- а) клапаны аорты
  - б) клапаны легочной артерии
  - в) митральный клапан
  - г) все клапаны поражаются с одинаковой частотой
- 121 Снижение уровня лейкоцитов в крови называется:
- а) лейкоз
  - б) лейкоцитоз
  - в) лейкопения
  - г) лейкопения
- 122 Признаки гипертонической болезни 2-ой степени:
- а) эпизоды повышения АД до 160/100
  - б) гипертрофия левого желудочка
  - в) сужение артерий на глазном дне
  - г) кровоизлияния на глазном дне, отслойка сетчатки
- 123 Тактика м/с в случае продолжения ангинозной боли более 15 минут:
- а) нитроглицерин под язык каждые 15 мин
  - б) аспирин или тромбо-АС под язык, вызов врача или «скорой»
  - в) вызов врача или «скорой» раствор анальгина внутримышечно
  - г) внутримышечно максиган или тромал и вызов «скорой»
- 124 Причина развития эндемического зоба:
- а) вирусная инфекция
  - б) переохлаждение
  - в) инсоляция
  - г) недостаточное количество йода в пище
- 125 Наиболее частая причина острого гастрита:
- а) нарушение режима питания
  - б) стресс
  - в) приём недоброкачественной пищи
  - г) курение
- 126 Признаки недостаточности кровообращения по большому кругу:
- а) одышка
  - б) отеки на ногах
  - в) увеличение печени
  - г) цианоз губ

- 127 Внутрибольничная инфекция возникает при наличии:
- а) источника инфекции
  - б) факторов и путей передачи
  - в) источника инфекции
  - г) источника инфекции + факторов передачи + восприимчивого коллектива
- 128 Для анализа мочи на глюкозурию моча собирается:
- а) утром 100 — 150 мл
  - б) утром 50 - 100 мл моча из средней порции струи
  - в) 24 часа, перемешивается, измеряется, отливается 150 - 200 мл на анализ
  - г) за 24 часа, 8 порций
- 129 Слизистая глаз, при попадании биологической жидкости (в том числе крови) обрабатывается:
- а) раствором перманганата калия 0,05%
  - б) раствором перманганата калия 0,01%
  - в) сульфацилом натрия (альбуцидом) 20 %
  - г) проточной водопроводной водой
- 130 Сроки наблюдения за эпид, очагом определяются:
- а) проведением заключительной дезинфекции
  - б) сроком инкубационного периода
  - в) госпитализацией источника инфекции
  - г) сроком периода разгара
- 131 Изменения на конечности при наложении венозного жгута пульс:
- а) сохранен, конечность теплая, отечная, цианотичная
  - б) не определяется ниже жгута, конечность бледная, холодная
  - в) слабый, конечность бледная, не отечная
  - г) сохранен, конечность обычной окраски, не отечна
- 132 Спастическим колитом страдают пациенты:
- а) преимущественно пожилого возраста
  - б) с повышенной эмоциональной возбудимостью
  - в) с выраженным ожирением
  - г) с гиподинамией
- 133 Этические нормы медицинского работника определяются:
- а) умениями и навыками
  - б) законами и приказами
  - в) этническими особенностями региона
  - г) моральной ответственностью
- 134 Для обострения хронического холецистита характерны:
- а) боли в правом подреберье, диспепсические расстройства, субфебрилитет
  - б) увеличение печени, боли в левом подреберье, субфебрилитет
  - в) фебрильная температура, рвота, боли в эпигастрии
  - г) диспепсические расстройства, субфебрилитет, боли в эпигастрии
- 135 Подготовка пациента к ЭГДС:
- а) исключение газообразующей пищи за три дня до исследования
  - б) проводится натощак
  - в) рекомендовать пациенту с утра слюну не глатывать, а сплевывать
  - г) очистительная клизма вечером накануне исследования

- 136 Основной фактор в развитии обострения хронического бронхита:
- а) курение
  - б) промышленные поллютанты
  - в) инфекция верхних дыхательных путей
  - г) неблагоприятные климатические условия (холодный климат, повышенная влажность)
- 137 Отеки сердечного происхождения появляются:
- а) утром на лице
  - б) утром на ногах
  - в) вечером на лице
  - г) вечером на ногах
- 138 Для приступа сердечной астмы характерна одышка:
- а) инспираторного типа
  - б) экспираторного типа
  - в) смешанного типа
  - г) дыхание типа Куссмауля
- 139 Побочный эффект приема нитроглицерина:
- а) брадикардия
  - б) коллапс
  - в) гипертензивный криз
  - г) носовое кровотечение
- 140 Атипичные формы инфаркта миокарда:
- а) ангинозная
  - б) церебральная
  - в) периферическая
  - г) абдоминальная
- 141 Клинические признаки приступа бронхиальной астмы:
- а) дистанционные сухие хрипы
  - б) учащенное дыхание
  - в) урежение число дыхательных движений
  - г) «немое легкое»
- 142 Рекомендации по питанию пациентам с диареей:
- а) большое количество жидкости
  - б) крепкий чай
  - в) рисовый отвар
  - г) отварная свекла
- 143 При хроническом гломерулонефрите с выраженной азотемией назначают диету:
- а) основной вариант стандартной
  - б) вариант с пониженным количеством белка
  - в) вариант с пониженной калорийностью
  - г) вариант с повышенным количеством белка
- 144 При ревматизме чаще поражается:
- а) митральный клапан
  - б) клапаны аорты
  - в) клапаны легочной артерии
  - г) трикуспидальный клапан



- 145 К эндоскопическим методам обследования органов дыхания относятся:
- а) рентгенография
  - б) флюорография
  - в) бронхоскопия
  - г) спирография
- 146 Пациентам, страдающим сердечной недостаточностью следует ограничить:
- а) потребление поваренной соли и жидкости
  - б) потребление овощей
  - в) потребление мясной пищи
  - г) молочные продукты
- 147 При атеросклерозе поражаются:
- а) артерии
  - б) вены
  - в) капилляры
  - г) мышцы
- 148 Источником инфекции при сыпном тифе является:
- а) больной сыпным тифом
  - б) окружающая среда
  - в) вошь
  - г) грызуны
- 149 Признаками печеночной недостаточности являются:
- а) асцит
  - б) желтуха, геморрагический синдром
  - в) варикоз вен пищевода
  - г) запах ацетона от кожи и слизистых
- 150 Сердечная недостаточность по малому кругу проявляется:
- а) отеками на ногах
  - б) увеличением печени
  - в) одышкой, цианозом
  - г) повышением АД
- 151 Критерий II стадии гипертонической болезни:
- а) отсутствие изменений на глазном дне
  - б) гипертрофия левого желудочка
  - в) первично сморщенная почка
  - г) сердечная недостаточность
- 152 Один из симптомов нефролитиаза:
- а) острые или тупые боли в области почек
  - б) тошнота
  - в) головокружение
  - г) повышение АД
- 153 Признак воздушной эмболии:
- а) приступ удушья
  - б) судороги
  - в) внезапное повышение АД
- 154 При желтухе первыми желтеют:
- а) кожные покровы
  - б) слизистые оболочки
  - в) стопы
  - г) ладони

- 155 Специфической профилактикой туберкулеза является:
- а) вакцинация БЦЖ
  - б) постановка реакции Манту
  - в) флюорографическое обследование населения
  - г) пропаганда здорового образа жизни
- 156 При отсутствии в организме антианемического фактора развивается анемия:
- а) железодефицитная
  - б) гемолитическая
  - в) фолиеводефицитная
  - г) В12 – дефицитная
- 157 Приоритетная проблема пациента при хроническом гастрите с сохраненной секреторной функцией:
- а) изжога
  - б) плохой сон
  - в) запор
  - г) боль в эпигастральной области
- 158 Появление крови в моче - это:
- а) уремия
  - б) гематурия
  - в) альбуминурия
  - г) протеинурия
- 159 В течении пневмонии у пожилых пациентов можно выделить следующие особенности:
- а) острое начало
  - б) высокая лихорадка
  - в) сильный кашель
  - г) стертая клиническая картина, незначительные физикальные изменения
- 160 Истощение пациента, чувство переполнения в эпигастрии, рвота при язвенной болезни – это:
- а) малигнизации
  - б) пенетрации
  - в) стеноза привратника
  - г) клинического кровотечения
- 161 При переломе костей предплечья шина накладывается от:
- а) лучезапястного сустава до нижней 1/3 плеча
  - б) лучезапястного сустава до верхней 1/3 плеча
  - в) кончиков пальцев до верхней 1/3 плеча
  - г) кончиков пальцев до противоположной лопатки
- 162 Суточный диурез пожилого пациента составил 300 мл - это:
- а) анурия
  - б) олигурия
  - в) полиурия
  - г) изостенурия
- 163 Особенность течения чесотки у детей:
- а) бессимптомность течения дерматоза
  - б) сильный зуд днем
  - в) шелушение кожи
  - г) высыпания на коже лица

- 164 Действия м/с в случае продолжительности острой коронарной боли у пациента более 15 минут:
- а) рекомендовать увеличение суточной дозы нитратов
  - б) рекомендовать амбулаторно консультацию врача – терапевта
  - в) рекомендовать амбулаторно консультацию врача – кардиолога
  - г) срочно госпитализировать больного по «03»
- 165 Для 1-го вида гипертензивного криза характерна:
- а) тахикардия
  - б) брадикардия
  - в) большое пульсовое давление
  - г) малое пульсовое давление
- 166 С какого момента исчисляется срок наблюдения за эпидемическим очагом:
- а) с момента выявления больного
  - б) с момента изоляции и проведения заключительной дезинфекции
  - в) с момента выхода в очаг
  - г) нет правильного ответа
- 167 Пациентам с атеросклерозом в питании следует ограничить потребление:
- а) творога
  - б) курятины
  - в) свинины
  - г) жирных сортов говядины
- 168 При употреблении консервированной и другой герметически упакованной пищи создается риск заболевания:
- а) дизентерией
  - б) ботулизмом
  - в) сальмонеллезом
  - г) стафилококковой пищевой токсикоинфекцией
- 169 Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются:
- а) генетические
  - б) уровень и образ жизни населения
  - в) уровень, качество и доступность медицинской помощи
  - г) все вышеперечисленное
- 170 Начальными признаками сердечной недостаточности у пожилых является:
- а) отеки
  - б) пароксизмальное нарушение сердечного ритма
  - в) покашливание при разговоре
  - г) проявления гипоксии мозга
- 171 Глюкозотолерантный тест проводится для диагностики:
- а) гипертонической болезни
  - б) хронического гепатита
  - в) сахарного диабета
  - г) несахарного диабета
- 172 Клинические признаки анемии:
- а) бледность кожи и слизистых
  - б) тахикардия
  - в) иктеричность кожи и слизистых
  - г) слабость, головокружение

- 173 Укажите наиболее приоритетное направление структурных преобразований здравоохранении:
- а) развитие ПМСП
  - б) развитие сети диспансеров
  - в) повышение роли стационаров
  - г) повышение роли санитарно-курортной помощи
- 174 При ушибе в качестве средства первой помощи применяют:
- а) согревающий компресс
  - б) пузырь со льдом
  - в) горячий компресс
  - г) влажное обертывание
- 175 Пациенты после купирования анафилактического шока:
- а) должны быть обязательно госпитализированы
  - б) госпитализации не подлежат
  - в) при полном купировании явлений шока могут быть оставлены под наблюдение участкового врача
  - г) направляются в дневной стационар
- 176 Заболевания, передающиеся половым путём:
- а) сифилис
  - б) гепатит А
  - в) ботулизм
  - г) крапивница
- 177 Сроки наблюдения за эпид, очагом определяются:
- а) проведением заключительной дезинфекции
  - б) сроком инкубационного периода
  - в) госпитализацией источника инфекции
  - г) сроком периода разгара
- 178 Выберите варианты диастолической артериальной гипертензии:
- а) 120/70 мм.рт.ст.
  - б) 140/89 мм.рт.ст.
  - в) 139/90 мм.рт.ст.
  - г) 135/100 мм.рт.ст.
- 179 Азотистые шлаки - это
- а) альбумины, глобулины
  - б) билирубин, холестерин
  - в) глюкоза, липопротеиды
  - г) креатинин, мочевины
- 180 Клинические формы острой сосудистой недостаточности:
- а) сердечная астма
  - б) отек легких
  - в) обморок
  - г) коллапс
- 181 Положения, регламентирующие поведение медсестры на рабочем месте отражено в:
- а) национальном проекте «Здоровье»
  - б) в целевой программе «Здоровье столицы»
  - в) этическом кодексе медицинской сестры
  - г) в журнале «Медицинская сестра»

- 182 Обильный, жидкий, пенистый зловонный кал с неперева­ренными кусочками пищи характерен для:
- а) острого колита
  - б) острого энтерита
  - в) язвенной болезни 12-ти перстной кишки
  - г) язвенной болезни желудка
- 183 Сроки наблюдения за очагом педикулеза:
- а) 30 дней
  - б) 20 дней
  - в) 10 дней
  - г) 40 дней
- 184 Приоритетные проблемы пациента при остром гломерулонефрите:
- а) слабость, недомогание
  - б) повышенная утомляемость, лихорадка
  - в) снижение работоспособности и аппетита
  - г) головная боль, отеки
- 185 Появление патологического зубца Q на ЭКГ является:
- а) признаком синусовой аритмии
  - б) признаком стенокардии
  - в) признаком инфаркта миокарда
  - г) блокады одной из ножек пучка Гиса
- 186 Характеристика первичной медико-санитарной помощи населению:
- а) дополнительный вид помощи, гарантируемый системой обязательного медицинского страхования
  - б) основной платный вид помощи в системе добровольного медицинского страхования
  - в) бесплатный вид помощи, предоставляемый только детям и пенсионерам
  - г) основной бесплатный вид помощи, доступный всем гражданам
- 187 Стресс - это:
- а) нервное напряжение
  - б) вид дистресса
  - в) неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему требование
  - г) состояние организма, возникающее в результате воздействия различных факторов и характеризующееся напряжением неспецифических адаптационных механизмов
- 188 Осложнения язвенной болезни:
- а) кровотечение
  - б) гастрит
  - в) хронический энтерит
  - г) рубцово-язвенный стеноз привратника
- 189 Перерождение язвы в рак называется:
- а) пенетрация
  - б) перфорация
  - в) малигнизация
  - г) метастазирование
- 190 Колоноскопия - это исследование толстой кишки:
- а) рентгенологическое
  - б) ультразвуковое
  - в) эндоскопическое
  - г) томографическое

- 191 Для менингококкцемии характерна сыпь :
- а) пятнисто — папулёзная
  - б) пустулёзная
  - в) геморрагическая
  - г) геморрагическая везикулёзная
- 192 Грудная клетка бочкообразной формы характерна для:
- а) очагового пневмосклероза
  - б) диффузного пневмосклероза
  - в) эмфиземы легких
  - г) экссудативного плеврита
- 193 Амилоидоз — это:
- а) деформация суставов
  - б) ограничение пассивных движений в суставе
  - в) неподвижность сустава вследствие сращения суставных поверхностей
  - г) заболевание с отложением специфического белка в органах и тканях
- 194 Клиническое проявление приступа бронхиальной астмы приступ:
- а) удушья с затрудненным выдохом
  - б) удушья с затрудненным вдохом
  - в) кашля с обильной гнойной мокротой
  - г) удушья, сопровождающийся звуком кипящего чайника
- 195 Второй период лихорадки – это:
- а) подъем температуры с ознобом
  - б) стабилизация температуры на высоком уровне
  - в) критическое снижение температуры
  - г) литическое снижение температуры
- 196 Метод временной остановки наружного венозного кровотечения:
- а) наложение жгута
  - б) максимальное сгибание конечности
  - в) наложение давящей повязки
  - г) наложение герметичной повязки
- 197 Анализ мочи по методу Нечипоренко проводится для определения в единице объема:
- а) белка, глюкозы
  - б) солей, билирубина
  - в) ацетона, глюкозы
  - г) лейкоцитов, эритроцитов
- 198 Алгоритм сестринской помощи при остром коронарном синдроме включает:
- а) введение анальгетиков
  - б) введение наркотических анальгетиков
  - в) дачу нитроглицерина и аспирина под язык
- 199 Самая тяжелая клиника при локализации отека Квинке:
- а) на лице
  - б) на наружных половых органах
  - в) на слизистой верхних дыхательных путей
  - г) степень тяжести при всех локализациях одинаковая
- 200 Забор кала на анализ на дизентерийную группу проводится:
- а) из свежевыделенного кала в чашку Петри
  - б) из свежевыделенного кала в стерильную чашку Петри
  - в) петлей из прямой кишки в стерильную пробирку
  - г) в стерильную пробирку из разных мест каловых масс

- 201 Метод временной остановки наружного венозного кровотечения:
- а) начожение жгута
  - б) максимальное сгибание конечности
  - в) наложение давящей повязки
  - г) наложение герметичной повязки
- 202 Особенность введения инсулина:
- а) строго в/м
  - б) в/к, шарик со спиртом не прикладывать
  - в) п/к, через 30 минут поесть
- 203 Профилактические мероприятия при бронхиальной астме:
- а) избегать контакта с аллергеном
  - б) мероприятия на снижения запыленности помещений
  - в) снижение химических раздражителей в воздухе
  - г) гипохлоридная диета
- 204 Температура воды для клизмы при атоническом запоре (в градусах):
- а) 12 – 15
  - б) 18 – 20
  - в) 36 – 37
  - г) 37 – 38
- 205 При сердечно-лёгочной реанимации в тройной приём Сафара не входит:
- а) запрокидывание головы
  - б) положение на боку
  - в) выдвижение нижней челюсти вверх
  - г) открывание рта
- 206 Поздними признаками биологической смерти являются:
- а) отсутствие сознания, сужение зрачка
  - б) помутнение роговицы, «кошачий зрачок»
  - в) трупное окоченение
  - г) трупные пятна
- 207 При употреблении консервированной и другой герметически упакованной пищи создается риск заболевания
- а) дизентерией
  - б) ботулизмом
  - в) сальмонеллезом
  - г) стафилококковой пищевой токсикоинфекцией
- 208 При возникновении укола необеззараженным инструментом во время проведения парентеральных процедур для оказания первой помощи из «Укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций» используются:
- а) 70% этиловый спирт,
  - б) ножницы;
  - в) стерильная марлевая салфетка;
  - г) 70% этиловый спирт, 5% спиртовой раствор йода, лейкопластырь
- 209 Каковы действия медицинской сестры при условии, что пациент болен СПИД?
- а) работа в защитном костюме
  - б) работа в обычных условиях, соблюдая меры предосторожности (избегать повреждения перчаток и кожных покровов)
  - в) не предпринимать никаких мер
  - г) не оказывать помощь

- 210 Критерий II стадии гипертонической болезни:
- а) отсутствие изменений на глазном дне
  - б) гипертрофия левого желудочка
  - в) первично сморщенная почка
  - г) сердечная недостаточность
- 211 При заболеваниях печени и желчного пузыря пациентам следует ограничить потребление:
- а) молока и других молочных продуктов
  - б) жира
  - в) сахара
  - г) жареных блюд
- 212 К виду дисциплинарного взыскания относится:
- а) штраф
  - б) порицание
  - в) выговор
- 213 Медицинская сестра обеспечит правильное положение пациента с гипертоническим кризом:
- а) горизонтальное
  - б) с приподнятым ножным концом
  - в) сидячее
  - г) с приподнятым головным концом
- 214 Основные симптомы ревматического полиартрита:
- а) повышение температуры, стойкая деформация суставов
  - б) поражение крупных суставов, летучесть и симметричность болей
  - в) поражение мелких суставов, скованность
  - г) недомогание, моноартрит с деформацией
- 215 Основным симптом язвенной болезни:
- а) рвота
  - б) боль
  - в) снижение аппетита
  - г) неустойчивый стул
- 216 Канцелярские отходы, упаковка, инвентарь, потерявший потребительские свойства, образующиеся в медицинском учреждении, относятся к медицинским отходам:
- а) класса А,
  - б) класса Б,
  - в) класса В,
  - г) класса Г,
  - д) класса Д
- 217 Высыпания на кожных покровах при инфекционных заболеваниях называются
- а) энантема
  - б) экзантема
  - в) эритема
  - г) гиперемия
- 218 Появление на ЭКГ широкого и глубокого зубца Q характерно для:
- а) стенокардии:
  - б) тромбоэмболии легочной артерии
  - в) инфаркта миокарда
  - г) мерцательной аритмии



- 219 Выделение «ржавой мокроты» отмечается при:
- а) хроническим бронхите
  - б) крупозной пневмонии
  - в) кавернозном туберкулезе легких
  - г) бронхиальной астме
- 220 Полное уничтожение микроорганизмов, их споровых форм называется:
- а) дезинфекцией
  - б) стерилизацией
  - в) дезинсекцией
  - г) дератизацией
- 221 Препарат, относящийся к группе р - блокаторов:
- а) капотен
  - б) энап
  - в) атенолол
  - г) аллопуринол
- 222 При регистрации ЭКГ на конечности накладываются электроды со следующими маркировками:
- а) на правую руку - черный
  - б) на правую ногу – красный
  - в) на левую руку - желтый
  - г) на левую руку — зеленый
- 223 Второй грудной электрод при регистрации ЭКГ располагают на грудной клетке:
- а) во 2-м межреберье справа у края грудины
  - б) во 2-м межреберье слева у края грудины
  - в) в 4-м межреберье справа у края грудины
  - г) в 4-м межреберье слева у края грудины
- 224 Соотношение компрессий на грудину и искусственных вдохов при проведении реанимации
- а) 2:15
  - б) 3:6
  - в) 30:2
  - г) 1:5
- 225 Температура воды для очистительной клизмы при спастических запорах:
- а) 18 – 24 °С
  - б) 24 – 26 °С
  - в) 30 – 36 °С
  - г) 38 – 40 °С
- 226 Какой из перечисленных Законов имеет высшую юридическую силу:
- а) Конституция Российской Федерации
  - б) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
  - в) Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
  - г) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»
- 227 Подъем сегмента ST над изолинией может быть признаком:
- а) гипертрофии левого желудочка
  - б) стенокардии
  - в) мерцательной аритмии
  - г) инфаркта миокарда

- 228 Факторы риска перфорации язвы желудка:
- а) переизбыток
  - б) подъем тяжести
  - в) злоупотребление крепкими алкогольными напитками
  - г) употребление газированных напитков
- 229 Цветовой показатель равен 0,8 характерен:
- а) для гипохромной анемии
  - б) для нормохромной анемии
  - в) для гиперхромной анемии
  - г) для лейкоза
- 230 Отеки почечного происхождения появляются
- а) утром на ногах
  - б) утром на лице
  - в) вечером на ногах
  - г) вечером на лице
- 231 В диагностический минимум амбулаторного обследования пациента с внебольничной пневмонией НЕ входит:
- а) рентгенография органов грудной клетки
  - б) клинический анализ крови
  - в) физикальное обследование
  - г) микробиологическое исследование мокроты
- 232 Все отходы ЛПУ по степени опасности делят на:
- а) 2 класса
  - б) 3 класса
  - в) 4 класса
  - г) 5 классов
- 233 Карантин при кишечных инфекциях накладывается на:
- а) 5 дней
  - б) 7 дней
  - в) 2 недели
  - г) 30 дней
- 234 Задержка мочи называется:
- а) анурией
  - б) полиурией
  - в) олигурией
  - г) ишурией
- 235 Потенциальная проблема пациента с бронхоэктатической болезнью:
- а) лихорадка
  - б) снижение аппетита
  - в) кашель с гнойной мокротой
  - г) кровохарканье
- 236 Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью, относятся к классу:
- а) А
  - б) Б
  - в) В
  - г) Г

- 237 Максимальное время на которое может быть наложен артериальный жгут:
- а) 2 часа
  - б) 1,5 часа
  - в) 1 час
  - г) 30 минут
- 238 Максимально допустимы сроки начала постконтактной профилактики антиретровирусными препаратами при риске инфицирования ВИЧ:
- а) не позднее 24 часов
  - б) не позднее 36 часов
  - в) не позднее 72 часов
  - г) не позднее 12 часов
- 239 Факторы риска ИБС:
- а) возраст до 40 лет
  - б) курение
  - в) артериальная гипертензия
  - г) гиподинамия
- 240 Желтуха развивается вследствие:
- а) увеличения в крови билирубина
  - б) употребления большого количества моркови
  - в) терапии акрихином
  - г) уменьшения в крови гемоглобина
- 241 Комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций организма, — это:
- а) реформация
  - б) реабилитация
  - в) транслокация
  - г) трансплантация
- 242 К отходам класса В относят
- а) материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекционными болезнями
  - б) пищевые отходы неинфекционных отделений
  - в) органические операционные отходы
  - г) пищевые отходы инфекционных отделений
- 243 Туберкулёз – это заболевание:
- а) острое инфекционное
  - б) хроническое инфекционное
  - в) хроническое инфекционное социальной значимости
  - г) не инфекционное
- 244 Число поражённых при областных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах) составляет:
- а) 10-50 поражённых
  - б) 50-500 поражённых
  - в) свыше 500 поражённых
  - г) до 10 поражённых
- 245 К основным симптомам СПИДА относятся:
- а) гепатоспленомегалия, слабость, головная боль
  - б) лимфаденопатия, диарея более месяца, лихорадка более месяца
  - в) потеря массы тела, желтушность кожных покровов
  - г) ночные поты, слабость

- 246 Приоритетные проблемы пациента при остром гломерулонефрите
- а) слабость, недомогание
  - б) повышенная утомляемость, лихорадка
  - в) снижение работоспособности и аппетита
  - г) головная боль, отеки
- 247 Минимальной морфологической структурой легких является:
- а) доля
  - б) ацинус
  - в) сегмент
  - г) долька
- 248 Схваткообразные боли в животе, отсутствие отхождения стула и газов являются симптомами:
- а) острого аппендицита
  - б) острого холецистита
  - в) запора
  - г) острой кишечной непроходимости
- 249 Возбудителем туберкулёза является:
- а) пневмококк
  - б) папочка Коха
  - в) папочка Леффлера
  - г) стрептококк
- 250 Вариант изолированной диастолической артериальной гипертензии – уровень АД:
- а) 170/110 мм.рт.ст.
  - б) 130/95 мм.рт.ст.
  - в) 140/90 мм.рт.ст.
  - г) 190/80 мм.рт.ст.
- 251 Облегчающее положение для больных сухим плевритом:
- а) сидя
  - б) лежа на здоровом боку
  - в) лежа на больном боку
  - г) нет облегчающего положения
- 252 При гипогликемической коме сознание у пациента:
- а) сохранено
  - б) отсутствует
  - в) затуманено
  - г) теряется кратковременно
- 253 Продолжительность болевого приступа, характерная для инфаркта миокарда:
- а) до 5 минут
  - б) 5 – 10 минут
  - в) до 30 минут
  - г) 30 минут и более
- 254 Продолжительность загрудинной боли при инфаркте миокарда:
- а) менее 5 минут
  - б) 5 – 10 минут
  - в) 15 – 20 минут
  - г) 30 минут и более

- 255 Вакцинация детей из групп риска против ВГВ проводится по схеме (в соответствии с национальным календарем профилактических прививок):
- а) новорожденные в первые 24 часа жизни - 1 месяц - 2 месяца-12 месяцев
  - б) новорожденные в первые 24 часа жизни - 1 неделя - 6 недель-12 недель
  - в) новорожденные в первые 24 часа жизни — 1месяц -6 месяцев-12 месяцев
  - г) новорожденные в первые 24 часа жизни — 1месяц - 12 месяцев
- 256 Первым признаком появления пролежней является:
- а) участок бледной кожи в местах риска развития пролежней
  - б) участок гиперемии кожи, исчезающей при осмотре за 1 – 2 минуты
  - в) участок стойкой неисчезающей гиперемии
  - г) участок некроза кожи
- 257 Гломерулонефрит - заболевание:
- а) аллергической природы
  - б) инфекционной природы
  - в) инфекционно-аллергической природы
  - г) врожденное с наследственной предрасположенностью
- 258 Методы неспецифической профилактики туберкулеза легких- это:
- а) соблюдение санитарных противоэпидмероприятий
  - б) флюорографическое обследование населения
  - в) БЦЖ
  - г) реакция Манту
- 259 Аллергические реакции немедленного типа:
- а) сывороточная болезнь
  - б) ангионевротический шок
  - в) анафилактический шок
  - г) инфекционно зависимая бронхиальная астма
- 260 Для приступа сердечной астмы характерна одышка:
- а) инспираторного типа
  - б) экспираторного типа
  - в) смешанного типа
  - г) дыхание типа Кусмауля
- 261 Территориальная программа госгарантий населению определяет собой:
- а) перечень медицинских услуг, предоставляемых населению бесплатно
  - б) перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
  - в) перечень услуг, которые гражданин может получить в соответствии с договором
  - г) перечень услуг, указанных в полисе медицинского страхования
- 262 Этиологической причиной холецистита является:
- а) редкие приемы пищи
  - б) наличие камней в желчном пузыре
  - в) жирная пища
  - г) инфекция в желчном пузыре
- 263 С целью специфической профилактики ревматизма пациенту необходимо:
- а) 1 раз в квартал проводить лечение бициллином
  - б) 1 раз в квартал проводить лечение бициллин + аспирин
  - в) 2 раза в год (сезонно) проводить лечение бициллин + аспирин
  - г) закаливание, здоровый образ жизни, своевременное адекватное лечение всех инфе

- 264 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» эпидемиологически безопасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
  - б) класса Б,
  - в) класса В,
  - г) класса Г,
  - д) класса Д
- 265 Левый желудочек выбрасывает у здорового человека кровь в:
- а) легочную артерию в период систолы
  - б) легочную артерию в период диастолы
  - в) аорту в период систолы
  - г) аорту в период диастолы
- 266 Рана является проникающей, если:
- а) в ней находится инородное тело
  - б) повреждены только кожа и подкожная клетчатка
  - в) повреждены мышцы и кости
  - г) повреждены пристеночные серозные оболочки
- 267 Какой побочный эффект может чаще развиваться при регулярном использовании ингаляционных кортикостероидов:
- а) дисфония
  - б) аллергический дерматит
  - в) задержка мочи
  - г) нет правильного ответа
- 268 Ранние осложнения инфаркта миокарда:
- а) хроническая левожелудочковая недостаточность
  - б) кардиогенный шок
  - в) хроническая аневризма сердца
  - г) острая левожелудочковая недостаточность
- 269 Кашель с белой пенистой мокротой, клочущее дыхание развиваются при:
- а) легочном кровотечении
  - б) отеке легких
  - в) сердечной астме
  - г) бронхиальной астме
- 270 Сестринское вмешательство при гипогликемии:
- а) внутривенно капельно 5% раствор глюкозы
  - б) внутривенно струйно 40% раствор глюкозы
  - в) сахар под язык
  - г) преднизолон 30 мг или раствор адреналин 0,1% - 0,5 мл
- 271 При регистрации ЭКГ электрод черного цвета накладывается на:
- а) правую руку
  - б) правую ногу
  - в) левую руку
  - г) левую ногу

- 272 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» эпидемиологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
  - б) класса Б,
  - в) класса В,
  - г) класса Г,
  - д) класса Д
- 273 Дефицит пульса – это:
- а) 80 – 70 в минуту
  - б) 70 – 60 в минуту
  - в) реже 60 в минуту
  - г) пульс реже числа сердечных сокращений
- 274 Креаторея — это:
- а) наличие крови в кале
  - б) наличие зерен крахмала в кале
  - в) наличие мышечных волокон в кале
  - г) наличие капель нейтрального жира в кале
- 275 Приступы атопической бронхиальной астмы вызываются контактом с аллергеном:
- а) инфекционной природы
  - б) неинфекционной природы
  - в) аллергеном любой природы
  - г) только совместным попаданием нескольких различных аллергенов
- 276 Рана является проникающей, если
- а) в ней находится инородное тело
  - б) повреждены только кожа и подкожная клетчатка
  - в) повреждены мышцы и кости
  - г) повреждены пристеночные серозные оболочки
- 277 Тип лихорадки, при которой суточные колебания температуры составляют 2 – 3 градуса, отмечаются ознобы, проливные поты:
- а) извращенная
  - б) гектическая
  - в) ремиттирующая
  - г) интермиттирующая
- 278 Какой путь введения адреналина предпочтителен при оказании первой помощи пациентам с анафилактическим шоком:
- а) внутривенный
  - б) внутримышечный
  - в) подкожный
  - г) ингаляционный
- 279 Независимым сестринским вмешательством при гипертензивном кризе является:
- а) внутривенно введение дибазола и магнезии
  - б) под язык таблетку клофелина
  - в) камерные горячие ванны, горчичники на затылок и икроножные мышцы
  - г) все перечисленное
- 280 Кашель с розовой мокротой, kloкочущее дыхание развиваются при:
- а) легочном кровотечении
  - б) отеке легких
  - в) сердечной астме
  - г) бронхиальной астме

- 281 Диффузный пневмосклероз развивается после:
- а) очаговой пневмонии
  - б) крупозной пневмонии
  - в) хронического бронхита
  - г) пневмокониозов
- 282 К эндоскопическим методам обследования органов дыхания относятся:
- а) рентгенография
  - б) флюорография
  - в) бронхоскопия
  - г) спирография
- 283 Планирование сестринского ухода – это:
- а) первый этап сестринского процесса
  - б) второй этап сестринского процесса
  - в) третий этап сестринского процесса
  - г) четвертый этап сестринского процесса
- 284 К какой диспансерной группе относятся пациенты с бронхиальной астмой:
- а) I
  - б) II
  - в) III
  - г) O
- 285 Симптомы, характерные для острого периода инфаркта миокарда:
- а) подъем температуры
  - б) лейкоцитоз
  - в) ускорение СОЭ
  - г) снижение уровня ферментов в крови (АСТ, АЛТ, КФК)
- 286 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» чрезвычайно эпидемиологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
  - б) класса Б,
  - в) класса В,
  - г) класса Г,
  - д) класса Д
- 287 Ревматизм поражает:
- а) суставы
  - б) сердце
  - в) кожу
  - г) все перечисленное
- 288 Клинические проявления острой сосудистой недостаточности
- а) отек легких
  - б) сердечная астма
  - в) коллапс
  - г) шок
- 289 Для крупозной пневмонии характерным является:
- а) возбудитель – стрептококковая инфекция
  - б) температура снижается литическим путем
  - в) снижение температуры происходит критически
  - г) воспалительный процесс вовлекается в плевра



- 290 Способ наблюдения за динамикой отеков:
- а) взвешивание пациента
  - б) измерение объемов
  - в) контроль водного баланса
  - г) спирометрия
- 291 Основная причина развития диабетической кетоацидотической комы:
- а) недостаток инсулина в организме
  - б) избыток инсулина в организме
  - в) избыток сахароснижающих препаратов
  - г) избыточное потребление жидкости
- 292 Пациентам с хроническим гепатитом следует исключить из пищи:
- а) легко усваиваемые углеводы
  - б) жареную пищу
  - в) пищу, приготовленную на пару
  - г) жирную пищу
- 293 Фармакодинамика - это:
- а) раздел фармакологии, изучающий влияние лекарственного средства на организм больного или здорового человека
  - б) раздел фармакологии, изучающий процессы, происходящие с лекарственным средством от момента его поступления в организм до его выведения
  - в) раздел фармакологии, рассматривающий основы генетической чувствительности организма к лекарственному средству
  - г) раздел фармакологии, рассматривающий особенности взаимодействия лекарственных веществ между собой
- 294 Мероприятия по профилактике хронического гепатита:
- а) рациональное питание
  - б) устранение контакта с гепатотропными ядами
  - в) своевременное распознавание и лечение острых вирусных гепатитов
  - г) все перечисленное
- 295 Специфическим заболеванием легких является:
- а) бронхиальная астма
  - б) очаговая пневмония
  - в) туберкулез легких
  - г) бронхоэктатическая болезнь
- 296 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» токсикологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
  - б) класса Б,
  - в) класса В,
  - г) класса Г,
  - д) класса Д
- 297 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» «радиоактивными» отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
  - б) класса Б,
  - в) класса В,
  - г) класса Г,
  - д) класса Д

298 Выделение большого количества гнойной мокроты («полным ртом») характерно для:

- а) бронхита
- б) первого периода абсцесса легких
- в) второго периода абсцесса легких
- г) очагового туберкулеза легких

299 Появление на ЭКГ широкого и глубокого зубца Q характерно для:

- а) стенокардии
- б) тромбоэмболии легочной артерии
- в) инфаркта миокарда
- г) мерцательной аритмии

300 Симптомы очаговой пневмонии:

- а) высокая лихорадка
- б) чаще субфебрильная температура
- в) кровохарканье
- г) симптомы интоксикации