

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

(для медицинских сестёр наркологических отделений и кабинетов, прошедших обучение по циклам 15.17 "Сестринское дело в наркологии", профессиональной переподготовки по специальности «Сестринское дело»)

- 1 О психопатоподобных изменениях личности наркомана свидетельствуют:
 - а) колебания эмоционального фона и снижение интеллекта;
 - б) раздражительность, возбудимость, неспособность критически оценивать свои действия и сужения круга интересов;
 - в) неспособность критически оценивать свои действия и снижение интеллекта;
 - г) снижение интеллекта, сужение круга интересов;
- 2 Летучие органические соединения (средства бытовой и промышленной химии) имеют ряд общих качеств, к которым относятся:
 1. хорошая растворимость в жирах;
 2. высокая токсичность;
 3. быстрая испаряемость;
 4. высокая наркогенность;
 5. преимущественное поражение ЦНС, сердца, печени и почек при злоупотреблении ими.
 - а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 3 Объектом профилактики в наркологии являются:
 1. больные люди, страдающие зависимостью от ПАВ;
 2. подростки из неблагополучных семей;
 3. подростки, замеченные в употреблении ПАВ;
 4. все контингенты населения;
 5. школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ.
 - а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3,5
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4
- 4 Антидепрессанты обладают следующими эффектами действия:
 1. антипсихотическим;
 2. седативным;
 3. миорелаксирующим;
 4. противосудорожным;
 5. транквилизирующим.
 - а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

- 5 Оглушение относится к расстройствам:
- мышления
 - восприятия
 - интеллекта
 - сознания
- 6 К критериям синдрома зависимости по МКБ-10 относятся:
- сильное желание или чувство насильственной тяги к приёму вещества;
 - физиологическое состояние отмены, при котором приём вещества прекращается или уменьшается, о чем свидетельствует характерный для вещества синдром отмены;
 - нарушение способности контролировать приём вещества, т.е. начало употребления, окончание или дозировку употребляемых веществ;
 - формирующаяся соматическая патология;
 - социальная дезадаптация.
- верно 1,2,3
 - верно 1,3
 - верно 2,4
 - верно 4
- 7 Токсикомании, формирующиеся вследствие злоупотребления лекарственными препаратами, чаще всего возникают из-за:
- нерационального, неправильного лечения;
 - частого приема бензодиазепинов при бессоннице или других расстройствах;
 - частого приема медикаментов при различных неблагоприятных жизненных ситуациях;
 - лечения барбитуратами
- 8 Клиника дисфорического варианта измененного простого алкогольного (острой алкогольной интоксикации) опьянения характеризуется:
- состоянием напряженности, сопровождаемой недовольством, угрюмостью в сочетании с неприязнью и злобой;
 - преобладанием подавленного настроения
 - придирчивостью с агрессивностью;
 - появлением суицидальных мыслей, сопровождаемых суицидальными действиями;
 - моторной заторможенностью.
- верно 1,2,3
 - верно 1,3
 - верно 2,4
 - верно все перечисленное
- 9 Наркотики – это препараты:
- вызывающие психическую зависимость при длительном употреблении
 - обладающие снотворным действием
 - обладающие седативным действием
 - обладающие жаропонижающим действием

- 10 Полизависимость формируется при употреблении нескольких ПАВ, которые:
1. по типу действия на ЦНС обладают одинаковыми эффектами у больных;
 2. при комбинированном приеме способны усиливать действие друг друга;
 3. обладают разной продолжительностью действия;
 4. оказывают разнонаправленные эффекты;
 5. обладают одинаковой продолжительностью действия.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4
- 11 Объектом профилактики в наркологии являются:
1. больные люди, страдающие зависимостью от ПАВ;
 2. подростки из неблагополучных семей;
 3. подростки, замеченные в употреблении ПАВ;
 4. все контингенты населения;
 5. школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3,5
в) верно 2,4
г) верно 4
- 12 По отношению к алкоголю население делится на:
- а) устойчивых к алкоголизму
 - б) злоупотребляющих и больных алкоголизмом
 - в) «любителей» спиртных напитков
 - г) выздоровевших от алкоголизма
- 13 О распространенности пьянства и алкоголизма наиболее объективно свидетельствует следующий показатель:
- а) рождаемость
 - б) смертность
 - в) количество абсолютного алкоголя, потребляемого на душу населения в год
 - г) количество состоящих на учете больных алкоголизмом
- 14 Синдром физической зависимости от наркотика включает:
1. компульсивное влечение;
 2. состояние отмены;
 3. способность достижения физического комфорта в интоксикации;
 4. общую депримированность;
 5. несобранность больного.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

- 15 Состояние отмены при бензодиазепиновой токсикомании проявляется:
1. тревогой, неусидчивостью, подавленностью и злобой;
 2. фибриллярными подергиваниями лицевой мускулатуры и мышц конечностей;
 3. тахикардией и ортостатической гипотензией;
 4. горизонтальным нистагмом и мелкокоразмашистым тремором;
 5. бессонницей, головными болями, тошнотой, отсутствием аппетита.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 16 Амбулаторные автоматизмы относятся к расстройствам:
- а) мышления
 - б) восприятия
 - в) сознания
 - г) интеллекта
- 17 Карбамазепин в наркологической практике применяют для:
1. коррекции аффективных нарушений;
 2. снижения интенсивности патологического влечения;
 3. лечение судорожных расстройств;
 4. профилактики судорожных расстройств;
 5. коррекции психопатоподобных нарушений.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 18 Характерными особенностями псевдозапой у больных алкоголизмом являются:
1. видимая связь алкогольного эксцесса с внешними факторами (начало и окончание псевдозапой)
 2. длительность периода ежедневного злоупотребления алкоголя от 3-4 дней до двух недель;
 3. сохранение высокой толерантности в течение всего периода злоупотребления;
 4. отчетливое изменение у больных как психического, так и физического состояния за несколько дней до начала эксцесса;
 5. спонтанность начала алкогольного эксцесса.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 19 К нарушениям памяти относятся:
- а) ментизм, шперрунг, обстоятельность
 - б) кратковременная и долговременная память
 - в) резонерство, разорванность мышления
 - г) амнезия, конфабуляции, псевдореминисценции

- 20 Изменения личности у больных алкоголизмом обусловлены:
1. токсическим действием алкоголя и его метаболитов;
 2. длительностью заболевания;
 3. психореактивными факторами;
 4. преморбидными характерологическими особенностями;
 5. сопутствующей соматической патологией.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 21 Чаще всего зависимость от ПАВ формируется у лиц:
1. с дефектами воспитания;
 2. с личностными девиациями;
 3. с нарушениями социальной адаптации;
 4. с невысоким уровнем профессиональной ориентации;
 5. с невысоким интеллектом.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 22 При прекращении приема наркотиков у больных развивается:
- а) синдром «рикошета»
 - б) абстинентный синдром
 - в) психоз
 - г) судорожный припадок
- 23 Объем однократно вводимой жидкости при зондовом промывании желудка взрослому пациенту составляет:
- а) 300 мл
 - б) 500 мл
 - в) 900 мл
 - г) 1000 мл
- 24 Среди социальных факторов, влияющих на формирование алкоголизма, наиболее значимыми являются:
1. алкогольная политика государства;
 2. социальное положение индивидуума и его экономическая обеспеченность;
 3. устойчивые обычаи ближайшего окружения;
 4. семейное положение
 5. расовая и этническая принадлежность.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

- 25 Актуализация ситуационно обусловленного первичного патологического влечения к алкоголю в значительной степени проявляется:
1. стойкими навязчивыми мыслями об алкоголе;
 2. повышенной двигательной активностью и суетливостью при появлении алкогольных раздражителей, или ситуаций связанных с алкоголем
 3. беспричинной раздражительностью;
 4. чрезмерным стремлением к контактам с окружающими;
 5. появлением сновидений с алкогольной тематикой.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 26 Деградация личности при наркомании развивается:
- а) при приеме наркотиков
 - б) в развернутой стадии
 - в) в стадии истощения
 - г) при абстиненции
- 27 Нарушения мышления по форме:
- а) депрессия
 - б) резонерство
 - в) деменция
 - г) дурашливость
- 28 Сенестопатии это:
- а) локализованные неприятные, тягостные ощущения;
 - б) необычные, часто алгические, ощущения с меняющейся локализацией;
 - в) тягостные болевые ощущения в утраченной конечности;
 - г) тягостные ощущения ползания насекомых, червей и т.п. под кожей, внутри тела.
- 29 Объектом профилактики в наркологии являются:
1. больные люди, страдающие зависимостью от ПАВ;
 2. подростки из неблагополучных семей;
 3. подростки, замеченные в употреблении ПАВ;
 4. все контингенты населения;
 5. школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3,5
в) верно 2,4
г) верно 4
- 30 Иллюзии относятся к расстройствам:
- а) мышления
 - б) восприятия
 - в) интеллекта
 - г) влечений
- 31 Принудительное лечение – это:
- а) насильственное лечение и кормление пациента
 - б) лечение пациента, совершившего общественно опасное деяние, признанного судом невменяемым, назначившего ему принудительные меры медицинского характера
 - в) фиксация пациента, чтобы он не причинил вреда себе и окружающим
 - г) изменение лечения пациенту, нарушившему режим в отделении

- 32 При передозировке кокаина смерть наступает от:
1. эпистатуса (серии судорожных припадков);
 2. остановки сердца вследствие аритмии;
 3. остановки дыхания;
 4. некронефроза;
 5. печеночной комы.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 33 К специфическим наркоманическим синдромам относятся синдромы:
1. изменённой реактивности;
 2. психической зависимости;
 3. физической зависимости;
 4. последствий злоупотребления ПАВ;
 5. неустойчивого равновесия.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4
- 34 Для вынесения заключения о факте употребления наркотического вещества при проведении экспертизы обязательным является:
- а) заявление испытуемого об употреблении наркотика
 - б) обнаружение наркотического вещества в биологических средах организма
 - в) обнаружение в вещах (одежде) наркотического вещества
 - г) выявление клиники опьянения (одурманивания) в сочетании с отрицательной химической реакцией на алкоголь
- 35 Укажите средства, относящиеся к наркотическим:
- а) гашиш
 - б) акинетон
 - в) фенозепам
 - г) циклодол
- 36 Изменение картины опьянения у больных алкоголизмом обусловлено:
1. содержанием алкоголя в алкогольных напитках;
 2. длительностью (тяжестью) заболевания;
 3. технологией приготовления алкогольных напитков;
 4. преморбидными характерологическими особенностями;
 5. половыми различиями.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 37 Объективными признаками наличия галлюцинаций являются:
- а) поведение больного, его внешний вид, высказывания
 - б) склонность пациента к конфликтам
 - в) дрожь в теле
 - г) помрачение сознания

- 38 К наиболее выраженным психопатологическим эффектам острой интоксикации галлюциногенами относятся:
- а) нарушения зрительного восприятия;
 - б) парестезии;
 - в) деперсонализационные и дереализационные расстройства;
 - г) стойкие вербальные галлюцинации;
- 39 Антитодом при отравлении наркотиками является:
- а) атропин
 - б) налоксон
 - в) прозерин
 - г) унитиол
- 40 Метадон является:
- а) нейролептиком
 - б) психостимулятором
 - в) галлюциногеном
 - г) опиоидным производным
- 41 Клониическая фаза развернутого эпилептического припадка продолжается:
- а) 10 – 15 секунд
 - б) 1 – 3 минуты
 - в) 3 – 5 минут
 - г) 5 – 10 минут
- 42 Для симптома снижения толерантности у больных алкоголизмом характерно:
- 1. появление признаков опьянения при употреблении привычных доз алкоголя;
 - 2. переход на напитки с более низким содержанием алкоголя;
 - 3. снижения разовой дозы алкоголя при сохранении суточной;
 - 4. появление на этапе 2-3 ст. заболевания;
 - 5. появление в картинах опьянения тотальных амнезий.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 43 В предмет наркологии входит:
- а) изучение проявлений, этиологии и патогенеза наркологических заболеваний, исследование медицинских, психологических, социальных и правовых аспектов этих заболеваний
 - б) изучение технологии получения наркотиков
 - в) изучение этиологии и патогенеза гепатитов В и С
 - г) исследование распространения ВИЧ-инфекции
- 44 Основные правила по применению методов физического стеснения пациента в наркологическом стационаре:
- а) фиксировать с помощью медперсонала
 - б) фиксировать на время не более 6 часов
 - в) получить письменное разрешение врача на фиксацию с указанием времени фиксации
 - г) сообщить дежурному врачу о необходимости фиксации в течение часа

- 45 В группу риска входят:
1. подростки, замеченные в употреблении алкоголя или других ПАВ;
 2. подростки, ведущие асоциальный образ жизни;
 3. подростки из неблагополучных семей;
 4. подростки и взрослые, страдающие алкоголизмом;
 5. подростки с пограничной умственной отсталостью.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 46 Наркоманию вызывает злоупотребление:
- а) препаратами опия, конопли
 - б) элениумом
 - в) налоксоном
 - г) феназепамом
- 47 Сенестопатии это:
- а) локализованные неприятные, тягостные ощущения;
 - б) необычные, часто алгические, ощущения с меняющейся локализацией;
 - в) тягостные болевые ощущения в утраченной конечности;
 - г) ягостные ощущения ползания насекомых, червей и т.п. под кожей, внутри тела
- 48 Недобровольная госпитализация в наркологический стационар – это:
- а) возражение пациента против госпитализации
 - б) госпитализация пациента без его согласия
 - в) госпитализация пациента старше 15 лет без согласия его родственников
 - г) госпитализация пациента бригадой скорой помощи
- 49 Тоническая фаза развернутого эпилептического припадка продолжается:
- а) 5 – 15 секунд
 - б) 1 – 3 минуты
 - в) 3 – 5 минут
 - г) 5 – 10 минут
- 50 Клиническая картина острого отравления опиатами характеризуется:
1. угнетением ЦНС от стадии засыпания до расстройства сознания в виде комы;
 2. сужением зрачков (симптом «точки») со снижением или полным отсутствием реакции на свет;
 3. угнетением дыхания до брадипноэ с частотой до 4-6 в минуту или полной его остановкой;
 4. снижением сухожильных и периостальных рефлексов или арефлексией;
 5. снижением или отсутствием реакции на болевое раздражение, корнеальных, кашлевых и глоточных рефлексов.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

- 51 Кардиомиопатия у больных алкоголизмом проявляется:
1. нарушением сердечного ритма;
 2. сниженной сократительной функцией миокарда;
 3. разнообразными болевыми ощущениями;
 4. нарушением проводимости;
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 52 При терапии алкогольных делириев с особой осторожностью следует назначать:
- а) полиионные растворы;
 - б) крово- и плазмозаменители;
 - в) транквилизаторы;
 - г) нейролептики;
- 53 Токсикомании, формирующиеся вследствие злоупотребления лекарственными препаратами, чаще всего возникают из-за:
- а) нерационального, неправильного лечения;
 - б) частого приема бензодиазепинов при бессоннице или других расстройствах;
 - в) частого приема медикаментов при различных неблагоприятных жизненных ситуациях;
 - г) лечения барбитуратами;
- 54 Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома I степени тяжести:
- а) до суток
 - б) 2 – 5 суток
 - в) 6 – 7 суток
 - г) до 10 суток
- 55 Схема заместительной терапии состояния отмены при барбитуровой наркомании фенobarбиталом не предусматривает:
- а) подбор дозы фенobarбитала из расчета 1/3 от суточной дозы барбитурата, которую принимал больной;
 - б) назначения высчитанной дозы в 4 приема ежедневно в течение первых 2-х дней;
 - в) уменьшения с 3-х суток лечения каждой следующей суточной дозы фенobarбитала на 10 %;
 - г) назначения высчитанной дозы фенobarбитала до момента купирования состояния отмены;
- 56 Путем биотрансформации из организма удаляется:
- а) 50% введенного алкоголя
 - б) 75% введенного алкоголя
 - в) 80 – 95% введенного алкоголя
 - г) 100% введенного алкоголя
- 57 Наркотики – это препараты:
- а) вызывающее абстиненцию при однократном приеме
 - б) входящие в список наркотических средств
 - в) обладающие снотворным действием
 - г) обладающие седативным действием

- 58 Наркомания - это хроническое заболевание:
- а) вызванное потреблением препаратов или средств, официально отнесенных к списку наркотических
 - б) характеризующееся развитием психофизической зависимости и медико-социальных последствий
 - в) вызывающее психические и соматические нарушения
 - г) вызывающее привыкание и требующее наблюдения и лечения у врача-нарколога
- 59 Сужение зрачков характерно для:
- а) опишной интоксикации
 - б) гашишной интоксикации
 - в) эфедроновой интоксикации
 - г) опишного абстинентного синдрома
- 60 Злоупотребление сильнодействующими препаратами называется:
- а) токсикоманией
 - б) вредной привычкой
 - в) наркотической зависимостью
 - г) алкоголизмом
- 61 Для эксплозивного варианта измененного простого алкогольного опьянения (острой алкогольной интоксикации) характерно:
1. слабо выраженная и кратковременная эйфория;
 2. вспышки резкого недовольства, раздражения или злобы, неоднократно повторяющиеся в состоянии опьянения;
 3. проявление конфликтности;
 4. состояние тревожно-тоскливого аффекта;
 5. проявление, демонстративности.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 62 Биотрансформация алкоголя происходит в:
- а) печени
 - б) почках
 - в) центральной нервной системе
 - г) желудке
- 63 Изменение картины опьянения у больных алкоголизмом обусловлено:
1. содержанием алкоголя в алкогольных напитках;
 2. длительностью (тяжестью) заболевания;
 3. технологией приготовления алкогольных напитков;
 4. преморбидными характерологическими особенностями;
 5. половыми различиями.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 64 Бредовые идеи относятся к расстройствам:
- а) мышления
 - б) восприятия
 - в) интеллекта
 - г) влечений

- 65 Сверхценные идеи относятся к расстройствам:
- мышления
 - восприятия
 - интеллекта
 - влечений
- 66 Для клиники токсикомании транквилизаторами бензодиазепинового ряда характерно:
- сходство с клиникой барбитуровой наркомании;
 - более медленное формирование основных симптомокомплексов;
 - менее brutальное интеллектуально-мнестическое снижение;
 - значительная выраженность аффективных нарушений;
 - отсутствие судорожных припадков.
- верно 1,2,3
 - верно 1,3
 - верно 2,4
 - верно все перечисленное
- 67 Для симптома «плато» толерантности у больных алкоголизмом характерно:
- потребление стабильно установленной дозы алкоголя;
 - появление состояний опьянения только при употреблении высоких доз алкоголя;
 - переносимость максимальных доз алкоголя на протяжении определённого отрезка времени;
 - появление на этапе перехода начальной стадии заболевания в среднюю;
 - переход на употребление алкогольных напитков с более низким содержанием алкоголя.
- верно 1,2,3
 - верно 1,3
 - верно 2,4
 - верно все перечисленное
- 68 К последствиям хронической интоксикации ПАВ при любой форме зависимости относятся:
- прогрессирующее падение активности, энергетического потенциала;
 - угасание влечений, утрата потребностей как в биологическом, так и в социальном смысле;
 - снижение сопротивляемости организма, прогрессирующее истощение;
 - развитие миокардиопатий;
 - угасание интеллекта.
- верно 1,2,3
 - верно 1,3
 - верно 2,4
 - верно все перечисленное
- 69 Медицинский работник к пациенту должен обращаться:
- по имени
 - по имени и отчеству
 - по фамилии
 - «больной»

- 70 К признакам острой интоксикации опиатами относят:
1. миоз с отсутствием или крайне вялой реакцией зрачков на свет;
 2. брадипное и тахипное;
 3. зуд кожи лица;
 4. « меловую » бледность и сухость кожи;
 5. отсутствие нарушений координации движений и артикуляции.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 71 Гашишизм – это:
- а) наркомания
 - б) табакокурение
 - в) психическое заболевание, возникающее у любого наркомана
 - г) курение кальяна
- 72 Судорожные припадки в абстинентном синдроме характерны для наркомании:
- а) барбитуровой
 - б) гашишной
 - в) эфедроновой
 - г) опийной
- 73 Сопор относится к расстройствам:
- а) сознания
 - б) восприятия
 - в) интеллекта
 - г) мышления
- 74 Трансы относятся к расстройствам:
- а) мышления
 - б) сознания
 - в) восприятия
 - г) интеллекта
- 75 Антероградная амнезия характеризуется:
1. утратой воспоминаний на период бессознательного состояния и период предшествовавший ему;
 2. правильное поведение в запомятованном периоде;
 3. распространение забвения на различные периоды жизни;
 4. утратой воспоминаний на период, непосредственно следовавший за выходом из бессознательного состояния;
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

- 76 Параноидная форма патологического опьянения характеризуется:
1. наличием аффекта страха, достигающего до ужаса;
 2. иллюзорно-бредовым восприятием окружающего;
 3. внешне целенаправленной деятельностью;
 4. наличием фантастических сценподобных галлюцинаций;
 5. делириозным расстройством сознания.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 77 Комплаенс - это:
- а) метод психотерапии, позволяющий настроить пациента на активное сотрудничество с персоналом
 - б) осознанная готовность пациента к сотрудничеству с врачом, настрой следовать его рекомендациям
 - в) пассивное следование больничному режиму, отсутствие замечаний по приему лекарств
 - г) осознанная активность пациента, готовность к сотрудничеству с медицинским персоналом в отделении
- 78 Доврачебные мероприятия при ортостатическом коллапсе у пациента, получающего нейролептики:
- а) внутримышечное введение аминазина
 - б) уложить пациента с приподнятым ножным концом
 - в) отменить нейролептики
 - г) наложить жгут на нижние конечности
- 79 Нарушения мышления по содержанию:
- а) навязчивости
 - б) гипестезии
 - в) амнезия
 - г) эйфория
- 80 Сведения о больных, находящихся в наркологическом отделении, сообщаются по телефону:
- а) всем обращающимся
 - б) только родственникам
 - в) только сотрудникам правоохранительных органов
 - г) никому не сообщаются
- 81 Первая фаза абстинентного синдрома при опиоидной наркомании развивается после последнего приема наркотика через:
- а) сутки
 - б) 8 – 12 часов
 - в) 48 – 72 часа
 - г) 5 суток
- 82 Дипсомания – это:
- а) запои
 - б) депрессивно – тревожный фон настроения
 - в) расстройства функции желудочно-кишечного тракта
 - г) агрессивность

- 83 Население по отношению и употреблению наркотических средств делится на:
- а) не употребляющих
 - б) «любителей» наркотических средств
 - в) выздоровевших от наркомании
 - г) резистентных к наркологическим средствам
- 84 О психопатоподобных изменениях личности наркомана свидетельствуют:
- а) колебания эмоционального фона и снижение интеллекта;
 - б) раздражительность, возбудимость, неспособность критически оценивать свои действия и сужения круга интересов;
 - в) неспособность критически оценивать свои действия и снижение интеллекта;
 - г) снижение интеллекта, сужение круга интересов
- 85 Назовите стадии алкоголизма:
- а) пивная, винная, водочная
 - б) зависимость психическая, физическая, алкогольная деградация
 - в) галлюциноз, делирий и параноид
 - г) похмелье, пропивание вещей, продажа квартиры
- 86 В отличие от взрослых, для подростков при становлении зависимости от ПАВ, характерно:
1. преобладание группового мотива употребления ПАВ;
 2. направленность влечения не на определённые ощущения, а на недифференцированное состояние оглушения («балдение»);
 3. предпочтение преимущественно веществ с галлюцинаторным эффектом;
 4. выбор дешёвых (а отсюда - тяжёлодействующих) ПАВ;
 5. замедленное формирование влечения вследствие незрелости чувственной сферы.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 87 К профилактическим формам борьбы с пьянством и алкоголизмом относят:
- а) организацию системы вытрезвителей
 - б) пропаганду контролируемого употребления алкоголя
 - в) разъяснение вреда, наносимого человеку употреблением алкоголя
 - г) запрещение продажи алкогольных напитков
- 88 Кардиомиопатия у больных алкоголизмом проявляется:
1. нарушением сердечного ритма;
 2. сниженной сократительной функцией миокарда;
 3. разнообразными болевыми ощущениями;
 4. нарушением проводимости;
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 89 Конфликтогены – это:
- а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту
 - б) проявления конфликта
 - в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности
 - г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта

- 90 Клинические проявления алкогольного абстинентного синдрома:
- а) гипергидроз, тремор
 - б) отвращение к алкоголю
 - в) сонливость
 - г) влечение к опохмелению
- 91 К факторам, влияющим на развитие алкоголизма, относятся:
- а) социально – средовые и личностные
 - б) экологические
 - в) географические
 - г) климатические
- 92 Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена:
- а) крепостью и качеством алкоголя;
 - б) культурально-этническими факторами;
 - в) поло-возрастным фактором;
 - г) активностью фермента алкогольдегидрогеназы /АДГ/
- 93 Полизависимость формируется при употреблении нескольких ПАВ, которые:
1. по типу действия на ЦНС обладают одинаковыми эффектами у больных;
 2. при комбинированном приёме способны усиливать действие друг друга;
 3. обладают разной продолжительностью действия;
 4. оказывают разнонаправленные эффекты;
 5. обладают одинаковой продолжительностью действия.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4
- 94 По данным ВОЗ, наибольшее влияние на возникновение заболеваний населения оказывают:
- а) организация и качество медицинской помощи
 - б) экологическая обстановка
 - в) социально-экономические условия и образ жизни населения
 - г) наследственность
- 95 При III степени тяжести алкогольного абстинентного синдрома преобладают расстройства:
- а) психические
 - б) вегетативно – соматические
 - в) неврологические
 - г) сердечно – сосудистые
- 96 Проявление паранойяльного синдрома:
- а) амнезия
 - б) ступор
 - в) сутяжничество
 - г) деменция

97 В группу риска входят:

1. подростки, замеченные в употреблении алкоголя или других ПАВ;
2. подростки, ведущие асоциальный образ жизни;
3. подростки из неблагополучных семей;
4. подростки и взрослые, страдающие алкоголизмом;
5. подростки с пограничной умственной отсталостью.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно все перечисленное

98 Делирий относится к расстройствам:

а) мышления

б) восприятия

в) интеллекта

г) сознания

99 Наиболее отличительной особенностью алкоголизма у женщин является:

а) злокачественность течения;

б) раннее появление психотических форм;

в) низкая курабельность;

г) аффективная окрашенность клинической симптоматики;

100 К основным критериям, определяющим состояние острой алкогольной интоксикации (простое алкогольное опьянение), относят:

1. изменения в эмоциональной сфере;

2. функциональные изменения моторики;

3. изменение ассоциативного процесса и восприятия окружающего;

4. наличие неврологических и вегетативных нарушений или изменений;

5. характерный запах алкоголя изо рта.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно все перечисленное

101 Уголовная ответственность не предусматривается за:

а) хищение наркотических лекарственных средств;

б) незаконное изготовление, сбыт, хранение наркотических средств;

в) потребление ПАВ без врачебного предписания;

г) содержание притонов для потребления наркотиков, склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств.

102 Показателями оценки уровня сформированности компетенций являются:

а) знания

б) умения

в) способы деятельности

г) знания, умения, способы деятельности

103 Стигма в области наркологии - это:

а) один из симптомов психического расстройства

б) предубеждение по отношению к пациентам

в) состояние, связанное с полным отсутствием интереса к жизни

г) состояние, связанное с недовольством собственной внешностью

- 104 Согласно классификации Портнова, для начальной стадии алкоголизма характерно:
- а) навязчивое влечение к алкоголю
 - б) снижение толерантности к алкоголю
 - в) повышение толерантности к алкоголю
 - г) абстинентный синдром
- 105 Фальсифицированное лекарственное средство – это:
- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.
 - б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе.
 - в) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.
 - г) лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства.
- 106 Невменяемость – это:
- а) неспособность пациента по психическому состоянию контролировать свои действия и отвечать за них
 - б) неспособность говорить и отвечать на вопросы
 - в) высокая степень алкогольного опьянения
 - г) выраженное слабоумие
- 107 Мусситирующий делирий характеризуется:
- 1. психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах постели;
 - 2. невнятным, бессвязным бормотанием;
 - 3. карфологическими нарушениями;
 - 4. возбуждением с совершением профессиональных действий;
 - 5. эпизодами кататонического возбуждения.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 108 Чаще всего зависимость от ПАВ формируется у лиц:
- 1. с дефектами воспитания;
 - 2. с личностными девиациями;
 - 3. с нарушениями социальной адаптации;
 - 4. с невысоким уровнем профессиональной ориентации;
 - 5. с невысоким интеллектом.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

- 109 К дезинтоксикационным средствам относятся:
1. гипохлорит натрия;
 2. гемодез;
 3. сернокислая магнезия;
 4. апоморфин;
 5. кордиамин.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 110 Для абстиненции при употреблении галлюциногенов характерны:
- а) зрительные галлюцинации
 - б) бредовые проявления
 - в) слабость, сонливость
 - г) подергивание мышц лица
- 111 К основным клиническими проявлениями алкогольного абстинентного синдрома относят:
1. влечение к алкоголю с целью опохмеления;
 2. расстройства в сфере памяти
 3. аффективно-вегетативные проявления;
 4. судорожные состояния;
 5. психосенсорные расстройства.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4
- 112 Основные признаки астенического синдрома:
- а) абулия, афазия, амнезия
 - б) бессонница, беспокойство, бродяжничество
 - в) утомляемость, раздражительность, бессонница
 - г) анорексия, негативизм, сонливость
- 113 Острая интоксикация амфетаминами проявляется:
1. ощущением прилива энергии и усилением активности, переоценкой собственных возможностей;
 2. склонностью к стереотипным однообразным действиям и раздражительностью, тревогой;
 3. нарушениями сердечного ритма и дыхания, повышением АД;
 4. резким снижением аппетита;
 5. повышенной потливостью, гиперрефлексией, тремором, расширением зрачков.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 114 Кома относится к расстройствам:
- а) мышления
 - б) восприятия
 - в) интеллекта
 - г) сознания

115 В спектр психотропного действия нейролептиков входят эффекты:

1. седативный;
2. снотворный;
3. подавляющий влечение;
4. противосудорожный;
5. тимономализующий.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно все перечисленное

116 Сенестопатии это:

- а) локализованные неприятные, тягостные ощущения;
- б) необычные, часто алгические, ощущения с меняющейся локализацией;
- в) тягостные болевые ощущения в утраченной конечности;
- г) ягостные ощущения ползания насекомых, червей и т.п. под кожей, внутри тела

117 Изменения личности у больных алкоголизмом проявляются:

1. заострением преморбидных характерологических особенностей;
2. снижением «энергетического потенциала»;
3. нивелировкой преморбидных характерологических особенностей
4. грубыми расстройствами памяти;
5. патологическим развитием личности.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно все перечисленное

118 Алкогольная деградация включает в себя:

1. аффективные расстройства;
2. психопатоподобные симптомы;
3. этическое снижение;
4. стойкое снижение памяти и интеллекта;
5. утрату критического отношения к злоупотреблению алкоголем и самому к себе.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно все перечисленное

119 Для синдрома отмены при амфетаминовой наркомании наиболее характерно:

- а) развитие острой депрессии с суицидальными тенденциями;
- б) повышенная утомляемость, раздражительность;
- в) сонливость при отсутствии сна;
- г) стойкое отсутствие аппетита;

120 Проявление расстройства интеллекта:

- а) оглушение
- б) амбитендентность
- в) слабоумие
- г) дисфория

- 121 Для средней степени острой алкогольной интоксикации характерно:
1. функциональные нарушение моторики;
 2. замедление и затруднение ассоциативного процесса;
 3. однообразность представлений и трудности в переключении внимания, дизартричность речи;
 4. непроизвольное мочеиспускание;
 5. выраженные соматические расстройства.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 122 Для патологического опьянения характерно:
1. внезапность, острота и транзиторность психотического эпизода;
 2. импульсивность и целенаправленность характера разрушительных действий;
 3. сумеречное расстройство сознания;
 4. нетипичность развития повторных аналогичных состояний;
 5. кризисное разрешение глубоким сном с последующей амнезией и астенией.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 123 Определение реабилитационного потенциала необходимо для:
- а) реализации способностей пациента
 - б) борьбы с осложнениями
 - в) составления плана лечения
 - г) составления плана сестринского ухода
- 124 При отказе пациента от процедуры медицинская сестра давать разъяснения пациенту:
- а) обязана в пределах своей компетенции
 - б) не имеет права ни при каких условиях
 - в) имеет право с разрешения врача
 - г) не обязана
- 125 К основным клиническим признакам алкогольного параноида относятся:
- а) повышенное настроение
 - б) страх, тревога, бред преследования
 - в) галлюцинации
 - г) судорожные припадки
- 126 Предварительный этап лечения больных с зависимостью от ПАВ включает:
1. проведение дезинтоксикационной терапии;
 2. купирование состояния отмены;
 3. коррекцию поведения больного;
 4. восстановление нарушенных соматических и психических функций;
 5. выявление основного симптомокомплекса психической зависимости и определение причин предшествующих рецидивов.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

- 127 Уголовная ответственность не предусматривается за:
- а) хищение наркотических лекарственных средств;
 - б) незаконное изготовление, сбыт, хранение наркотических средств;
 - в) потребление ПАВ без врачебного предписания;
 - г) содержание притонов для потребления наркотиков, склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств.
- 128 К основным признакам алкогольного галлюциноза относится:
- а) помрачение сознания
 - б) полная амнезия
 - в) преобладание вербальных псевдогаллюцинаций
 - г) преобладание истинных вербальных галлюцинаций
- 129 Изменение картины опьянения у больных алкоголизмом обусловлено:
1. содержанием алкоголя в алкогольных напитках;
 2. длительностью (тяжестью) заболевания;
 3. технологией приготовления алкогольных напитков;
 4. преморбидными характерологическими особенностями;
 5. половыми различиями.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 130 Для подросткового возраста наиболее характерны:
- а) тяга к знаниям
 - б) реакция эмансипации
 - в) реакция группирования со сверстниками
 - г) стремление к одиночеству
- 131 Пациенты с суицидальными намерениями и мыслями нуждаются в:
- а) строгом наблюдении
 - б) общем наблюдении
 - в) амбулаторном лечении
 - г) диспансерном наблюдении
- 132 Психосоциальная реабилитация пациентов подразумевает восстановление или формирование недостаточных или утраченных в результате болезни:
- а) когнитивных функций
 - б) постоянства внутренней среды организма
 - в) психического здоровья
 - г) физического здоровья
- 133 Фальсифицированное лекарственное средство – это:
- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.
 - б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе.
 - в) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.
 - г) лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства.

- 134 Этические нормы медицинского работника определяются:
- а) умениями и навыками
 - б) законами и приказами
 - в) этническими особенностями региона
 - г) моральной ответственностью
- 135 Галлюцинации – это:
- а) яркие фантастические сновидения
 - б) крайне неприятные ощущения жжения, стягивания
 - в) ложное восприятие несуществующего объекта
 - г) световые вспышки при проведении электроэнцефалографии
- 136 Медицинский компонент наркомании означает:
- а) воздействие на центральную нервную систему
 - б) использование наркотиков в немедицинских целях
 - в) рост заболеваемости
 - г) использование наркотиков в медицинских целях
- 137 К основным клиническим проявлениям алкоголизма относятся:
1. патологическое влечение к алкоголю;
 2. синдром отмены (ААС);
 3. синдром измененной реактивности;
 4. аффективный синдром;
 5. психоорганический синдром.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4
- 138 Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена:
- а) крепостью и качеством алкоголя
 - б) активностью фермента алкогольдегидрогеназы
 - в) культурально – этическими особенностями
 - г) поло-возрастными особенностями
- 139 Для алкогольной комы характерно:
1. нарушение сознания;
 2. понижение температуры тела и появление цианоза;
 3. резкое снижение мышечного тонуса;
 4. повышение тонуса сердечно-сосудистой системы;
 5. двигательное возбуждение.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

- 140 Ретроградная амнезия характеризуется:
1. фрагментарной утратой памяти;
 2. выпадением из памяти событий периода, следовавшего непосредственно после выхода из бессознательного состояния;
 3. отсутствием памяти на текущие события;
 4. выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию;
 5. потеря способности запоминать.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4,5
г) верно 4
- 141 Первая степень тяжести алкогольного абстинентного синдрома характеризуется преобладанием расстройств:
- а) вегетативно – астенических
 - б) психических
 - в) неврологических
 - г) сердечно – сосудистых
- 142 К группе риска по развитию наркомании относятся:
- а) дети из семей пьющих родителей, сироты
 - б) мигранты
 - в) лица БОМЖ
 - г) любые дети
- 143 Токсикомания – это:
- а) вредная привычка
 - б) зависимость от наркотических препаратов
 - в) прием различных ядовитых веществ
 - г) злоупотребление средствами, не относящимися к наркотикам
- 144 Все отходы ЛПУ по степени опасности делят на:
- а) 2 класса
 - б) 3 класса
 - в) 4 класса
 - г) 5 классов
- 145 Для алкоголизма в подростковом возрасте свойственно:
1. недостаточная выраженность и незавершенность специфических симптомов, а иногда и отсутствие некоторых из них;
 2. высокая прогрессивность;
 3. трудность разграничения стадий алкоголизма и нечеткость стереотипа их развития;
 4. формирование алкогольной деградации с эйфорической установкой;
 5. высокий риск развития психотических форм алкоголизма.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

- 146 Токсикоманию вызывает злоупотребление:
- а) снотворными и транквилизаторами
 - б) алкоголем
 - в) слабоалкогольными напитками
 - г) «лёгкими» наркотиками
- 147 Вербальные и пантомимические стигмы (ужимки, жаргон, уплощенный юмор) в статусе больных могут свидетельствовать:
1. о наличии токсической энцефалопатии;
 2. о признаках снижения уровня личности;
 3. о неблагоприятном микросоциальном окружении;
 4. об отравлении марганцово-кислым калием;
 5. об олигофрении.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 148 Факторы риска развития наркомании:
- а) социальные
 - б) психологические
 - в) биологические
 - г) географические
- 149 К признакам острой интоксикации опиатами относят:
1. миоз с отсутствием или крайне вялой реакцией зрачков на свет;
 2. брадипное и тахипное;
 3. зуд кожи лица;
 4. « меловую » бледность и сухость кожи;
 5. отсутствие нарушений координации движений и артикуляции.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 150 Онейроид относится к расстройствам:
- а) мышления
 - б) восприятия
 - в) интеллекта
 - г) сознания
- 151 Предварительный этап лечения больных с зависимостью от ПАВ включает:
1. проведение дезинтоксикационной терапии;
 2. купирование состояния отмены;
 3. коррекцию поведения больного;
 4. восстановление нарушенных соматических и психических функций;
 5. выявление основного симптомокомплекса психической зависимости и определение причин предшествующих рецидивов.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

- 152 К группе риска по развитию наркомании относятся:
- а) дети, подростки из неполных семей
 - б) сироты
 - в) дети семей курящих родителей
 - г) подростки с нарушением психики, внимания, памяти
- 153 К основным симптомам Корсаковского психоза относятся:
- а) полиневриты, амнезия, конфабуляции
 - б) зрительные галлюцинации
 - в) депрессия
 - г) анорексия
- 154 Интеллектуально – мнестические расстройства при алкоголизме обычно возникают:
- а) в первой стадии заболевания
 - б) в переходной от первого ко второй стадии
 - в) во второй стадии
 - г) в третьей стадии
- 155 Для диагностики состояния острой интоксикации каннабиноидами значимыми являются следующие признаки:
1. расширение зрачков и инъекированность сосудов склер;
 2. хриплый, «лающий» голос,
 3. выраженная сухость видимых слизистых;
 4. резкие колебания эмоционального фона;
 5. готовность к индукции поведения.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 156 Уголовная ответственность не предусматривается за:
- а) хищение наркотических лекарственных средств;
 - б) незаконное изготовление, сбыт, хранение наркотических средств;
 - в) потребление ПАВ без врачебного предписания;
 - г) содержание притонов для потребления наркотиков, склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств.
- 157 Деменция относится к расстройствам:
- а) мышления
 - б) восприятия
 - в) интеллекта
 - г) влечений
- 158 Состояние отмены при бензодиазепиновой токсикомании проявляется:
1. тревогой, неусидчивостью, подавленностью и злобой;
 2. фибриллярными подергиваниями лицевой мускулатуры и мышц конечностей;
 3. тахикардией и ортостатической гипотензией;
 4. горизонтальным нистагмом и мелкоразмахистым тремором;
 5. бессонницей, головными болями, тошнотой, отсутствием аппетита.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

- 159 Среди женщин, больных алкоголизмом, преобладают лица, занятые в:
- а) торговле, сфере услуг
 - б) промышленности
 - в) здравоохранении
 - г) народном образовании
- 160 К расстройствам восприятия относятся:
- а) амнезия, абулия, афазия
 - б) резонерство, навязчивость
 - в) иллюзии, галлюцинации, сенестопатии
 - г) амбивалентность, амбигенность
- 161 Ретроградная амнезия характеризуется:
1. фрагментарной утратой памяти;
 2. выпадением из памяти событий периода, следовавшего непосредственно после выхода из бессознательного состояния;
 3. отсутствием памяти на текущие события;
 4. выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию;
 5. потерей способности запоминать.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4,5
 - г) верно 4
- 162 Иллюзии – это:
- а) искаженное восприятие реально существующего предмета
 - б) действия иллюзиониста
 - в) голоса, носящие «приказной» императивный характер
 - г) выдумки, вымыслы, не соответствующие действительности
- 163 В клинической структуре алкогольного абстинентного синдрома наиболее специфичным является:
- а) расстройство сна;
 - б) аффективные проявления;
 - в) вегетативные расстройства;
 - г) вторичные формы влечения к алкоголю
- 164 Ретроградная амнезия характеризуется:
1. фрагментарной утратой памяти;
 2. выпадением из памяти событий периода, следовавшего непосредственно после выхода из бессознательного состояния;
 3. отсутствием памяти на текущие события;
 4. выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию;
 5. потерей способности запоминать.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4,5
 - г) верно 4
- 165 Промывание желудка при острых пероральных отравлениях показано:
- а) если прошло не больше двух часов после приема яда
 - б) если прошло не более 10 часов после приема яда
 - в) при бессознательном состоянии пациента
 - г) при любых острых пероральных отравлениях

- 166 К последствиям хронической интоксикации ПАВ при любой форме зависимости относятся:
1. прогрессирующее падение активности, энергетического потенциала;
 2. угасание влечений, утрата потребностей как в биологическом, так и в социальном смысле;
 3. снижение сопротивляемости организма, прогрессирующее истощение;
 4. развитие миокардиопатий;
 5. угасание интеллекта.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 167 Для алкогольной комы характерно:
1. нарушение сознания;
 2. понижение температуры тела и появление цианоза;
 3. резкое снижение мышечного тонуса;
 4. повышение тонуса сердечно-сосудистой системы;
 5. двигательное возбуждение.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 168 Поддерживающая терапия больных алкоголизмом включает в себя:
- а) проведение длительной индивидуальной терапии, лечение соматических и неврологических нарушений
 - б) назначение антибиотиков
 - в) проведение «кодирования»
 - г) проведение сеансов гипноза
- 169 Наркотическая эйфория — это изменение в сторону максимально положительного для субъекта значения восприятий:
1. настроения;
 2. мышления;
 3. физического состояния;
 4. психического состояния;
 5. памяти.
- а) верно 1,3,4
б) верно 1,2,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 170 ЛСД относится к:
- а) психостимуляторам
 - б) производным конопли
 - в) галлюциногенам
 - г) опиатам

- 171 Тяжелая степень острой алкогольной интоксикации определяется:
1. мозжечковой атаксией;
 2. мышечной атонией, амимией;
 3. вестибулярными расстройствами: головокружением, тошнотой, рвотой;
 4. бледностью кожных покровов;
 5. снижением тонуса сердечно-сосудистой системы.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 172 Для клиники алкоголизма у лиц пожилого возраста характерно:
1. относительная невысокая интенсивность влечения к алкоголю;
 2. непродолжительные запои;
 3. преобладание соматических и неврологических расстройств в структуре ААС;
 4. усиление в опьянении эмоциональной лабильности;
 5. относительно невысокая толерантность.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 173 Для синдрома отмены при амфетаминовой наркомании наиболее характерно:
- а) развитие острой депрессии с суицидальными тенденциями;
 - б) повышенная утомляемость, раздражительность;
 - в) сонливость при отсутствии сна;
 - г) стойкое отсутствие аппетита
- 174 К опийной группе наркотиков относится:
- а) морфин
 - б) гашиш
 - в) амфетамин
 - г) ЛСД
- 175 Для алкогольной энцефалопатии типа Корсаковского психоза характерно:
1. развитие после перенесенного состояния помрачения сознания;
 2. появление невропатии нижних конечностей;
 3. наличие расстройств памяти с преобладанием фиксационной амнезии;
 4. полное отсутствие осознания болезни;
 5. острое начало болезни.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

- 176 Исходя из сложившихся классификаций, к острым металкогольным психозам относят:
1. алкогольный делирий;
 2. алкогольный галлюциноз;
 3. бредовые психозы;
 4. алкогольную эпилепсию;
 5. дипсоманию.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4
- 177 Абстинентный синдром при наркомании возникает вследствие:
- а) присутствия наркотика в организме
 - б) прекращения поступления наркотика в организм
 - в) выраженных соматоневрологических нарушений в организме
 - г) отсутствия сна и аппетита
- 178 При малейших признаках наркотической интоксикации человека необходимо:
- а) вызвать бригаду скорой помощи
 - б) направить в поликлинику для обследования
 - в) направить к наркологу
 - г) направить к кардиологу
- 179 Понятие "токсикомания" применяется как термин для определения болезни, вызванной злоупотреблением:
- а) веществом или лекарственным средством, способным вызывать зависимость, но не входящим в список наркотиков
 - б) наркотическим средством
 - в) суррогатами алкоголя
 - г) алкоголем
- 180 Для истинных запоев у больных алкоголизмом характерно:
1. отсутствие продрома запоя (изменение физического и психического состояния перед началом запоя);
 2. спонтанное появление интенсивного патологического влечения к алкоголю;
 3. отсутствие каких-либо расстройств в физической и психической сферах больного в динамике запоя;
 4. декомпенсация физического и психического состояния в процессе запоя и, особенно в конце запоя;
 5. появление на этапе 2ст. заболевания.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 181 Алкогольные амнезии у больных в I стадии алкоголизма:
- а) отсутствуют
 - б) носят тотальный характер
 - в) носят систематический характер
 - г) встречаются крайне редко

- 182 Проявление судорожного синдрома:
- а) припадок
 - б) дереализация
 - в) амбивалентность
 - г) сенестопатии
- 183 Состояние отмены при героиновой наркомании характеризуется:
1. лавинообразным нарастанием симптомов;
 2. алгическими и диспептическими расстройствами;
 3. профузным потом, «ледящим ознобом», слезотечением, светобоязнью;
 4. подавленным настроением с тревогой, неусидчивостью, приступами отчаяния;
 5. быстрой, практически, критической редукцией симптомов.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 184 Повышение толерантности к алкоголю проявляется:
- а) необходимостью принятия более высоких доз алкоголя для достижения состояния эйфории
 - б) достижением состояния эйфории при приеме меньших, чем раньше, доз алкоголя
 - в) более редким желанием употреблять алкоголь
 - г) более частым желанием употреблять алкоголь
- 185 Для легкой степени алкогольного опьянения характерно:
- а) расстройство поведения
 - б) расстройство сознания и ориентировки
 - в) нарушение походки
 - г) галлюцинации
- 186 Рекомендуемая длительность диспансерного наблюдения при наркомании:
- а) 1 год
 - б) 3 года
 - в) 5 лет
 - г) пожизненно
- 187 Наркогенность ПАВ определяется:
1. скоростью формирования зависимости;
 2. высотой толерантности;
 3. степенью психической и социальной инвалидизации;
 4. значением субъективного эффекта удовольствия от вещества;
 5. видом вещества.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 188 Индивидуальные особенности поведения человека – это:
- а) условия жизни
 - б) качество жизни
 - в) стиль жизни
 - г) уровень жизни

- 189 Мусситирующий делирий характеризуется:
1. психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах постели;
 2. невнятным, бессвязным бормотанием;
 3. карфологическими нарушениями;
 4. возбуждением с совершением профессиональных действий;
 5. эпизодами кататонического возбуждения.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 190 В задачи наркологии входит:
- а) изучение этиологии и патогенеза различных психических расстройств
 - б) борьба с незаконным оборотом наркотиков
 - в) сравнительный анализ распространенности наркологических заболеваний, планирование и организация наркологической помощи населению
 - г) разработка новых наркотических препаратов
- 191 Культура речи – это, прежде всего:
- а) владение речевой культурой
 - б) соблюдение норм русского литературного языка
 - в) достижение целей коммуникации
 - г) соблюдение речевого этикета
- 192 Соотношение компрессий на грудину и искусственных вдохов при проведении реанимации
- а) 2:15
б) 3:6
в) 30:2
г) 1:5
- 193 Для эксплозивного варианта изменённого простого алкогольного опьянения (острой алкогольной интоксикации) характерно:
1. слабо выраженная и кратковременная эйфория;
 2. вспышки резкого недовольства, раздражения или злобы, неоднократно повторяющиеся в состоянии опьянения;
 3. проявление конфликтности;
 4. состояние тревожно-тоскливого аффекта;
 5. проявление, демонстративности.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 194 Полинаркомания – это:
- а) одновременное злоупотребление несколькими наркотиками
 - б) повышение дозы наркотического вещества
 - в) алкоголизм
 - г) токсикомания

- 195 Объем воды, необходимой для эффективного промывания желудка взрослому человеку, составляет:
- а) 6 литров
 - б) 8 литров
 - в) 10 литров
 - г) 20 литров
- 196 Морфинизм – это:
- а) хроническое отравление морфием
 - б) привыкание нервной ткани к яду
 - в) вид наркомании
 - г) результат лечения бессонницы
- 197 Для симптома снижения толерантности у больных алкоголизмом характерно:
1. появление признаков опьянения при употреблении привычных доз алкоголя;
 2. переход на напитки с более низким содержанием алкоголя;
 3. снижения разовой дозы алкоголя при сохранении суточной;
 4. появление на этапе 2-3 ст. заболевания;
 5. появление в картинах опьянения тотальных амнезий.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 198 При выявлении признаков тяжелой наркотической интоксикации человека необходимо:
- а) госпитализировать в ближайшую ЛПО
 - б) направить на обследование к психиатру
 - в) провести дезинтоксикацию на месте
 - г) провести искусственный массаж сердца
- 199 Формирование состояния отмены свидетельствует о становлении:
1. начальной стадии наркомании;
 2. средней стадии наркомании;
 3. конечной стадии наркомании;
 4. синдрома физической зависимости;
 5. синдрома измененной реактивности.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4
- 200 Для эксплозивного варианта изменённого простого алкогольного опьянения (острой алкогольной интоксикации) характерно:
1. слабо выраженная и кратковременная эйфория;
 2. вспышки резкого недовольства, раздражения или злобы, неоднократно повторяющиеся в состоянии опьянения;
 3. проявление конфликтности;
 4. состояние тревожно-тоскливого аффекта;
 5. проявление, демонстративности.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

- 201 Легкая степень острой алкогольной интоксикации характеризуется:
1. ощущением психического и физического комфорта;
 2. повышением речедвигательной активности;
 3. легким нарушением координации движений;
 4. замедлением ассоциативного процесса;
 5. появлением психосенсорных расстройств.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 202 Нарушения памяти у больных алкоголизмом III стадии болезни:
- а) необратимы
 - б) обратимы после купирования антиалкогольными средствами
 - в) обратимы при условии лечения и воздержания от алкоголя более 1 года
 - г) обратимы при приеме ноотропов
- 203 Для купирования состояния отмены (алкогольного абстинентного синдрома) обычно используются:
1. витаминные препараты;
 2. ноотропы;
 3. транквилизаторы;
 4. антибиотики;
 5. трихопол, фуразолидон.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4
- 204 Летучие органические соединения (средства бытовой и промышленной химии) имеют ряд общих качеств, к которым относятся:
1. хорошая растворимость в жирах;
 2. высокая токсичность;
 3. быстрая испаряемость;
 4. высокая наркотичность;
 5. преимущественное поражение ЦНС, сердца, печени и почек при злоупотреблении ими.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 205 Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома II степени тяжести:
- а) до суток
 - б) 2 – 5 суток
 - в) 6 – 7 суток
 - г) до 10 суток
- 206 Острая опийная интоксикация обычно характеризуется:
- а) дисфорией
 - б) депрессией
 - в) эйфорией
 - г) галлюцинациями

- 207 Алкоголизм - это хроническое заболевание, характеризующееся:
- а) наличием бреда
 - б) развитием патологического влечения к спиртным напиткам, формированием абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя
 - в) развитием галлюцинаций
 - г) спастическим параличом конечностей
- 208 Наркология - это самостоятельная отрасль медицины, объединяющая следующие нозологические формы болезней:
- а) алкоголизм, наркомания, токсикомания
 - б) склонность к злоупотреблению алкоголем
 - в) сердечно – сосудистая патология
 - г) психические расстройства
- 209 Профессиональная компетентность – это:
- а) степень развития личности
 - б) степень обученности
 - в) совокупность профессиональных и личностных качеств
 - г) вид профессиональной деятельности
- 210 Пустые ампулы из-под наркотиков уничтожаются:
- а) старшей медсестрой
 - б) специальной комиссией
 - в) главной медицинской сестрой
 - г) заведующим отделением
- 211 К хроническим формам алкогольной энцефалопатии относятся:
- а) бессонница, раздражительность, депрессия
 - б) корсаковский психоз, энцефалопатия Гайе-Верника
 - в) алкогольная эпилепсия, полиневропатия, нейродермит
 - г) деменция, амнезия, афазия
- 212 Наркогенность ПАВ определяется:
1. скоростью формирования зависимости;
 2. высотой толерантности;
 3. степенью психической и социальной инвалидизации;
 4. значением субъективного эффекта удовольствия от вещества;
 5. видом вещества.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 213 Формирование состояния отмены свидетельствует о становлении:
1. начальной стадии наркомании;
 2. средней стадии наркомании;
 3. конечной стадии наркомании;
 4. синдрома физической зависимости;
 5. синдрома изменённой реактивности.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4

- 214 У больных алкоголизмом поведенческая компонента при актуализации патологического влечения к алкоголю проявляется:
1. затруднениями в профессиональной деятельности;
 2. дисфориями;
 3. неуступчивость и потребностью во всем противоречить окружающим;
 4. размышлениями о неизбежности употребления алкоголя;
 5. раздражительностью.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 215 Факторами риска развития зависимости от алкоголя у подростков являются:
1. тяжёлое материальное положение семьи;
 2. алкоголизм отца или матери;
 3. наличие соматической патологии;
 4. отсутствие эмоциональной привязанности и сплочённости между членами семьи, постоянная конфликтность взаимоотношений;
 5. определённая национальная принадлежность.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4
- 216 Алкогольные амнезии у больных в третьей стадии алкоголизма:
- а) встречаются крайне редко
 - б) носят тотальный характер
 - в) носят систематический характер
 - г) отсутствуют
- 217 Для симптома снижения толерантности у больных алкоголизмом характерно:
1. появление признаков опьянения при употреблении привычных доз алкоголя;
 2. переход на напитки с более низким содержанием алкоголя;
 3. снижения разовой дозы алкоголя при сохранении суточной;
 4. появление на этапе 2-3 ст. заболевания;
 5. появление в картинах опьянения тотальных амнезий.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 218 Запись о введении наркотических средств необходимо сделать в:
- а) листе назначений
 - б) журнале учета наркотических средств
 - в) истории болезни
 - г) журнале учета наркотических средств и истории болезни
- 219 О психопатоподобных изменениях личности наркомана свидетельствуют:
- а) колебания эмоционального фона и снижение интеллекта;
 - б) раздражительность, возбудимость, неспособность критически оценивать свои действия и сужения круга интересов;
 - в) неспособность критически оценивать свои действия и снижение интеллекта;
 - г) снижение интеллекта, сужение круга интересов;

- 220 К биологическим особенностям женщин, влияющим на возникновение у них алкоголизма, относится:
- наследственность
 - предменструальное напряжение
 - ранняя психическая травматизация
 - соматические заболевания
- 221 Для начальных проявлений алкоголизма (1ст. заболевания) характерно;
- 2-3 кратный рост толерантности в сравнении с изначальной;
 - нарушение сна;
 - актуализация влечения к алкоголю в основном в «питейных» ситуациях;
 - выраженные изменения состояний опьянения;
 - появление так называемого «симптома критической дозы».
- верно 1,2,3
 - верно 1,3
 - верно 2,4
 - верно все перечисленное
- 222 В отличие от взрослых, для подростков при становлении зависимости от ПАВ, характерно:
- преобладание группового мотива употребления ПАВ;
 - направленность влечения не на определенные ощущения, а на недифференцированное состояние оглушения («балдение»);
 - предпочтение преимущественно веществ с галлюцинаторным эффектом;
 - выбор дешевых (а отсюда - тяжелодействующих) ПАВ;
 - замедленное формирование влечения вследствие незрелости чувственной сферы.
- верно 1,2,3
 - верно 1,3
 - верно 2,4
 - верно все перечисленное
- 223 Клиническая картина развёрнутого делирия характеризуется:
- наплывом парейдолий, сценopodobных зрительных галлюцинаций;
 - двигательным беспокойством;
 - помрачением сознания;
 - кататоническими нарушениями;
 - массивными псевдогаллюцинациями.
- верно 1,2,3
 - верно 1,3
 - верно 2,4
 - верно 4
- 224 Принудительное лечение это:
- насильственное лечение и кормление больного
 - лечение, назначенное по приговору суда, в соответствии с существующим законодательством
 - фиксация больного в период психомоторного возбуждения
 - лечение больного по заявлению родственников

- 225 Синдром последствий при наркомании у подростков:
1. появляется быстро;
 2. опережает развитие собственно наркологической симптоматики;
 3. проявляется остановкой в психическом развитии уже на этапе систематического потребления наркотика;
 4. характеризуется нарушением закономерности психического и социального созревания;
 5. выражается формированием психоорганического синдрома с очень быстрым исходом в слабоумие.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 226 Журнал наблюдения за больными в отделении заполняется медсестрой:
- а) один раз в сутки
 - б) два раза в сутки
 - в) три раза в сутки
 - г) один раз в неделю
- 227 Состояние отмены при героиновой наркомании характеризуется:
1. лавинообразным нарастанием симптомов;
 2. алгическими и диспептическими расстройствами;
 3. профузным потом, «леденящим ознобом», слезотечением, светобоязнью;
 4. подавленным настроением с тревогой, неусидчивостью, приступами отчаяния;
 5. быстрой, практически, критической редукцией симптомов.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 228 Реабилитация больных наркологического профиля осуществляется:
1. социальными работниками;
 2. психотерапевтами;
 3. психологами;
 4. врачами;
 5. специалистами по социальной работе.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 229 Для начальной стадии алкоголизма характерно:
- а) отсутствие тяги к алкоголю
 - б) обсессивное влечение к алкоголю
 - в) компульсивное влечение к алкоголю
 - г) абстинентный синдром

- 230 Острые интоксикационные психозы при злоупотреблении амфетаминами чаще протекают по типу:
1. острого параноида;
 2. острого галлюциноза;
 3. делирия;
 4. онейроидноподобного состояния;
 5. аменции.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 231 Легкая степень острой алкогольной интоксикации характеризуется:
1. ощущением психического и физического комфорта;
 2. повышением речсдвигательной активности;
 3. легким нарушением координации движений;
 4. замедлением ассоциативного процесса;
 5. появлением психосенсорных расстройств.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 232 Клиническими признаками наркоманий при употреблении препаратов стимулирующего ряда являются:
- а) приподнятое настроение
 - б) повышение работоспособности
 - в) болтливость
 - г) острые бредовые состояния
- 233 К основным клиническим проявлениям алкоголизма относятся:
1. патологическое влечение к алкоголю;
 2. синдром отмены (ААС);
 3. синдром изменённой реактивности;
 4. аффективный синдром;
 5. психоорганический синдром.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4
- 234 Социальный компонент наркомании означает:
- а) использование наркотиков в немедицинских целях
 - б) социальные проблемы, связанные с приёмом наркотиков
 - в) рост преступности
 - г) улучшение экономического благосостояния
- 235 Алкогольные амнезии у больных во второй стадии алкоголизма:
- а) встречаются крайне редко
 - б) носят тотальный характер
 - в) носят систематический характер
 - г) отсутствуют

- 236 Медицинская психология – это:
- а) психопатология
 - б) отрасль клинической медицины, изучающая клиническое и душевное состояние пациента
 - в) отрасль психологической науки, изучающая психологические аспекты гигиены, профилактики, диагностики, лечения, экспертизы и реабилитации пациентов
 - г) отрасль медицины, изучающая душевное состояние пациентов при различных заболеваниях
- 237 К неотложным доврачебным мероприятиям при отравлении циклодолом относится:
- а) искусственная вентиляция легких
 - б) дезинтоксикация
 - в) промывание желудка
 - г) внутривенное введение 100 мл 40% глюкозы и витаминотерапия
- 238 Для алкоголизма в подростковом возрасте свойственно:
1. недостаточная выраженность и незавершенность специфических симптомов, а иногда и отсутствие некоторых из них;
 2. высокая прогрессивность;
 3. трудность разграничения стадий алкоголизма и нечеткость стереотипа их развития;
 4. формирование алкогольной деградации с эйфорической установкой;
 5. высокий риск развития психотических форм алкоголизма.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 239 Эпилептический статус – это:
- а) серия приступов, между которыми пациент не приходит в сознание
 - б) оформление документов на инвалидность больному эпилепсией
 - в) речедвигательная заторможенность больного эпилепсией
 - г) невозможность больному эпилепсией водить автомобиль
- 240 Эфедрон чаще всего употребляется:
- а) внутривенно
 - б) внутримышечно
 - в) перорально
 - г) путем курения
- 241 Для алкогольной комы характерно:
1. нарушение сознания;
 2. понижение температуры тела и появление цианоза;
 3. резкое снижение мышечного тонуса;
 4. повышение тонуса сердечно-сосудистой системы;
 5. двигательное возбуждение.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

- 242 Индивидуальные особенности поведения человека – это:
- а) условия жизни
 - б) качество жизни
 - в) стиль жизни
 - г) уровень жизни
- 243 Ранним называется алкоголизм, формирующийся в период:
- а) до 18 лет
 - б) до 25 лет
 - в) до 30 лет
 - г) внутриутробного развития плода
- 244 Обсессивное влечение к алкоголю отражает:
- а) психическую зависимость от алкоголя
 - б) физическую зависимость от алкоголя
 - в) генетическую предрасположенность к алкоголю
 - г) социально обусловленное желание
- 245 По медицинским показаниям наркотики назначают:
- а) онкологическим пациентам
 - б) терапевтическим пациентам
 - в) стоматологическим пациентам
 - г) наркологическим пациентам
- 246 Для алкогольной энцефалопатии типа Корсаковского психоза характерно:
1. развитие после перенесённого состояния помрачения сознания;
 2. появление невропатии нижних конечностей;
 3. наличие расстройств памяти с преобладанием фиксационной амнезии;
 4. полное отсутствие осознания болезни;
 5. острое начало болезни.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4
- 247 Соматические расстройства у наркоманов возникают:
- а) в начальной стадии
 - б) в стадии истощения
 - в) постоянно
 - г) в развернутой стадии
- 248 К основным клиническим проявлениям алкогольного абстинентного синдрома относят:
1. влечение к алкоголю с целью опохмеления;
 2. расстройства в сфере памяти
 3. аффективно-вегетативные проявления;
 4. судорожные состояния;
 5. психосенсорные расстройства.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4

- 249 Для острого алкогольного гепатита характерно:
1. состояние общей интоксикации;
 2. диспептические расстройства;
 3. увеличение печени;
 4. гиперхолестеринемия;
 5. паренхиматозная желтуха.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 250 Самой частой причиной дыхательных расстройств при отравлении снотворными является:
- а) бронхоспазм
б) аспирация рвотных масс
в) угнетение дыхательного центра
г) бронхорея
- 251 Наркоманы, отказывающиеся от лечения:
- а) подвергаются уголовной ответственности
б) к ответственности не привлекаются
в) подвергаются принудительному лечению
г) привлекаются к поддерживающей терапии транквилизаторами
- 252 Чаще всего острые токсические энцефалопатии развиваются при передозировке:
1. циклодола;
 2. летучих органических соединений;
 3. гашиша;
 4. эфедрона;
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4
д) верно все перечисленное
- 253 Олигофрения относятся к расстройствам:
- а) мышления
б) восприятия
в) интеллекта
г) влечений
- 254 Все листы журнала учета наркотических препаратов должны быть:
- а) пронумерованы, прошнурованы, опломбированы и заверены подписью руководителя учреждения
б) заверены подписью руководителя учреждения или его заместителя
в) заверены подписью главной медсестры
г) просто пронумерованы
- 255 Наркоман – это:
- а) больной человек, принимающий наркотические средства
б) больной человек, имеющий зависимость от употребления наркотиков
в) здоровый человек, употребляющий наркотические вещества
г) больной человек, страдающий онкологическим заболеванием

- 256 Рекомендуемая длительность диспансерного наблюдения при алкоголизме:
- а) 1 год
 - б) 3 года
 - в) 5 лет
 - г) пожизненно
- 257 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» эпидемиологически безопасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 258 Абстиненция при наркомании – это:
- а) отсутствие наркотика в организме
 - б) иллюзорное восприятие окружающего мира
 - в) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления наркотика в организм
- 259 Для первой стадии делирия характерно:
- 1. наплывы ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях;
 - 2. развитие псевдогаллюцинаторных расстройств;
 - 3. расстройства сна, яркие сновидения;
 - 4. помрачение сознания;
 - 5. деперсонализация.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4
- 260 Соматоневрологическая патология у больных алкоголизмом обусловлена:
- 1. преморбидными морфофункциональными особенностями органов и систем индивидуума;
 - 2. токсическим действием этанола;
 - 3. токсическим действием ацетальдегида;
 - 4. длительностью заболевания;
 - 5. злоупотреблением суррогатами алкоголя.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 261 Маниакальное состояние включает:
- а) моторную расторможенность
 - б) резонерство
 - в) сниженный фон настроения
 - г) замедление темпа мышления

- 262 Для первой стадии делирия характерно:
1. наплывы ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях;
 2. развитие псевдогаллюцинаторных расстройств;
 3. расстройства сна, яркие сновидения;
 4. помрачение сознания;
 5. деперсонализация.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4
- 263 Абстинентный синдром – это:
- а) физическая зависимость от психоактивного вещества
 - б) психическая зависимость от психоактивного вещества
 - в) психическое заболевание
 - г) изменение резистентности организма
- 264 Мотивами потребления наркотиков чаще всего являются:
1. удовлетворение любопытства, желание испытать новые ощущения;
 2. желание отвлечься от будничных трудностей;
 3. гедонистические установки;
 4. необходимость признания «своим» в группе;
 5. желание повысить настроение.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 265 Иллюзии, выражающиеся в восприятии действительно существующих образов изменено, обычно в причудливо – фантастическом виде, называются:
- а) аффективными
 - б) парейдолическими
 - в) вербальными
 - г) иллюзиями невнимания
- 266 Узелки по ходу вен свидетельствуют:
- а) о наркотической зависимости
 - б) о болезненном состоянии
 - в) о варикозном расширении вен
 - г) об аллергическом заболевании
- 267 Лёгкая степень острой алкогольной интоксикации характеризуется:
1. ощущением психического и физического комфорта;
 2. повышением речедвигательной активности;
 3. лёгким нарушением координации движений;
 4. замедлением ассоциативного процесса;
 5. появлением психосенсорных расстройств.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

268 В группу риска входят:

1. подростки, замеченные в употреблении алкоголя или других ПАВ;
2. подростки, ведущие асоциальный образ жизни;
3. подростки из неблагополучных семей;
4. подростки и взрослые, страдающие алкоголизмом;
5. подростки с пограничной умственной отсталостью.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно все перечисленное

269 К транквилизаторам относятся:

1. производные бензамида;
2. производные бензодиазепина;
3. производные ГАМК;
4. производные пропандиола;
5. ингибиторы моноаминоксидазы.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно 4

270 Кустарно изготовленный первитин относится к:

а) опиатам

б) психостимуляторам

в) галлюциногенам

г) барбитуратам

271 Рецидив алкоголизма – это возобновление приёма алкоголя в период ремиссии с:

а) продолжительностью более одного дня

б) выпивкой более 20 г в пересчёте на чистый алкоголь

в) обострением симптомов влечения к алкоголю

г) появлением признаков повышенной возбудимости

272 Максимальная толерантность к алкоголю развивается при алкоголизме:

а) в первой стадии заболевания

б) во второй стадии заболевания

в) в третьей стадии заболевания

г) на любой стадии заболевания

273 Острая интоксикация амфетаминами проявляется:

1. ощущением прилива энергии и усилением активности, переоценкой собственных возможностей;

2. склонностью к стереотипным однообразным действиям и раздражительностью, тревогой;

3. нарушениями сердечного ритма и дыхания, повышением АД;

4. резким снижением аппетита;

5. повышенной потливостью, гиперрефлексией, тремором, расширением зрачков.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно все перечисленное

- 274 Алкогольная абстиненция – это:
- а) присутствие алкоголя в крови
 - б) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления алкоголя в организм
 - в) алкогольное поражение печени
 - г) алкогольная эпилепсия
- 275 В приемном отделении ЛПУ наркотические средства:
- а) сохраняются три дня
 - б) сохраняются пять дней
 - в) нужны для оказания экстренной медицинской помощи
 - г) не используются вообще
- 276 Изменения личности у больных алкоголизмом проявляются:
1. заострением преморбидных характерологических особенностей;
 2. снижением «энергетического потенциала»;
 3. нивелировкой преморбидных характерологических особенностей
 4. грубыми расстройствами памяти;
 5. патологическим развитием личности.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 277 Депрессия включает в себя:
- а) моторную заторможенность
 - б) повышенный фон настроения
 - в) навязчивости
 - г) ускорение темпа мышления
- 278 Кокаин относится к:
- а) сильнодействующим средствам
 - б) седативным препаратам
 - в) психостимуляторам
 - г) галлюциногенам
- 279 При терапии алкогольных делириев с особой осторожностью следует назначать:
- а) полиионные растворы;
 - б) крово- и плазмозаменители;
 - в) транквилизаторы;
 - г) нейролептики
- 280 Токсикомании, формирующиеся вследствие злоупотребления лекарственными препаратами, чаще всего возникают из-за:
- а) нерационального, неправильного лечения;
 - б) частого приёма бензодиазепинов при бессоннице или других расстройствах;
 - в) частого приёма медикаментов при различных неблагоприятных жизненных ситуациях;
 - г) лечения барбитуратами;
- 281 Тяжелая степень алкогольного опьянения определяется:
- а) мозжечковой атаксией, мышечной атонией, амимией, вестибулярными расстройствами
 - б) дисфорией
 - в) повышенным настроением с дурашливостью
 - г) высоким АД

- 282 Мусситирующий делирий характеризуется:
1. психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах постели;
 2. невнятным, бессвязным бормотанием;
 3. карфологическими нарушениями;
 4. возбуждением с совершением профессиональных действий;
 5. эпизодами кататонического возбуждения.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 283 При психомоторном возбуждении больному необходимо ввести:
- а) мажептил
 - б) аминазин
 - в) седуксен
 - г) модитен – депо
- 284 Толерантность к алкоголю в большей степени зависит:
1. от технологии изготовления алкогольной продукции.
 2. от частоты употребления алкоголя;
 - 3 от функционального состояния организма;
 4. от изначальной активности альдегидоксилирующих ферментов;
 5. от возраста и пола индивидуума.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4
- 285 Неврологические расстройства у больных алкоголизмом проявляются;
1. патологическими рефлексам;
 2. полиневропатиями;
 3. нарушением вибрационной чувствительности;
 4. синдромом рассеянного энцефаломиелита;
 5. расширением желудочков мозга.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 286 Навязчивые идеи относятся к расстройствам:
- а) мышления
 - б) восприятия
 - в) интеллекта
 - г) влечений

- 287 Для клиники алкоголизма у лиц пожилого возраста характерно:
1. относительная невысокая интенсивность влечения к алкоголю;
 2. непродолжительные запои;
 3. преобладание соматических и неврологических расстройств в структуре ААС;
 4. усиление в опьянении эмоциональной лабильности;
 5. относительно невысокая толерантность.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 288 Наркогенность ПАВ определяется:
1. скоростью формирования зависимости;
 2. высотой толерантности;
 3. степенью психической и социальной инвалидизации;
 4. значением субъективного эффекта удовольствия от вещества;
 5. видом вещества.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 289 Первая помощь при передозировке опиатов заключается в:
- а) введении реланиума
 - б) введении налоксона
 - в) введении галоперидола
 - г) срочном вызове бригады скорой помощи
- 290 Среди социальных факторов, влияющих на формирование алкоголизма, наиболее значимыми являются:
1. алкогольная политика государства;
 2. социальное положение индивидуума и его экономическая обеспеченность;
 3. устойчивые обычаи ближайшего окружения;
 4. семейное положение
 5. расовая и этническая принадлежность.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 291 Для третьей стадии алкоголизма характерны:
- а) снижение толерантности к алкоголю
 - б) повышение толерантности к алкоголю
 - в) увеличение сроков запоев
 - г) исчезновение толерантности
- 292 Снижение количественного контроля принятого алкоголя во второй стадии заболевания проявляется в:
- а) повышении толерантности к алкоголю
 - б) понижении толерантности к алкоголю
 - в) непреодолимом влечении к последующему приему алкоголя после употребления начальной (критической) дозы
 - г) развитии алкогольного делирия

- 293 Состояние отмены при барбитуровой наркомании характеризуется:
1. дисфорическим аффектом;
 2. гиперрефлексией с мышечной гипертензией и мелким тремором;
 3. подъемом АД с последующей гипотензией вплоть до коллапсов;
 4. бессонницей;
 5. болями в желудке и крупных суставах.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 294 К основным формам алкогольных психозов относятся:
- а) алкогольная горячка, алкогольное возбуждение, алкогольный озноб
 - б) алкогольный делирий, галлюциноз, параноид
 - в) спокойный, похмельный, смешанный
 - г) бред ревности, бред преследования, бред отрицания болезни
- 295 Галлюцинации относятся к расстройствам:
- а) мышления
 - б) восприятия
 - в) интеллекта
 - г) влечений
- 296 Характеристика термина "наркотическое средство" включает следующие критерии:
- а) психологический
 - б) политический
 - в) морально – этический
 - г) медицинский и юридический
- 297 Острые интоксикационные психозы при злоупотреблении амфетаминами чаще протекают по типу:
1. острого параноида;
 2. острого галлюциноза;
 3. делирия;
 4. онейроидноподобного состояния;
 5. аменции.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 298 При паркинсонизме, возникшем в результате лечения психотропными препаратами, назначают:
- а) корректоры
 - б) нейролептики
 - в) антидепрессанты
 - г) седативные средства
- 299 В сомнительных случаях картины алкогольного опьянения следует:
- а) опираться на собственные признания испытуемого о приеме алкоголя
 - б) ориентироваться на запах алкоголя изо рта испытуемого
 - в) провести не менее двух проб на алкоголь
 - г) ориентироваться на утверждение очевидцев

300 Для первой стадии делирия характерно:

1. наплывы ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях;
2. развитие псевдогаллюцинаторных расстройств;
3. расстройства сна, яркие сновидения;
4. помрачение сознания;
5. деперсонализация.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно 4