

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

(для медицинских сестер неврологических отделений и кабинетов, прошедших обучение по циклам 15.18 "Сестринское дело в неврологии", профессиональной переподготовки по специальности «Сестринское дело»)

- 1 При применении антидепрессантов возможны следующие побочные эффекты:
 - а) диспепсические расстройства
 - б) склонность к суициду
 - в) заторможенность
 - г) сонливость
- 2 Основным патогенетическим препаратом применяемым при купировании мистического криза:
 - а) прозерин
 - б) клофелин
 - в) атропина
- 3 Первостепенными проблемами в сестринском процессе в острейшем периоде инсульта в первые часы являются все, кроме:
 - а) поддержание проходимости верхних дыхательных путей и контроль адекватности дыхания
 - б) контроль гемодинамики
 - в) профилактика инфекционных осложнений, пролежней
 - г) профилактика задержки мочи
- 4 Этиологическим фактором развития гнойного менингита является:
 - а) вирус гриппа
 - б) менингококк
 - в) вирус кори
 - г) вирус герпеса
- 5 Диаметр зрачка в норме при обычном освещении примерно равен:
 - а) 0,5 мм;
 - б) 3-4 мм
 - в) 1-1,5 мм;
 - г) 2-2,5 мм;
- 6 Факторами развития невропатий являются:
 - а) воздействие ультрафиолета, перегревание
 - б) наследственность, чрезмерные физические нагрузки
 - в) бессонница, ожирение
 - г) травмы, токсические вещества
- 7 Наиболее перспективной в отношении прогноза и эффективности группой для диспансеризации являются:
 - а) больные с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга
 - б) больные с переходящими нарушениями мозгового кровообращения
 - в) больные перенесшие инсульт

- 8 При осмотре больного с черепно - мозговой травмой после ДТП на догоспитальном этапе при обнаружении повреждения в области лба следует всегда иметь в виду возможность:
- а) гиперэкстензионной травмы шейного отдела позвоночника
 - б) посттравматический менингоэнцефалит
 - в) посткоммоционный синдром
 - г) различные виды внутричерепных гематом
- 9 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» «радиоактивными» отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 10 Передозировка нейролептиков может осложниться:
- а) тремором рук, скованностью движений
 - б) появлением маскообразности лица
 - в) судорогами ног
 - г) бредом, страхом, возбуждением
 - д) лихорадкой
- 11 Симптом «очков» характерен для:
- а) гипертонического инсульта
 - б) геморрагического инсульта
 - в) перелома основания черепа
 - г) субарахноидального кровоизлияния
- 12 Показателями оценки уровня сформированности компетенций являются:
- а) знания
 - б) умения
 - в) способы деятельности
 - г) знания, умения, способы деятельности
- 13 Основной признак коматозного состояния:
- а) угнетение центральной нервной системы
 - б) угнетение гемодинамики
 - в) угнетение периферической нервной системы
- 14 Факторы риска развития пролежней:
- а) влажные кожные покровы
 - б) мужской пол
 - в) отсутствие сознания у пациента
 - г) сахарный диабет
 - д) женский пол
 - е) сухость кожных покровов
- 15 Подтверждение диагноза геморрагического инсульта включает в себя следующие инструментальные исследования:
- а) ЭЭГ (электроэнцефалография)
 - б) КТ (компьютерная томография) - головного мозга
 - в) люмбальная пункция с исследованием спинномозговой жидкости
 - г) УЗИ (ультразвуковое исследование)
 - д) рентгенография черепа

- 16 Культура речи – это, прежде всего:
- а) владение речевой культурой
 - б) соблюдение норм русского литературного языка
 - в) достижение целей коммуникации
 - г) соблюдение речевого этикета
- 17 К отходам класса В относят:
- а) материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекционными болезнями
 - б) пищевые отходы неинфекционных отделений
 - в) органические операционные отходы
 - г) пищевые отходы инфекционных отделений
- 18 "Пьяная" походка характерна для:
- а) хорей
 - б) поражения мозжечка
 - в) спастического парапареза нижних конечностей
 - г) поражения нижеберцового нерва
- 19 Профессиональная компетентность – это:
- а) степень развития личности
 - б) степень обученности
 - в) совокупность профессиональных и личностных качеств
 - г) вид профессиональной деятельности
- 20 Исходы черепно-мозговой травмы включают:
- а) посткоммоционный синдром
 - б) посттравматическая энцефалопатия
 - в) посттравматическая эпилепсия
 - г) эпидуральная гематома
 - д) посттравматический менингоэнцефалит
 - е) абстинентный синдром
- 21 Понятие кома включает в себя:
- а) отсутствие реакции на внешние раздражители
 - б) координированный двигательный ответ на болевые раздражители
 - в) реакцию на звуковые раздражители
 - г) ригидность затылочных мышц
- 22 При возникновении судорожного припадка на догоспитальном этапе применяется:
- а) реланиум;
 - б) кофеин;
 - в) лидокаин;
 - г) кетолорак
- 23 Периферический паралич не проявляется:
- а) нарушением произвольных движений при сохранении непроизвольных;
 - б) снижением мышечного тонуса;
 - в) арефлексией;
 - г) фибриллярным подергиванием мышц.
- 24 В клинической карте миелита ведущее место занимает:
- а) нарушения функций тазовых органов
 - б) нарушение сознания
 - в) гемипарез

- 25 При планировании сестринского ухода за больным с синдромом Паркинсона выделить приоритетную проблему пациента:
- а) отказ от приема пищи
 - б) лихорадка
 - в) нарастание двигательного дефекта
- 26 Уменьшение суточного диуреза менее 500 мл – это
- а) полиурия
 - б) олигурия
 - в) никтурия
 - г) анурия
- 27 Энцефалит – это:
- а) воспалительное заболевание твердой мозговой оболочки
 - б) воспалительное заболевание сосудистой мозговой оболочки
 - в) воспалительное заболевание вещества головного мозга
 - г) заболевание вещества головного мозга невоспалительной природы
- 28 Основной признак коматозного состояния:
- а) утрата сознания
 - б) состояние зрачков и их реакция
 - в) нарушение регуляции АД и дыхания
- 29 Наркотические препараты:
- а) подлежат предметно - количественному учёту
 - б) подлежат только количественному учёту
 - в) не подлежат учёту
- 30 Фальсифицированное лекарственное средство – это:
- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.
 - б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе.
 - в) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.
 - г) лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства.
- 31 Противопоказаниями к проведению люмбальной пункции является:
- а) признаки или угроза осевой дислокации мозга при наличии внутричерепного объемного процесса
 - б) длительный прием антикоагулянтов, наличие геморрагического диатеза с выраженными нарушениями свертывающей системы крови
 - в) наличие инфекции в поясничной области, включая кожу, подкожные ткани, кости и эпидуральное пространство
 - г) подозрение на менингоэнцефалит
 - д) подозрение на субарахноидальное кровоизлияние
 - е) диагностика нормотензивной гидроцефалии
- 32 Гемиплегия – это:
- а) полное отсутствие движения в одной верхней конечности
 - б) частичное отсутствие движения в нижних конечностях
 - в) полное отсутствие движения в одной половине тела
 - г) частичное отсутствие движения в одной половине тела

- 33 Медицинская психология – это:
- а) психопатология
 - б) отрасль клинической медицины, изучающая клиническое и душевное состояние пациента
 - в) отрасль психологической науки, изучающая психологические аспекты гигиены, профилактики, диагностики, лечения, экспертизы и реабилитации пациентов
 - г) отрасль медицины, изучающая душевное состояние пациентов при различных заболеваниях
- 34 Характерные симптомы при геморрагическом инсульте:
- а) бледность лица, однократная рвота, мелькание мушек перед глазами
 - б) гиперемия лиц, многократная рвота, судороги, преимущественно односторонние
 - в) головная боль, тошнота, кратковременная потеря сознания
 - г) маскообразность лица, тремор рук, скованность движений
- 35 Атаксия - это:
- а) нарушение координации движения
 - б) утрата силы конечностей
 - в) утрата речевых способностей как средства выражения
 - г) невозможность громко говорить при сохранении шепотной речи
- 36 Гирудотерапия применяется с целью:
- а) кровопускания
 - б) кровоостанавливающей
 - в) противосвертывающей
 - г) разжижения мокроты
 - д) диагностики заболеваний
- 37 Передозировка наркотиков может привести к:
- а) остановке дыхания, параличу дыхательного центра
 - б) непроизвольной дефекации
 - в) острой задержке мочи
 - г) шоку
 - д) менингеальному синдрому
- 38 Дыхательные анальгетики (цититон, бемеград и др.) у больных с комами применяются:
- а) при поверхностной коме
 - б) при глубокой коме
 - в) применение их у больных с комами не показано
 - г) при коме любой глубины
- 39 Триада поражения глазодвигательного нерва (3 пара) исключает следующий симптом:
- а) птоз верхнего века
 - б) широкий зрачок
 - в) узкий зрачок
 - г) отхождение глазного яблока кнаружи
- 40 Больные в коматозном состоянии транспортируются:
- а) на боку
 - б) на спине
 - в) на животе

- 41 Геморрагический инсульт не проявляется:
- а) медленным нарастанием общемозговых симптомов;
 - б) несоответствием очаговых симптомов определенному сосудистому бассейну;
 - в) рвотой;
 - г) артериальной гипертензией.
- 42 Наиболее перспективной в отношении прогноза и эффективности группой для диспансеризации являются:
- а) больные с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга
 - б) больные с переходящими нарушениями мозгового кровообращения
 - в) больные, перенесшие инсульт
- 43 Первостепенными проблемами в сестринском процессе в острейшем периоде комы являются все перечисленные, кроме:
- а) проблема профилактики аспирационно-обтурационных нарушений дыхания
 - б) проблемы контроля параметров гемодинамики, дыхания
 - в) проблема профилактики пролежней инфекционных осложнений
- 44 Ортостатический коллапс в виде резкого перепада давления развивается чаще:
- а) в горизонтальном положении
 - б) в положении сидя
 - в) при длительном стоянии
 - г) при переходе из горизонтального положения в вертикальное
- 45 Психоневрологический синдром в виде изменения личности различных неврологических симптомов является:
- а) ранним симптомом ВИЧ-инфекции
 - б) поздним симптомом СПИД
- 46 Депрессивное состояние характеризуется:
- а) тоской
 - б) агрессивностью
 - в) злобой
 - г) безразличием
- 47 Для купирования приступа мигрени не используется:
- а) кофетамин
 - б) ацетилсалициловая кислота
 - в) анаприлин
- 48 Осложнением гипертонической болезни не является:
- а) геморрагический, ишемический инсульт
 - б) инфаркт миокарда
 - в) атеросклероз
- 49 Выделяют основные типы эпилептических припадков:
- а) парциальные
 - б) генерализованные
 - в) алкогольные
 - г) лекарственные
 - д) гипертензионные
- 50 Сопору по шкале Глазго соответствует сумма баллов, равная:
- а) 5;
 - б) 7;
 - в) 9;
 - г) 13.

- 51 Нарушение мозгового кровообращения в бассейне сонных артерий не проявляется:
- а) резким ослаблением или отсутствием пульсации на внутренней сонной артерии на стороне поражения;
 - б) менингеальными симптомами;
 - в) гемипарезами на стороне, противоположной сосудистому поражению;
- 52 Правила сбора мочи на общий анализ:
- а) утром, среднюю порцию мочи 150–200 мл
 - б) утром из всей ночной мочи 150–200 мл
 - в) в любое время суток среднюю порцию мочи
 - г) в любое время суток всю порцию мочи
- 53 Первоочередным мероприятием при оказании помощи больному с комой, пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, не является:
- а) ингаляция кислорода
 - б) обеспечение проходимости дыхательных путей
 - в) укладывание больного на щит
- 54 Развернутый судорожный припадок при эпилепсии не проявляется :
- а) генерализованными тоническими и клоническими судорогами;
 - б) сохранением ясного сознания во время и после припадков;
 - в) произвольным мочеиспусканием;
 - г) травмами после падения.
- 55 Амнезия - это:
- а) потеря памяти
 - б) нарушение процессов узнавания предметов, вещей, животных, людей
 - в) утрата речевых способностей как средства выражения мыслей
 - г) нарушение понимания устной речи
- 56 Атаксия - это:
- а) нарушение координации движения
 - б) утрата силы конечностей
 - в) утрата речевых способностей как средства выражения
 - г) невозможность громко говорить при сохранении шепотной речи
- 57 Для поражения мозжечка характерны:
- а) атаксия
 - б) гипомимия
 - в) насильственный плач
 - г) мышечная гипотония
 - д) трофические нарушения в мягких тканях
- 58 Для тяжело больных, нуждающихся в возвышенном положении используют:
- а) функциональные кровати состоящие из 3 секций..
 - б) не менее двух подушек
 - в) функциональные кровати состоят из 2х секций
- 59 Сотрясение головного мозга не проявляется:
- а) головной болью, тошнотой, рвотой;
 - б) эпизодом потери сознания;
 - в) ретроградной амнезией;
 - г) очаговой неврологической симптоматикой
- 60 Ангионеврозы:
- а) ограниченное или диффузное расширение просвета сосуда или выпячивание его стенки
 - б) нарушения, связанные с функциональными расстройствами кровеносных сосудов

- 61 Канцелярские отходы, упаковка, инвентарь, потерявший потребительские свойства, образующиеся в медицинском учреждении, относятся к медицинским отходам:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 62 При поверхностной коме характеристика рефлексов:
- а) все рефлексы сохранены
 - б) часть рефлексов сохранены, часть отсутствует
 - в) отсутствие рефлексов
- 63 Клинические симптомы опухоли головного мозга:
- а) головная боль в вечернее время
 - б) головная боль чаще по утрам, а в поздние стадии постоянная
 - в) нарушение памяти, ориентации
 - г) двигательные и чувствительные расстройства
 - д) головная боль в одном и том же месте, чаще односторонняя
 - е) головная боль уменьшается после применения холода к голове
- 64 Каковы действия медицинской сестры при условии, что пациент болен СПИД?
- а) работа в защитном костюме
 - б) работа в обычных условиях, соблюдая меры предосторожности (избегать повреждения перчаток и кожных покровов)
 - в) не предпринимать никаких мер
 - г) не оказывать помощь
- 65 Шкала Глазго используется для оценки:
- а) уровня угнетения сознания;
 - б) степени тяжести шока;
 - в) выраженности дыхательных расстройств при коме;
 - г) состояния новорожденного.
- 66 При менингитах возникают:
- а) общемозговые симптомы
 - б) ригидность затылочных мышц
 - в) парезы периферических нервов
 - г) общая гиперестезия кожи
 - д) тромбоэмболия
 - е) сотрясение, сдавление нерва
- 67 Самая легкая травма головного мозга:
- а) ушиб
 - б) сотрясение
 - в) закрытая черепно-мозговая травма с внутримозговой гематомой
 - г) перелом основания черепа
- 68 Острое нарушение мозгового кровообращения является преходящим если:
- а) регресс неврологических признаков происходит в течение суток после их проявления
 - б) неврологические симптомы выпадения исчезают в сроки до 30 недель
 - в) неврологическая симптоматика стойкая длительная

- 69 Правила подачи пузыря со льдом:
- а) пузырь заполняется водой и замораживается в морозильной камере
 - б) подается не более, чем на 1,0-1,5 часа
 - в) пузырь заполняется колотым льдом и доливается холодной водой
 - г) пузырь оборачивается полотенцем перед подачей пациенту
 - д) пузырь заполняется холодной водой и подается пациенту
- 70 К признакам поражения периферического двигательного нейрона относятся:
- а) мышечная гипотония
 - б) угнетение сухожильных рефлексов
 - в) патологические рефлексы
 - г) гиперкинезы
 - д) нистагм
- 71 Пероральный приём наркотических лекарственных средств показан:
- а) только в присутствии медицинской сестры
 - б) не зависимо от присутствия медицинской сестры
 - в) только в присутствии врача
- 72 Преходящее нарушение мозгового кровообращения может сопровождаться:
- а) слабостью в конечностях (рука, нога) односторонней, проходящей через 10-15 минут
 - б) слабостью в конечностях (рука, нога) двухсторонней, проходящей в течение 1-2 суток
 - в) расстройством речи и зрения, проходящих через 10-15 минут
 - г) расстройством речи и зрения, проходящих через 2-3 суток
 - д) невозможностью разогнуть пальцы руки и похлопать в ладони
- 73 Полиневропатии могут развиваться при:
- а) травмах центральной нервной системы, дорсопатии шейного отдела позвоночника
 - б) шизофрении, олигофрении,
 - в) сахарном диабете, отравлениях солями тяжелых металлов, алкоголизме
 - г) менингитах, ишемическом инсульте, геморрагическом инсульте
- 74 Отсасывание слизи отсосом у больного в коматозном состоянии может производиться:
- а) 5-10 секунд
 - б) не более 15 секунд
 - в) не более 20 секунд
 - г) 20-30 секунд
- 75 Осложнения, развивающиеся у пациентов с мозговой комой:
- а) гипостатическая пневмония
 - б) пролежни
 - в) анемия
 - г) коллапс
 - д) обморок
- 76 Наиболее частой причиной смерти при коме любой глубины являются:
- а) аспирационные и обтурационные нарушения дыхания
 - б) запредельные угнетения АД и дыхания
 - в) нарушения двигательных функций

- 77 Угрожающим состоянием у больного с миастенией и миастеническим кризом является:
- а) нарушения дыхания; требующие применения ИЕЛ
 - б) алиментарное истощение из-за нарушения глотания
- 78 Мимические мышцы лица иннервируются:
- а) тройничным нервом
 - б) лицевым нервом
 - в) блуждающим нервом
 - г) языкоглоточным нервом
- 79 Эпилептический статус – это:
- а) один длительный генерализованный эпилептический приступ
 - б) состояние, при котором эпилептический приступ продолжается более 30 минут, либо в течение этого же срока эпилептические приступы следуют друг за другом очень часто, но в промежутках между ними больной приходит в сознание
 - в) состояние, при котором эпилептический приступ продолжается более 30 минут, либо в течение этого же срока эпилептические приступы следуют друг за другом столь часто, что в промежутках между ними больной не проходит в сознание
 - г) серия эпилептических приступов
- 80 Ангионеврозы:
- а) ограниченное или диффузное расширение просвета сосуда или выпячивание его стенки
 - б) нарушения, связанные с функциональными расстройствами кровеносных сосудов
- 81 В клинической карте миелита ведущее место занимает:
- а) нарушения функций тазовых органов
 - б) нарушение сознания
 - в) гемипарез
- 82 Новый эффективный препарат для лечения паркинсонизма:
- а) наком
 - б) циклодол
 - в) ромпаркин
- 83 Признаками развивающегося отека головного мозга являются все перечисленные, кроме:
- а) нарастающая брадикардия
 - б) снижение гемодинамических показателей
 - в) урежение дыхания
 - г) учащение дыхания
- 84 Начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга повторяются и усиливаются при всех перечисленных факторах, кроме:
- а) напряженной умственной работы
 - б) переутомлении умственном
 - в) на свежем морозном воздухе
 - г) нет правильного ответа
- 85 Инсульт со стойкой неврологической симптоматикой чаще развивается как следствие:
- а) ишемического инсульта
 - б) геморрагического инсульта
- 86 Плексопатия - это:
- а) изолированное поражение отдельных нервных стволов
 - б) поражение сплетений

- 87 Тахикардия – это число сердечных сокращений в минуту:
- а) менее 60
 - б) 60–70
 - в) 70–80
 - г) более 90
- 88 Одностороннее резкое расширение зрачка с утратой реакции на свет у пациента в коме не свидетельствует:
- а) об интоксикации атропином;
 - б) о нарастании внутримозговой гематомы при черепно-мозговой травме;
 - в) о нарастании внутримозговой гематомы при разрыве аневризмы сосудов головного мозга;
 - г) об остром дислокационном синдроме при опухоли мозга.
- 89 Внутренние сонные артерии отходят:
- а) от подключичных артерий
 - б) от общих сонных артерий
- 90 Прогрессивный паралич – это одна из форм:
- а) нарушения памяти
 - б) нейросифилиса
 - в) нарушения движения
 - г) нейроспида
- 91 Осложнениями гипертонической болезни чаще всего являются:
- а) стенокардия, инфаркт миокарда
 - б) острый тромбоз сосудов нижних конечностей
- 92 Причины ишемического инсульта:
- а) тромбоэмболия сосудов головного мозга
 - б) атеросклероз сосудов головного мозга
 - в) передозировка барбитуратов
 - г) передозировка мочегонных препаратов
 - д) разрыв аневризмы
- 93 Характеристика рефлексов при глубокой коме:
- а) все рефлексы сохранены
 - б) снижение глоточных, роговичных рефлексов
 - в) все рефлексы отсутствуют
 - г) отсутствие глоточных, роговичных рефлексов, зрачковый рефлекс снижен или отсутствует
- 94 При поражении центрального двигательного нейрона мышечный тонус:
- а) повышается
 - б) понижается
 - в) не изменяется
 - г) может повыситься или понизиться
- 95 Согласно СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» эпидемиологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д

- 96 Противопоказания для постановки горчичников:
- а) субфебрильная температура
 - б) сирингомиелия
 - в) лихорадка
 - г) псориаз
 - д) гипертонический криз
 - е) бронхит, трахеит
- 97 Нарушение чувствительности по «типу носков» наблюдается у пациентов с:
- а) алкогольной полиневропатией
 - б) белой горячкой
 - в) алкогольным бредом ревности
 - г) кататоническим ступором
- 98 Степенью угнетения сознания не является:
- а) оглушение;
 - б) сопор;
 - в) кома;
 - г) делирий
- 99 Аневризма - это:
- а) ограниченное или диффузное расширение просвета сосуда или выпячивания его стенки
 - б) нарушения, связанные с функциональными расстройствами кровеносных сосудов
- 100 При геморрагическом инсульте имеет место:
- а) расширение зрачка на стороне противоположной кровоизлиянию
 - б) расширение зрачка на стороне инсульта
 - в) сужение зрачка на стороне инсульта
 - г) двухстороннее расширение зрачков
- 101 Невропатия это:
- а) изолированное положение отдельных нервных стволов
 - б) изолированное поражение спинного мозга
 - в) изолированное поражения сплетений
- 102 Деменция проявляется:
- а) первичными нарушениями мышления, памяти и вторичными эмоционально-поведенческими нарушениями
 - б) первичными эмоционально-поведенческими нарушениями, вторичными нарушениями памяти, мышления
- 103 Положительный симптом Кернига выявляется:
- а) сгибанием головы с приведением подбородка к груди;
 - б) разгибанием голени при согнутом под прямым углом к туловищу бедре;
 - в) надавливанием на лонное сочленение;
 - г) поднятием выпрямленной в коленном суставе ноги.
- 104 После люмбальной пункции больной укладывается горизонтально без подушки:
- а) на 2 часа
 - б) до утра следующего дня

- 105 Максимально допустимы сроки начала постконтактной профилактики антиретровирусными препаратами при риске инфицирования ВИЧ:
- а) не позднее 24 часов
 - б) не позднее 36 часов
 - в) не позднее 72 часов
 - г) не позднее 12 часов
- 106 Большой эпилептический припадок может сопровождаться:
- а) прикусыванием языка
 - б) отеком легких
 - в) непроизвольным мочеиспусканием
 - г) афазией
 - д) анизокорией
- 107 Параличи бывают:
- а) центральные
 - б) периферические
 - в) смешанные
 - г) перемежающиеся
 - д) вегетативные
- 108 Минимальная частота осмотров больного при остаточных явлениях мозгового инсульта:
- а) не реже 1 раза в год
 - б) не реже 1 раза в 3 месяца
 - в) не реже 2 раз в год
- 109 Первый период лихорадки сопровождается:
- а) ознобом
 - б) судорогами
 - в) проливым потом
 - г) падением АД
- 110 Глюкокортикоидные гормоны у больных с черепно-мозговыми травмами вводят:
- а) для уменьшения проницаемости сосудистой стенки и профилактики перифокального отека в области травмы
 - б) для повышения тонуса емкостных сосудов большого круга, увеличения возврата крови к сердцу и повышения сердечного выброса
- 111 При рассеянном склерозе возникают:
- а) расстройства грамматической и лексической структуры речи или нарушение её понимания
 - б) нистагм, поблдение височных половин сосков зрительных нервов, выпадение брюшных рефлексов
 - в) олигобрадикинезия
 - г) двигательные и чувствительные расстройства
- 112 Люмбальную пункцию производят специальной иглой с мандером между остистыми отростками:
- а) ZIII- ZIV
 - б) ZI - ZII
- 113 Отравление барбитуратами может привести к:
- а) макрогематурии
 - б) коме
 - в) кишечной непроходимости
 - г) аритмии

- 114 Доминирующим постоянным симптомом сирингомиелии, который надо учитывать при организации сестринского ухода в стационаре и в поликлинике являются:
- а) расстройства чувствительности
 - б) двигательные нарушения
 - в) нарушения функции тазовых органов
- 115 Минимальная частота осмотров больного с переходящими нарушениями мозгового кровообращения:
- а) не реже 1 раза в год
 - б) не реже 1 раза в 3 месяца
 - в) не реже 2 раз в год
- 116 Повышение температуры не характерно при:
- а) геморрагическом инсульте
 - б) алкогольной коме
 - в) менингоэнцефалите
- 117 Согласно СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» токсикологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 118 Клинические проявления остеохондроза:
- а) боль
 - б) расстройства чувствительности (онемение, парестезии)
 - в) атрофия мышц
 - г) трофические нарушения в мягких тканях
 - д) нарушение сердечного ритма
- 119 Первостепенной проблемой в сестринском процессе в острейшем периоде менингита не является:
- а) общеинфекционные проявления
 - б) общемозговые симптомы
 - в) симптомы локального поражения нервной системы
- 120 Фактором риска гипертонической болезни не является:
- а) избыточное употребление поваренной соли
 - б) подавленные отрицательные эмоции
 - в) гиподинамия
 - г) употребление жесткой воды
- 121 Физиологическое значение цереброспинальной жидкости (ликвора):
- а) снабжает нервную ткань питательными веществами
 - б) обеспечивает механическую защиту мозга
 - в) препятствует проникновению микроорганизмов
 - г) уменьшает потребность мозга в кислороде
 - д) способствует отдаче избытка тепла
- 122 К признакам, оцениваемым по шкале Глазго, не относится :
- а) способность пациента к речи;
 - б) способность пациента к открыванию глаз;
 - в) способность пациента к самостоятельному дыханию;
 - г) двигательные реакции пациента.

- 123 В клинике острого геморрагического инсульта преобладает:
- а) очаговая неврологическая симптоматика
 - б) общемозговая симптоматика
- 124 Абстинентный синдром при алкоголизме – это:
- а) симптомы интоксикации на следующий день после опьянения
 - б) похмельный синдром
 - в) снижение толерантности к алкоголю
 - г) патологическое опьянение
- 125 К факторам риска развития ишемического инсульта относятся:
- а) стресс
 - б) артериальная гипертензия
 - в) нарушения сердечного ритма
 - г) атеросклероз
 - д) чрезмерные физические нагрузки
 - е) травмы
- 126 Важными проблемами сестринского процесса в остром периоде травмы позвоночника и спинного мозга являются все перечисленные, кроме:
- а) правильная транспортировка больного на щите с соблюдением строгого горизонтального положения
 - б) исключение сгибательных, боковых вращательных движений в позвоночнике
 - в) профилактика инфекций со стороны мочевыводящих путей
- 127 Кровянистый или ксантохромный ликвор характерен для:
- а) гнойного менингита
 - б) серозного менингита
 - в) субарахноидального кровоизлияния
 - г) тромбоза сосудов головного мозга
- 128 Аграфия- это:
- а) потеря способности письма
 - б) уточнение причины заболевания
 - в) диагностика и лечения заболевания
- 129 Афония - это:
- а) невозможность громко говорить при сохранении шепотной речи
 - б) нарушение устной речи
 - в) нарушение слухового восприятия
 - г) нарушение понимания письменной речи
- 130 Больной должен соблюдать горизонтальное положение и постельный режим в течение 2-3х часов после применения все указанных гипотензивных препаратов, кроме:
- а) клофелина в инъекциях
 - б) пентамина в инъекциях
 - в) аминазина в инъекциях
 - г) мочегонных в инъекциях
- 131 Сильнейшие приступы боли в различных частях лица и челюстях – это клинические симптомы:
- а) невралгии лицевого нерва
 - б) невралгии тройничного нерва
 - в) сотрясения головного мозга
 - г) дорсопатии шейного отдела позвоночника

- 132 В клинике острого ишемического инсульта преобладает:
- а) очаговая неврологическая симптоматика
 - б) общемозговая симптоматика
- 133 Осложнением гипертонической болезни является:
- а) отслойка клетчатки
 - б) кровоизлияние в мозг
 - в) атеросклероз
 - г) острый тромбоз сосудов нижних конечностей
- 134 Синкопальное состояние – это:
- а) внезапная потеря сознания
 - б) пароксизмальное нарушение ритма
 - в) потеря памяти
 - г) падение АД
- 135 Температура воды для смачивания горчичников (в градусах по Цельсию):
- а) 20–24
 - б) 36–37
 - в) 40–45
 - г) 50–60
- 136 Для мигрени не характерны:
- а) пароксизмальные боли в одной половине головы, сопровождающиеся рвотой
 - б) длительность пароксизмов в течение нескольких часов
 - в) наследственное отягощение
 - г) длительные тяжелые пароксизмы сверлящих болей в области глаза или верхней челюсти
- 137 Больным с черепно-мозговой травмой тугая тампонада уха или носа при наличии ликворы:
- а) показана
 - б) не показана
- 138 Кома по шкале Глазго не соответствует сумма баллов:
- а) 3;
 - б) 5;
 - в) 7;
 - г) 9.
- 139 Минимальная частота осмотров больного с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга:
- а) не реже 1 раза в год
 - б) не реже 1 раза в 3 месяца
 - в) не реже 2 раз в год
- 140 При поражении межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника возникает:
- а) анталгическая поза
 - б) выпадение ахиллова рефлекса
 - в) симптом Ласега
 - г) нарушение чувствительности по полиневритическому типу
 - д) паралич седалищного типа
 - е) трофические нарушения в мягких тканях
- 141 Основной признак коматозного состояния:
- а) утрата сознания
 - б) состояние зрачков и их реакция
 - в) нарушения регуляции АД и дыхания

- 142 Острое нарушение мозгового кровообращения является преходящим, если:
- а) регресс неврологических признаков происходит в течение суток после их появления
 - б) неврологические симптомы "выпадения" исчезают в сроки до 30 недель
 - в) неврологическая симптоматика стойкая, длительная
- 143 Положение больного при люмбальной пункции:
- а) на боку, ноги согнуты в коленных суставах и подогнуты к животу, голова наклоняется вперёд
 - б) на боку, ноги согнуты в коленных суставах и подогнуты к животу, голова отклоняется назад
 - в) на животе с выпрямленными конечностями
- 144 В третьем периоде лихорадки снижение температуры может проходить:
- а) волнообразно
 - б) литически
 - в) критически
 - г) фебрильно
 - д) скачкообразно
- 145 Сестринский процесс при эпилептическом статусе должен быть ориентирован на следующую проблему:
- а) профилактика западения корня языка, аспирация слюны и бронхиальной слизи
 - б) профилактика гипоксии и отека мозга
 - в) антиконвульсивная терапия
- 146 Косоглазие наблюдается при поражении нерва:
- а) тройничного
 - б) глазодвигательного
 - в) лицевого
 - г) отводящего
 - д) блуждающего
- 147 Помощь больному во время эпилептического припадка сводится к следующему:
- а) прекратить только что начавшийся эпилептический припадок
 - б) максимально оградить пациента от травмы и асфиксии
 - в) предотвратить прикус языка поместив между зубами твёрдый предмет
 - г) ввести любым способом различные формы препарата диазепам
- 148 Наиболее перспективной в отношении прогноза и эффективности группой для диспансеризации являются:
- а) больные с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга
 - б) больные с переходящими нарушениями мозгового кровообращения
 - в) больные, перенесшие инсульт
- 149 Наиболее частой причиной смерти при коме любой глубины являются:
- а) аспирационные и обтурационные нарушения дыхания
 - б) заpredельные угнетения АД и дыхания
 - в) нарушения двигательных функций
- 150 План реализации сестринского процесса при нарушениях сна должен содержать всё перечисленное, кроме:
- а) коррекцию эмоциональных сдвигов, ликвидацию тревоги, страха
 - б) рациональное сочетание умственной и физической нагрузки
 - в) выработка ритуалов сна
 - г) подбор снотворных

- 151 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» эпидемиологически безопасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 152 Наиболее важной процедурой в профилактике пролежней является:
- а) частая смена положения больного
 - б) обработка кожи камфорным спиртом
 - в) антибиотикотерапия
 - г) ЛФК, УФО
- 153 При выявлении носителя австралийского антигена текущая дезинфекция проводится:
- а) 3%-м раствором хлорамина
 - б) 1%-м раствором хлорамина
 - в) 5% раствором хлорамина
- 154 Острое нарушение мозгового кровообращения является преходящим, если:
- а) регресс неврологических признаков происходит в течение суток после их появления
 - б) неврологические симптомы "выпадения" исчезают в сроки до 30 недель
 - в) неврологическая симптоматика стойкая, длительная
- 155 Одной из многочисленных причин головных болей может быть:
- а) недостаточность кровоснабжения из позвоночной артерии стволовой части мозга
 - б) затруднения венозного оттока
- 156 Клинике ишемического инсульта не соответствует:
- а) постепенное нарастание симптоматики в течение нескольких часов
 - б) преобладание очаговой симптоматики над общемозговой
 - в) чаще пожилой возраст больного
 - г) обычно пониженное АД
- 157 Этические нормы медицинского работника определяются:
- а) умениями и навыками
 - б) законами и приказами
 - в) этническими особенностями региона
 - г) моральной ответственностью
- 158 Аграфия - это:
- а) потеря способности письма
 - б) потеря двигательной функции руки
 - в) утрата речевых способностей как средство выражения мыслей
 - г) утрата силы конечностей
- 159 К симптомам сотрясения головного мозга относятся:
- а) тремор рук, диспепсические расстройства
 - б) судороги, гиперемия лица
 - в) кратковременная потеря сознания, головная боль, тошнота, рвота
 - г) параличи, парезы

- 160 При поражении левой лобной доли наблюдается:
- а) моторная афазия
 - б) сенсорная афазия
 - в) амнестическая афазия
 - г) все виды афазии
- 161 В клинике острого геморрагического инсульта преобладает:
- а) очаговая неврологическая симптоматика
 - б) общемозговая симптоматика
- 162 Для мигрени не характерны:
- а) пароксизмальные боли в одной половине головы, сопровождающиеся рвотой
 - б) длительность пароксизмов в течение нескольких часов
 - в) наследственное отягощение
 - г) длительные тяжелые пароксизмы сверлящих болей в области глаза или верхней челюсти
- 163 При гипертонической болезни поражаются в первую очередь:
- а) сосуды сердца и мозга
 - б) сосуды конечностей
- 164 Глубина комы определяется:
- а) состоянием зрачков и их реакцией
 - б) состоянием двигательных функций
 - в) степенью угнетения рефлексов
- 165 Индивидуальные особенности поведения человека – это:
- а) условия жизни
 - б) качество жизни
 - в) стиль жизни
 - г) уровень жизни
- 166 Менингеальный синдром не проявляется :
- а) сильной головной болью в сочетании со рвотой;
 - б) общей гиперстезией;
 - в) ригидностью затылочных мышц;
 - г) односторонним положительным симптомом Бабинского.
- 167 Причины эпилепсии:
- а) внутриутробные повреждения головного мозга, родовые травмы
 - б) прижизненные черепно-мозговые травмы
 - в) опухоли мозга
 - г) передозировка транквилизаторов
 - д) гипертоническая болезнь
 - е) невралгия лицевого нерва
- 168 Важными проблемами сестринского процесса в подостром периоде травмы позвоночника и спинного мозга являются все перечисленные, кроме:
- а) исключение движений в позвоночнике во время транспортировки
 - б) профилактика пролежней
 - в) профилактика инфекционных осложнений мочевыводящих путей
 - г) обеспечение регулярного опорожнения кишечника
- 169 Количество белка в рационе у пациента с риском развития пролежней должно быть не менее (грамм/сутки):
- а) 70
 - б) 90
 - в) 120
 - г) 140

- 170 АТФ как средство воздействия на энергетический обмен в мышцах в неврологии применяется при:
- а) миопатиях
 - б) миелите
 - в) миоклонии
- 171 К общемозговым симптомам не относится:
- а) головная боль;
 - б) рвота;
 - в) головокружение;
 - г) анизокория.
- 172 Основной метод диагностики опухоли головного мозга:
- а) электроэнцефалография
 - б) эхоэнцефалоскопия
 - в) магнитно-резонансная томография головы
 - г) рентгенография черепа
- 173 Апраксия, нарушение навыков самоухода в большей степени характерны для:
- а) шизофрении
 - б) сосудистой деменции
 - в) болезни Альцгеймера
 - г) депрессии
- 174 Все отходы ЛПУ по степени опасности делят на:
- а) 2 класса
 - б) 3 класса
 - в) 4 класса
 - г) 5 классов
- 175 Гемипарез – это:
- а) выпадение полей зрения
 - б) игнорирование половины пространства
 - в) расстройство грамматической и лексической структуры речи или нарушение её понимания
 - г) нарушение двигательной активности одной из половины тела
- 176 Медицинский работник к пациенту должен обращаться:
- а) по имени
 - б) по имени и отчеству
 - в) по фамилии
 - г) «больной»
- 177 Остро развившийся односторонний положительный симптом Бабинского выявляется при поражении:
- а) полушария головного мозга на противоположной стороне;
 - б) полушария головного мозга на той же стороне;
 - в) мозжечка;
 - г) ствола мозга.
- 178 Для большого эпилептического припадка характерно:
- а) никогда не бывает предвестников
 - б) чаще бывают предвестники
 - в) больные теряют сознание
 - г) сознание полностью не утрачивается
 - д) лихорадка, гиперемия лица, многократная рвота

- 179 При генерализованом эпилептическом припадке медсестра должна:
- а) с целью предотвращения прикуса языка поместить полотенце или другой предмет между зубов
 - б) убрать потенциально опасные предметы от больного
 - в) переместить пациента в тихое, спокойное место
 - г) ввести внутримышечно диазепам
- 180 План реализации сестринского процесса при эпилепсии не должен содержать:
- а) строгое обеспечение режима сна
 - б) исключение алкоголя
 - в) подбор антиконвульсивной терапии
- 181 Основным патогенетический препарат, применяемый при купировании миасгенического криза:
- а) инъекции прозерина 0,05% раствора
 - б) калимин в таблетках
- 182 Малый инсульт характеризуется:
- а) регрессом неврологических признаков в течение суток после его появления
 - б) регрессом неврологических симптомов "выпадения" в сроки до 3-х недель
- 183 Соотношение компрессий на грудину и искусственных вдохов при проведении реанимации:
- а) 2:15
 - б) 3:6
 - в) 30:2
 - г) 1:5
- 184 Субарахноидальное кровоизлияние, как правило, развивается вследствие:
- а) выраженного атеросклероза
 - б) гипертензивного криза
 - в) разрыва стенки аневризмы артерии головного мозга
 - г) всех перечисленных причин
- 185 Факторы риска развития церебрального атеросклероза:
- а) отягощенная наследственность
 - б) курение
 - в) работники сельского хозяйства
 - г) артериальная гипертензия
 - д) физическая нагрузка
 - е) стресс
- 186 По данным ВОЗ, наибольшее влияние на возникновение заболеваний населения оказывают:
- а) организация и качество медицинской помощи
 - б) экологическая обстановка
 - в) социально-экономические условия и образ жизни населения
 - г) наследственность
- 187 Для поражения подкорковых ядер характерны:
- а) атаксия
 - б) кукольная походка
 - в) гипомимия
 - г) олигобрадикинезия
 - д) анизокирия
 - е) гемианопсия

- 188 Возможные осложнения внутримышечной инъекций:
- а) флегмона, гематома
 - б) некроз, флебит
 - в) паралич седалищного нерва, абсцесс
 - г) воздушная эмболия
- 189 Субарахноидальное кровоизлияние не проявляется:
- а) внезапно возникшей головной болью, часто следующей за физическим напряжением;
 - б) высокой температурой в самом начале заболевания;
 - в) тахикардией, потливостью, тошнотой, рвотой;
 - г) менингеальными симптомами.
- 190 К травматическим повреждением периферических нервов относятся:
- а) перерыв нерва полный или не полный
 - б) переохлаждение нерва
 - в) кровоизлияние в нерв
 - г) сотрясение, сдавление нерва
 - д) перелом нерва
- 191 Менингит-воспаление:
- а) мягкой мозговой оболочки
 - б) твердой мозговой оболочки
 - в) паутинной оболочки
- 192 Возможной причиной невроза является:
- а) черепно-мозговая травма
 - б) алкоголизм
 - в) конфликтная ситуация в семье
 - г) наркомания
- 193 Абсолютными показаниями к проведению люмбальной пункции и лабораторному анализу ликвора являются:
- а) диагностика системной красной волчанки, мышечная гипотония
 - б) демиелинизирующие процессы, угнетение сухожильных рефлексов
 - в) подозрение на внутримозговую гематому, гиперкинезы
 - г) подозрение на нейроинфекцию и субарахноидальное кровоизлияние
- 194 Угрожающим состоянием у больного с миастенией и миастеническим кризом является:
- а) нарушение дыхания требующие применения ИВЛ
 - б) алиментарное истощение из-за нарушения глотания
 - в) сердечно сосудистая недостаточность
- 195 Симптомы невропатии лицевого нерва:
- а) незначительная боль за ухом
 - б) глаз не закрывается на больной стороне
 - в) глаз не закрывается на здоровой стороне
 - г) рот перетянут в здоровую сторону
 - д) рот перетянут в больную сторону
 - е) сильнейшие приступообразные боли в лице

- 196 Вещества, применяемые для послабляющей клизмы:
- а) вазелиновое масло
 - б) облепиховое масло
 - в) 10% раствор натрия хлорида (NaCl)
 - г) 20–30% раствор магния сульфата (MgSO₄)
 - д) 0,9% раствор хлорида натрия
 - е) персиковое масло
- 197 Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью, относятся к классу:
- а)
 - б)
 - в)
 - г)
- 198 Первостепенными проблемами в сестринском процессе в восстановительном периоде миелита являются все перечисленные, кроме:
- а) устранение задержки мочеиспускания
 - б) профилактика пролежней, инфекционных осложнений мочевого пузыря
 - в) восстановление двигательных функций
- 199 Угнетение дыхательного центра развивается у больных:
- а) с поверхностной комой
 - б) с глубокой комой
- 200 При прекращении приема наркотиков у больных развивается:
- а) синдром «рикошета»
 - б) абстинентный синдром
 - в) психоз
 - г) судорожный припадок
- 201 Афазия – это:
- а) нарушение тактильной чувствительности
 - б) полная потеря памяти
 - в) потеря речи
 - г) бессонница
- 202 Менингит - воспаление:
- а) мягкой мозговой оболочки
 - б) твердой мозговой оболочки
 - в) паутинной оболочки
- 203 Важными проблемами сестринского процесса по отношению к больным с рассеянным склерозом в амбулаторных условиях являются все перечисленные, кроме:
- а) профилактика обострений путем предупреждения у больных инфекции, интоксикации, переутомления
 - б) регулярный охват 2 раза в год противорецидивным лечением
 - в) профилактика инфекционных осложнений, пролежней
- 204 Агнозия - это:
- а) нарушение процессов, узнавания предметов: вещей, животных, людей
 - б) утрата речевых способностей как средства выражения мыслей
 - в) нарушение памяти
 - г) потеря двигательной функции руки

- 205 К очаговым неврологическим симптомам не относится:
- а) угнетение сознания;
 - б) анизокория;
 - в) диссоциация сухожильных рефлексов;
 - г) гемипарезы.
- 206 Спинной мозг лежит в поясничном канале и у взрослых оканчивается коническим заострением, на уровне:
- а) V поясничного позвонка
 - б) II поясничного позвонка
 - в) XII грудного позвонка
 - г) VII поясничного позвонка
- 207 При заболеваниях периферической нервной системы частота осмотров больных невропатологом:
- а) не реже 1 раза в год
 - б) не реже 1 раза в 3 месяца
 - в) не реже 2 раз в год
- 208 Угнетение дыхательного центра развивается у больных:
- а) с глубокой комой
 - б) с поверхностной комой
 - в) в сопоре
- 209 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» чрезвычайно эпидемиологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 210 Афазия – это:
- а) нарушение процесса распознавания и понимания
 - б) игнорирование половины пространства
 - в) расстройство грамматической и лексической структуры речи или нарушение её понимания
 - г) нарушение памяти
- 211 Ригидность затылочных мышц развивается у больного при:
- а) травмах спинного мозга
 - б) шейном остеохондрозе
 - в) геморрагическом инсульте
 - г) ишемическом инсульте
- 212 Профилактика повторного ишемического инсульта включает в себя:
- а) лечение гипертонической болезни
 - б) лечение нарушений ритма сердца
 - в) хирургическое удаление атеросклеротических бляшек
 - г) применение ноотропных лекарственных препаратов
 - д) увеличение физических нагрузок
 - е) уменьшение стрессовых ситуаций
- 213 Невропатия - это:
- а) изолированное поражение отдельных нервных стволов
 - б) изолированное поражение спинного мозга
 - в) изолированное поражение сплетений

- 214 К очаговым неврологическим симптомам не относится:
- а) угнетение сознания;
 - б) анизокория;
 - в) диссоциация сухожильных рефлексов;
 - г) гемипарезы
- 215 Больному с артериальной гипертонией в диете ограничивают всё перечисленное, кроме:
- а) поваренную соль и жидкость
 - б) жиры животного происхождения
 - в) соли калия
 - г) легкоусвояемые углеводы
- 216 Арахноидит - воспаление:
- а) паутинной оболочки
 - б) твердой мозговой оболочки
 - в) мягкой мозговой оболочки
- 217 Периферический паралич не проявляется:
- а) нарушением произвольных движений при сохранении непроизвольных;
 - б) снижением мышечного тонуса;
 - в) арефлексией;
 - г) фибриллярным подергиванием мышц
- 218 В первый год после нейрохирургической операции и черепно-мозговых травм частота осмотров больного невропатологом:
- а) не реже 1 раза в год
 - б) не реже 1 раза в 3 месяца
 - в) не реже 2 раз в год
- 219 Наркотические препараты:
- а) подлежат предметно - количественному учёту
 - б) подлежат только количественному учёту
 - в) не подлежат учёту
- 220 Конфликтогены – это:
- а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту
 - б) проявления конфликта
 - в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности
 - г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта
- 221 При оказании первой помощи пациенту с корешковым синдромом его следует:
- а) уложить на живот, на щит
 - б) уложить на спину, на щит
 - в) уложить на живот, на мягкое
 - г) уложить на спину, на мягкое
- 222 Ведущим признаком болезни Меньера является:
- а) возникающий среди полного здоровья острый приступ резчайшего головокружения
 - б) стойкое прогрессирующее снижение слуха
 - в) прогрессирующий шум в ушах
- 223 Поражение мозжечка не проявляется:
- а) нарушением равновесия;
 - б) горизонтальным нистагмом;
 - в) «скандированной» речью;
 - г) анизокорией.

- 224 Анизокория – это:
- а) неравенство величины зрачков
 - б) оба зрачка широкие
 - в) отсутствие зрачков
 - г) оба зрачка узкие
- 225 При заболеваниях центральной нервной системы воспалительного характера частота осмотров больного невропатологом:
- а) не реже 1 раза в год
 - б) не реже 1 раза в 3 месяца
 - в) не реже 2 раз в год
- 226 Противопоказаниями к проведению люмбальной пункции являются:
- а) окклюзионная форма гидроцефалии
 - б) подозрение на субарахноидальное кровоизлияние
 - в) патология спинного мозга и позвоночного канала с нарушениями ликвороциркуляции
 - г) подозрение на менингоэнцефалит
- 227 Психоневрологический синдром в виде изменения личности различных неврологических симптомов является:
- а) ранним симптомом ВИЧ-инфекции
 - б) поздним симптомом СПИД
- 228 Основной признак коматозного состояния:
- а) угнетение гемодинамики
 - б) угнетение дыхания
 - в) угнетение центральной нервной системы
 - г) угнетение периферической нервной системы
- 229 Афазия - это:
- а) утрата речевых способностей как средства выражения мыслей
 - б) нарушение мыслей, процессов узнавания предметов, вещей, животных, людей
 - в) нарушение понимания устной речи
 - г) нарушение письма
- 230 Ортостатический коллапс в виде резкого перепада давления развивается чаще:
- а) в горизонтальном положении
 - б) в положении сидя
 - в) при длительном стоянии
 - г) при переходе из горизонтального положения в вертикальное
- 231 Булимия - это:
- а) повышенное чувство голода при сниженной насыщаемости
 - б) повышенная жажда при отсутствии чувства утоления
 - в) отказ от еды
- 232 Больному в коматозном состоянии с угрозой рвоты рекомендовано положение:
- а) на спине
 - б) на животе, голова повернута на бок
 - в) на боку, голова фиксирована
 - г) произвольное
- 233 Глубину коматозного состояния характеризует:
- а) выраженность гемодинамических расстройств
 - б) степень угнетения сознания
 - в) степень угнетения рефлексов

- 234 Первостепенными проблемами в сестринском процессе в остром периоде миелита является:
- а) профилактика инфекционных осложнений
 - б) профилактика аспирационно-обтурационных нарушений дыхания
 - в) контроль параметров гемодинамики, дыхания
- 235 Клинике геморрагического инсульта соответствует:
- а) преобладание очаговой симптоматики над общемозговой
 - б) внезапное начало, часто на фоне высокого АД
 - в) часто симптомы раздражения мозговых оболочек
 - г) повышение температуры
- 236 Ишемический инсульт, вызванный эмболией сосудов головного мозга, не проявляется:
- а) острым развитием очаговых симптомов одновременно с потерей сознания;
 - б) соответствием очаговых симптомов определенному сосудистому бассейну;
 - в) менингеальными симптомами;
 - г) нормальным или пониженным артериальным давлением;
- 237 Ретроградная амнезия:
- а) утрата памяти на период времени, предшествовавший потере сознания
 - б) утрата памяти на период спутанности при выходе из комы
- 238 При анизокории выявляется одностороннее:
- а) расширение или сужение зрачка;
 - б) снижение или повышение реакции зрачка на свет;
 - в) снижение корнеального рефлекса;
 - г) опущение века
- 239 Аспирационно-обтурационные нарушения дыхания могут развиваться при:
- а) поверхностной коме
 - б) глубокой коме
 - в) коме любой глубины
- 240 Бредовые идеи – это когда больной:
- а) понимает ненужность мыслей
 - б) хочет избавиться от мыслей
 - в) ищет помощи
 - г) высказывает мысли, к которым нет критики
- 241 Важными проблемами сестринского процесса в остром периоде травмы позвоночника и спинного мозга являются все перечисленные, кроме:
- а) правильная транспортировка больного на щите с соблюдением строгого горизонтального положения
 - б) исключение сгибательных, боковых вращательных движений в позвоночнике
 - в) профилактика инфекций со стороны мочевыводящих путей
- 242 Моторная афазия - это:
- а) нарушение устной речи
 - б) нарушение понимания устной речи
- 243 К симптомам раздражения мягкой мозговой оболочки не относится:
- а) симптом Керн ига
 - б) симптом Брудзинского
 - в) симптом Ситковского

- 244 Ведущим признаком болезни Меньера является:
- а) возникающий среди полного здоровья острый приступ резчайшего головокружения
 - б) стойкое прогрессирующее снижение слуха
 - в) прогрессирующий шум в ушах
- 245 Тяжесть коматозного состояния больного зависит:
- а) от причины комы
 - б) от глубины комы
- 246 Атаксия это:
- а) нарушение координации движения
 - б) утрата силы конечностей
 - в) утрата возможности письма
- 247 Спинномозговая жидкость находится в:
- а) центральном канале спинного мозга
 - б) субарахноидальном пространстве
 - в) эпидуральном пространстве
 - г) субдуральном пространстве
- 248 Антероградная амнезия:
- а) утрата памяти на период времени, предшествовавший потере сознания
 - б) утрата памяти на период спутанности при выходе из комы
- 249 При планировании сестринского ухода больным с синдромом Паркинсона приоритетной проблемой пациента является:
- а) нарастание двигательного дефекта..
 - б) отказ от приёма пищи
 - в) лихорадка
- 250 "Танцующая" походка характерна для:
- а) хорей
 - б) поражения мозжечка
 - в) спастического парапареза нижних конечностей
 - г) поражение малоберцового нерва
- 251 Препаратом, применяемым для купирования судорожного статуса на догоспитальном этапе не является:
- а) диазепам;
 - б) эуфиллин;
 - в) оксипутират натрия;
 - г) гексенал.
- 252 Булимия - это:
- а) повышенное чувство голода при сниженной насыщаемости
 - б) повышенная жажда при отсутствии чувства утоления
 - в) отказ от еды
- 253 Больные в коматозном состоянии транспортируются:
- а) на спине
 - б) на боку
 - в) на животе
- 254 Степенью угнетения сознания не является
- а) оглушение;
 - б) сопор;
 - в) кома;
 - г) делирий;

- 255 Основной целью сестринского процесса в острейшем периоде менингита является:
- а) своевременное улавливание симптомов отека мозга (нарушение сознания, судороги, расширение зрачков)
 - б) профилактика пролежней
 - в) контроль функции ЖКТ
- 256 Состояние помраченного сознания с ложной ориентировкой в месте и времени:
- а) амнезия
 - б) галлюцинация
 - в) делирий
 - г) кома
- 257 При невралгии 2-ой ветви тройничного нерва боль локализуется:
- а) в верхней челюсти, верхних зубах
 - б) во лбу, носу, глазу
 - в) в нижней челюсти, нижних зубах
 - г) одновременно во всех перечисленных областях
- 258 К клиническим проявлениям нейропатии лучевого нерва относятся:
- а) невозможность сжать руку в кулак, невозможность поднять руку вверх
 - б) невозможность разогнуть пальцы руки, невозможность похлопать в ладони
 - в) невозможность закрыть глаз на больной стороне, сильнейшие боли в лице
 - г) боль, отек, гематома, крепитация
- 259 Для перелома основания черепа не характерно:
- а) кровоизлияние в конъюнктиву и окологлазную клетчатку
 - б) потеря сознания в момент получения травмы
 - в) редкий напряженный пульс
 - г) дыхание Чейн-Стокса
 - д) парезы и параличи, разеивающиеся сразу же после получения травмы
- 260 Причины развития геморрагического инсульта:
- а) гипертензивный криз
 - б) разрыв аневризмы
 - в) тромбоэмболия
 - г) жировая эмболия сосудов мозга
 - д) передозировка мочегонных препаратов
- 261 Положение больного при люмбальной пункции:
- а) больной ложится на бок, ноги сгибает в коленных суставах и подгибает к животу, голову наклоняет вперед
 - б) больной ложится на бок, ноги сгибает в коленных суставах и подтягивает к животу, голова откинута назад
- 262 Условия постановки лекарственной клизмы:
- а) объем 50–100 мл, температура 20–24°C
 - б) объем 50–100 мл, температура 38–40°C
 - в) объем 100–150 мл, температура 18–22°C
 - г) объем 1–1,5 л, температура 18–22°C
- 263 Триада признаков болезни Паркинсона и паркинсонизма исключает:
- а) параплегия
 - б) акинез
 - в) ригидность
 - г) тремор

- 264 Положение больного при люмбальной пункции:
- а) больной ложится на бок, ноги сгибает в коленных суставах и подгибает к животу , голову наклоняет вперед
 - б) больной ложится на бок, ноги сгибает в коленных суставах и подтягивает к животу, голова откинута назад
- 265 "Петушиная" походка характерна для:
- а) спастического парапареза нижних конечностей
 - б) поражение малоберцового нерва
 - в) хорей
 - г) поражения мозжечка
- 266 При возникновении укола необеззараженным инструментом во время проведения парентеральных процедур для оказания первой помощи из «Укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций» используются:
- а) 70% этиловый спирт,
 - б) ножницы;
 - в) стерильная марлевая салфетка;
 - г) 70% этиловый спирт, 5% спиртовой раствор йода, лейкопластырь
- 267 Сестринская помощь пациенту с большим эпилептическим приступом:
- а) фиксировать голову
 - б) голову не фиксировать, подложить под голову подушку
 - в) фиксировать туловище и конечности
 - г) разжать руками челюсти пациента
- 268 Деменция – это:
- а) легкая степень умственной отсталости
 - б) тоскливое, «угнетенное» настроение
 - в) слабоумие, приобретенное в результате патологии центральной нервной системы
 - г) врожденное слабоумие при ДЦП
- 269 Для мигрени характерны:
- а) головная боль в одном и том же месте, чаще односторонняя
 - б) диспепсические расстройства во время приступа: тошнота, рвота
 - в) головная боль уменьшается после применения холода к голове
 - г) заболевание имеет наследственную предрасположенность
 - д) головная боль чаще по утрам, а в поздние стадии постоянная
 - е) нарушение памяти, ориентации
- 270 Расстройством высших корковых функций является:
- а) анизокория;
 - б) фазия;
 - в) нистагм;
 - г) центральный паралич
- 271 Компьютерная томография при ишемическом инсульте выявляет в головном мозге:
- а) очаг повышенной плотности
 - б) очаг пониженной плотности
 - в) отсутствие изменений плотности мозговой ткани
 - г) множественные очаги повышенной или пониженной плотности

- 272 Положение в постели пациента с гипертензивным кризом:
- а) возвышенный ножной конец постели
 - б) возвышенный головной конец постели
 - в) строго горизонтально
 - г) не требует специального положения
- 273 Позвоночные артерии отходят:
- а) от общих сонных артерий
 - б) от подключичных артерий
- 274 Центральный паралич не проявляется:
- а) нарушением всех видов движений;
 - б) спастическим повышением мышечного тонуса;
 - в) появлением патологических рефлексов;
 - г) появлением защитных движений.
- 275 Для клинической картины дисциркуляторной энцефалопатии характерны:
- а) менингеальные симптомы
 - б) рассеянные очаговые симптомы
 - в) интеллектуально-мнестические нарушения
 - г) зрительные нарушения
 - д) диспепсические расстройства
- 276 Менингеальный синдром отмечается при:
- а) менингитах
 - б) геморрагическом инсульте
 - в) ишемическом инсульте
 - г) травматическом повреждении спинного мозга
 - д) дорсопатии позвоночника
- 277 Переходящие приступы головокружения в виде ощущения нарушенной ориентации тела в пространстве - наиболее частый симптом:
- а) недостаточности кровоснабжения из позвоночной артерии стволовой части мозга
 - б) затруднения венозного оттока крови
- 278 При наследственных и дегенеративных заболеваниях нервной системы частота осмотров больного невропатологом:
- а) не реже 1 раза в год
 - б) не реже 1 раза в 3 месяца
 - в) не реже 2 раз в год
- 279 Аневризма это:
- а) ограниченное или диффузное расширение просвета сосуда или выпячивания его стенки
 - б) нарушения связанные с функциональными расстройствами кровеносных сосудов
 - в) сужение просвета сосудов
- 280 Основной патогенетический препарат, применяемый при лечении миастении:
- а) инъекции прозерина 0,05% раствора
 - б) калимин в таблетках
- 281 К методам исследования головного мозга относятся:
- а) эхоэнцефалография, компьютерная томография
 - б) лапароскопия, торакоскопия
 - в) торакоцентез, ирригоскопия
 - г) колоноскопия, ректороманоскопия

- 282 Геморрагический инсульт развивается вследствие:
- а) спазма сосудов головного мозга
 - б) тромбоза мозговых артерий
 - в) отека головного мозга
 - г) разрыва мозговой артерии на фоне гипертензивного криза
- 283 Ортостатический коллапс в виде резкого перепада давления развивается чаще:
- а) в горизонтальном положении
 - б) при длительном стоянии
 - в) при переходе из горизонтального положения в вертикальное
- 284 Внутренние сонные артерии отходят:
- а) от подключичных артерий
 - б) от общих сонных артерий
- 285 Для истерического припадка характерно:
- а) развивается в местах, где есть зрители
 - б) сознание не выключается
 - в) не бывает судорог
 - г) больной внезапно падает, где попало
 - д) отмечаются слуховые и зрительные галлюцинации
- 286 Понятие сопор включает в себя:
- а) полную неразбудимость больного
 - б) координированный двигательный ответ на болевые раздражители
 - в) реакцию на звуковые раздражители
 - г) отсутствие реакции на звуковые раздражители
 - д) ригидность затылочных мышц
- 287 Для купирования острых невротических расстройств на догоспитальном этапе применяются:
- а) транквилизаторы;
 - б) нейролептики;
 - в) ноотропы;
 - г) психостимуляторы
- 288 Невротическое расстройство характеризуется:
- а) сохранением чувства реальности;
 - б) развитием бреда;
 - в) наличием истинных галлюцинаций;
 - г) наличием псевдогаллюцинаций
- 289 Характерные признаки невротозов:
- а) состояние функциональные (обратимые)
 - б) состояния органические (необратимые)
 - в) больные критически оценивают свое состояние
 - г) больные критически не оценивают свое состояние
 - д) развиваются в местах, где есть зрители
- 290 Постоянным признаком повреждения спинного мозга является:
- а) травматический шок
 - б) нарушение функций тазовых органов
 - в) нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы
 - г) нарушение дыхания

- 291 Для межреберной невралгии характерно:
- а) боли по ходу одного или нескольких межреберий
 - б) усиление боли при глубоком вдохе, движениях, поворотах туловища, пальпации межреберий
 - в) уменьшение боли после приема нитроглицерина
 - г) характер боли пульсирующий
 - д) ригидность затылочных мышц
 - е) парезы периферических нервов
- 292 При оказании помощи больному с черепно-мозговой травмой показан:
- а) гидрокортизон
 - б) только преднизолон
 - в) дексаметазон
- 293 Ассиметрия глазных щелей, анизокория, симптом «паруса» относятся:
- а) к симптомам очагового поражения мозга
 - б) к общемозговой симптоматике
- 294 Для алкогольного делирия характерно:
- а) развивается на фоне алкогольной интоксикации
 - б) развивается на фоне абстинентного синдрома
 - в) отмечаются слуховые и зрительные галлюцинации
 - г) опасен для себя и окружающих
 - д) развивается в местах, где есть зрители
 - е) больной внезапно падает, где попало
- 295 Гематоэнцефалический барьер является препятствием:
- а) в проникновении многих лекарственных препаратов
 - б) для проникновения микроорганизмов
 - в) для проникновения глюкозы и аминокислот
 - г) для проникновения кислорода
 - д) для проникновения тепла из вне
- 296 Первостепенными проблемами в сестринском процессе в восстановительном периоде миелита являются все перечисленные, кроме:
- а) устранение задержки мочеиспускания
 - б) профилактика пролежней. инфекционных осложнений мочевого пузыря
 - в) восстановление двигательных функций
- 297 При диагностической люмбальной пункции извлекают:
- а) 10 мл жидкости
 - б) 5 мл жидкости
- 298 Смешанные нервы имеют в своем составе волокна:
- а) чувствительные
 - б) двигательные
 - в) вегетативные
 - г) аналитические
 - д) натуральные
 - е) мышечные
- 299 Признаком синдрома вклинения ствола мозга не является :
- а) прогрессирующее угнетение сознания;
 - б) узкие зрачки с сохраненной реакцией на свет;
 - в) судорожный синдром;
 - г) тенденция к брадикардии.

- 300 Применение холода (пузыря со льдом) к голове показано при:
- а) ишемических инсультах, закрытых черепно-мозговых травмах
 - б) опухолях мозга, внутриутробных повреждениях головного мозга
 - в) родовых травмах, менингитах, энцефалитах
 - г) геморрагических инсультах