

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ  
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

**(для медицинских сестёр оториноларингологических отделений и кабинетов,  
в т.ч. детских, прошедших обучение  
по циклам 15.30 «Сестринское дело в оториноларингологии»,  
профессиональной переподготовки по специальности  
«Сестринское дело»)**

- 1 Для обострения хронического гнойного среднего отита характерны признаки:
  - а) отсутствие гноетечения из уха
  - б) наличие стойкой перфорации барабанной перепонки
  - в) снижение слуха
  - г) усиление гноетечения из уха
  - д) появление шума в ушах
- 2 Признаки острого фронтита:
  - а) боль, локализующаяся в области лба
  - б) гнойные выделения из носа
  - в) болезненность при пальпации верхнечелюстных пазух
  - г) снижение пневматизации на R-грамме лобных пазух
  - д) слизистые выделения из носа
- 3 При развитии отогенного менингита общее состояние больного:
  - а) средней тяжести
  - б) очень тяжелое
  - в) удовлетворительное
  - г) не вызывает опасения
- 4 Какая из ангин сопровождается затруднением носового дыхания:
  - а) Ангина язычной миндалины
  - б) Гортанной ангина
  - в) Ангина носоглоточной миндалины
  - г) Фолликулярная ангина
- 5 Отосклероз — это:
  - а) аномалия развития уха
  - б) исход воспалительного заболевания уха
  - в) самостоятельное заболевание
  - г) внутричерепное осложнение
- 6 Группы антибиотиков с ототоксическим эффектом:
  - а) аминогликозиды
  - б) макролиды
  - в) пенициллины
  - г) цефалоспорины
- 7 Симптомы ангины:
  - а) боль при глотании с обеих сторон
  - б) высокая температура и озноб
  - в) налеты на миндалинах
  - г) невозможность глотать пищу
  - д) ларингоспазм

- 8 Решающим признаком болезни Меньера является наличие:
- а) приступов головокружения
  - б) приступов тошноты
  - в) приступов светобоязни
  - г) заложенности носа
- 9 Пищеводный голос -это:
- а) Симптом нарушения голоса
  - б) Навык человека, перенёвшего удаление гортани
  - в) Вредная привычка
  - г) Искусственная голосообразование
- 10 К каким осложнениям может приводить фурункул носа:
- а) дерматит кожи носа
  - б) общий фурункулез
  - в) внутричерепным осложнениям.
- 11 Заболеваемость хроническим ларингитом чаще
- а) у лиц голосо-речевых профессий
  - б) у лиц женского пола
  - в) у лиц мужского пола
  - г) не зависит от пола
- 12 К исследованиям слуховой функции не относится:
- а) импедансометрия
  - б) аудиометрия
  - в) отоакустическая эмиссия
  - г) вестибулометрия
- 13 Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием...
- а) личность;
  - б) индивид;
  - в) человек;
  - г) индивидуальность;
  - д) субъект
- 14 Способность понимания психологических состояний других людей и сопереживание им, умение посмотреть на ситуацию глазами другого - это качество личности
- а) доброжелательность
  - б) открытость
  - в) конфронтация
  - г) эмпатия
  - д) аутентичность
- 15 Рецидивы при оперативном лечении полипов:
- а) часто
  - б) редко
  - в) не бывают
  - г) бывают при отсутствии противорецидивного лечения в послеоперационном периоде

- 16 Какие антибиотики используют при лечении гнойных заболеваний гортани чаще всего:
- а) защищенные полусинтетические пенициллины
  - б) препараты левофлоксацина
  - в) меропенемы
  - г) биопарокс
- 17 Дифтерия лечится:
- а) антибиотиками пенициллинового ряда
  - б) антибиотиками цефалоспоринового ряда
  - в) макролидами
  - г) не лечится антибиотиками
- 18 К осложнениям попадания инородных тел в гортань относится:
- а) аносмия
  - б) тубоотит
  - в) носовое кровотечение
  - г) пневмония
- 19 Остов гортани составляет:
- а) Кости
  - б) Хрящи
  - в) Мышцы
  - г) Связки
- 20 При дифтерии налеты снимаются:
- а) с трудом, с образованием язвы
  - б) легко
  - в) с трудом, с образованием эрозии
  - г) налеты плотно фиксированы на поверхности
- 21 Иннервация гортани осуществляется ветвями:
- а) Языкоглоточного нерва
  - б) Блуждающего нерва
  - в) Кохлеарного нерва
  - г) Варианты А, Б
- 22 Лакунарная и фолликулярная ангины относятся к заболеваниям:
- а) инфекционным
  - б) оториноларингологическим
  - в) терапевтическим
  - г) хирургическим
- 23 Симптомы сенсоневральной тугоухости:
- а) снижение слуха
  - б) снижение разборчивости речи
  - в) наличие костно-воздушного разрыва на аудиограмме
  - г) шум в ухе
  - д) боль в ухе
- 24 Пункция верхнечелюстной пазухи показано:
- а) В случае осложнения
  - б) Во всех случаях
  - в) При затяжном течении
  - г) При рецидиве заболевания

- 25 Метод отоакустической эмиссии используется для диагностики:
- а) в любом возрасте
  - б) в пожилом возрасте
  - в) в раннем детском возрасте
  - г) в зрелом возрасте
- 26 Клинические проявления полипов носа зависит от:
- а) размеров поражения
  - б) от гистологического строения полипов
  - в) от сопутствующих заболеваний
  - г) ни от чего не зависит
- 27 Стремечко состоит из:
- а) головки
  - б) двух ножек
  - в) основания
  - г) короткого отростка
  - д) седла
- 28 С чем сообщаются придаточные пазухи носа:
- а) с глазницей
  - б) друг с другом
  - в) с полостью носа
  - г) ни с чем не сообщаются
- 29 Характерные симптомы для перфорированной стадии острого среднего отита:
- а) гноетечение из уха
  - б) понижение слуха
  - в) повышенная температура
  - г) усиление боли в ухе
  - д) головокружение
- 30 Первая помощь при ложном крупе:
- а) сделать щелочную ингаляцию
  - б) обеспечить приток свежего воздуха
  - в) сделать горячую ножную ванну
  - г) применить холодный компресс на шею
  - д) поставить горчичник на затылок
- 31 Основным симптомом ларингоспазма является:
- а) дыхание Биота
  - б) насморк
  - в) стридорозное дыхание
  - г) обильная мокрота
- 32 Цель санитарного просвещения:
- а) формирование высокой санитарной культуры, сознательного гигиенического поведения граждан
  - б) нетерпимое и критичное отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к условиям окружающей среды, наносящим ущерб здоровью
  - в) правильное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленное на выздоровление
  - г) овладение знаниями, необходимыми для соблюдения правил гигиенического поведения

- 33 При обмороке АД у больных:
- а) резко снижается
  - б) снижается постепенно в течении нескольких часов
  - в) не изменяется
  - г) резко повышается на несколько минут
- 34 Фурункул носа может дать осложнения:
- а) тромбоз пещеристого синуса
  - б) сепсис
  - в) гайморит
  - г) фронтит
  - д) туботит
- 35 Кратковременная, бурно протекающая, чрезвычайно интенсивная эмоциональная реакция:
- а) фрустрация
  - б) аффект
  - в) настроение
  - г) депрессия
  - д) стресс
- 36 Развитию отитов у детей способствует:
- а) особенности анатомии детского возраста
  - б) снижение резистентности организма
  - в) неадекватное лечение
- 37 Носовое кровотечение могут вызвать:
- а) повышение АД
  - б) болезни крови
  - в) перенесенная вирусная инфекция
  - г) хронические заболевания желудочно-кишечного тракта
  - д) варикозная болезнь
- 38 Для лечения наружных отитов используется:
- а) местная терапия
  - б) системная антибиотикотерапия
  - в) оперативная санация очага
  - г) дезинтоксикационная терапия
- 39 С использованием какого прибора проводят тимпанометрию:
- а) аудиометр
  - б) импедансометр
  - в) набор камертонов
  - г) ушной манометр
- 40 В каких случаях гортаноглотку осматривают с использованием местной анестезии:
- а) при неадекватном поведении больного
  - б) при повышенном рвотном рефлексе
  - в) при повышенном болевом рефлексе
  - г) при отеке гортаноглотки
- 41 Кохлеарная имплантация — это:
- а) разновидность слухопротезирования
  - б) метод лечения тугоухости
  - в) система мероприятий, направленных на восстановление слуха

- 42 Симптомы лабиринтита — это:
- а) заложенность в ухе
  - б) гноетечение из уха
  - в) снижение слуха
  - г) головокружение
- 43 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие пульса на:
- а) локтевой артерии
  - б) лучевой артерии
  - в) сонной артерии
  - г) бедренной артерии
- 44 В России трансплантация может проводится без согласия донора, если донор:
- а) особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение
  - б) гражданин страны, находящейся в состоянии войны с Россией
  - в) психически неполноценный
  - г) донор — умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов
- 45 Ротоглотка состоит из следующих анатомических образований:
- а) небная занавеска
  - б) небные миндалины
  - в) надгортанник
  - г) язычок
  - д) гортань
- 46 Пороговым звуком называется звук:
- а) достаточный по громкости, чтобы услышать
  - б) вызывающий неприятные ощущения
  - в) вызывающий комфортные ощущения
  - г) вызывающий болевые ощущения
- 47 Первая помощь при инородном теле глотки на догоспитальном этапе:
- а) в момент кашля произвести короткие удары в межлопаточное пространство
  - б) заесть кусочком хлеба
  - в) попытаться достать инородное тело
  - г) прополоскать горло
- 48 Острые паратонзиллиты являются осложнениями:
- а) фарингита
  - б) ангины
  - в) туберкулеза глотки
  - г) перихондрита гортани
- 49 Для болезни Менъера характерно:
- а) длительное постепенное развитие
  - б) приступообразное течение
  - в) спонтанное выздоровление
- 50 Певческие узелки являются разновидностью:
- а) хронического субатрофического фарингита
  - б) хронического гипертрофического ларингита
  - в) острого ларингита
  - г) перихондрита гортани

- 51 Болезнь Меньера —это:
- а) воспалительное заболевание уха
  - б) разновидность лабиринтопатии
  - в) осложнение отитов
  - г) внутричерепное осложнение
- 52 К симптомам инородного тела гортани относятся:
- а) дисфагия
  - б) дисфония
  - в) кашель
  - г) саливация
  - д) стеноз
- 53 Причиной парезов голосовых складок чаще всего являются:
- а) Оперативные вмешательства
  - б) Травмы, Ушибы
  - в) Нарушение кровообращения центрального характера
  - г) Голосовые перегрузки
- 54 Аллергический ринит проявляется:
- а) Гноетечение из носа
  - б) Боли в полости носа
  - в) Заложенность носа
  - г) Кашель
- 55 Медицинские работники имеют право на:
- а) оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
  - б) совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях;
  - в) соблюдение врачебной тайны;
  - г) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя.
- 56 К носовым кровотечениям может приводить:
- а) заболевания кроветворных органов
  - б) гипертоническая болезнь
  - в) заболевания печени
  - г) все вышеперечисленные заболевания
- 57 Возбудителем наружного отита чаще всего является:
- а) Бактерии
  - б) Вирусы
  - в) Грибы
  - г) Протозои
- 58 Для продувания слуховых труб по Политцеру понадобится:
- а) шпатель
  - б) ушная воронка
  - в) резиновая груша с оливой
  - г) шприц
- 59 Заболевание, при котором нарушается подвижность стремечка:
- а) болезнь Меньера
  - б) острый отит
  - в) хронический средний отит
  - г) отосклероз

- 60 На консультацию к фониатру направляется пациент по поводу:
- а) снижения слуха
  - б) изменений голоса
  - в) нарушения вестибулярного аппарата
  - г) нарушения акта глотания
- 61 Внутричерепные осложнения синуситов вызываются:
- а) вирулентностью возбудителя
  - б) особенностью анатомии пазух
  - в) отсутствием лечения
  - г) аллергизацией слизистых
- 62 Больному, перенесшему паратозиллярный абсцесс, показана операция:
- а) тонзиллэктомия
  - б) коникотомия
  - в) аденомэктомия
  - г) ларингоэктомия
- 63 Наружный диффузный отит лечится в основном:
- а) Местная терапия
  - б) Системная антибиотика терапия
  - в) Хирургическим путём
  - г) Физиотерапия
- 64 В состав системы среднего уха входит:
- а) барабанная полость
  - б) сосцевидный отросток
  - в) слуховая труба
  - г) сигмовидный синус
  - д) пирамида височной кости
- 65 Ведущий фактор, приводящий к развитию хронических заболеваний гортани:
- а) Экологические факторы
  - б) Курение
  - в) Воспалительные заболевания пазух носа
  - г) Наследственность
- 66 Сенсоневральная тугоухость — это:
- а) патология звукопроводящего аппарата уха
  - б) нарушение цепи слуховых косточек
  - в) нарушение звуковоспринимающего аппарата уха
  - г) нарушение в системе овального и круглого окна
- 67 Седловидный нос является следствием:
- а) туберкулеза
  - б) злоупотребления кокаином
  - в) сифилиса
  - г) ринофимы
  - д) травмы носа
- 68 Абсцессы гортаноглотки могут распространяться:
- а) в мозг
  - б) в придаточные пазухи
  - в) в средостение
  - г) в пищевод



- 69 Парез лицевого нерва при остром среднем отите:
- а) возможен
  - б) не возможен
  - в) возникает только после инструментального вмешательства
- 70 Абсцессы мозга и мозжечка чаще:
- а) самостоятельные заболевания
  - б) осложнения воспалительных заболеваний уха
  - в) последствия вирусных заболеваний уха
- 71 Инородные тела носа удаляются:
- а) шприцем Жане
  - б) пинцетом
  - в) набором крючков
  - г) иглой Куликовского
- 72 Лимфоаденоидное кольцо глотки выполняет функцию:
- а) глотания
  - б) защитную
  - в) дыхательную
  - г) разделительную
- 73 Выберите устные средства санитарного просвещения:
- а) беседа, лекция
  - б) фотография, плакат
  - в) брошюра, журнал
  - г) бюллетень, буклет
- 74 Возбудителем инфекционного мононуклеоза является:
- а) стафилококк
  - б) стрептококк
  - в) вирус Эпштейна-Барра
  - г) веретенообразная палочка
- 75 Основными физиологическими функциями глотки являются:
- а) речеобразовательная
  - б) дыхательная
  - в) защитная
  - г) адаптационная
  - д) пищеварительная
- 76 Отосклероз – это заболевание, связанное с:
- а) гнойным процессом в ухе
  - б) катаральным процессом в ухе
  - в) дистрофическим процессом
  - г) нарушением иннервации
- 77 Хондроперихондрит гортани развивается как:
- а) самостоятельное заболевание
  - б) результат травмы, ушиба
  - в) функциональное заболевание
  - г) воспалительное заболевание
- 78 При оперативном лечении доброкачественных опухолей гортани используется доступ:
- а) через ларингофиссуру
  - б) эндоскопический подход
  - в) подход под местной анестезией
  - г) операция Крайля

- 79 Носовые полипы чаще всего растут из клеток:
- а) решетчатого лабиринта
  - б) обонятельных луковиц
  - в) бокаловидных желез
  - г) соединительной ткани
- 80 Длина свободных концов ниток тампона, предназначенного для задней тампонады носа (в сантиметрах):
- а) 70-100
  - б) 60-80
  - в) 40-50
  - г) 30-40
- 81 Размеры тампона для задней тампонады носа определяются по:
- а) размеру кулака больного
  - б) совмещенным ногтевым фалангам больших пальцев рук больного
  - в) совмещенным фалангам указательного и среднего пальцев рук больного
  - г) длине спинки носа
- 82 Обязательное медицинское страхование - это:
- а) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи;
  - б) страховой риск, связанный с возникновением страхового случая;
  - в) обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи;
  - г) обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, целевым назначением которых является обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения;
- 83 Первая помощь при травме барабанной перепонки:
- а) закапать раствор 3% перекиси водорода
  - б) ввести в слуховой проход стерильный ватный тампон
  - в) промыть ухо
  - г) закапать раствор борной кислоты
- 84 Для голосообразования голосовая щель должна быть:
- а) открыта
  - б) закрыта по всей длине
  - в) закрыта в переднем и среднем отделе
  - г) закрыта в задней трети
- 85 Отёк тканей шеи и увеличение шейных лимфоузлов является симптомом:
- а) Ангины Симановского-Венсана
  - б) Агранулоцитарной ангины
  - в) Дифтерии
  - г) Герпетической ангины
  - д) Всё вышеперечисленное верно
- 86 Ложный круп развивается чаще всего:
- а) Постепенно в течение дня
  - б) Неожиданно ночью
  - в) Независимо от времени суток

- 87 При ударе подбородком часто происходит перелом:
- а) верхней челюсти
  - б) нижней челюсти
  - в) верхней стенки слухового прохода
  - г) передней стенки слухового прохода
- 88 Длительность заболевания острым синуситом у взрослых составляют:
- а) 2-3 Недели
  - б) 1 месяц
  - в) до 12 недель
  - г) свыше 12 недель
- 89 Какой метод обследования наиболее информативен для диагностики заболеваний гортаноглотки:
- а) Диафаноскопия
  - б) Эндоскопия
  - в) Отоскопия
  - г) Импедансометрия
- 90 Показания к кохlearной имплантации является:
- а) снижение слуха то 20 до 50 Дб
  - б) снижение слуха от 10 до 30 Дб
  - в) односторонняя глухота
  - г) двусторонняя выраженная тугоухость
- 91 Для передней тампонады носа используют:
- а) резиновый жгут
  - б) марлевая турунда длиной 10 см
  - в) марлевая турунда 80-90 см
  - г) гемостатическая губка
- 92 Пресбиакюзис – это патология лиц возраста:
- а) детского
  - б) молодого
  - в) среднего
  - г) пожилого
- 93 Онкопатология наиболее часто локализуется в следующих органах:
- а) Уха
  - б) Нос и его пазухи
  - в) Глотка
  - г) Гортань
- 94 Диагноз невриномы слух нерва ставится на основании:
- а) импедансометрии
  - б) аудиометрии
  - в) вестибулометрии
  - г) КТ, МРТ
- 95 Стеноз гортани вызывается:
- а) Сужением просвета гортани
  - б) Сужением трахеи
  - в) Спазмом бронхов
  - г) Спазмом мышц глотки

- 96 Для современной модели профессиональной морали - биоэтики, основным принципом является:
- а) принцип "соблюдения долга"
  - б) принцип "не навреди"
  - в) принцип приоритета науки
  - г) принцип приоритета прав и уважения достоинства пациента
- 97 Методы исследования слуха:
- а) вестибулометрия
  - б) отоскопия
  - в) аудиометрия
  - г) вращательная проба
- 98 При рецидивирующем папилломатозе гортани показано:
- а) консервативное лечение
  - б) оперативное лечение
  - в) противорецидивное лечение
  - г) физиотерапия
- 99 Острый тубоотит может быть следствием:
- а) ангины
  - б) острого ринита
  - в) аденоидита
  - г) бронхита
  - д) отосклероза
- 100 Больные со стенозом гортани подлежат:
- а) плановой госпитализации в стационар
  - б) амбулаторному лечению
  - в) госпитализации в течение суток
  - г) экстренной госпитализации
- 101 Для купирования приступа стенокардии на доврачебном этапе нитроглицерин можно применять повторно с интервалом:
- а) 20-30 минут
  - б) 10-15 минут
  - в) 5-10 минут
  - г) 5 минут
- 102 Сипота голоса является симптомом:
- а) воспалительного заболевания глотки
  - б) заболевания гортани и трахеи
  - в) заболевания только гортани
  - г) заболевания органов грудной клетки
- 103 Какой путь введения лекарственных препаратов предпочтителен при оказании помощи больным с анафилактическим шоком:
- а) внутривенный
  - б) внутримышечный
  - в) подкожный
  - г) ингаляционный
- 104 Вирус Эпштейна-Барра является возбудителем:
- а) Банальных ангин
  - б) Ангины Симановского-Венсана
  - в) Агранулоцитарной ангины
  - г) Инфекционного мононуклеоза

- 105 Возбудителем ангины Симановского-Венсана является:
- а) стафилококк
  - б) стрептококк
  - в) веретенообразная палочка в симбиозе со спирохетой полости рта
  - г) синегнойная палочка
- 106 Боли в глотке при глотании слюны беспокоят при:
- а) Ангине
  - б) Инфекционном мононуклеозе
  - в) Остром фарингите
  - г) Дифтерии
  - д) Всё вышеперечисленное верно
- 107 Первый приступ болезни Меньера обычно возникает у лиц возраста:
- а) детского
  - б) молодого
  - в) среднего
  - г) пожилого
- 108 Парацентез барабанной перепонки производится:
- а) Без анестезии
  - б) Под наркозом
  - в) Под инфильтрационной анестезией
  - г) Под местной анестезией смазыванием
  - д) Всё вышеперечисленное верно
- 109 Какие заболевания гортани относят к предраковым заболеваниям: .
- а) парез голосовых складок
  - б) фонастения
  - в) гортанная ангина
  - г) пахидермия гортани
- 110 Показанием к наложению окклюзионной повязки является:
- а) ранение груди
  - б) гемоторакс
  - в) закрытые переломы ребер
  - г) ушибы грудной клетки
- 111 Постепенная потеря слуха в обоих ушах, как признак атрофических возрастных изменений, обозначается термином:
- а) пресбиопия
  - б) пресбиакузис
  - в) престариум
  - г) пресбиофрения
- 112 Каким видом ткани является небные и глоточные миндалины:
- а) Соединительной тканью
  - б) Лимфоидной тканью
  - в) Мышечной тканью
  - г) Железистой тканью
- 113 Функции гортани:
- а) голосообразование
  - б) дыхательная
  - в) защитная
  - г) адаптационная
  - д) пищепроводная

- 114 Компресс на сосцевидный отросток ставится со спиртом в концентрации:
- а) 96
  - б) 70
  - в) 45
  - г) 10
- 115 Ингаляцию при вирусном крупе проводят раствором:
- а) с лекарственными травами
  - б) с муколитиками
  - в) с бронхолитиками
  - г) со спазмолитиками
- 116 Паратонзиллярный абсцесс является осложнением:
- а) Гортанной ангины
  - б) Ангины язычной миндалины
  - в) Ангины носоглоточной миндалины
  - г) Банальной ангины небных миндалин
- 117 Аденоиды расположены в:
- а) полости носа
  - б) носоглотке
  - в) ротоглотке
  - г) Евстахиевой трубе
- 118 Сурдология — раздел отоларингологии, который занимается:
- а) всеми заболеваниями, приводящими к нарушениям слуха
  - б) гнойными заболеваниями слухового аппарата
  - в) сенсоневральными нарушениями слухового аппарата
  - г) только слухопротезированием
- 119 К негнойным заболеваниям уха относят:
- а) лабиринтит
  - б) лабиринтопатию
  - в) заболевания слуховой трубы
  - г) петрозит
- 120 Операция на среднем ухе показана при:
- а) мезотимпаните
  - б) эптитимпаните
  - в) мастоидите
  - г) антрите
- 121 При профессиональной тугоухости преимущественно происходит поражение в системе:
- а) наружного уха
  - б) среднего уха
  - в) внутреннего уха
- 122 Аденоотомия - это удаление:
- а) небных миндалин
  - б) носоглоточной миндалины
  - в) язычной миндалины
  - г) полипов носа
- 123 При остром среднем отите больного беспокоят:
- а) заложенность уха, выделение из слухового прохода.
  - б) Сильные стреляющие боли.
  - в) Шум в голове, звон.
  - г) Тупые ноющие боли в ухе

- 124 Симптомы хронического ларингита:
- а) периодически возникающая охриплость
  - б) затруднение дыхания
  - в) быстрая утомляемость голоса
  - г) боль при глотании
- 125 В первом периоде острого среднего отита звук латерализуется (при обследовании камертоном):
- а) в сторону здорового уха
  - б) в сторону больного уха
  - в) остается посередине
- 126 Для проведения обратной ларингоскопии необходимо приготовить:
- а) гортанное зеркало
  - б) ларингоскоп
  - в) шпатель
  - г) носовое зеркало
- 127 Отогенные внутричерепные осложнения чаще возникают при:
- а) адгезивном среднем отите
  - б) отосклерозе
  - в) хроническом гнойном эпитемпаните и остром среднем отите
  - г) хроническом мезотимпаните
- 128 Возможно ли консервативное лечение полипов носа:
- а) невозможно
  - б) возможно при использовании иммуномодуляторов
  - в) возможно при использовании эндоназальных кортикостероидных препаратов
  - г) возможно при использовании препаратов местной противовоспалительной терапии
- 129 Вестибулярный рефлекс на мышцы глаз выражается в проявлении:
- а) амавроза
  - б) нистагма
  - в) птоза
  - г) экзофтальма
- 130 Понятие “милосердие” включает в себя все, кроме:
- а) чувства и способности сострадания
  - б) готовность оказать помощь тому, кто в ней нуждается
  - в) снисходительность
  - г) готовность выполнить любую просьбу человека
- 131 С целью исключения какого заболевания делается мазок на «BL»:
- а) сифилиса носа
  - б) ангины Симановского
  - в) дифтерии
  - г) лакунарной ангины
- 132 Основным симптомом отомикоза является:
- а) скудное гнойное выделение
  - б) глухота
  - в) зуд слухового прохода
  - г) острая боль

- 133 Какие препараты являются приоритетными в лечении аллергических вазомоторных ринитов:
- а) сосудосуживающие средства
  - б) средства ирригационной терапии
  - в) эндоназальные кортикостероиды
  - г) иммуномодуляторы
- 134 Серная пробка — это:
- а) результат несоблюдения гигиены
  - б) заболевание
  - в) аномалия слухового прохода
  - г) результат манипуляций в слуховом проходе и ношения ушной гарнитуры.
- 135 Первая помощь при носовом кровотечении:
- а) усадить больного
  - б) уложить больного
  - в) холод на переносицу
  - г) ватный шарик с 3% перекисью водорода в полость носа
  - д) тампон с адреналином в полость носа
- 136 Для профилактики ангин рекомендуется:
- а) системное назначение антибиотиков
  - б) промывание лакун небных миндалин
  - в) тубус-кварц глотки
  - г) иммунопрофилактика
- 137 Нарушение обоняния – это:
- а) афония
  - б) атрезия
  - в) anosmia
  - г) амовроз
- 138 Хондропериондрит гортани развивается как:
- а) самостоятельное заболевание
  - б) Результат травмы, ушиба
  - в) Функциональное заболевание
  - г) Порок развития
- 139 Причиной истинных парезов и параличей гортани являются:
- а) травмы, ушибы
  - б) ятрогенные причины
  - в) функциональные причины
  - г) онкопатология
- 140 Латерализация звука от камертона, поставленного в области темени у больного с перфорацией барабанной перепонки, происходит в:
- а) больное ухо
  - б) здоровое ухо
  - в) оба уха
- 141 Ангиофиброма носоглотки развивается:
- а) в возрасте 20-40 лет
  - б) у девушек 15-20 лет
  - в) у мальчиков 9-15 лет
  - г) в пожилом возрасте



- 142 Хондроперихондриты гортани могут приводить:
- а) к обострению хронического ларингита
  - б) к рубцовой атрезии
  - в) к деформации шеи
  - г) к тиреоидиту
- 143 Острый мастоидит является:
- а) Осложнением острого отита.
  - б) Самостоятельным заболеванием
  - в) Осложнением евстахеита.
  - г) Воспаление структур внутреннего уха.
- 144 Заболевание, характеризующееся пароксизмальным чиханием, обильным прозрачным водянистым отделяемым из носа, заложенностью носа, зудом в области носа, называется:
- а) острый ринит
  - б) острый синусит
  - в) аллергический ринит
  - г) атрофический ринит
- 145 При живом инородном теле слухового прохода следует закапать в ухо:
- а) борный спирт
  - б) масло
  - в) раствор перманганата калия
  - г) раствор фурацилина
- 146 Фурункул слухового прохода обычно развивается:
- а) На нижней стенке
  - б) На верхней стенке
  - в) На передней стенке
  - г) На задней стенке
  - д) Всё вышеперечисленное верно
- 147 Первоочередной эвакуации подлежат пораженные сортировочной группы:
- а) первой
  - б) второй
  - в) третьей
  - г) четвертой
- 148 Причинами сезонного аллергического ринита является:
- а) Шерсть домашних животных
  - б) Пыльца растений и деревьев
  - в) Клещ домашней пыли
  - г) Плесень
- 149 Основные функции носа:
- а) дыхательная
  - б) обонятельная
  - в) защитная
  - г) резонаторная
  - д) вестибулярная
- 150 Сосудосуживающие капли в нос можно применять в течение:
- а) 5 дней
  - б) 7 дней
  - в) 14 дней
  - г) 1 месяц

- 151 Хронический средний отит —это:
- а) мастоидит
  - б) мезотимпанит
  - в) евстахеит
  - г) лабиринтит
- 152 При остром среднем отите возможны осложнения:
- а) гнойный менингит
  - б) абсцесс мозга
  - в) мастоидит
  - г) паратонзиллярный абсцесс
  - д) евстахиит
- 153 Показанием к оперативному лечению является:
- а) Ангины до 2 раз в год
  - б) Рецидивирующие фарингиты
  - в) Ангины Симановского-Венсана
  - г) Постоянные боли в глотке
- 154 Пути проникновения возбудителя инфекции в барабанную полость:
- а) тубогенный
  - б) гематогенный
  - в) из наружного слухового прохода
  - г) лимфогенный
  - д) контактно-бытовой
- 155 Осложнения, наиболее часто встречающиеся при остром среднем отите:
- а) мастоидит
  - б) отосклероз
  - в) парез лицевого нерва
  - г) менингит
- 156 Анатомические отделы органа слуха, участвующие в звуковосприятии:
- а) кортиев орган
  - б) проводящие пути
  - в) зона коры головного мозга
  - г) барабанная перепонка
  - д) слуховая косточка
- 157 Основным в лечении парезов и параличей гортани является:
- а) медикаментозная терапия
  - б) физиотерапия
  - в) фонопедическая коррекция
  - г) иглорефлексотерапия
- 158 Полуспиртовой компресс на ухо ставят на (время в часах):
- а) 2-4
  - б) 4-6
  - в) 6-8
  - г) 8-12
- 159 Вторичный острый средний отит развивается после инфекционных заболеваний, таких как:
- а) скарлатина
  - б) корь
  - в) краснуха
  - г) дифтерия
  - д) коклюш

- 160 Согласно приказу МЗ РФ от 04.03.2003 №73 длительность реанимационных мероприятий составляет:
- а) не менее 15 минут
  - б) не менее 25 минут
  - в) не менее 30 минут
  - г) не менее 1 часа
- 161 Развитие риносинусита вызывается:
- а) плохим носовым дыханием
  - б) неадекватным лечением
  - в) эмпиемой пазухи
  - г) травмой носа
- 162 В этиологии болезни Рейнке первопричиной считается:
- а) фактор экологии
  - б) курение
  - в) профессиональные вредности
  - г) голосовые перегрузки
- 163 Что определяет показания к аденотомии:
- а) размеры аденоидной вегетации
  - б) рецидивирующие отиты в анамнезе
  - в) частые простуды
  - г) другие причины
- 164 Что способствует развитию аллергического ринита:
- а) анатомические особенности строения перегородки носа
  - б) воспалительные заболевания полости носа
  - в) снижение резистентности организма
  - г) неправильное лечение
- 165 При нейросенсорной тугоухости в ушах отмечается шум:
- а) высокой тональности
  - б) низкой тональности
  - в) средней тональности
- 166 При гортанной ангине воспалительный процесс затрагивает:
- а) ткани мягкого неба
  - б) слизистую надгортанника
  - в) слизистую подсвязочной области
  - г) трахею
- 167 Воспалительные заболевания наружного уха — это:
- а) острый средний отит
  - б) фурункул уха
  - в) мастоидит
  - г) лабиринтит
- 168 Задняя тампонада носа выполняется:
- а) При кровотечении передних отделов носа
  - б) Если другие виды остановок кровотечений не состоятельны
  - в) При кровотечении из зоны Киссельбаха
  - г) При кровотечении из ветвей общей сонной артерии

- 169 Основные исходы острого среднего отита:
- а) выздоровление
  - б) адгезивный процесс
  - в) хронический процесс
  - г) осложнения
  - д) атрезия слухового прохода
- 170 Вскрытие фурункула слухового прохода производится на стадии:
- а) Инфильтрации
  - б) Абсцедирование
  - в) Инволюции
- 171 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
- а) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
  - б) лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей,
  - в) в целях проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях;
  - г) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения
- 172 Инфекция в среднее ухо попадает:
- а) со стороны слухового прохода
  - б) воздушно- капельным путем
  - в) через слуховую трубу.
- 173 Симптомы острого насморка (ринита):
- а) зуд в области преддверия носа
  - б) затруднение носового дыхания
  - в) слизистые выделения из носа
  - г) температура 39-40°C
  - д) гнойные выделения из носа
- 174 Придаточные пазухи носа - это:
- а) Бухтообразные полости в костях черепа
  - б) Полости носа
  - в) Носовые раковины
- 175 Положение больного при носовом кровотечении:
- а) лежа на спине
  - б) сидя с запрокинутой назад головой
  - в) сидя с наклоненной вперед головой
  - г) лежа на боку
- 176 Метод отоакустической эмиссии используется:
- а) Для исследования нарушения слуха
  - б) Для экспресс-диагностики в раннем детском возрасте
  - в) Для диагностики сенсоневральной тугоухости
  - г) Для диагностики хронических заболеваний уха
  - д) Всё вышеперечисленное верно

- 177 Папилломатоз гортани вызывается:
- а) онковирусом
  - б) ассоциацией грибов и вирусов
  - в) спирохетой полости рта
  - г) бактериями полости рта
- 178 Биомедицинская этика и медицинское право должны находиться в состоянии:
- а) независимости
  - б) медицинское право - приоритетно
  - в) должен быть выдержан приоритет биомедицинской этики
  - г) биомедицинская этика - критерий корректности медицинского права
- 179 Для временной остановки венозного наружного кровотечения применяют
- а) пальцевое прижатие артерии на протяжении
  - б) наложение жгута
  - в) максимальное сгибание конечности
  - г) наложение давящей повязки
- 180 Трахеотомия выполняется обычно в положении больного:
- а) лежа на спине с валиком в грудном отделе
  - б) сидя
  - в) лежа на спине с валиком в поясничном отделе
  - г) лежа на спине с валиком под лопатками
- 181 Функциональные нарушения голоса вызываются:
- а) Воспалением голос.складок
  - б) Воспалением ложных голосовых складок
  - в) Ограничение подвижности голосовых складок
  - г) Отёком голосовых складок
- 182 К сурдологу направляется пациент с:
- а) тугоухостью
  - б) аллергическими реакциями
  - в) нарушениями дыхания
  - г) изменением голоса
- 183 К каким осложнениям могут приводить абсцессы глотки при не своевременном лечении?
- а) к формированию капсулы абсцесса
  - б) К рецидиву
  - в) К медиастиниту
  - г) К самопроизвольному выздоровлению.
- 184 Основная функция трахеи:
- а) защитная
  - б) дренажная
  - в) дыхательная
  - г) резонансная
- 185 Голосовая щель имеет размеры:
- а) 30 мм
  - б) 20 мм
  - в) меньше 19 мм
  - г) 10 мм

- 186 Исследование вестибулярной функции — это:
- а) импедансометрия
  - б) опыт Вальсальвы
  - в) тональная аудиометрия
  - г) калорическая проба
- 187 Остов гортани образуется:
- а) костями
  - б) хрящами
  - в) соединительной тканью
  - г) мягкими тканями шеи
- 188 Симптомы стеноза гортани:
- а) затрудненный вдох
  - б) затрудненный выдох
  - в) участие в акте вспомогательной мускулатуры
  - г) стридорозное дыхание
  - д) боль при глотании
- 189 Причинами носовых кровотечений являются:
- а) Заболевания слизистой носа
  - б) Анатомические особенности носа
  - в) Соматические заболевания носа
  - г) Опухоли носа
  - д) Всё вышеперечисленное верно
- 190 Мастоидит — это воспаление:
- а) носовой перегородки
  - б) придаточных пазух носа
  - в) сосцевидного отростка височной кости
  - г) лобных пазух носа
- 191 Слои барабанной перепонки:
- а) эпидермальный
  - б) фиброзный
  - в) эндотелиальный
  - г) эпителиальный
  - д) слизистый
- 192 Лейкоцитоз до 30млн в крови характерен:
- а) Фолликулярная ангина
  - б) Агранулоцитарной ангины
  - в) Инфекционного мононуклеоза
  - г) Ангина Симановского-Венсана
- 193 Мастоидит — это:
- а) разновидность острого отита:
  - б) распространение воспалительного процесса на ячейки сосцевидного отростка
  - в) хронизация процесса
  - г) исход процесса
- 194 Серная пробка удаляется из слухового прохода:
- а) Промыванием слухового прохода стерильным физ. раствором.
  - б) Промыванием сл. пр. после предварительного закапывания раствора  $H_2O_2$
  - в) Механическим удалением серной пробки крючком
  - д) Всё вышеперечисленное верно

- 195 Предпочтительным положением грудного ребёнка в кроватке при наличии у него ринита является:
- а) на спине
  - б) на животе
  - в) на боку с возвышенным изголовьем
  - г) коленно-кистевое
- 196 Пункция верхнечелюстной пазухи показана в случае:
- а) затяжного течения заболевания
  - б) при наличии клинических и рентгенологических показаний
  - в) во всех случаях синусита
  - г) при хроническом синусите
- 197 Коникотомия - это:
- а) рассечение трахеи
  - б) вскрытие паратонзиллярного пространства
  - в) рассечение связки между перстневидным и щитовидным хрящами
  - г) рассечение уздечки языка
- 198 Аденоиды I-II степени могут считаться физиологической нормой до возраста:
- а) 3 лет
  - б) 7 лет
  - в) 12 лет
  - г) 16 лет
- 199 Слухопротезирование показано:
- а) при снижении слуха на 30 Дб
  - б) при односторонней стойкой глухоте
  - в) при снижении слуха на 40-60 Дб
  - г) при полной глухоте
- 200 Какие причины вызывают развитие рецидивирующего папилломатоза гортани у детей:
- а) Хим. канцерогены
  - б) Экологические факторы
  - в) Вирусы
  - г) Рентгеновское излучение
- 201 Показанием к оперативному лечению хронического тонзиллита является:
- а) постоянные боли в глотке
  - б) ангины ежегодно 1 раз в год
  - в) ангины 2 раза в год
  - г) выделения из лакун гнойного отделяемого
- 202 У грудного ребёнка при остром отите боль усиливается при:
- а) приёме пищи
  - б) проведении туалета носа
  - в) физической нагрузке
  - г) надавливании на козелок
- 203 Что способствует формированию абсцессов в глотке:
- а) Кариозные зубы
  - б) Инфекционные заболевания
  - в) Рецидивирующие ангины
  - г) Снижение резистентности организма
  - д) Всё вышеперечисленное верно

- 204 Функции уха:
- а) звуковосприятие
  - б) защитная
  - в) сохранение равновесия
  - г) ориентация в пространстве
  - д) резонаторная
- 205 Продувание слуховых труб для восстановления слуха производится при:
- а) воспалении среднего уха
  - б) воспалении внутреннего уха
  - в) аденоидите
  - г) назофарингите
- 206 При лечении синуситов антибиотики:
- а) не показаны
  - б) показаны во всех случаях
  - в) при синуситах средней тяжести и тяжелых
  - г) при безпункционном ведении.
- 207 Какой метод исследования применяется для осмотра гортани на первичном приёме лор-врача:
- а) Непрямая ларингоскопия
  - б) Прямая ларингоскопия
  - в) Фарингоскопия
  - г) Флуометрия
- 208 Профилактика тяжёлой реакции на госпитализацию у ребёнка 1 года жизни включает:
- а) раздельное пребывание матери и ребёнка
  - б) отвлечение игрушкой
  - в) госпитализацию матери с ребёнком
  - г) проведение терапевтической игры
- 209 Юношеская ангиофиброма носоглотки относится к:
- а) Злокачественным опухолям
  - б) Доброкачественным опухолям
  - в) Условно доброкачественным опухолям
  - г) Опухолеподобным заболеваниям
- 210 К аномалиям развития наружного уха относится:
- а) атрезия хоан
  - б) незаращения твердого нёба
  - в) микротия
  - г) анкилоз стремена
- 211 Температура воды, применяемая для промывания уха с целью удаления серной пробки, должна быть (в градусах по Цельсию):
- а) 18
  - б) 20
  - в) 37
  - г) 45
- 212 При каких видах параличей гортани больные страдают от затрудненного дыхания:
- а) при правосторонних парезах
  - б) при левосторонних парезах
  - в) двусторонних
  - г) импатических



- 213 Гортанная ангина является заболеванием, связанным с:
- а) С подслизистым отёком надгортанника
  - б) Отёком подскладочным отд. гортани
  - в) Отёком голосовой щели
  - д) Всё вышеперечисленное верно
- 214 При катаральном ларингите выявляется:
- а) дисфагия
  - б) дисфония
  - в) дыхательная недостаточность
  - г) кашель
  - д) стридорозное дыхание
- 215 Какие отделы носа наиболее часто вызывают носовые кровотечения:
- а) носовые раковины
  - б) дно полости носа
  - в) придаточные пазухи
  - г) зона Киссельбаха
- 216 Интенсивная терапия при стридорозном дыхании предусматривает:
- а) восстановление свободной проходимости дыхательных путей
  - б) введение сердечных гликозидов
  - в) введение диуретиков
  - г) бальнеотерапию
- 217 Здоровый молодой человек воспринимает шепотную речь не менее чем с (в метрах):
- а) 3
  - б) 5
  - в) 6
  - г) 10
- 218 На доврачебном этапе (при отсутствии ЭКГ) можно думать о начавшемся инфаркте миокарда, если приступ стенокардии не купируется приемом нитроглицерина в течение:
- а) 20- 30 минут
  - б) 30 минут — 1 часа
  - в) 1,5-2 часа
  - г) суток
- 219 Фурункул носа опасен:
- а) Рецидивом
  - б) Изменениями тканей наружного носа
  - в) Распространением процесса на придаточные пазухи
  - г) Внутричерепными осложнениями
- 220 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:
- а) две
  - б) три
  - в) четыре
  - г) пять

- 221 Симптомы острого фарингита:
- а) боль при глотании слюны, першение в глотке
  - б) охриплость
  - в) ощущение кома в глотке
  - г) повышение температуры
  - д) ларингоспазм
- 222 К гортани относятся:
- а) щитовидный хрящ
  - б) подъязычная кость
  - в) перстневидный хрящ
  - г) черпаловидный хрящ
  - д) коническая связка
- 223 Анатомические отделы органа слуха, участвующие в проведении звука - это:
- а) наружный слуховой проход
  - б) среднее ухо
  - в) перелимфа лестницы преддверия и барабанной лестницы
  - г) проводящие пути
  - д) ушная раковина
- 224 При остром гнойном лабиринтите показана:
- а) санирующая операция на среднем ухе
  - б) санирующая операция на лабиринте
  - в) мастоидотомия
  - г) консервативное лечение
- 225 Для дифтерии характерно:
- а) слабая выраженность болевых ощущений
  - б) бледный или бледно-синюшный оттенок слизистой носа
  - в) ярко-красная гиперемия зева и слизистой миндалин
  - г) наличие плотных, трудно снимающихся серых налетов
  - д) гной в лагунах миндалин
- 226 Холестеатома —это:
- а) проявление острого экссудативного отита
  - б) проявление хронического эпитимпанита
  - в) проявление хронического мезотимпанита
  - г) проявление лабиринтита
- 227 Остеомы носа развиваются в:
- а) клиновидной пазухе
  - б) лобной пазухе
  - в) полости носа
  - г) в носоглотке
- 228 Тонзиллотом необходим для:
- а) частичного удаления небных миндалин
  - б) удаление носоглоточной миндалины
  - в) удаления язычной миндалины
  - г) прокола гайморовой пазухи
- 229 При лечении риносинуситов используются:
- а) Местная терапия
  - б) Антибиотики и деконгестанты
  - в) Системная антибактериальная терапия
  - г) Сосудосуживающие средства

- 230 Введение лекарственных средств в барабанную полость грудного ребёнка предусматривает применение:
- а) шпателя
  - б) ушной воронки
  - в) шприца
  - г) резиновой груши
- 231 К нарушениям вестибулярного аппарата не относятся:
- а) Нистагм
  - б) Тугоухость
  - в) Головокружение
  - г) Тошнота
- 232 Здоровый образ жизни включает в себя:
- а) благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе поведенческой, гигиенические навыки
  - б) состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
  - в) принятие мер, направленных на снижение влияния вредных факторов на организм человека
  - г) привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом
- 233 При ангине больного госпитализируют в отделение:
- а) ЛОР
  - б) инфекционное
  - в) терапевтическое
  - г) по уходу
- 234 В каких случаях показана экстренная госпитализация пациента:
- а) Абсцесс глотки в стадии инфильтрации
  - б) Абсцесс глотки в стадии абсцедирования
  - в) Абсцесс глотки в стадии разрешения
  - г) Во всех случаях
- 235 Носовые ходы ограничены следующими образованиями:
- а) средней носовой раковиной
  - б) носовой перегородкой
  - в) верхней носовой раковиной
  - г) носоглоточной миндалиной
  - д) Евстахиевой трубой
- 236 В структуре ЛОР-заболеваний онкопатология чаще локализуется:
- а) в ухе
  - б) в носу и в придаточных пазухах
  - в) в глотке
  - г) в гортаноглотке
- 237 Профессиональная тугоухость развивается:
- а) у лиц, длительное время работающих в условиях шума, превышающего ПДУ (предельно допустимый уровень)
  - б) при однократном воздействии интенсивного шума
  - в) в старческом возрасте
  - г) после приема ототоксических антибиотиков

- 238 Гортань иннервируется ветвями:
- а) тройничного нерва
  - б) кохлеарного нерва
  - в) возвратного нерва
  - г) языкоглоточного нерва
- 239 Этиология миопатических парезов гортани следующая:
- а) функциональные причины
  - б) травмы гортани
  - в) соматические заболевания
  - г) медицинские манипуляции
- 240 К отделам глотки относятся:
- а) носоглотка
  - б) ротоглотка
  - в) гортаноглотка
  - г) язычная миндалина
- 241 При эпилептическом припадке:
- а) развитию судорог предшествует аура
  - б) припадок начинается внезапно
  - в) каждый припадок начинается своеобразно
  - г) развитию судорог предшествует психотравмирующая ситуация
- 242 К симптомам поллиноза относятся:
- а) гнойные выделения из носовых ходов
  - б) обильные водянистые выделения из носовых ходов
  - в) повышение температуры тела до 38-40°C
  - г) аллергический конъюнктивит
  - д) многократное чихание
- 243 Прокол барабанной перепонки (парацентез) применяется при:
- а) остром среднем отите
  - б) абсцедирующем фурункуле слухового прохода
  - в) отосклерозе
  - г) лабиринтите
  - д) туботите
- 244 Осложнения острых отитов:
- а) сенсоневральная тугоухость
  - б) тубарная дисфункция
  - в) мастоидит
  - г) диффузный наружный отит
- 245 К околоносовым относятся пазухи (синусы):
- а) верхнечелюстные
  - б) сигмовидная
  - в) лобные
  - г) клиновидная
  - д) пещеристая
- 246 Метод лечения гипертрофического ринита:
- а) медикаментозное (сосудосуживающие капли)
  - б) оперативное лечение
  - в) электрофорез
  - г) лазеротерапия

- 247 Диагноз хронического риносинусита ставится в случае:
- а) длительность заболевания до 12 нед.
  - б) заболевание повторяется 2-4 раза в году
  - в) длительность заболевания свыше 12 нед.
  - г) перерыв между обострениями меньше 12 нед.
- 248 Туалет уха, введение турунд с лекарственными веществами в слуховой проход, применение сосудосуживающих капель в нос, продувание слуховых труб по Политцеру применяется в комплексе для лечения:
- а) отомикоза
  - б) фурункула уха
  - в) острого среднего отита
  - г) мастоидита
- 249 Метод отоакустической эмиссии используется:
- а) для диагностики воспалительных заболеваний уха
  - б) для диагностики нарушений слуха
  - в) для экспресс-диагностики нарушений слуха
  - г) для диагностики вестибулярных нарушений.
- 250 Длительность течения острого риносинусита:
- а) 10-14 дней
  - б) до 1 мес.
  - в) 5-6 нед.
  - г) до 12 нед.
- 251 Радикальная операция на среднем ухе выполняется:
- а) для улучшения слуха
  - б) для улучшения вестибулярной функции
  - в) санации уха
  - г) для профилактики внутричерепных осложнений
- 252 При остром катаральном ларингите рекомендован голосовой режим:
- а) строгий
  - б) шепотная речь
  - в) обычный
- 253 Оперативное лечение на среднем ухе показано:
- а) при наличии выделения из уха
  - б) при снижении слуха
  - в) для профилактики внутричерепных осложнений
  - г) при частых обострениях
- 254 При евстахиите развивается тугоухость:
- а) кондуктивная
  - б) нейросенсорная
  - в) смешанная
- 255 Что приводит к развитию сезонного аллергического ринита:
- а) использование эндоназальных сосудосуживающих средств
  - б) домашняя пыль
  - в) пыльца растений
  - г) шерсть, слюна домашних животных
- 256 Отосклероз проявляется в виде:
- а) склероз всех звукопроводящих структур уха
  - б) склероз барабанной перепонки
  - в) анкилоз стремени
  - г) склероз звуковоспринимающего аппарата

- 257 Осмотр глотки - это:
- а) отоскопия
  - б) риноскопия
  - в) ларингоскопия
  - г) фарингоскопия
- 258 В каких случаях при остром среднем отите показан парацентез:
- а) выпячивание барабанной перепонки
  - б) сильные боли
  - в) высокая температура
  - г) втянутость барабанной перепонки
  - д) нарушение равновесия
- 259 У больного с агранулоцитарной ангиной в крови:
- а) лейкоциты  $30 \cdot 10^9$ /л, мононуклеары
  - б) умеренный лейкоцитоз
  - в) лейкопения ниже 1 млн
  - г) эозинофилия
- 260 Негнойные заболевания уха это:
- а) Евстахеит
  - б) Лабиринтит
  - в) Лабиринтопатия
  - г) Мирингит
- 261 При ложном крупе отек тканей развивается на уровне:
- а) голосовых складок
  - б) выше голосовых складок
  - в) в подсвязочной области
  - г) в трахее
- 262 К достоверным признакам внезапной остановки сердечной деятельности не относится:
- а) отсутствие пульса на сонных артериях
  - б) внезапная потеря сознания
  - в) отсутствие самостоятельного дыхания
  - г) отсутствие тонов сердца
- 263 К среднему уху относятся:
- а) барабанная перепонка
  - б) слуховые косточки
  - в) улитка
  - г) слуховая труба
  - д) седло
- 264 Одонтогенный левосторонний гайморит развивается при патологии зубов:
- а) верхней челюсти справа
  - б) верхней челюсти слева
  - в) нижней челюсти справа
  - г) нижней челюсти слева
- 265 Первая помощь при ушибе носа:
- а) троксевазиновая мазь
  - б) холод на место ушиба
  - в) согревающий компресс
  - г) постельный режим
  - д) турунды с адреналином

- 266 При злокачественных опухолях гортани позднее диагностируются опухоли следующих локализаций:
- а) надскладочное пространство
  - б) область голосовых складок
  - в) подсвязочное пространство
  - г) область надгортанника
- 267 Правильным определением этики как науки является:
- а) этика - наука об отношении живых существ между собой
  - б) этика - наука о природе и смысле моральных взаимоотношений и нравственных принципов
  - в) этика - наука о минимизировании зла в человеческих отношениях
  - г) этика - наука об умении правильно себя вести в обществе
- 268 Отогематома — это:
- а) воспаление ушной раковины в результате заболевания
  - б) результат травмы уха
  - в) аномалия развития
  - г) осложнения наружного отита
- 269 Форма хронического гнойного среднего отита, при которой наиболее часто наблюдаются опасные для жизни осложнения:
- а) мезотимпанит
  - б) эпитимпанит
  - в) аллергическая
  - г) адгезивная
- 270 В анатомии трахеи различают:
- а) шейный и грудной отделы
  - б) брюшной отдел
  - в) гортанный отдел
  - г) пищеводный отдел
- 271 Функциональные заболевания гортани характеризуются:
- а) гиперемией тканей гортани
  - б) ограничением подвижности голосовых складок
  - в) отеком тканей гортани
  - г) сужением просвета гортани
- 272 Каким категориям больных показано обучение пищеводному голосу:
- а) больным с двусторонними параличами гортани
  - б) больным с функциональной афонией
  - в) больным, перенесшим операцию ларингоэктомию больным с рецидивирующим папилломатозом гортани
- 273 Наиболее частым осложнением ринита у грудных детей является:
- а) отит
  - б) ангина
  - в) гайморит
  - г) плеврит
- 274 В начале приступа бронхиальной астмы у больных отмечается кашель:
- а) с выделением пенистой розовой мокроты
  - б) с выделением «ржавой» мокроты
  - в) сухой
  - г) с выделением стекловидной мокроты

- 275 Истечение ликвора из уха или носа является характерным признаком
- а) сотрясения головного мозга
  - б) сдавления головного мозга
  - в) перелома свода черепа
  - г) перелома основания черепа
- 276 Фонопедическая коррекция-это:
- а) Метод лечения заболевания голоса
  - б) Физиотерапевтическая методика
  - в) ЛФК
  - г) Местная противовоспалительная терапия.
- 277 Коникотомия показана:
- а) если участок асфиксии ниже трахеи
  - б) если участок асфиксии в грудном отделе трахеи
  - в) если нет времени на осуществлении типичной трахеотомии
- 278 Кольцо Пирогова или глоточное кольцо состоит из следующих образований:
- а) глоточные миндалины
  - б) язычные миндалины
  - в) пейеровы бляшки
  - г) носоглоточные миндалины
  - д) трубные миндалины
- 279 Устье слуховой трубы располагается в:
- а) боковой стенке носоглотки
  - б) задней стенке носоглотки
  - в) области хоан
  - г) своде носоглотки
- 280 Ушная ликворея возникает при:
- а) переломе основания черепа и височной кости
  - б) травмах небных миндалин
  - в) травмах носа
  - г) травмах уха
- 281 После удаления небных миндалин пациент состоит на диспансерном учете:
- а) 1 год
  - б) 10 месяцев
  - в) 6 месяцев
  - г) 1 месяц
- 282 Признаки хронического гайморита:
- а) упорные головные боли
  - б) затемнение верхне-челюстных пазух на R-графии
  - в) периодические гнойные выделения из носа
  - г) менингеальные знаки
  - д) обильные водянистые выделения из носа
- 283 Характерные симптомы для начального периода острого среднего отита:
- а) боль в ухе
  - б) снижение слуха
  - в) повышение температуры
  - г) гноетечение
  - д) головокружение



- 284 К развитию сенсоневральной тугоухости приводят:
- а) воспалительные заболевания уха
  - б) осложнения отитов
  - в) внутричерепные осложнения
  - г) гипертоническая болезнь
- 285 Наружное ухо состоит из следующих образований:
- а) наружный слуховой проход
  - б) ушная раковина
  - в) сустав нижней челюсти
  - г) барабанная перепонка
  - д) стремечко
- 286 Число пораженных при территориальных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах):
- а) 10-50 пораженных
  - б) 50-500 пораженных
  - в) свыше 500 пораженных
  - г) до 10 пораженных
- 287 Лимфоаденоидное кольцо Пирогова выполняет функции:
- а) Глотательную
  - б) Дыхательную
  - в) Защитную
  - г) Разделительную
- 288 Приоритетным в лечении аллергических ринитов являются:
- а) Антигистаминные препараты
  - б) Местные сосудосуживающие средства
  - в) Местная кортикостероидная терапия
  - г) Водно-солевые спреи
- 289 Наиболее информативными методами обследования гортаноглотки в настоящее время являются:
- а) непрямая ларингоскопия
  - б) прямая ларингоскопия
  - в) фиброларингоскопия
  - г) рентгенологическое обследование
- 290 Отогенный менингит чаще встречается при:
- а) хронических гнойных средних отитах
  - б) острых синуситах
  - в) наружных отитах
  - г) лабиринтитах (внутренних отитах)
- 291 Симптомы эпитимпанита:
- а) гнойное отделяемое с запахом
  - б) боль в ухе
  - в) центральная перфорация
  - г) перфорация в ненатянутой части перепонки
  - д) повышение температуры
- 292 Изъятие органов и тканей от мертвого донора осуществляется в Российской Федерации:
- а) беспрепятственно в интересах науки и общества
  - б) согласно принципу "презумпция несогласия"
  - в) согласно принципу "презумпция согласия"
  - г) в соответствии с морально-религиозными ценностями

- 293 В каждой половине носа имеется носовых ходов:
- а) три
  - б) два
  - в) четыре
  - г) пять
- 294 Сурдологический кабинет занимается лечением заболеваний:
- а) Лиц, перенёвших радикальную операцию.
  - б) Сенсоневральных нарушений.
  - в) Глухоту детского возраста.
  - г) Все виды нарушения слуха.
- 295 При отосклерозе основными жалобами больного являются:
- а) снижение слуха
  - б) шум в ухе
  - в) головокружение
  - г) улучшение слуха в шумной обстановке (паракузис Визилии)
  - д) боль в ухе
- 296 Субпериостальный абсцесс — это:
- а) абсолютный признак мастоидита
  - б) исход заболевания
  - в) самостоятельное заболевание мягких тканей
  - г) осложнение фурункула слух, прохода
- 297 При среднем отите, кроме барабанной полости, в воспалительный процесс вовлекаются:
- а) костный отдел слухового прохода, слуховая труба
  - б) ячейки сосцевидного отростка, лабиринт
  - в) слуховая труба, ячейки сосцевидного отростка
  - г) лабиринт, костный отдел слухового прохода
- 298 К особым формам мастоидитов относятся:
- а) зигом атицит
  - б) затяжное течение среднего отита
  - в) некротизирующий наружный отит
  - г) гнойный лабиринтит
- 299 Показания к оперативному лечению по поводу искривления перегородки носа определяют:
- а) характер кривизны перегородки носа
  - б) сопутствующие заболевания носа
  - в) сопутствующие соматические заболевания
  - г) аллергические заболевания носа.
- 300 Влечении опухолей гортани используется:
- а) оперативное лечение
  - б) химиотерапия
  - в) рентгенотерапия
  - г) комплексная терапия