

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ  
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

**(для медицинских сестёр психиатрических учреждений, прошедших обучение по циклам  
15.12 "Сестринское дело в психиатрии", профессиональной переподготовки по  
специальности «Сестринское дело»)**

- 1 Возбуждение, характеризующееся манерными, вычурными, импульсивными, некоординированными, иногда ритмичными, однообразно повторяющимися движениями и говорливостью, вплоть до бессвязности, называется:
  - а) маниакальным
  - б) гебефреническим
  - в) кататоническим
  - г) эпилептическим
- 2 "Великой симулянткой" называют:
  - а) Неврастению.
  - б) Ипохондрию.
  - в) Истерию.
  - г) депрессию
- 3 Абсолютно специфическим заболеванием, развивающимся у сотрудников психиатрической больницы, является:
  - а) Невроз.
  - б) Шизофрения.
  - в) Депрессия
  - г) Аллергия на психотропные препараты.
- 4 Абсолютно специфическим заболеванием, развивающимся у сотрудников психиатрической больницы, является:
  - а) невроз
  - б) шизофрения
  - в) аллергия на психотропные препараты
  - г) гипертоническая болезнь
- 5 Абстиненция при наркомании – это:
  - а) отсутствие аппетита у наркомана
  - б) иллюзорное восприятие окружающего мира
  - в) присутствие наркотика в организме наркомана
  - г) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления наркотика в организм
- 6 Абулия проявляется всем перечисленным, кроме
  - а) отказ от речи (мутизм)
  - б) отсутствием побуждений
  - в) утраты желаний
  - г) полную безучастность и бездеятельность
- 7 Алкогольная абстиненция – это:
  - а) присутствие алкоголя в крови
  - б) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления алкоголя в организм
  - в) алкогольное поражение печени
  - г) алкогольная эпилепсия

- 8 Алкогольная деградация включает все, кроме:
- а) стойких изменений памяти и интеллекта
  - б) разорванности мышления
  - в) игнорирования этических норм
  - г) психопатоподобных проявлений
- 9 Алкогольная деградация развивается:
- а) сразу после употребления первой же дозы алкоголя
  - б) на первой стадии алкоголизма
  - в) на второй стадии алкоголизма
  - г) на третьей стадии алкоголизма
- 10 Алкогольный делирий развивается:
- а) при систематическом употреблении больших доз алкоголя
  - б) при запоях
  - в) через несколько дней после массивного употребления алкоголя на фоне абстинентного синдрома
  - г) как индивидуальная реакция на однократный прием иногда даже совсем небольшой дозы алкоголя
- 11 Амбивалентность – это расстройство:
- а) памяти
  - б) мышления
  - в) эмоций
  - г) сознания
- 12 Аменция – это расстройство:
- а) сознания
  - б) памяти
  - в) ощущений
  - г) мышления
- 13 Апатия – это:
- а) снижение настроения
  - б) повышение настроения
  - в) злобно – тоскливое настроение
  - г) отсутствие эмоциональных реакций на внешние раздражители
- 14 Бессвязность мышления характеризуется:
- а) склонностью к пустым рассуждениям
  - б) отсутствием связи между отдельными мыслями или даже словами
  - в) полной хаотичностью, бессмысленностью мышления
  - г) отсутствием в мышлении логической связи
- 15 Больной с бредовыми идеями:
- а) Понимает ненужность и нелепость своих мыслей
  - б) Ищет помощи
  - в) Высказывает бредовые идеи, которые не критикует
  - г) Хочет избавиться от нелепых мыслей
- 16 В браке больного эпилепсией со здоровой женщиной вероятность рождения больного ребенка:
- а) 1:100
  - б) 1:50
  - в) 1:25
  - г) не имеет значения

- 17 В дневниках наблюдений за больными медсестрой проводится описание больных:
- а) На строгом надзоре
  - б) при изменении психического состояния
  - в) при изменении соматического состояния
  - г) Всё перечисленное
- 18 В качестве корректоров при психофармакотерапии назначаются все, кроме:
- а) кофеина
  - б) акинетона
  - в) галоперидола
  - г) транквилизаторов
- 19 В начальной стадии атеросклероза наблюдается:
- а) головные боли
  - б) шум в ушах
  - в) все перечисленное
  - г) ничего из перечисленного
- 20 В описании психического статуса недопустимы выражения;
- а) Больной высказывает бредовые мысли.
  - б) Больной "полон бреда".
  - в) Больной высказывает мысли о преследовании.
  - г) У больного бредовые мотивы
- 21 В питательную смесь для кормления психически больных через зонд входит все, кроме:
- а) Яиц (домашние).
  - б) Сахара.
  - в) Соли.
  - г) Молока.
- 22 В пятилетнем возрасте ребёнок может;
- а) Одеться и раздеться.
  - б) Назвать основные цвета,
  - в) Уметь сопереживать.
  - г) Верно а) и б).
- 23 В развитии большого судорожного припадка различают:
- а) тоническую фазу
  - б) клоническую фазу
  - в) фазу помрачения сознания (оглушение или сумеречное помрачение сознания)
  - г) все перечисленное
- 24 Ведущим методом изучения психически больных является:
- а) Психологическое исследование.
  - б) Психоанализ.
  - в) Клинический метод.
  - г) Лабораторное исследование
- 25 Виды судебно-психиатрической экспертизы:
- а) военная, гражданская, муниципальная
  - б) амбулаторная, стационарная
  - в) экстренная, плановая, внеочередная
  - г) по агрессивным и реактивным больным, по самоубийцам
- 26 ВИЧ относится к семейству:
- а) рабдовирусов
  - б) гепадновирусов
  - в) ретровирусов
  - г) аденовирусов

- 27 Внутрибольничные инфекции развиваются при наличии:
- а) источника инфекции
  - б) восприимчивого организма (контингента)
  - в) источника инфекции и восприимчивого (контингента)
  - г) источника инфекции, факторов передачи и восприимчивого человека
- 28 Возбуждение, характеризующееся гримасничанием, кривлянием, немотивированным смехом, называется:
- а) маниакальным
  - б) гебефреническим
  - в) кататоническим
  - г) эпилептическим
- 29 Возбуждение, характеризующееся повышенным настроением и самочувствием, выразительной мимикой и жестами, ускоренной речью, усиленной деятельностью, называется:
- а) маниакальным
  - б) гебефреническим
  - в) кататоническим
  - г) эпилептическим
- 30 Возможные причины невротозов:
- а) Черепно-мозговая травма
  - б) Алкоголизм
  - в) Конфликтная ситуация в семье
  - г) Всё перечисленное
- 31 Врачебному контролю не подвергаются письма больных:
- а) Всех без исключения.
  - б) Больных, находящихся на судебной и военной экспертизе.
  - в) Больных, находящихся в остром состоянии.
  - г) Направленные в суд.
- 32 Врожденное слабоумие называется:
- а) деменцией
  - б) аменцией
  - в) умственной отсталостью
  - г) эпилепсией
- 33 Галлюцинации – это:
- а) яркие фантастические сновидения
  - б) крайне неприятные ощущения жжения, стягивания
  - в) ложное восприятие несуществующего объекта
  - г) световые вспышки при проведении электроэнцефалографии
- 34 Галлюцинации относятся к расстройству:
- а) памяти
  - б) сознания
  - в) эмоций
  - г) восприятия
- 35 Галлюцинации это:
- а) Искажённое восприятие окружающего
  - б) Нечёткое восприятие объекта
  - в) Восприятие без объекта
  - г) Ощущение нереальности окружающего

- 36 Грамотной записью в дневнике о больном, испытывающим зрительные псевдогаллюцинации, является;
- а) "Больной галлюцинирует".
  - б) "У больного зрительные псевдогаллюцинации".
  - в) Больной видит внутренним взором "внутри головы" яркую звезду.
  - г) Верно а) и б)
- 37 Двигательный автоматизм встречается в структуре синдрома:
- а) Психоорганического,
  - б) Галлюцинаторно-параноидного.
  - в) Амнестического.
  - г) Астенического
- 38 Действия медицинских работников, ущемляющие права и законные интересы граждан при оказании им психиатрической помощи, могут быть обжалованы:
- а) только в вышестоящий орган.
  - б) только вышестоящему должностному лицу.
  - в) только в суд или прокурору.
  - г) по выбору лица, приносящего жалобу, непосредственно в суд, а также в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или прокурору.
- 39 Делирий относится к расстройствам:
- а) памяти
  - б) мышления
  - в) сознания
  - г) воли
- 40 Деменция это:
- а) Лёгкая степень умственной отсталости
  - б) Тоскливое настроение
  - в) Слабоумие приобретённое в результате патологии ЦНС
  - г) Врождённое слабоумие при ДЦП
- 41 Депрессивный синдром опасен совершением:
- а) Побега
  - б) Нападением на персонал
  - в) Криминальными действиями
  - г) Суицидом
- 42 Диагноз ларвированных (скрытых) депрессий можно поставить на основании всего, кроме:
- а) гипермнезии
  - б) периодичности возникновения
  - в) наличия расстройств сна
  - г) раздражительности
- 43 Диссимуляция – это:
- а) демонстрация несуществующих психических расстройств
  - б) расстройство сознания
  - в) сокрытие болезненной симптоматики
  - г) приступы речедвигательного возбуждения
- 44 Диссимуляция – это:
- а) демонстрация несуществующих психических расстройств
  - б) усиление (аггравация) имеющихся расстройств
  - в) сокрытие истинной, болезненной симптоматики
  - г) расстройство мыслительной деятельности

- 45 Дисфорию можно определить как:
- а) повышенное настроение
  - б) расстройство речи
  - в) злобно – тоскливое настроение
  - г) отсутствие эмоциональных реакций
- 46 Для делирия характерны все расстройства, кроме:
- а) парейдолии
  - б) зрительные галлюцинации
  - в) синдром Кандинского-Клерамбо
  - г) двигательного возбуждения
- 47 Для злокачественного нейролептического синдрома характерно:
- а) Судорожные припадки
  - б) Гипертермия
  - в) психомоторное возбуждение
  - г) ничего из перечисленного
- 48 Для купирования алкогольного делирия преимущественно применяют:
- а) Аминазин.
  - б) Реланиум.
  - в) Мажептил.
  - г) модетен-депо
- 49 Для лечения психических нарушений при гипертонической болезни надо:
- а) постоянно контролировать соматическое состояние
  - б) систематически контролировать АД
  - в) не применять больших доз психотропных средств
  - г) все перечисленное
- 50 Для малых истерических припадков характерно все, кроме:
- а) абсансов
  - б) приступов рыданий, хохота
  - в) чувства дурноты, учащённого дыхания, дрожания тела
  - г) покраснения и побледнения, затруднения дыхания, стремлением лечь
- 51 Для мусситирующего делирия характерно все, кроме
- а) возбуждения в пределах постели
  - б) бессвязного бормотания
  - в) отсутствия реакции на внешние раздражители
  - г) конфабуляций
- 52 Для органического психосиндрома характерно:
- а) снижение памяти
  - б) снижение сообразительности
  - в) снижение воли
  - г) все перечисленное
- 53 Для параноидального бреда характерно:
- а) наличие обманов восприятия
  - б) отсутствие галлюцинаций
  - в) глубокое слабоумие
  - г) наличие иллюзий
- 54 Для паранойяльного бреда характерно:
- а) наличие истинных галлюцинаций
  - б) наличие псевдогаллюцинаций
  - в) отсутствие галлюцинаций
  - г) наличие иллюзий

- 55 Для шизофрении характерны все перечисленные расстройства кроме:
- а) невротоподобных
  - б) судорожных
  - в) бредовых
  - г) галлюцинаторно-параноидных
  - д) верно а) и б)
- 56 Если по решению комиссии врачей-психиатров недобровольная госпитализация признана обоснованной:
- а) госпитализированный может быть выписан по его желанию.
  - б) госпитализированный может быть выписан только «под расписку» близких родственников.
  - в) госпитализированный содержится в стационаре до решения суда без применения недобровольного лечения.
  - г) госпитализированный содержится в стационаре и получает необходимое лечение до решения суда..
- 57 Если явления анафилактического шока развивались на фоне внутривенного введения лекарственного препарата, то в первую очередь необходимо:
- а) введение препарата прекратить, иглу из места инъекции убрать
  - б) введение препарата прекратить, из вены не выходить
  - в) введение препарата прекратить, иглу из места инъекции убрать, пунктировать другую вену
  - г) введение препарата прекратить, иглу из места инъекции убрать, приложить холод
- 58 Закатывание глаз, кривошея, тонические судороги характерны при использовании:
- а) Амитриптилина.
  - б) Тегретола,
  - в) Барбамила.
  - г) Галоперидола.
- 59 Запои характерны для:
- а) первой стадии алкоголизма
  - б) второй стадии алкоголизма
  - в) третьей стадии алкоголизма
  - г) бытового пьянства
- 60 Злобность, напряжённость, отсутствие продуктивного контакта психически больного с врачом и мед. персоналом свидетельствует о:
- а) Нарушении сознания.
  - б) Бреде,
  - в) Галлюцинациях.
  - г) Все перечисленное.
- 61 Из очаговых расстройств при болезни Альцгеймера обязательными являются:
- а) афазия (нарушения речи)
  - б) апраксия (нарушение целенаправленных движений)
  - в) агнозия (нарушение узнавания)
  - г) верно 1 и 3
- 62 Изменение личности при шизофрении характеризуется всем, кроме;
- а) "Расщепления" психики.
  - б) Эмоциональной тупости.
  - в) Апатии, абулии
  - г) Прогрессирующего расстройства памяти.

- 63 Иллюзии – это:
- а) искаженное восприятие реально существующего предмета
  - б) действия иллюзиониста
  - в) голоса, носящие «приказной» императивный характер
  - г) выдумки, вымыслы, не соответствующие действительности
- 64 Иллюзии, возникающие под влиянием сильного чувства, называются:
- а) вербальными
  - б) парейдолическими
  - в) аффективными
  - г) иллюзиями невнимания
- 65 Иллюзии, выражающиеся в восприятии действительно существующих образов измененном, обычно в причудливо-фантастическом виде, называются:
- а) аффективными
  - б) парейдолическими
  - в) вербальными
  - г) иллюзиями невнимания
- 66 Иллюзии, выражающиеся в ошибочном восприятии смысла слов, речей окружающих, называются:
- а) вербальными
  - б) парейдолическими
  - в) аффективными
  - г) иллюзиями невнимания
- 67 Истерическая психопатия характеризуется всем перечисленным, кроме:
- а) стремлением казаться в собственном мнении и в глазах окружающих значительной личностью
  - б) стремлением к оригинальности
  - в) тенденцией к самоанализу
  - г) демонстрацией превосходства
- 68 Истинные зрительные галлюцинации характерны для:
- а) Шизофрении
  - б) Интоксикационного делирия
  - в) Инволюционной меланхолии
  - г) Деменции
- 69 Истинные зрительные галлюцинации характерны для:
- а) Шизофрении.
  - б) Интоксикационного делирия.
  - в) Инволюционной меланхолии.
  - г) Эпилепсии
- 70 К апато – абулическому синдрому относится:
- а) утрата желаний, интересов в сочетании безразличия с безмолвием
  - б) резкое расстройство запоминания, дезориентировка и конфабуляции
  - в) отказ от приёма пищи
  - г) психомоторное возбуждение
- 71 К галлюциногенам относится наркотик:
- а) морфин
  - б) гашиш
  - в) амфетамин
  - г) ЛСД



- 72 К истерическим реактивным психозам относят:
- а) истерические сумеречные помрачения сознания (включая синдром Газнера)
  - б) псевдодеменция
  - в) пугэрилизм
  - г) всё перечисленное верно
- 73 К каннабиноидам относится:
- а) морфин
  - б) гашиш
  - в) амфетамин
  - г) ЛСД
- 74 К качественным нарушениям памяти относятся:
- а) Амнезии
  - б) Парамнезии
  - в) Гипомнезия
  - г) Гипермнезия
- 75 К навязчивым движениям относятся:
- а) припадки
  - б) тики
  - в) автоматизмы при синдромах Кандинского – Клерамбо
  - г) псевдогаллюцинации
- 76 К нарушениям мышления по форме относится:
- а) резонерство
  - б) депрессия
  - в) деменция
  - г) анорексия
- 77 К нарушениям памяти относится:
- а) Парафрении
  - б) Агнозия
  - в) Конфабуляции
  - г) Сенестопатии
- 78 К новым антидепрессантам относятся все, кроме;
- а) Золофта.
  - б) Паксила.
  - в) Рекситин
  - г) Рисполепта.
- 79 К опийной группе наркотиков относится:
- а) морфин
  - б) гашиш
  - в) амфетамин
  - г) ЛСД
- 80 К основным симптомам СПИДА относятся:
- а) гепатоспленомегалия, слабость, головная боль
  - б) лимфаденопатия, диарея более месяца, лихорадка более месяца
  - в) потеря массы тела, желтушность кожных покровов
  - г) ночные поты, слабость

- 81 К основным формам расстройства личности относятся:
- а) гебефрения, парафрения, шизофрения
  - б) шизоидное, эмоционально неустойчивое, истерическое
  - в) простое, осложнённое
  - г) амнезия, конфабуляции
- 82 К пациенту, находящемуся на стационарном обследовании (военная экспертиза) и возбуждавшемуся в связи с конфликтом:
- а) Применяют терапевтические меры.
  - б) Меры стеснения.
  - в) Назначение нейролептиков
  - г) Ничего из перечисленного.
- 83 К профилактическим средствам расстройств настроения относится:
- а) Амитриптилин.
  - б) Ноотропил.
  - в) Золофт.
  - г) Карбонат лития.
- 84 К проявлениям гебефренического синдрома относится:
- а) конфабуляция
  - б) дурашливость
  - в) отказ от пищи
  - г) дезориентировка
- 85 К проявлениям истерического расстройства личности относится:
- а) эйфория
  - б) иллюзии
  - в) театральность
  - г) апатия
- 86 К психостимуляторам относится наркотик:
- а) морфин
  - б) гашиш
  - в) амфетамин
  - г) ЛСД
- 87 К расстройствам влечений относятся:
- а) эхопраксия, эхоламия
  - б) клептомания, анорексия
  - в) гипомания, ступор
  - г) эйфория, депрессия
- 88 К расстройствам восприятия относятся:
- а) Бред
  - б) Галлюцинации
  - в) Парамнезия
  - г) Абсанс
- 89 К расстройствам восприятия относятся:
- а) Судороги
  - б) Галлюцинации
  - в) Бред
  - г) Делирий

- 90 К расстройствам восприятия, когда человек вследствие нарушений психической деятельности видит, слышит, ощущает то, что в реальной действительности не существует, относятся:
- а) галлюцинации
  - б) иллюзии
  - в) конфабуляции
  - г) синестезии
- 91 К расстройствам восприятия, при которых внешний раздражитель, адресованный к одному анализатору, вызывает одновременно ответ с какого-то другого или нескольких анализаторов, относятся:
- а) галлюцинации
  - б) иллюзии
  - в) сенестопатии
  - г) синестезии
- 92 К расстройствам восприятия, при которых возникают патологические ощущения в виде возникающего в различных частях тела или внутренних органах неприятного чувства покалывания, давления, жжения, стягивания, не связанного с какой – либо соматической патологией, относятся:
- а) галлюцинации
  - б) иллюзии
  - в) сенестопатии
  - г) синестезии
- 93 К расстройствам восприятия, при которых реальные явления или предметы воспринимаются человеком в измененном, ошибочном виде, относятся:
- а) галлюцинации
  - б) иллюзии
  - в) сенестопатии
  - г) синестезии
- 94 К расстройствам интеллекта относятся:
- а) деменция, умственная отсталость
  - б) нарушение сна, астения
  - в) амнезия, конфабуляции
  - г) эйфория, аффективные расстройства
- 95 К расстройствам мышления относится:
- а) ментизм
  - б) сенестопатия
  - в) галлюцинации
  - г) псевдореминисценции
- 96 К расстройствам памяти относится все перечисленное, кроме:
- а) дисмнезии
  - б) амнезии
  - в) парамнезии
  - г) сделанных воспоминаний
- 97 К расстройствам памяти относится:
- а) ментизм
  - б) сенестопатия
  - в) галлюцинации
  - г) псевдореминисценции

- 98 К расстройствам памяти относятся:
- а) деменция, умственная отсталость
  - б) астения, нарушение сна
  - в) амнезия, конфабуляции
  - г) эйфория, аффективные расстройства
- 99 К расстройствам сознания относятся:
- а) Конфабуляции
  - б) Астения
  - в) Дисфория
  - г) Абсанс
- 100 К расстройствам сознания относятся:
- а) ритуалы, бессонница
  - б) онейроид, аменция
  - в) дезориентировка, дереализация
  - г) иллюзии, галлюцинации
- 101 К расстройствам эмоций относятся:
- а) деменция, умственная отсталость
  - б) астения, нарушение сна
  - в) амнезия, конфабуляции
  - г) эйфория, аффективные расстройства
- 102 К хроническим формам алкогольной энцефалопатии относятся:
- а) бессонница, раздражительность, депрессия
  - б) корсаковский синдром, психоз Гайе – Вернике
  - в) алкогольная эпилепсия, полиневропатия, нейродермит
  - г) деменция, амнезия, афазия
- 103 К числу особенностей современного алкоголизма относится:
- а) стабилизация распространённости алкогольных психозов
  - б) увеличение числа типичных алкогольных психозов
  - в) увеличение числа нетипичных форм алкогольных психозов
  - г) развитие соматических осложнений
- 104 К числу особенностей современного алкоголизма относится:
- а) Стабилизация распространённости алкогольных психозов.
  - б) Увеличение числа типичных алкогольных психозов.
  - в) Увеличение числа нетипичных форм алкогольных психозов.
  - г) Ничего из перечисленных
- 105 Карбамазепин (финлепсин) применяют для лечения всех состояний, кроме:
- а) депрессивных и маниакальных состояний
  - б) вербального галлюциноза
  - в) судорожных синдромов
  - г) предупреждения аффективных фаз
- 106 Кардинальный признак неврастении:
- а) Истерический припадок
  - б) Сумеречное состояние
  - в) Раздражительность, слабость
  - г) Амнезия
- 107 Кататонический синдром встречается при:
- а) Психопатиях
  - б) Неврозах
  - в) Шизофрении
  - г) Все перечисленное

- 108 Кататонический ступор – это:
- а) глухонемота
  - б) побочное действие нейролептиков
  - в) расстройство сознания
  - г) восковидная гибкость, негативизм
- 109 Коматозное состояние – это:
- а) полное выключение сознания
  - б) частые приступы с потерей сознания
  - в) снижение памяти
  - г) оглушение, вялость сонливость
- 110 Консультативно-лечебная амбулаторная психиатрическая помощь отличается от диспансерного наблюдения:
- а) частотой осмотров пациента врачом-психиатром.
  - б) продолжительностью наблюдения и лечения.
  - в) степенью добровольности.
  - г) объёмом оказываемой терапевтической помощи.
- 111 Консультативно-лечебная амбулаторная психиатрическая помощь отличается от диспансерного наблюдения:
- а) частотой осмотров пациента врачом-психиатром.
  - б) продолжительностью наблюдения и лечения.
  - в) степенью добровольности.
  - г) объёмом оказываемой терапевтической помощи.
- 112 Конфабуляции относятся к расстройствам:
- а) памяти
  - б) мышления
  - в) сознания
  - г) воли
- 113 Корсаковский синдром относится к расстройствам:
- а) памяти
  - б) сознания
  - в) мышления
  - г) эмоций
- 114 Критерии умственной отсталости:
- а) недоразвитие всех сторон познавательной деятельности
  - б) искаженное развитие
  - в) неравномерность развития
  - г) нарушение предпосылок интеллекта
- 115 Купирование нейролептического синдрома осуществляется:
- а) корректорами
  - б) транквилизаторами
  - в) противосудорожными средствами
  - г) гипотензивными средствами
- 116 Купирование нейролептического синдрома осуществляется:
- а) Корректорами.
  - б) Противосудорожным и средствами.
  - в) Нейролептиками.
  - г) Все перечисленное.

- 117 Легкая степень умственной отсталости:
- а) дебильность
  - б) имбецильность
  - в) идиотия
  - г) ступор
- 118 Лица, перенёвшие острый психоз с последующей стойкой ремиссией, относятся к группе учёта:
- а) Активного диспансерного наблюдения (АДН).
  - б) Диспансерного
  - в) Не подлежат учёту
  - г) Консультативного.
- 119 Маниакальный синдром встречается при всех заболеваниях кроме:
- а) биполярного аффективного расстройства
  - б) шизофрении
  - в) неврозов
  - г) эпилепсии
- 120 Медикаментозными средствами, оказывающими профилактическую помощь в лечении расстройств настроения, являются:
- а) Антидепрессанты.
  - б) Препараты солей лития.
  - в) Психостимуляторы.
- 121 Медицинская психология – это:
- а) психопатология
  - б) отрасль клинической медицины, изучающая клиническое и душевное состояние пациента
  - в) отрасль психологической науки, изучающая психологические аспекты гигиены, профилактики, диагностики, лечения, экспертизы и реабилитации пациентов
  - г) отрасль медицины, изучающая душевное состояние пациентов при различных заболеваниях
- 122 Медицинские учреждения, оказывающие психиатрическую помощь:
- а) вытрезвитель, изолятор, отделение реанимации
  - б) психоневрологический диспансер, психиатрическая больница, кабинеты психиатров в поликлиниках и многопрофильных больницах
  - в) психологические консультации, лаборатории и клубы
  - г) цеха промышленной трудотерапии, ЛТМ, сельскохозяйственные предприятия
- 123 Меры физического стеснения и изоляции могут применяться:
- а) как при недобровольной, так и при добровольной госпитализации дееспособных лиц в психиатрический стационар.
  - б) при недобровольной госпитализации и пребывании в психиатрическом стационаре, когда, по мнению врача-психиатра, иными методами невозможно предотвратить действия, представляющие непосредственную опасность для него или других лиц.
  - в) только в течение первых двух суток с момента помещения лица в психиатрический стационар.
  - г) только с санкции прокурора.

- 124 Меры физического стеснения и изоляции могут применяться:
- а) как при недобровольной, так и при добровольной госпитализации дееспособных лиц в психиатрический стационар.
  - б) при недобровольной госпитализации и пребывании в психиатрическом стационаре, когда, по мнению врача-психиатра, иными методами невозможно предотвратить действия, представляющие непосредственную опасность для него или других лиц.
  - в) только в течение первых двух суток с момента помещения лица в психиатрический стационар.
  - г) только с санкции прокурора.
- 125 Метод временной остановки наружного венозного кровотечения:
- а) наложение жгута
  - б) максимальное сгибание конечности
  - в) наложение давящей повязки
  - г) наложение герметичной повязки
- 126 Может ли алкогольный делирий развиваться у больного без абстинентных явлений:
- а) Да
  - б) Нет
  - в) Иногда
- 127 Мутизм – это:
- а) расстройство речи, характеризующееся неправильным произношением отдельных звуков
  - б) обеднение речи, малый запас слов
  - в) смазанная, запинаясь речь
  - г) состояние, когда пациент не отвечает на вопросы и даже знаками не даёт понять, что он согласен вступить в контакт с окружающими
- 128 На высоте депрессии при биполярном аффективном расстройстве наблюдаются пречисленные симптомы кроме:
- а) бледности кожи
  - б) помолодевшего внешнего облика
  - в) обложенного языка
  - г) похудания
- 129 На консультативного больного оформляется:
- а) Амбулаторная карта 025/у.
  - б) Контрольная карта 030-1 /у.
  - в) Талон на приём к врачу.
  - г) Верно а) и в).
- 130 Наблюдение за пациентом при применении мер физического стеснения отражается медсестрой:
- а) В истории болезни
  - б) В выписном эпикризе
  - в) В дневнике наблюдений
  - г) В листе назначений
- 131 Навязчивые состояния называются:
- а) обсессии
  - б) онейроид
  - в) конфабуляции
  - г) псевдореминисценции
- 132 Назначает или отменяет принудительное лечение психически больным, совершившим противоправные действия:
- а) Комиссия врачей-экспертов
  - б) Суд

- 133 Наиболее злокачественной формой шизофрении является:
- а) Кататоническая форма
  - б) Гебефреническая форма
  - в) Простая форма
  - г) Ничего из перечисленного
- 134 Наиболее злокачественным алкоголизмом является:
- а) Женский.
  - б) Мужской.
  - в) Различий нет.
  - г) Вопрос спорный.
- 135 Наиболее опасные слуховые галлюцинации:
- а) Комментирующие
  - б) Констатирующие
  - в) Императивные
  - г) Всё перечисленное
- 136 Наиболее опасными слуховыми галлюцинациями являются:
- а) комментирующие
  - б) контрастирующие
  - в) императивные
  - г) акаозмы
- 137 Наиболее опасными слуховыми галлюцинациями являются:
- а) Комментирующие,
  - б) Гипнагогические
  - в) ничего из перечисленных
  - г) Императивные.
- 138 Наиболее тяжелая степень интеллектуальной недостаточности:
- а) дебильность
  - б) имбецильность
  - в) идиотия
  - г) ступор
- 139 Наиболее эффективным средством купирования нейролептического синдрома с неусидчивостью является:
- а) Аминазин.
  - б) Реланиум.
  - в) Акинетон.
  - г) галоперидол
- 140 Наиболее эффективным средством купирования нейролептического синдрома с неусидчивостью является:
- а) аминазин
  - б) реланиум
  - в) акинетон
  - г) седуксен
- 141 Нарушение чувствительности по "типу носков" наблюдается у больных с:
- а) Алкогольным полиневритом.
  - б) Белой горячкой.
  - в) Алкогольным бредом ревности.
  - г) Эпилепией



- 142 Нарушения памяти:
- а) амнезия, конфабуляции, псевдореминисценции
  - б) ментизм, шперрунг, обстоятельность
  - в) резонерство, разорванность мышления
  - г) амбивалентность, амбитендентность
- 143 Настроение при дисфории:
- а) Подавленное
  - б) Тревожное
  - в) Раздражительно-злое
- 144 Недобровольная госпитализация в психиатрический стационар – это :
- а) возражение родственников против госпитализации пациента
  - б) госпитализация пациента без его согласия
  - в) госпитализация пациента младше 15 лет без его согласия
  - г) госпитализация пациента бригадой скорой помощи в психиатрическую больницу
- 145 Нейролептический синдром характеризуется:
- а) Неусидчивостью.
  - б) Тремором.
  - в) Скованностью
  - г) Все перечисленное.
- 146 Нейролептический синдром характеризуется:
- а) скованностью
  - б) плаксивость
  - в) депрессией
  - г) манией
- 147 Немотивированное влечение к воровству называется:
- а) kleptomанией
  - б) пироманией
  - в) дипсоманией
  - г) мифоманией
- 148 Неотложные доврачебные мероприятия при отравлении циклодолом:
- а) искусственная вентиляция лёгких
  - б) дезинтоксикация
  - в) внутривенное введение 40% раствора глюкозы и витаминотерапия
  - г) промывание желудка
- 149 Нервная анорексия – это:
- а) патология подросткового возраста
  - б) сознательный упорный отказ от пищи
  - в) девушки болевают чаще мужчин
  - г) все перечисленное
- 150 Неспособность пациента из-за тяжелых психических расстройств понимать значение своих действий и руководить ими называется:
- а) невменяемостью
  - б) недееспособностью
  - в) эпилептическим статусом
  - г) кататоническим ступором
- 151 Обонятельные галлюцинации при шизофрении свидетельствуют о течении болезни:
- а) Благоприятном.
  - б) Неблагоприятном.
  - в) Определить невозможно.
  - г) Не влияют на течение

- 152 Обонятельные галлюцинации при шизофрении свидетельствуют о течении болезни:
- а) благоприятном
  - б) неблагоприятном
  - в) определить невозможно
  - г) ремиссии
- 153 Одним из проявлений аффективного синдрома является:
- а) слабоумие
  - б) навязчивость
  - в) театральность
  - г) депрессия
- 154 Олигофреническое слабоумие возникает:
- а) в раннем возрасте (до 3 лет)
  - б) в детском возрасте
  - в) в период зрелости
  - г) независимо от возраста
- 155 Опиаты употребляют:
- а) внутрь
  - б) под кожу, внутривенно
  - в) в виде курения, ингаляций
  - г) всеми указанными способами
- 156 Осложнения, которые могут появиться при назначении нейролептиков:
- а) нарушения памяти
  - б) припадки
  - в) паркинсоноподобные расстройства
  - г) повышение артериального давления
- 157 Основанием помещения больного в интернат для психохроников является:
- а) Хроническое психическое заболевание с частыми обострениями,
  - б) Недееспособность,
  - в) Отсутствие опекуна.
  - г) Отсутствие родственников
- 158 Основаниями для госпитализации в психиатрический стационар являются:
- а) просьба родственников больного.
  - б) решение главного врача психоневрологического диспансера.
  - в) наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра о проведении обследования или лечения в стационарных условиях, либо постановление судьи, а также необходимость проведения психиатрической экспертизы.
  - г) наличие у лица тяжёлого психического расстройства.
- 159 Основаниями для госпитализации в психиатрический стационар являются:
- а) просьба родственников больного.
  - б) решение главного врача психоневрологического диспансера.
  - в) наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра о проведении обследования или лечения в стационарных условиях, либо постановление судьи
  - г) наличие у лица тяжёлого психического расстройства.
- 160 Основное правило ухода за депрессивным больным:
- а) режим нестеснения
  - б) постельный режим
  - в) усиленное наблюдение
  - г) проведение медико – педагогических мероприятий

- 161 Основной тенденцией алкоголизма является:
- а) Рост во всем мире.
  - б) Снижение числа больных.
  - в) Стабилизация распространенности болезни.
  - г) Рост в России
- 162 Основные клинические признаки биполярного расстройства:
- а) Наличие бреда, галлюцинаций
  - б) Наличие аффективных синдромов (фаз)
  - в) Расстройство сознания
  - г) все перечисленное
- 163 Основные правила по применению методов физического стеснения пациента в психиатрическом стационаре:
- а) фиксировать с помощью медперсонала
  - б) фиксировать на время не более 6 часов
  - в) получить письменное разрешение врача на фиксацию с указанием времени фиксации
  - г) сообщить дежурному врачу о необходимости фиксации в течение смены
- 164 Основные признаки синдрома Кандинского – Клерамбо:
- а) повышение настроения, речедвигательных и интеллектуально-мнестических функций
  - б) психический автоматизм, псевдогаллюцинации, бред воздействия
  - в) утомляемость, раздражительность, бессонница
  - г) утрата желаний, интересов в сочетании с безволием
- 165 Основные расстройства восприятия:
- а) амнезия, абулия, афазия
  - б) иллюзии, галлюцинации, сенестопатии
  - в) резонерство, навязчивости
  - г) амбивалентность, амбитендентность
- 166 Основные формы бреда:
- а) паранойяльный, параноидный, парафренный
  - б) подверженный коррекции и неменяемый
  - в) отношения, значения, высокого происхождения
  - г) индуцированный, многофакторный
- 167 Основными невротическими синдромами являются все, кроме:
- а) фобического, обсессивного
  - б) астенического, ипохондрического
  - в) психоорганического
  - г) невротической депрессии
- 168 Основными признаками астенического синдрома являются:
- а) абулия, афазия, амнезия
  - б) бессонница, бродяжничество, беспокойство
  - в) утомляемость, раздражительность, бессонница
  - г) анорексия, негативизм, сонливость
- 169 Основными признаками синдрома Кандинского - Клерамбо являются:
- а) невозможность запомнить что-либо на короткий период
  - б) одновременное появление двух противоположных желаний
  - в) психический автоматизм, псевдогаллюцинации
  - г) одновременное совершение двух противоположных действий

- 170 Основными характерными свойствами реактивных состояний являются:
- а) временный и обратимый характер
  - б) принадлежность к расстройствам психогенного характера
  - в) общность с невротами
  - г) все перечисленное
- 171 Основой слабоумия являются:
- а) Грубые органические поражения клеток головного мозга
  - б) Функциональные расстройства высшей нервной деятельности
  - в) Хроническая соматическая патология
  - г) Всё перечисленное
- 172 Отказ опекуна взять из психиатрического стационара недееспособного больного с ремиссией предусматривает:
- а) Немедленную выписку больного,
  - б) Оформление в ПНИ,
  - в) Обращение в суд.
  - г) Обращение в орган опеки и попечительства.
- 173 Отказ опекуна взять из психиатрического стационара недееспособного пациента с ремиссией предусматривает:
- а) немедленную выписку пациента
  - б) оформление в психоневрологический интернат
  - в) обращение в суд
  - г) обращение в органы опеки и попечительства
- 174 Отличие иллюзий от галлюцинаций заключается в:
- а) наличии или отсутствии внешнего раздражителя
  - б) содержании переживаний
  - в) степени нарушения сознания
  - г) степени нарушения мышления
- 175 Паралогичное мышление характеризуется:
- а) склонностью к пустым рассуждениям
  - б) отсутствием связи между отдельными мыслями или даже словами
  - в) полной хаотичностью, бессмысленностью мышления
  - г) отсутствием в мышлении логической связи
- 176 Патологические рефлексии наблюдаются при;
- а) Инсулинокоматозной терапии.
  - б) После эпилептического припадка.
  - в) После электрошока.
  - г) Все перечисленное.
- 177 Патологическое опьянение развивается:
- а) при систематическом употреблении больших доз алкоголя
  - б) при запоях
  - в) через несколько дней после массивного употребления алкоголя на фоне абстинентного синдрома
  - г) как индивидуальная реакция на однократный прием иногда даже совсем небольшой дозы алкоголя
- 178 Пациентам с невротической формой депрессии курс лечения проводится в:
- а) загородных психиатрических больницах
  - б) психиатрическом отделении городской психиатрической больницы
  - в) дневном стационаре психоневрологического диспансера
  - г) неврологическом отделении городской клинической больницы

- 179 Пациенту, помещённому в психиатрический стационар добровольно, при его требовании о выписке:
- а) не может быть отказано.
  - б) может быть отказано комиссией врачей-психиатров при наличии оснований для госпитализации в недобровольном порядке.
  - в) может быть отказано единоличным решением лечащего врача.
  - г) может быть отказано решением главного врача.
- 180 По данным ВОЗ, наибольшее влияние на возникновение заболеваний населения оказывают:
- а) организация и качество медицинской помощи
  - б) экологическая обстановка
  - в) социально-экономические условия и образ жизни населения
  - г) наследственность
- 181 Повторение пациентом слов и фраз окружающих называется:
- а) дислалия
  - б) эхолалия
  - в) дизартрия
  - г) заикание
- 182 Повышение толерантности к алкоголю характерно для:
- а) первой стадии алкоголизма
  - б) второй стадии алкоголизма
  - в) третьей стадии алкоголизма
  - г) бытового пьянства
- 183 Повышение толерантности к наркотику ярко выражено:
- а) на первой стадии наркомании
  - б) на второй стадии наркомании
  - в) на третьей стадии наркомании
  - г) при абстинентном синдроме
- 184 Под диспансерным наблюдением понимают:
- а) систематический осмотр пациентов для профилактики обострения заболевания и лечения
  - б) лечение и наблюдение пациентов с психическими расстройствами без их госпитализации
  - в) осмотр врачом пациентов для оформления на лечение в психиатрическую больницу
  - г) посещение пациентов на дому для оформления или подтверждения инвалидности
- 185 Под невменяемостью понимают:
- а) неспособность пациента говорить и отвечать на вопросы
  - б) неспособность пациента по психическому состоянию контролировать свои действия и отвечать за них
  - в) высокую степень алкогольного опьянения
  - г) выраженное слабоумие
- 186 Под принудительным лечением понимают:
- а) насильственное лечение и кормление пациента
  - б) лечение пациента, совершившего общественно опасное деяние, признанного судом невменяемым, назначившего ему принудительные меры медицинского характера
  - в) фиксация пациента, чтобы он не причинил вреда себе и окружающим
  - г) изменение лечения пациенту, нарушившему режим в отделении

- 187 Показателями оценки уровня сформированности компетенций являются:
- а) знания
  - б) умения
  - в) способы деятельности
  - г) знания, умения, способы деятельности
- 188 Положение при транспортировке пациента с симптомами шока:
- а) лёжа с возвышенным головным концом
  - б) лёжа с возвышенным ножным концом
  - в) положение сидя
  - г) любое положение, удобное для пациента
- 189 Получение согласия пациента на госпитализацию в психиатрический стационар
- а) Не оформляется в медицинской документации
  - б) Оформляется записью дежурного врача или врача скорой помощи
  - в) Оформляется специальным бланком установленной формы за подписью пациента или его законного представителя и врача-психиатра
  - г) Оформляется медсестрой при госпитализации пациента
- 190 Получение согласия пациента на госпитализацию в психиатрический стационар
- а) Не оформляется в медицинской документации
  - б) Оформляется записью дежурного врача или врача скорой помощи
  - в) Оформляется специальным бланком установленной формы за подписью пациента или его законного представителя и врача-психиатра
  - г) Оформляется медсестрой при госпитализации пациента
- 191 Помрачение сознания отмечается при:
- а) алкогольном делирии
  - б) алкогольном галлюцинозе
  - в) алкогольном бреде ревности
  - г) болезни Корсакова
- 192 Постановка на учёт подростка, злоупотребляющего наркотиками, осуществляется:
- а) По просьбе подростка.
  - б) По просьбе его попечителя.
  - в) По просьбе администратора школы.
  - г) Ничего из перечисленного.
- 193 Право граждан на охрану здоровья гарантируется:
- а) Трудовым кодексом
  - б) Конституцией РФ
  - в) Гражданским кодексом
  - г) Программой развития здравоохранения
- 194 Право на получение информации о своих правах, а также в доступной форме и с учётом психического состояния информации о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения имеют:
- а) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением.
  - б) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар.
  - в) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера.
  - г) все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи.

- 195 Право на получение информации о своих правах, а также в доступной форме и с учётом психического состояния информации о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения имеют:
- а) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением.
  - б) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар.
  - в) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера.
  - г) все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи.
- 196 Пребывание лица в психиатрическом стационаре в недобровольном порядке продолжается:
- а) до полного выздоровления.
  - б) до улучшения психического состояния.
  - в) в период сохранения оснований, по которым была проведена госпитализация.
  - г) не более трёх месяцев.
- 197 При алкоголизме абстинентный синдром формируется на этапе:
- а) систематического употребления алкоголя
  - б) в 1 стадии заболевания
  - в) при переходе во 2 стадию
  - г) во 2 стадии
- 198 При алкогольном психозе характерен вариант помрачения сознания:
- а) онейроид
  - б) делирий
  - в) амнезия
  - г) кома
- 199 При астеническом синдроме отмечается:
- а) абулия, афазия, амнезия
  - б) утомляемость, раздражительность, бессонница
  - в) анорексия, негативизм
  - г) психический автоматизм, псевдогаллюцинации
- 200 При госпитализации ребенка 11 лет в психиатрический стационар согласие на госпитализацию и лечение подписывает:
- а) сам ребенок
  - б) мать или опекун
  - в) участковый милиционер
  - г) лечащий врач
- 201 При госпитализации ребенка 15 лет в психиатрический стационар согласие на госпитализацию и лечение подписывает:
- а) сам ребенок
  - б) социальный работник
  - в) участковый милиционер
  - г) лечащий врач
- 202 При интоксикационном делирии пациенту необходимо:
- а) запретить употребление алкоголя
  - б) провести дезинтоксикационную и дегидратационную терапию
  - в) госпитализировать в инфекционное отделение
  - г) назначить нейролептики

- 203 При истерическом припадке отмечается:
- а) сохранение реакции зрачков на свет
  - б) отсутствие реакции зрачков на свет
  - в) прикусывание языка
  - г) непроизвольное мочеиспускание и дефекация
- 204 При наличии суицидальных тенденций медсестра должна:
- а) Ввести пациенту 2,0 реланиума
  - б) Применить методы физического стеснения
  - в) Установить неотлучное наблюдение, доложить врачу, проверять постель, одежду, карманы и т.д.
  - г) Ничего из перечисленного
- 205 При нарушении сознания у пациента отмечается:
- а) Дезориентация
  - б) нарушение памяти
  - в) Нарушение мышления
  - г) Всё перечисленное
- 206 При неврастении ведущее место в клинической картине заболевания занимает синдром:
- а) астенический
  - б) гефебренический
  - в) Кандинского – Клерамбо
  - г) Корсакова
- 207 При неврозоподобной симптоматике пациентам назначают:
- а) нейролептики
  - б) транквилизаторы
  - в) корректоры
  - г) антибиотики
- 208 При ортостатическом коллапсе пациенту, получающему нейролептики, необходимо:
- а) ввести по назначению врача сердечные средства, кислород под кожу
  - б) ввести по назначению врача кордиамин, кофеин
  - в) по назначению врача отменить нейролептики, дать обезболивающее
  - г) сделать горячую ножную ванну, поставить горчичники на область спины
- 209 При острой мании неотложными мерами могут быть все, кроме:
- а) ограничения подвижности больного
  - б) срочного парентерального введения нейролептиков
  - в) амбулаторного лечения
  - г) неотлучного строгого надзора
- 210 При параноидной шизофрении характерно выделение следующих синдромов:
- а) галлюцинаторного
  - б) гебефренического
  - в) бредового
  - г) верно а) и в)
- 211 При паранойальном синдроме отмечается:
- а) аменция
  - б) ступор
  - в) сутяжничество
  - г) резонерство



- 212 При паркинсоноподобном расстройстве, возникшем в результате лечения психотропными препаратами, назначают:
- а) корректоры
  - б) нейролептики
  - в) транквилизаторы
  - г) седативные средства
- 213 При получении согласия на лечение дееспособного лица, страдающего психическим расстройством, информацию о характере расстройства и лечении:
- а) обязан предоставить данному лицу врач.
  - б) может предоставить данному лицу любой специалист, участвующий в оказании психиатрической помощи.
  - в) может предоставить данному лицу медсестра психиатрического учреждения.
  - г) может предоставить врач не самому лицу, страдающему психическим расстройством, а его родственникам.
- 214 При получении согласия на лечение дееспособного лица, страдающего психическим расстройством, информацию о характере расстройства и лечении:
- а) обязан предоставить данному лицу врач.
  - б) может предоставить данному лицу любой специалист, участвующий в оказании психиатрической помощи.
  - в) может предоставить данному лицу медсестра психиатрического учреждения.
  - г) может предоставить врач не самому лицу, страдающему психическим расстройством, а его родственникам
- 215 При проведении учебного процесса, фото-, видео- или киносъемок необходимо получать предварительное согласие:
- а) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи.
  - б) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением больных, состоящих под диспансерным наблюдением.
  - в) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением больных, госпитализированных в психиатрический стационар в недобровольном порядке.
  - г) только от больных, госпитализированных в психиатрический стационар в недобровольном порядке, и лиц, в отношении которых применяются принудительные меры медицинского характера.
- 216 При проведении учебного процесса, фото-, видео- или киносъемок необходимо получать предварительное согласие:
- а) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи.
  - б) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением больных, состоящих под диспансерным наблюдением.
  - в) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением больных, госпитализированных в психиатрический стационар в недобровольном порядке.
  - г) только от больных, госпитализированных в психиатрический стационар в недобровольном порядке, и лиц, в отношении которых применяются принудительные меры медицинского характера.

- 217 При психомоторном возбуждении медсестре необходимо:
- а) Применить меры физического стеснения
  - б) Ввести В/в нейролептики
  - в) Доложить врачу, по назначению врача применить меры физического стеснения, сделать запись в дневнике наблюдений и журнале учёта мер стеснения
  - г) Привлечь силы других пациентов для принудительной фиксации
- 218 При сердечно-лёгочной реанимации в тройной приём Сафара не входит:
- а) запрокидывание головы
  - б) положение на боку
  - в) выдвижение нижней челюсти вверх
  - г) открывание рта
- 219 При серийных эпилептических припадках пациенту необходимо ввести:
- а) аминазин
  - б) амитриптимен
  - в) стелазин
  - г) реланиум
- 220 При СПИДе возможны психические расстройства:
- а) реактивная депрессия
  - б) ипохондрическая фиксация на болезни
  - в) слабоумие
  - г) всё перечисленное
- 221 При суицидальных высказываниях назначают следующие виды надзора
- а) Усиленное наблюдение
  - б) Общий режим
  - в) Строгий надзор
  - г) Без режимных моментов
- 222 При туберкулёзе возможны все психические расстройства, кроме:
- а) астении
  - б) деменции
  - в) эйфории
  - г) ипохондричности
- 223 При эпилепсии, медсестре необходимо:
- а) Удерживать силой конечности. Для профилактики прикуса языка применить языкодержатель
  - б) Ввести в/в 2,0 реланиума
  - в) Фиксировать пациента
  - г) Оберегать голову подложив мягкую ткань, не применять силу, положить пациента на бок, расстегнуть одежду
- 224 Применение мер физического стеснения возможно на срок:
- а) До 1 часа
  - б) Постоянно в течении всего срока лечения в стационаре
  - в) Ограниченный, на период действия пациента представляющего опасность
  - г) На период нахождения пациента на строгом надзоре
- 225 Приобретенное слабоумие называется:
- а) деменцией
  - б) аменцией
  - в) умственной отсталостью
  - г) эпилепсией

- 226 Профессиональная компетентность – это:
- а) степень развития личности
  - б) степень обученности
  - в) совокупность профессиональных и личностных качеств
  - г) вид профессиональной деятельности
- 227 Проявление острого алкогольного психоза:
- а) речедвигательное возбуждение, приступы ярости, депрессия
  - б) лихорадка, рвота, желудочно-кишечные расстройства
  - в) делирий, галлюциноз, параноид
  - г) сенестопатии, обсессии, иллюзии
- 228 Проявлением мании является:
- а) повышенное настроение
  - б) сниженное настроение
  - в) суицидальные мысли
  - г) апатия
- 229 Псевдореминисценции относятся к расстройствам:
- а) сознания
  - б) памяти
  - в) ощущений
  - г) мышления
- 230 Психиатр, осматривающий психически больного на дому, и впервые вынесший решение о госпитализации, должен иметь:
- а) Санкцию суда на осмотр,
  - б) Санкцию суда на госпитализацию,
  - в) Согласие пациента
  - г) согласие родственников
- 231 Психиатрическая помощь считается добровольной, если она оказывается:
- а) по просьбе или с согласия самого пациента или его законного представителя
  - б) по просьбе близких родственников пациента.
  - в) только при самостоятельном (активном) обращении пациента в психиатрическое учреждение.
  - г) по направлению участкового врача территориальной поликлиники.
- 232 Психическая зависимость от алкоголя развивается:
- а) сразу после употребления первой же дозы алкоголя
  - б) на первой стадии алкоголизма
  - в) на второй стадии алкоголизма
  - г) на третьей стадии алкоголизма
- 233 Психические расстройства с чёткой клиникой характерны:
- а) для взрослых
  - б) для детей
  - в) для подростков
  - г) для всех групп
- 234 Психопатии это:
- а) Соматическое заболевание
  - б) Расстройство личности
  - в) Всё перечисленное
  - г) Ничего из перечисленного

- 235 Психотерапия это воздействие:
- а) Словесное
  - б) Физическое
  - в) Электрическое
  - г) все перечисленное
- 236 Психотропные лекарственные средства – это:
- а) средства для улучшения памяти
  - б) средства, действующие в отношении психопатологической симптоматики
  - в) препараты, вызывающие галлюцинации
  - г) наркотики
- 237 Развитие «госпитализма» у больных шизофренией связано со всем кроме:
- а) однообразной длительной жизни в отделении больницы
  - б) общения с психически больными людьми
  - в) ограничения контактов
  - г) бездеятельности, скудности впечатлений
- 238 Разорванность мышления характеризуется:
- а) склонностью к пустым рассуждениям
  - б) отсутствием связи между отдельными мыслями или даже словами
  - в) полной хаотичностью, бессмысленностью мышления
  - г) отсутствием в мышлении логической связи
- 239 Расстройства памяти наиболее характерны для:
- а) органических заболеваний головного мозга
  - б) шизофрении
  - в) психопатии
  - г) кататонического синдрома
- 240 Реабилитационные мероприятия при злокачественной шизофрении включают:
- а) внутриотделенческую трудовую терапию
  - б) преодоление явлений «госпитализма»
  - в) работу в лечебных мастерских
  - г) все перечисленное
- 241 Реактивное состояние – это:
- а) быстрое разрушительное действие при помрачении сознания
  - б) расстройства, вызванные психотравмирующей ситуацией, стрессом
  - в) реакция на прекращение лечения
  - г) психические изменения во время перелёта на реактивном самолёте
- 242 Резонёрство характеризуется:
- а) склонностью к пустым рассуждениям
  - б) отсутствием связи между отдельными мыслями или даже словами
  - в) полной хаотичностью, бессмысленностью мышления
  - г) отсутствием в мышлении логической связи
- 243 Реланиум показан при лечении:
- а) неврозов
  - б) реактивных состояний
  - в) хронического алкоголизма
  - г) всего перечисленного
- 244 Ремиссия при шизофрении – это:
- а) приступы речедвигательного возбуждения
  - б) ослабление психопатологической симптоматики между приступами
  - в) обострение психопатологических симптомов
  - г) помрачение сознания

- 245 Риск передачи по наследству эпилепсии возрастает, когда в семье болен;
- а) Отец.
  - б) Мать.
  - в) Бабушка.
  - г) Не имеет значения
- 246 Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать:
- а) его сотрудники по работе.
  - б) участковый врач территориальной поликлиники.
  - в) судебно-следственные органы.
  - г) никому не дано такого права.
- 247 Серийные эпилептические припадки – это:
- а) одинаковые ежедневные судорожные приступы в течение болезни
  - б) нарастающие приступы речедвигательного возбуждения
  - в) судорожные пароксизмы, следующие один за другим до 40 раз в сутки
  - г) частые приступы с потерей сознания, между припадками пациент приходит в сознание
- 248 Симптом, характерный для перелома основания черепа:
- а) истечение ликвора из носа
  - б) головная боль
  - в) головокружение
  - г) кровотечение из уха
- 249 Синдром Кандинского – Клерамбо – это синдром:
- а) психического автоматизма
  - б) астенический
  - в) маниакальный
  - г) аментивный
- 250 Синдром острой сосудистой недостаточности характеризуется:
- а) сердечной астмой, отёком лёгких
  - б) шоком, коллапсом, обмороком
  - в) гипертермией
  - г) гипертензией
- 251 Смирительные рубашки в психиатрических больницах отменил:
- а) Ф. Пинель.
  - б) Ж.Э. Эскироль.
  - в) Дж. Конолли.
  - г) С. Корсаков
- 252 Снижение памяти на текущие события и яркие воспоминания прошлого описаны:
- а) Э. Крепелином.
  - б) С.Корсаковым.
  - в) З.Т. Рибо.
  - г) Э.Блейлером
- 253 Снижение толерантности к алкоголю отмечается у пациента при:
- а) первой стадии алкоголизма
  - б) второй стадии алкоголизма
  - в) третьей стадии алкоголизма
  - г) бытовом пьянстве

- 254 Снижение толерантности к наркотику отмечается:
- а) на первой стадии наркомании
  - б) на второй стадии наркомании
  - в) на третьей стадии наркомании
  - г) при абстинентном синдроме
- 255 Снятию с психиатрического учёта подлежат больные с:
- а) Стойкой ремиссией.
  - б) Категорическим отказом.
  - в) Поменявшие место жительства.
  - г) Верно а) и в).
- 256 Согласие больного на госпитализацию берётся:
- а) При госпитализации больного в психиатрический стационар в состоянии острого психоза
  - б) Во всех случаях при госпитализации больного в психиатрический стационар
  - в) При госпитализации больного в состоянии острого психоза или выраженной деменции
- 257 Согласие на госпитализацию полученное от больного в состоянии психоза:
- а) Должно быть подтверждено свидетелями
  - б) Принимается во внимание, если оно дано добровольно без принуждения
  - в) Не имеет правового значения
- 258 Согласно приказу МЗ РФ от 04.03.2003 №73 длительность реанимационных мероприятий составляет:
- а) не менее 15 минут
  - б) не менее 25 минут
  - в) не менее 30 минут
  - г) не менее 1 часа
- 259 Сопор проявляется:
- а) патологическим сном
  - б) неподвижностью больных (с закрытыми глазами и отсутствием мимики)
  - в) при сильном раздражении лишь стереотипными защитными реакциям
  - г) всем перечисленным
- 260 Состояние выключенного сознания:
- а) Сумеречное состояние
  - б) Кома
  - в) Делирий
  - г) Онейроид
- 261 Состояние эйфории предполагает приподнятое настроение с:
- а) Творческой активностью,
  - б) Двигательной активностью.
  - в) Нарушением питания
  - г) Беспечностью.
- 262 Спинной мозг заканчивается на уровне:
- а) Копчика.
  - б) Крестца.
  - в) 11 поясничного позвонка.
  - г) 12 поясничного позвонка

- 263 Стадии алкоголизма:
- а) пивная, винная, водочная
  - б) зависимость психическая, физическая, алкогольная деградация
  - в) галлюциноз, делирий и параноид
  - г) похмелье, пропивание вещей, продажа квартиры
- 264 Статистика утверждает, что большинство послеродовых психозов - это:
- а) Интоксикационные.
  - б) МДП.
  - в) Неврозы
  - г) Шизофрения.
- 265 Ступор – это:
- а) расстройство мышления
  - б) двигательное расстройство
  - в) расстройство памяти
  - г) расстройство ощущений
- 266 Ступор с явлениями восковой гибкости проявляется всем перечисленным, кроме:
- а) состояния обездвиженности
  - б) сохранения любого изменения позы
  - в) резкого напряжения мышц с противодействием при попытке изменить позу
  - г) появления восковой гибкости в жевательных мышцах, затем в мышцах шеи. верхних и нижних конечностях
- 267 Суицидальное поведение у больных выражается:
- а) в мыслях о бессмысленности существования
  - б) в высказываниях о безвыходности ситуации, отсутствии надежд на излечение
  - в) в суицидальных мыслях
  - г) во всем перечисленном
- 268 Сумеречное расстройство сознания может проявиться:
- а) дурашливостью
  - б) ступором
  - в) анорексией
  - г) снохождением
- 269 Термин "шизофрения" введен:
- а) Э. Крепелином.
  - б) С. Корсаковым.
  - в) Э. Блейлером.
  - г) В.Кандинским
- 270 Тихая, монотонная медленная речь присуща больным с:
- а) Кататонией.
  - б) Бредом преследования.
  - в) Бредом громадности.
  - г) Депрессией.
- 271 Тоническая фаза эпилептического припадка продолжается:
- а) 5 – 30 секунд
  - б) 1 – 2 минуты
  - в) 3 – 5 минут
  - г) 5 – 10 минут

- 272 У пациента в психиатрическом стационаре могут быть ограничены следующие права:
- встречаться с адвокатом и священнослужителем наедине.
  - выписывать газеты и журналы.
  - иметь и приобретать предметы не первой необходимости, алкоголь, табачные изделия.
  - обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему отделением по вопросам лечения, обследования, выписки из психиатрического стационара.
- 273 Узкие зрачки, сухость кожи, следы множественных инъекций на предплечьях, бёдрах, деградация личности характерны для:
- Онкологических больных.
  - Наркоманов.
  - Алкоголиков.
  - Психически больных
- 274 Узкие зрачки, сухость кожи, следы множественных инъекций на предплечьях, бедрах, деградация личности характерны для:
- онкологических больных
  - больных наркоманией
  - больных алкоголизмом
  - больных шизофренией
- 275 Утрата желаний, интересов в сочетании с безволием встречается при синдроме:
- апато-абулическом
  - маниакальном
  - астеническом
  - Кандинского – Клерамбо
- 276 Утрата чувства голода, отсутствие аппетита характерны для:
- булимии
  - полидипсии
  - анорексии
  - парорексии
- 277 Фальсифицированное лекарственное средство – это:
- лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.
  - лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе.
  - лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.
  - лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства.
- 278 Причинами умственной отсталости являются:
- внутриутробные инфекции и интоксикации
  - энцефалиты у школьников
  - социально – педагогическая запущенность ребенка
  - тяжелая физическая работа



- 279 Для делирия характерны:
- а) истинные зрительные галлюцинации
  - б) зрительные псевдогаллюцинации
  - в) конфабуляции
  - г) псевдореминисценции
- 280 Фамилия врача, описавшего тотальное слабоумие с распадом речи:
- а) Г, Вернике.
  - б) А. Альцгеймер.
  - в) А. Пик,
  - г) С. Корсаков.
- 281 Физическая зависимость от алкоголя развивается:
- а) сразу после употребления первой же дозы алкоголя
  - б) на первой стадии алкоголизма
  - в) на второй стадии алкоголизма
  - г) на третьей стадии алкоголизма
- 282 Фиксационная амнезия может быть определена как:
- а) амнезия следующих за черепно – мозговой травмой событий
  - б) незапоминание текущих событий
  - в) паталогическое фантазирование
  - г) амнезия событий, произошедших много лет назад
- 283 Этические нормы медицинского работника определяются:
- а) умениями и навыками
  - б) законами и приказами
  - в) этническими особенностями региона
  - г) моральной ответственностью
- 284 Характерной особенностью фобий при неврозе навязчивых состояний является:
- а) Сочетание навязчивых состояний с галлюцинациями
  - б) Сочетание навязчивых состояний с защитными действиями и ритуалами
  - в) Ничего из перечисленного
  - г) Всё из перечисленного
- 285 Хранение, раздача сильнодействующих медикаментов медицинской сестрой осуществляется в кабинете:
- а) старшей сестры
  - б) врача
  - в) процедурном
  - г) лекарственном
- 286 Цепи с психически больных впервые были сняты в:
- а) Англии.
  - б) Франции.
  - в) Австрии.
  - г) России
- 287 Что относится к основным правам пациента, закрепленным в 323-ФЗ:
- а) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья
  - б) получение информации о своих правах и обязанностях, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья
  - в) получение информации о медицинской организации
  - г) получение информации о состоянии своего здоровья

- 288 Что относится к основным правам пациента, закрепленным в 323-ФЗ:
- а) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья
  - б) получение информации о своих правах и обязанностях, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья
  - в) получение информации о медицинской организации
  - г) получение информации о состоянии своего здоровья
- 289 Что относится к основным правам пациента, закрепленным в 323-ФЗ:
- а) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья
  - б) получение информации о своих правах и обязанностях, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья
  - в) получение информации о медицинской организации
  - г) получение информации о состоянии своего здоровья
- 290 Шизофренией наиболее часто заболевают в возрасте:
- а) 15-35 лет
  - б) зрелом
  - в) старческом
  - г) одинаково во всех возрастных группах
- 291 Шизофрения относится к категории болезней:
- а) Реактивных
  - б) Психогенных
  - в) Эндогенных
- 292 Шизофрения предполагает утрату единства:
- а) Воли и эмоций
  - б) Собственного «Я»
  - в) Всей психики в целом
- 293 Онейроид можно определить как:
- а) разновидность делирия
  - б) сновидное помрачение сознания
  - в) вариант синдрома Корсакова
  - г) вариант синдрома Кандинского – Клерамбо
- 294 Шизофрения, параноидной формы чаще возникает:
- а) В подростковом возрасте
  - б) В возрасте 20-40 лет
  - в) Старческом возрасте
  - г) В детском возрасте
- 295 Школьные фобии наиболее часты:
- а) в 1 классе у младших школьников
  - б) в 7 классе у подростков
  - в) в 11 классе у выпускников
  - г) преимущественно в возрасте нет
- 296 Причинами аменции являются:
- а) маниакальные состояния
  - б) депрессивные состояния
  - в) интоксикации
  - г) травмы головы

297 Эквивалент судорожного припадка на уровне настроения:

- а) Депрессия
- б) Дисфория
- в) Эйфория
- г) Всё перечисленное

298 Эпилептические изменения личности:

- а) Манерность, эмоциональная неадекватность, аутизм
- б) Слабодушие, раздражительность, слезливость, недоверчивость к близким
- в) Обстоятельность, тугоподвижность психических процессов, вязкость, гиперсоциальность
- г) Всё перечисленное

299 Эпилептический статус – это:

- а) оформление документов на инвалидность пациенту с эпилепсией
- б) серия приступов, между которыми пациент не приходит в сознание
- в) речедвигательная заторможенность пациента с эпилепсией
- г) невозможность водить автомашину пациенту с эпилепсией

300 Фиксационная амнезия характеризуется:

- а) потерей способности запоминать
- б) отсутствием памяти на текущие события
- в) выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших текущему моменту
- г) всем перечисленным