

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ (ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО»**

**(для операционных медицинских сестёр, прошедших обучение
по циклам 17.1 "Сестринское операционное дело",
Профессиональной переподготовки по специальности "Операционное дело")**

- 1 Операция наложения искусственного свища на орган:
 - а) трепанация;
 - б) стомия;
 - в) резекция;
 - г) томия
- 2 К физическому методу окончательной остановки кровотечения относится:
 - а) максимальное сгибание в суставе
 - б) тампонада раны
 - в) диатермокоагуляция
 - г) ушивание сосуда
- 3 Гематурия - это:
 - а) опухоль почки
 - б) наличие крови в моче
 - в) разрыв мочевого пузыря
 - г) внутрибрюшное кровотечение
- 4 К осложнениям со стороны операционной раны относятся все, кроме:
 - а) боль в ране;
 - б) кровотечение;
 - в) инфильтрат;
 - г) гематома
- 5 Смазывание анестетиком поверхности слизистой – это анестезия:
 - а) инфильтрационная;
 - б) поверхностная;
 - в) проводниковая;
 - г) эпидуральная
- 6 Срок завязывания нитей при первично-отсроченном шве:
 - а) до 2 - 3 дней
 - б) до 5 - 6 дней
 - в) от 8 - 9 до 15 дней
 - г) сразу после хирургической обработки
- 7 Способ остановки паренхиматозного кровотечения:
 - а) давящая повязка
 - б) тампонада
 - в) сосудистый шов
 - г) лигирование кровоточащего сосуда

- 8 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
- а) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
 - б) лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей;
 - в) в целях проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях;
 - г) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения
- 9 В операционном блоке посеы воздуха производят:
- а) 4 раза в месяц
 - б) 1 раз в месяц
 - в) 1 раз в 3 месяца
 - г) 1 раз в 6 месяцев
- 10 Признаки ожога II степени:
- а) только гиперемия кожи;
 - б) мраморного цвета струп;
 - в) пузыри с прозрачным содержимым на гиперемированной коже;
 - г) пузыри, наполненные кровью
- 11 При подозрении на острое заболевание органов брюшной полости неотложная помощь включает в себя:
- а) применение тепла на область наибольшей болезненности;
 - б) применение холода на область наибольшей болезненности;
 - в) применение анальгетиков по назначению врача;
 - г) применение спазмолитиков по назначению врача
- 12 Правильность нахождения эндотрахеальной трубки в трахее контролируют:
- а) аускультацией легких;
 - б) по диаметру зрачка;
 - в) по изменению цвета кожных покровов;
 - г) путем подсчета пульса
- 13 Наружным искусственным свищом является:
- а) трахеопищеводный;
 - б) артериовенозный шунт;
 - в) гастростома;
 - г) холедоходуоденоанастомоз
- 14 Кусачки Дальгрена входят в набор инструментов для:
- а) резекции ребра
 - б) трепанации черепа
 - в) ампутации конечности
 - г) аппендэктомии
- 15 Сечение иглы выглядит как:
- а) круг;
 - б) овал;
 - в) треугольник;
 - г) все ответы верны

- 16 Биопсийный материал фиксируется в:
- а) физиологическом растворе
 - б) 0,02% растворе анолита
 - в) 10% растворе формалина
 - г) дистиллированной воде
- 17 Цель применения груза, давящего на рану, в послеоперационном периоде:
- а) уменьшение боли
 - б) предупреждение тромбоза
 - в) предупреждение расхождения краев раны
 - г) предупреждение кровоизлияния
- 18 Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью:
- а) уничтожение всех непатогенных и патогенных микроорганизмов;
 - б) уничтожение вегетативных форм наиболее патогенных микроорганизмов;
 - в) уничтожение на инструментах следов крови и других биологических жидкостей;
 - г) уничтожение споровых микроорганизмов
- 19 Компонент крови, обладающий наиболее выраженным гемостатическим эффектом:
- а) плазма;
 - б) лейкоцитарная масса;
 - в) альбумин;
 - г) протеин
- 20 Предварительную уборку операционной производят с применением:
- а) дез. средства;
 - б) воды;
 - в) сухим способом
- 21 Применение обезболивающих средств при подозрении на «острый живот» опасно следующим:
- а) стимуляцией активности микрофлоры;
 - б) углублением пареза ЖКТ;
 - в) развитием привыкания к анальгетикам;
 - г) искажением клинической картины и затруднением
- 22 Наибольшую угрозу для жизни представляет гемоторакс:
- а) открытый;
 - б) закрытый;
 - в) клапанный
- 23 Иглодержатель с заправленной иглой подается:
- а) к хирургу
 - б) к сестре
 - в) иглой вверх
 - г) иглой вниз
- 24 Условно инфицированными считаются раны:
- а) рубленные
 - б) ушибленные
 - в) укушенные
 - г) операционные

- 25 Флакон с остатками крови после переливания необходимо:
- а) выбросить;
 - б) поставить в холодильник;
 - в) герметически упаковать;
 - г) герметически упаковать и поставить в холодильник
- 26 Пеногасители при отеке легких:
- а) пары амилнитрита;
 - б) спиртовой раствор антифомсилена;
 - в) фторотан;
 - г) закись азота с кислородом
- 27 Полное удаление органа - это:
- а) резекция
 - б) экстракция
 - в) экстирпация
 - г) эвентрация
- 28 Срок окончания послеоперационного периода:
- а) до первых признаков улучшения;
 - б) до снятия швов;
 - в) до выписки из стационара;
 - г) до восстановления трудоспособности
- 29 Как часто обследуют на HBs-антиген медицинских работников, имеющих контакт с кровью и ее компонентами:
- а) при поступлении на работу;
 - б) 1 раз в год;
 - в) 1 раз в 2 года;
 - г) при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год
- 30 К химическим средствам остановки кровотечения относятся:
- а) нитрат серебра
 - б) адреналин
 - в) тромбин
 - г) аспирин
- 31 К механической антисептике относится:
- а) орошение раны
 - б) дренирование раны
 - в) применение гигроскопических и капиллярных материалов
 - г) первичная хирургическая обработка (ПХО)
- 32 Профилактические мероприятия в оперблоке проводятся исходя из положения, что каждый пациент расценивается как потенциальный источник:
- а) гемоконтактных инфекций (гепатит В, С, ВИЧ);
 - б) кишечных инфекций;
 - в) туберкулеза
- 33 К инструментам для разделения тканей относятся все, кроме:
- а) ножниц;
 - б) скальпеля;
 - в) кусачек Люера;
 - г) иглодержателя

- 34 Для наложения швов на кожу используют иглы:
- а) режущие;
 - б) колющие;
 - в) плоские
- 35 Рана является проникающей, если:
- а) в ней находится инородное тело;
 - б) повреждены только кожа и подкожная клетчатка;
 - в) повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка (плевра, брюшина);
 - г) повреждены мышцы и кости
- 36 Возбудитель хирургического сепсиса:
- а) стафилококк
 - б) стрептококк
 - в) пневмококк
 - г) кишечная палочка
- 37 Возможные осложнения в первые сутки после операции:
- а) расхождение швов
 - б) кровотечение
 - в) пролежень
 - г) тромбофлебит
- 38 Какой повязкой фиксируется перевязочный материал на ране подбородка:
- а) Дезо;
 - б) пращевидной;
 - в) колосовидной;
 - г) черепашьей расходящейся
- 39 В посевах воздуха операционной рост колоний золотистого стафилококка, кишечной палочки:
- а) не допускается
 - б) допускается 1 колония в кубическом метре
 - в) допускается 3 колонии в кубическом метре
 - г) допускается 5 колонии в кубическом метре
- 40 К факторам, способствующим развитию сепсиса, относятся:
- а) сахарный диабет
 - б) тиреотоксикоз
 - в) бронхиальная астма
 - г) постинфарктный кардиосклероз
- 41 Метод исследования для диагностики внутрибрюшного кровотечения:
- а) гастроскопия
 - б) лапароскопия
 - в) обзорная рентгеноскопия
 - г) клинический анализ крови
- 42 Ожидаемая частота гнойно-септических инфекций в области хирургического вмешательства при IV классе хирургических операций (гнойные операции):
- а) 1-5;
 - б) 10%;
 - в) до 20%;
 - г) до 29%.

- 43 Зажим хирургу или ассистенту подается:
- а) кольцами по направлению к хирургу
 - б) рабочими концами в сторону хирурга
 - в) раскрытым
 - г) нераскрытым
- 44 .Операционная сестра может дотрагиваться до стерильных объектов:
- а) руками в стерильных перчатках
 - б) руками, обработанными 70% этиловым спиртом
 - в) стерильным инструментом
 - г) руками, обработанными раствором хлоргексидина
- 45 Ножницы подают хирургу в:
- а) закрытом виде ручками к руке хирурга
 - б) открытом виде браншами к руке хирурга
 - в) открытом виде ручками к руке хирурга
 - г) закрытом виде браншами к руке хирурга
- Сестринское операционное дело
- 46 Из крови человека приготавливают:
- а) плазму
 - б) тромбицитарную массу
 - в) желатиноль
 - г) полиглюкин
- Сестринское операционное дело
- 47 При положительной пробе на кровь на инструменте появляется окраска:
- а) зеленая
 - б) розовая
 - в) сине-фиолетовая
 - г) желтая
- 48 К биологической антисептике относятся:
- а) вакцины
 - б) сыворотки
 - в) антибиотики
 - г) сульфаниламиды
- 49 По соображениям асептики нельзя стоять и даже проходить в операционном зале во время операции между:
- а) анестезиологом и капельницей
 - б) столиком операционной сестры и большим инструментальным столом
- 50 Выберите повреждение, которое является сочетанным:
- а) двойной перелом бедра;
 - б) перелом бедер и переднего полукольца таза;
 - в) перелом ребер, разрыв селезенки;
 - г) термический ожог грудной клетки и поражение проникающей радиацией в дозе

- 51 Показание для наложения первично-отсроченного шва на рану:
- а) большая кровопотеря
 - б) возможность развития инфекции
 - в) невозможность стянуть края раны при первичной хирургической обработке
 - г) ранение нерва
- 52 Причины остановки сердца и дыхания при массивных переливаниях крови:
- а) распад эритроцитов
 - б) гемотрансфузионный шок
 - в) избыток лимоннокислого натрия
- 53 Фасцию зашивают:
- а) нерассасывающейся нитью и режущей иглой
 - б) рассасывающейся нитью и колющей иглой
 - в) нерассасывающейся нитью и колющей иглой
 - г) рассасывающейся нитью и режущей иглой
- 54 К достоверным признакам внезапной остановки сердечной деятельности не относится:
- а) отсутствие пульса на сонных артериях;
 - б) внезапная потеря сознания;
 - в) отсутствие самостоятельного дыхания;
 - г) отсутствие тонов сердца
- 55 Время бритья операционного поля перед плановой операцией:
- а) за сутки до операции;
 - б) утром в день операции;
 - в) накануне вечером
- 56 Основным нормативным документом по дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения:
- а) приказ МЗ РФ №170;
 - б) МУ 287-113
 - в) приказ МЗ РФ №408;
 - г) приказ МЗ РФ №720
- 57 Абсолютный признак перелома:
- а) кровоподтек;
 - б) припухлость;
 - в) крепитация костных отломков;
 - г) нарушение функции конечности
- 58 К задачам послеоперационного периода относятся:
- а) профилактика и лечение послеоперационных осложнений;
 - б) ускорение процессов восстановления (регенерации) в органах и тканях;
 - в) контроль за сердечно-сосудистой системой, дыханием, диурезом;
 - г) все перечисленное

- 59 Операционная медицинская сестра для дренирования плевральной полости при пневмотораксе должна приготовить:
- а) троакар
 - б) дренажные трубки
 - в) шприц с длинной иглой для пункции
 - г) зажим
- 60 Ожидаемая частота гнойно-септических инфекций в области хирургического вмешательства при I классе хирургических операций (чистые операции):
- а) 10%;
 - б) до 20%;
 - в) 1-5%;
 - г) до 29%
- 61 К развитию перитонита могут привести все перечисленные факторы, кроме:
- а) воспалительный процесс в брюшной полости;
 - б) травма полых органов;
 - в) травма паренхиматозных органов;
 - г) кровотечение в ЖКТ
- 62 При подготовке пациента к экстренной операции необходимо:
- а) определить рост пациента;
 - б) дать стакан сладкого чая;
 - в) подготовить операционное поле;
 - г) сделать очистительную клизму
- 63 Назначение окклюзионной повязки при клапанном пневмотораксе:
- а) прекращение доступа воздуха;
 - б) прекращение доступа микробов;
 - в) иммобилизация;
 - г) остановка кровотечения
- 64 В набор инструментов для аппендэктомии входят:
- а) зажимы Пеана, зонд Кохера, крючки Фарабефа
 - б) зажимы Пеана, брюшные зеркала, крючки Лангенбека
 - в) крючки Фарабефа, зажимы Микулича, зажимы Бильрота
 - г) зажимы Микулича, крючки Лангенбека, брюшные зеркала
- 65 Специальный инструмент для тромбэктомии:
- а) катетер Фолея
 - б) зонд Блэкмора
 - в) катетер Фогарти
 - г) зонд Бэбкокка
- 66 Операционный зал относится к зоне:
- а) общего режима;
 - б) ограниченного режима;
 - в) строгого режима.
 - г) стерильная

- 67 Глаза, с целью профилактики ВИЧ-инфекции, при попадании в них биологических жидкостей больного, следует промыть:
- а) 1% раствором борной кислоты
 - б) 0,01% раствором перманганата калия
 - в) струей воды
 - г) 20% раствором сульфацила натрия
- 68 Причина гемотранфузионного шока:
- а) переливание инфицированной крови;
 - б) переливание крови с нарушенным сроком хранения;
 - в) быстрая, избыточная трансфузия;
 - г) переливание несовместимой крови
- 69 Анестезия должна быть завершена к моменту:
- а) наложения последнего шва
 - б) началу послойного ушивания раны
 - в) выхода хирурга из операционной
 - г) наложения повязки
- 70 К факторам риска пациента при развитии госпитальных хирургических раневых инфекций относится:
- а) характер основного и сопутствующих заболеваний;
 - б) длительность операции;
 - в) продолжительность предоперационного пребывания пациента в стационаре;
- 71 Эндогенный путь проникновения инфекции в рану:
- а) воздушно-капельный;
 - б) контактный;
 - в) воздушно-пылевой;
 - г) лимфогенный.
- 72 К радикальной операции относится:
- а) обходной анастомоз при раке кишки;
 - б) гастростомия при раке пищевода;
 - в) холецистэктомия;
 - г) биопсия
- 73 Пункция плевральной полости при пневмотораксе проводится в положении больного сидя по среднеключичной линии в межреберьях:
- а) I;
 - б) II-III;
 - в) IV-V;
 - г) VI-VII
- 74 Длительно заживающие ткани должны быть сшиты:
- а) рассасывающимся материалом натурального происхождения
 - б) нерассасывающимся материалом натурального происхождения
 - в) рассасывающимся материалом искусственного происхождения
 - г) нерассасывающимся материалом искусственного происхождения
- 75 Возможные причины вторичных артериальных кровотечений:
- а) применение антикоагулянтов
 - б) отрыв тромба в результате вторичной травмы
 - в) гнойное расплавление стенки сосуда
 - г) механическое давление на сосуд дренажа

- 76 Гематома – это:
- а) скопление крови в брюшной полости;
 - б) скопление крови в подкожно-жировой клетчатке;
 - в) скопление крови в суставе;
 - г) скопление крови в плевральной полости
- 77 Операционная сестра при лапаротомии по поводу разлитого перитонита дополнительно должна приготовить:
- а) отсос
 - б) 0,02% водный раствор хлоргексидина
 - в) большое количество дренажей
 - г) 1% водный раствор хлоргексидина
- 78 Накрытый большой операционный стол считается стерильным в течение (в часах):
- а) 2
 - б) 3
 - в) 6
 - г) 12
- 79 Первично-отсроченный шов накладывается на предварительно обработанную рану:
- а) до появления грануляций;
 - б) на гранулирующую рану;
 - в) на гранулирующую рану после иссечения ее краев и дна
- 80 Учет травм и чрезвычайных ситуаций (порезы, уколы и т.д.), связанных с профессиональной деятельностью персонала, проводятся:
- а) по показаниям;
 - б) по желанию медицинского работника;
 - в) обязательно всех
- 81 Воздушная эмболия может возникнуть при ранении:
- а) пищевода;
 - б) вен голени;
 - в) яремной вены;
 - г) плечевой артерии
- 82 Показанием к наложению окклюзионной повязки является
- а) гемоторакс;
 - б) ранение груди;
 - в) закрытые переломы ребер;
 - г) ушибы грудной клетки
- 83 Длительно заживающие ткани должны быть сшиты:
- а) рассасывающимся материалом;
 - б) не рассасывающимся материалом
- 84 Способ подачи инструментов в руки хирургу - наиболее:
- а) совершенный;
 - б) совершенный и трудный;
 - в) простой и распространенный;
 - г) распространенный

- 85 Абсолютный признак вывиха:
- а) нарушение функции;
 - б) пружинящая фиксация;
 - в) боль;
 - г) отёк
- 86 Иглы, используемые при операции на кишечнике, желудке:
- а) режущие
 - б) колющие
 - в) комбинированные
 - г) тупоконечные
- 87 Что не характерно для злокачественной опухоли:
- а) атипизм строения;
 - б) полиморфизм строения;
 - в) метастазирование;
 - г) наличие капсулы
- 88 Нарушение асептики может осложняться развитием:
- а) аллергической реакции;
 - б) воздушной эмболии;
 - в) абсцесса;
 - г) жировой эмболии
- 89 Полное уничтожение микроорганизмов и их спор:
- а) дезинсекция;
 - б) дезинфекция;
 - в) стерилизация;
 - г) дератизация
- 90 Нити без игл подают хирургу:
- а) руками;
 - б) пинцетом;
 - в) зажимом
- 91 Что такое петля тока:
- а) вход тока;
 - б) выход тока;
 - в) вариант распространения тока в теле человека;
 - г) обугливание эпидермиса
- 92 Опоясывающая боль наблюдается при:
- а) холецистите;
 - б) травме селезенки;
 - в) перфоративной язве желудка;
 - г) панкреатите
- 93 Предоперационные мероприятия, уменьшающие опасность инфицирования операционной раны:
- а) антибиотикотерапия;
 - б) бритье кожных покровов;
 - в) гигиенический душ;
 - г) все перечисленное

- 94 Профилактика нагноения операционной раны:
- а) частые швы на рану;
 - б) рассасывающие швы на рану;
 - в) дренирование раны;
 - г) герметичная повязка
- 95 После вшивания сосудистого протеза возможны все осложнения, кроме:
- а) раннего тромбоза протеза;
 - б) инфицирования эксплантата;
 - в) аневризмы анастомоза;
 - г) атеросклероза эксплантата
- 96 Острая кишечная непроходимость характеризуется всем перечисленным, кроме:
- а) повышением температуры тела;
 - б) нарушением эвакуации кишечного содержимого;
 - в) рвотой;
 - г) болями в животе
- 97 Эвентрация это:
- а) наружное кровотечение из операционной раны;
 - б) расхождение раны с выпадением органов наружу;
 - в) нагноение раны;
 - г) образование послеоперационной вентральной грыжи в раннем сроке
- 98 Влажность в операционной должна быть:
- а) 50% - 60%;
 - б) 100%;
 - в) 20%
- 99 Укажите оптимальный режим стерилизации при паровом методе, рекомендуемый для инструментов из стекла и металла:
- а) 120°C – 30 минут;
 - б) 132°C – 20 минут;
 - в) 120°C - 45 минут;
 - г) 132°C – 45 минут
- 100 Наиболее вероятным источником хирургического сепсиса является:
- а) ожоги II степени
 - б) закрытые переломы
 - в) раны
 - г) карбункулы лица
- 101 Положение пациента на операционном столе на боку с валиком в поясничной области применяется при операциях на:
- а) мочевом пузыре;
 - б) органах живота (передний доступ);
 - в) почках;
 - г) груди
- 102 Способы подачи инструментов операционной медицинской сестрой хирургу:
- а) непосредственно в руки
 - б) выкладывая их на инструментальный столик
 - в) выкладывая их на операционный стол

- 103 Для местной инфильтрационной анестезии применяется:
- а) дикаин
 - б) новокаин
 - в) тримекаин
 - г) совкаин
- 104 Иглы Дешана относятся к инструментам для:
- а) операции по поводу геморроя
 - б) операции по поводу зоба
 - в) венесекции
 - г) грыжесечения
- 105 Биологическая жидкость, наиболее опасная в эпидемиологическом отношении при вирусном гепатите В:
- а) моча;
 - б) слюна;
 - в) кровь;
- 106 Предстерилизационная очистка инструментов проводится с целью:
- а) уничтожение всех непатогенных и патогенных микроорганизмов;
 - б) уничтожение споровых микроорганизмов;
 - в) уничтожение вегетативных форм наиболее патогенных микроорганизмов;
 - г) уничтожение на инструментах следов крови, гноя, лекарственных средств
- 107 Гемоторакс — это скопление крови в:
- а) капсуле сустава;
 - б) плевральной полости;
 - в) брюшной полости;
 - г) околосердечной сумке
- 108 К экстренным операциям относятся:
- а) лапаротомия при разрыве селезенки
 - б) операция по поводу перитонита
 - в) трахеотомия при отеке гортани
 - г) операция при хронической венозной недостаточности
- 109 К диагностическим операциям относится:
- а) аппендэктомия;
 - б) биопсия лимфоузла;
- 110 Проникающей резаной раной живота называется рана с повреждением:
- а) внутренних органов;
 - б) кожи;
 - в) мышц;
 - г) париетальной брюшины
- 111 Способ временного гемостаза при ранении сонной артерии:
- а) наложение давящей повязки;
 - б) жгут-закрутка;
 - в) жгут с противоупором;
 - г) асептическая повязка

- 112 Преимуществами плазменной стерилизации являются все указанные, кроме:
- а) короткая экспозиция;
 - б) невозможность использования целлюлозной упаковки;
 - в) отсутствие необходимости дегазации и охлаждения стерильного материала по окончании цикла стерилизации;
 - г) отсутствие повреждающего действия на стерилизуемые инструменты, снижение затрат на ремонты инструментария и оборудования
- 113 Снятие швов с кожной операционной раны после аппендэктомии происходит на (в сутках):
- а) 3 - 4
 - б) 5 - 6
 - в) 7 - 8
 - г) 14
- 114 Если больной принимал пищу за 40 минут перед экстренной операцией, то следует:
- а) отложить операцию на сутки;
 - б) удалить содержимое желудка через зонд;
 - в) вызвать рвоту;
 - г) ничего не предпринимать
- 115 Диаметр безушковых игл:
- а) больше диаметра нити
 - б) меньше диаметра нити
 - в) диаметр иглы и нити одинаков
- 116 Медицинские отходы класса «Б» (опасные отходы) после дезинфекции упаковываются в пакеты:
- а) белого цвета;
 - б) красного цвета;
 - в) черного цвета;
 - г) желтого цвета
- 117 Дезинфицирующим агентом при воздушном методе стерилизации является:
- а) водяной пар;
 - б) насыщенный пар под давлением;
 - в) газ;
 - г) сухой горячий воздух
- 118 Температура водяной бани при проведении «тепловой пробы»:
- а) 420С - 450С
 - б) 380С - 400С
 - в) 460С - 500С
 - г) 500С - 550С
- 119 Правильное положение пациента после наркоза:
- а) лежа на подушке вверх лицом;
 - б) лежа на подушке, голова повернута на бок;
 - в) лежа без подушки, голова повернута на бок;
 - г) лежа на подушке вниз лицом

- 120 Хирургические иглы изготавливаются по номерам – от № 1 до № 12, чем больше номер, тем игла:
- а) толще
 - б) тоньше
 - в) длиннее
 - г) короче
- 121 При определении группы крови с применением цоликлонов заключение о групповой принадлежности дается через:
- а) 30 секунд
 - б) 1 минуту
 - в) 3 минуты
 - г) 10 минут
- 122 Истечение ликвора из уха или носа является характерным признаком
- а) сотрясения головного мозга;
 - б) сдавления головного мозга;
 - в) перелома свода черепа;
 - г) перелома основания черепа
- 123 Лапчатый пинцет относится к набору:
- а) сосудистому
 - б) травматологическому
 - в) общехирургическому
 - г) нейрохирургическому
- 124 Показатели гемодинамики у пациентов с травматическим шоком
- а) брадикардия, АД снижено;
 - б) тахикардия, АД снижено;
 - в) аритмия, АД снижено;
 - г) тахикардия, АД повышено
- 125 Оптимальная температура воздуха в операционной должна быть:
- а) 18°C;
 - б) 22°C;
 - в) 10° – 12°C;
 - г) 30°C
- 126 Метод обезболивания при оперативном лечении панариция:
- а) инфильтрационная анестезия
 - б) анестезия охлаждением
 - в) проводниковая анестезия по Оберсту-Лукашевичу
 - г) внутривенный наркоз
- 127 Для обеззараживания инструментов используют:
- а) проточную воду
 - б) моющий раствор
 - в) дезинфицирующий раствор
 - г) стерилиант
- 128 Участниками обязательного медицинского страхования являются:
- а) застрахованные лица;
 - б) страхователи;
 - в) федеральный фонд;
 - г) страховые медицинские организации

- 129 Лучшее запоминание предметов, изображений, звука, цвета и т.п. свидетельствует о преобладании у человека:
- а) словесно-абстрактной памяти;
 - б) кратковременной памяти;
 - в) промежуточной памяти;
 - г) наглядно-образной памяти;
 - д) долговременной памяти
- 130 Проба на индивидуальную совместимость крови проводится между:
- а) сывороткой реципиента и кровью донора
 - б) сывороткой донора и кровью реципиента
 - в) цельной кровью донора и реципиента
- 131 Осложнения, встречающиеся при переливании крови:
- а) гипертонический криз;
 - б) острая почечная недостаточность;
 - в) инфаркт миокарда
- 132 При появлении боли и отека в месте перелома после наложения циркулярной гипсовой повязки необходимо:
- а) фиксировать конечность в приподнятом положении;
 - б) ввести обезболивающее средство;
 - в) рассечь повязку по всей длине и развести ее края;
 - г) ввести мочегонное средство
- 133 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
- а) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его жизни или здоровью может быть причинен в ходе противоправных действий;
- 134 Генеральную уборку в операционной проводят:
- а) 1 раз в 7 дней;
 - б) 1 раз в 10 дней;
 - в) 1 раз в месяц
- 135 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:
- а) две;
 - б) три;
 - в) четыре;
 - г) пять
- 136 Вести счет инструментов, салфеток, игл необходимо:
- а) до операции, перед ушиванием операционной раны (полости), после операции
 - б) перед ушиванием полости, после операции
 - в) до и после операции
 - г) после операции

- 137 Медицинские работники имеют право на:
- а) оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
 - б) совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях;
 - в) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя;
 - г) соблюдение врачебной тайны
- 138 При наличии участка некроза в ране необходимо применить:
- а) кортикостероиды
 - б) ферменты
 - в) сульфаниламиды
 - г) гипертонический раствор
- 139 Приоритетная психологическая проблема пациента в предоперационном периоде:
- а) беспокойство за оставленную работу;
 - б) чувство страха;
 - в) дефицит самоухода;
 - г) недооценка тяжести своего состояния
- 140 Симптомы инфицирования послеоперационной раны:
- а) кровотечение;
 - б) отёк;
 - в) местное повышение температуры;
 - г) рвота
- 141 Метод обработки рук, при котором можно добиться их полной стерильности:
- а) Альфреда
 - б) Фюрбрингера
 - в) системой С-4
 - г) ни одним из перечисленных
- 142 Инструменты в автоклаве при давлении в 2 атм. стерилизуют в течение (в минутах):
- а) 20
 - б) 30
 - в) 45
 - г) 60
- 143 Стерилизация изделий медицинского назначения проводится в следующих случаях:
- а) для всех изделий медицинского назначения;
 - б) для изделий медицинского назначения, предназначенных для оказания помощи новорожденным;
 - в) для изделий медицинского назначения, соприкасающихся в процессе манипуляций с раневой поверхностью

- 144 Одним из опасных для жизни осложнений тромбофлебита является:
- а) тромбоз легочной артерии;
 - б) слоновость нижней конечности;
 - в) кровотечение из вены;
 - г) хроническая венозная недостаточность
- 145 К ятрогенным относятся заболевания:
- а) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников;
 - б) обусловленные вредными факторами производства;
 - в) с неблагоприятным прогнозом;
 - г) наследственного генеза
- 146 Первичная хирургическая обработка раны является мероприятием:
- а) механической асептики
 - б) механической антисептики
 - в) физической асептики
 - г) биологической антисептики
- 147 Кровь для переливания необходимо достать из холодильника за (в минутах):
- а) 15 - 30
 - б) 30 - 60
 - в) 60 - 90
 - г) 90 - 120
- 148 К операционным факторам риска госпитальных хирургических раневых инфекций относится:
- а) степень чистоты операционной раны;
 - б) характер основного и сопутствующих заболеваний пациента;
 - в) нарушение правил асептики и антисептики при обработке дренажей;
 - г) организация перевязок в послеоперационном периоде
- 149 Операция при варикозном расширении вен носит название:
- а) флебэктомия;
 - б) спленэктомия;
 - в) фундопликация;
 - г) гемиколэктомия
- 150 Предоперационный период считается с:
- а) момента поступления больного в стационар
 - б) момента установления диагноза
 - в) момента установления показаний к операции
 - г) начала подготовки больного к операции
- 151 Инкубационный период при ВИЧ инфекции:
- а) до 7 дней;
 - б) до 30 дней;
 - в) от 3 недель до 3 месяцев, иногда до года и более

- 152 Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в стерилизационной коробке с фильтром:
- а) не более 3-х суток;
 - б) не более 1-х суток;
 - в) не более 6 часов;
 - г) не более 20-ти суток
- 153 К проводниковой анестезии относится метод обезболивания:
- а) аппликационный
 - б) перидуральный
 - в) внутрикостный
 - г) инфильтрационный
- 154 К анаэробной хирургической инфекции относится:
- а) костный туберкулёз;
 - б) газовая гангрена;
 - в) септикопиемия;
 - г) остеомиелит
- 155 Вид раны, при котором кровотечение выражено слабо:
- а) ушибленная
 - б) рваная
 - в) укушенная
 - г) разможенная
- 156 Для стерилизации химическим методом используют:
- а) стеридекс 2000;
 - б) сайдекс;
 - в) аламинол;
 - г) пресепт
- 157 Профилактика анаэробной (газовой) гангрены включает все, кроме:
- а) ранней хирургической обработки раны;
 - б) введения больших доз антибиотиков;
 - в) введения поливалентной противогангренозной сыворотки;
 - г) дезинтоксикационной инфузионной терапии
- 158 Вид санитарной обработки перед плановой операцией:
- а) обтирание кожи и смена белья;
 - б) частичная санитарная обработка;
 - в) санитарная обработка не производится;
 - г) полная санитарная обработка и смена белья
- 159 К инструментам для первичной хирургической обработки раны голени, кроме общего набора, относятся:
- а) кусачки Люэра
 - б) расширитель Труссо
 - в) крючки Фарабефа
 - г) зонд Кохера
- 160 "Грязным" этапом холецистэктомии считается:
- а) удаление пузыря
 - б) перевязка пузырной артерии
 - в) повреждение стенки пузыря при мобилизации
 - г) перитонизация ложа пузыря

- 161 В сухожаровом шкафу стерилизуют:
- а) перевязочный материал;
 - б) перчатки;
 - в) хирургический инструментарий;
 - г) операционное белье
- 162 Индикаторы стерилизации перевязочного материала, белья:
- а) бензойная кислота, ИС-120;
 - б) мочевиная, ИС-132;
 - в) тиомочевина, ИС-180
- 163 Лапаро - и цистоскопы следует стерилизовать:
- а) кипячением
 - б) автоклавированием
 - в) в антисептиках
 - г) газовым методом
- 164 Укажите мероприятие, направленное на профилактику легочных осложнений после операции:
- а) дыхательная гимнастика;
 - б) вдыхание закиси азота;
 - в) введение пациенту препаратов железа
- 165 Неотложная помощь при почечной колике исключает:
- а) тепло на поясничную область;
 - б) холод на живот;
 - в) обезболивание;
 - г) спазмолитики
- 166 Операционный блок делят на зоны:
- а) стерильная, строгого режима, чистая и общебольничная
 - б) стерильная и чистая
 - в) стерильная, транспортная и вспомогательная
 - г) грязная, чистая, стерильная
- 167 Дезинфекция – это:
- а) комплекс мероприятий по предупреждению попадания микробов в рану при медицинских манипуляциях;
 - б) процесс уничтожения патогенных и условно патогенных микроорганизмов;
 - в) процесс уничтожения абсолютно всех микроорганизмов, включая споровые формы;
 - г) комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения микроорганизмов в ране
- 168 Бесшовное закрытие ран в зависимости от объема раны осуществляется:
- а) кожными скобами
 - б) кожным пластырем
 - в) салфеткой с антисептиком
 - г) раневым клеем

- 169 Жомы Пайра используют для:
- а) аппендэктомии
 - б) резекции желудка
 - в) холецистэктомии
 - г) экстирпации матки
- 170 В условиях гипотермии при сердечно-лёгочной реанимации выживаемость:
- а) удлиняется;
 - б) укорачивается;
 - в) не изменяется
- 171 Вынужденное положение конечности и деформация в области плечевого сустава характерны для:
- а) ушиба;
 - б) артрита;
 - в) опухоли;
 - г) вывиха
- 172 Для контроля качества предоперационной обработки рук используют:
- а) термоиндикаторы;
 - б) бактериологический контроль;
 - в) фенолфталеиновую пробу;
 - г) амидопириновую пробу
- 173 К методам временной остановки кровотечения относятся:
- а) перевязка сосуда в ране
 - б) наложение жгута
 - в) наложение зажима в ране
 - г) пальцевое прижатие сосуда
- 174 Для колотой раны характерно:
- а) малая информативность о характере повреждений
 - б) благоприятные условия для развития гнойных осложнений
 - в) частые повреждения артерий
 - г) малое зияние раны
- 175 Персонал операционного блока на носительство патогенного стафилококка проверяют 1 раз в:
- а) год
 - б) квартал
 - в) месяц
 - г) неделю
- 176 1 фаза раневого процесса – это:
- а) регенерация;
 - б) эпителизация;
 - в) воспаление;
 - г) рубцевание
- 177 Ожоговая болезнь у взрослых возникает при площади поражения поверхностными ожогами более:
- а) 3%;
 - б) 7%;
 - в) 10%;
 - г) 21%.

- 178 Метод стерилизации режущих инструментов:
- а) прокаливание;
 - б) автоклавирование;
 - в) обжигание;
 - г) холодная стерилизация в 96% спирте
- 179 Инструмент, используемый для расширения раны трахеи при трахеостомии:
- а) крючки Фарабефа
 - б) зеркало Куско
 - в) расширитель Труссо
- 180 Стерилизация изделий медицинского назначения проводится с целью:
- а) уничтожение патогенных микроорганизмов;
 - б) уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов;
 - в) очистка инструментов от остатков крови и лекарств;
 - г) уничтожение всех микроорганизмов как вегетативных, так и в споровых формах
- 181 Для какой из перечисленных травм мозга характерно наличие «светлого промежутка»:
- а) сотрясение головного мозга;
 - б) ушиб головного мозга;
 - в) сдавление головного мозга
- 182 Количество инструментов для контроля качества ПСО:
- а) 3% от обработанной партии;
 - б) 5% от обработанной партии;
 - в) 1% от обработанной партии, но не менее 3 единиц
- 183 Термин эвентрация означает:
- а) ущемление содержимого грыжевого мешка
 - б) рассечение стенки желудка
 - в) выпадение органов брюшной полости в рану
 - г) нагноение послеоперационной раны
- 184 В электрохирургии нейтральный электрод необходимо размещать на теле пациента к месту оперативного вмешательства:
- а) как можно дальше;
 - б) как можно ближе;
 - в) в любом месте
- 185 Количество инструментов, которое берется для проверки качества предстерилизационной очистки (на кровь):
- а) вся партия инструментов
 - б) 5% от обработанной партии
 - в) 1% от обработанной партии
 - г) 3 - 5 изделий каждого наименования

- 186 Анестезия, при которой используют 0,25% раствор ксикаина, называется:
- а) инфильтрационная
 - б) аппликационная (поверхностная)
 - в) перидуральная
 - г) проводниковая
- 187 Дополнительные инструменты при резекции кишки:
- а) кишечные иглы
 - б) жом Пайра
 - в) кишечные жомы
 - г) толстая трубка
- 188 Дезинфицирующим агентом при паровом методе стерилизации является:
- а) водяной пар;
 - б) насыщенный водяной пар;
 - в) сухой горячий воздух;
 - г) насыщенный водяной пар под давлением
- 189 Имеется рваная рана. Края раны гиперемированы с фибринозным налетом. Тактика операционной медицинской сестры:
- а) провести первичную хирургическую обработку
 - б) провести вторичную хирургическую обработку
 - в) сделать туалет раны и наложить повязку с антисептиком
 - г) наложить швы
- 190 Перед входом в какую зону операционного блока предусматривается санпропускник:
- а) в стерильную;
 - б) строгого режима;
 - в) ограниченного режима;
- 191 Наиболее слабо выражен компонент действия перекиси водорода:
- а) антимикробный
 - б) дезодорирующий
 - в) механически очищающий раны
 - г) органолептический
- 192 Сроки первичной хирургической обработки от момента ранения:
- а) до 12 часов
 - б) до 48 часов
 - в) до появления признаков развития инфекции
 - г) не имеют значение
- 193 Отсутствие токсического и аллергенного эффектов шовной нити на организм - это:
- а) биосовместимость;
 - б) резорбтивность;
 - в) атравматичность;
 - г) манипуляционные свойства
- 194 Генеральная уборка проводится 1 раз в:
- а) 7 дней
 - б) 10 дней
 - в) месяц
 - г) квартал

- 195 Чем отличается поздняя первичная хирургическая обработка раны от вторичной хирургической обработки:
- а) техникой операции;
 - б) наличием воспаления в ране;
 - в) сроками операции;
 - г) отсутствием первичной хирургической обработки
- 196 Инъекционное поле обрабатывают:
- а) 40% этиловым спиртом
 - б) 3% раствором перекиси водорода
 - в) салфеткой с 70 % изопропиловым спиртом
 - г) 96% этиловым спиртом
- 197 При прободной язве желудка живот:
- а) мягкий, болезненный;
 - б) доскообразный, резко болезненный;
 - в) болезненный в правой подвздошной области;
 - г) слегка напряжен
- 198 Игла в иглодержатель берется:
- а) за ушко иглы
 - б) за середину иглы
 - в) за кончик иглы
 - г) на 1/3 от ушка
- 199 Что не является абсолютным показанием для оперативного лечения при доброкачественной опухоли:
- а) ускоренный рост опухоли;
 - б) сдавление соседнего органа;
 - в) постоянное травмирование опухоли одеждой;
 - г) длительное существование опухоли
- 200 Больные с подозрением на перелом позвоночника должны транспортироваться
- а) лежа на специальных щитовых носилках;
 - б) лежа на боку;
 - в) сидя;
 - г) полусидя
- 201 Вовлечение в процесс подкожной клетчатки при рожистом воспалении ведет к развитию:
- а) подкожной эмфиземы;
 - б) флегмоны подкожной клетчатки;
 - в) подкожной гематомы;
- 202 Цель паллиативной операции при опухолях:
- а) уточнение диагноза
 - б) излечение больного
 - в) облегчение состояния больного
 - г) завершение многомоментной операции

- 203 Операционная сестра подает скальпель хирургу за:
- а) лезвие рукояткой к хирургу
 - б) шейку скальпеля, лезвием вверх, рукояткой к хирургу
 - в) шейку скальпеля, лезвием вниз, рукояткой к хирургу
 - г) рукоятку лезвием к хирургу
- 204 Пациента с кровопотерей транспортируют в положении
- а) лежа на спине;
 - б) лежа на боку;
 - в) лежа с приподнятым головным концом;
 - г) лежа с приподнятым ножным концом
- 205 Цель наложения груза на рану в послеоперационном периоде:
- а) для обезболивания;
 - б) для предотвращения отека;
 - в) для профилактики нагноения;
 - г) для профилактики кровотечения
- 206 Вторичное инфицирование раны возникает при:
- а) нарушении асептики при оказании первой помощи
 - б) нарушении асептики при перевязках
 - в) нарушении асептики во время операции
 - г) плохой стерилизации шовного материала
- 207 Сразу же после окончания стерилизации необходимо:
- а) провести контроль стерильности
 - б) биксы маркировать (дата стерилизации)
 - в) закрыть шторы боковых отверстий бикса
 - г) протереть биксы насухо
- 208 Первичная хирургическая обработка ран – это метод антисептики:
- а) химический;
 - б) биологический;
 - в) механический;
 - г) физический
- 209 Развитие инфекции более вероятно в ране:
- а) резаной
 - б) укушенной
 - в) рубленной
 - г) колотой
- 210 Ретрактор применяется для:
- а) разделения тканей
 - б) удерживания тканей
 - в) оттеснения и выделения тканей
 - г) соединения тканей
- 211 Для подготовки желудочно-кишечного тракта перед экстренной операцией необходимо:
- а) дать слабительное;
 - б) с помощью зонда очистить желудок;
 - в) поставить очистительную клизму;
 - г) поставить сифонную клизму

- 212 Причиной развития терминального состояния при электротравме является:
- а) фибрилляция желудочков;
 - б) остановка дыхания;
 - в) резкое падение АД;
 - г) клонико-тонические судороги
- 213 Абластика – это система мероприятий, направленных на:
- а) предотвращение диссеминации раковых клеток во время операции;
 - б) уничтожение раковых клеток в ране;
 - в) изоляцию больного от окружающих;
 - г) профилактику заболеваний среди медперсонала
- 214 Основное лечебное мероприятие при повреждениях органов живота:
- а) переливание крови
 - б) введение антибиотиков
 - в) введение сердечных средств
 - г) экстренная лапаротомия
- 215 Вытекание крови непрерывной струей темно-вишневого цвета характеризует кровотечение:
- а) капиллярное;
 - б) смешанное;
 - в) артериальное;
 - г) венозное
- 216 Сколько раз можно подогревать моющий комплекс в течение 1 суток, если он не изменил свою окраску:
- а) используется однократно;
 - б) не более 2 раз;
 - в) не более 6 раз;
 - г) до 10 раз
- 217 Определять группу крови и Rh-фактор при повторных гемотрансфузиях:
- а) нужно только перед первой трансфузией;
 - б) нужно перед каждой трансфузией;
 - в) не нужно; взять из истории болезни;
 - г) не нужно; взять из паспорта больного
- 218 Наиболее устойчив к воздействию окружающей среды:
- а) вирус гепатита В;
 - б) ВИЧ;
 - в) вирус гриппа;
 - г) кишечная палочка
- 219 Способность понимания психологических состояний других людей и сопереживание им, умение посмотреть на ситуацию глазами другого - это качество личности
- а) доброжелательность;
 - б) открытость;
 - в) конфронтация;
 - г) эмпатия;

- 220 Уборка операционной подразделяется на следующие виды:
- а) текущая
 - б) внеочередная
 - в) генеральная
 - г) постоянная
- 221 К инструментам разъединяющим ткани относятся:
- а) зажим Кохера;
 - б) зажим Бильрота;
 - в) скальпель;
 - г) иглодержатель
- 222 К психическим процессам относятся:
- а) воля;
 - б) характер;
 - в) память;
 - г) темперамент;
 - д) способности
- 223 Основных позиций пациента на операционном столе:
- а) 3
 - б) 4
 - в) 5
 - г) 6
- 224 В целях предупреждения заражения парентеральными вирусными гепатитами от донорства отстраняются лица:
- а) несколько лет назад получившие переливание крови;
 - б) переболевшие в прошлом вирусным гепатитом, независимо от давности заболевания;
 - в) посещавшие врача - стоматолога за последние 6 месяцев
- 225 Пациент имеет право на:
- а) на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья;
 - б) соблюдение режима лечения, в том числе определенного на период временной нетрудоспособности;
 - в) выбор врача и выбор медицинской организации;
 - г) осуществление рекламы лекарственных препаратов, биологически активных
- 226 Медицинские отходы, соприкасавшиеся с кровью и другими биологическими жидкостями относятся:
- а) к классу «А»;
 - б) к классу «Б»;
 - в) к классу «В»;
 - г) к классу «Г»
- 227 Лимфангиитом называется острое воспаление:
- а) лимфатических сосудов;
 - б) потовых желез;
 - в) сальных желез;
 - г) лимфоузлов

- 228 При подозрении на нагноение послеоперационной раны показано:
- а) иссечение раны
 - б) ревизия раны
 - в) наложение повязок с антибиотиками
 - г) физиотерапия
- 229 Наиболее эффективной пробой на скрытую кровь является:
- а) азопирамовая проба;
 - б) амидопириновая проба;
 - в) бензидиновая проба;
 - г) орто-толуидиновая проба
- 230 Радикальная операция - это:
- а) операция, выполненная одновременно
 - б) операция, полностью устраняющая патологический очаг
 - в) операция, устраняющая болевой синдром
 - г) технически простая операция
- 231 Оказание помощи при внутреннем кровотечении исключает:
- а) абсолютный покой;
 - б) холод на область предполагаемого кровотечения;
 - в) грелку на область предполагаемого кровотечения;
 - г) экстренную госпитализацию
- 232 Какой антисептик наиболее эффективен против анаэробных микробов:
- а) раствор калия перманганата;
 - б) спирт этиловый;
 - в) раствор водорода пероксида;
 - г) борная кислота
- 233 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие пульса на:
- а) локтевой артерии;
 - б) сонной артерии;
 - в) лучевой артерии;
 - г) бедренной артерии
- 234 Подготовка пациента к плановой операции включает:
- а) клинические, лабораторные исследования;
 - б) психологическую подготовку;
 - в) профилактику эндогенной инфекции;
 - г) все перечисленное
- 235 К биологической антисептике относится:
- а) первичная хирургическая обработка раны
 - б) промывание раны перекисью водорода
 - в) применение антибиотиков
 - г) применение ферментов
- 236 Клинические проявления грыжи:
- а) боль;
 - б) высокая температура;
 - в) опухолевидное выпячивание, вправляющееся в брюшную полость

- 237 Уборка операционной проводится:
- а) 4 раза в день
 - б) 3 раза в день
 - в) 1 раз в день
 - г) после каждой операции
- 238 Для временной остановки венозного наружного кровотечения применяют
- а) пальцевое прижатие артерии на протяжении;
 - б) наложение жгута;
 - в) максимальное сгибание конечности;
 - г) наложение давящей повязки
- 239 Эвентрация – это:
- а) образование свищей в области раны;
 - б) образование спаек в брюшной полости;
 - в) выпадение внутренних органов при расхождении краев раны;
 - г) вздутие живота
- 240 Согласно приказу МЗ РФ от 04.03.2003 №73 длительность реанимационных мероприятий составляет:
- а) не менее 30 минут;
 - б) не менее 15 минут;
 - в) не менее 25 минут;
 - г) не менее 1 часа
- 241 Цель паллиативной операции:
- а) облегчение состояния больного;
 - б) уточнение диагноза;
 - в) излечение больного;
 - г) получение материала для исследования
- 242 Коловорот относится к инструментам для:
- а) разделения тканей
 - б) удержания тканей
 - в) соединения тканей
 - г) оттеснения и выделения тканей
- 243 Частота смены маски:
- а) перед каждой операцией
 - б) каждые 4 часа
 - в) каждые 6 часов
 - г) в конце рабочего дня
- 244 Типичное проявление перелома основания черепа:
- а) отек век;
 - б) кровотечение и ликворея из носа и ушей;
 - в) подкожная эмфизема;
 - г) двоение в глазах
- 245 Какая окраска появляется на медицинском инструментарии при азопирамовой пробе, положительной на кровь:
- а) зеленая;
 - б) розовая, переходящая в сине-фиолетовую;
 - в) розовая;
 - г) сине-фиолетовая

- 246 Кратковременная, бурно протекающая, чрезвычайно интенсивная эмоциональная реакция:
- а) фрустрация;
 - б) аффект;
 - в) настроение;
 - г) депрессия;
- 247 Экстренная операция показана при:
- а) напряженном пневмотораксе
 - б) внутрибрюшном кровотечении
 - в) перитоните
 - г) злокачественных опухолях
- 248 Пробы на качество предстерилизационной очистки медицинского инструментария:
- а) азопирамовая
 - б) сулемовая
 - в) фенолфталеиновая
 - г) судан - III
- 249 Какую пробу проводят при переливании плазмы:
- а) биологическую;
 - б) на резус-совместимость;
 - в) на групповую совместимость
- 250 Обязательное медицинское страхование – это:
- а) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи;
 - б) страховой риск, связанный с возникновением страхового случая;
 - в) обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи;
 - г) обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, целевым назначением которых является обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения
- 251 Подготовка пациента вечером накануне плановой операции заключается в:
- а) общей гигиенической обработке
 - б) смене нательного и постельного белья
 - в) бритье кожи
 - г) постановке очистительной клизмы
- 252 Заключительный этап операции начинается с:
- а) смены перчаток
 - б) установки дренажей
 - в) смены инструментов
 - г) подсчета салфеток и инструментов
- 253 Маска после операции снимается:
- а) за завязку
 - б) за фильтр
 - в) в перчатках
 - г) без перчаток

- 254 Перевязочный материал (шарики, салфетки, тампоны) подаются хирургу:
- а) только пинцетом
 - б) только рукой
 - в) через ассистента
 - г) в емкости для перевязочного материала
- 255 Комплекс мероприятий по предупреждению попадания микробов в рану при медицинских манипуляциях это:
- а) асептика;
 - б) антисептика;
 - в) заключительная дезинфекция;
 - г) текущая дезинфекция
- 256 Развитием воздушной эмболии опасно кровотечение из:
- а) пищевода;
 - б) вен голени;
 - в) крупных вен шеи;
 - г) плечевой артерии
- 257 Что не является признаком клинической смерти:
- а) отсутствие пульса;
 - б) остановка сердца;
 - в) спутанное сознание;
 - г) остановка дыхания
- 258 Доврачебная помощь при переломе кости:
- а) транспортная иммобилизация;
 - б) наложение фиксирующей повязки;
 - в) наложение гипсовой повязки;
 - г) согревающий компресс
- 259 Число пораженных при территориальных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах):
- а) до 10 пораженных;
 - б) 10-50 пораженных;
 - в) 50-500 пораженных;
- 260 Способ окончательной остановки кровотечения:
- а) наложение сосудистого зажима;
 - б) наложение артериального жгута;
 - в) наложение сосудистого шва;
 - г) пузырь со льдом
- 261 Влажные кожные покровы характерны для комы:
- а) гипергликемической;
 - б) гипогликемической;
 - в) уремической;
 - г) почечной
- 262 Рассасывающийся шовный материал должен деградировать:
- а) до полного заживления раны
 - б) после полного заживления раны
 - в) на стадии красного рубца
 - г) на стадии серого (позднего) рубца

- 263 Проводить окончательный подсчет тампонов и инструментов до окончания операции:
- а) можно;
 - б) нельзя;
 - в) категорически запрещено
- 264 Укажите виды операций в зависимости от характера оперативного вмешательства:
- а) повторные
 - б) радикальные
 - в) экстренные
 - г) паллиативные
- 265 Какова должна быть температура моеющего комплекса для предстерилизационной обработки медицинского инструментария:
- а) комнатная температура;
 - б) 75°C;
 - в) 50°C;
 - г) температура кипения
- 266 Первичная хирургическая обработка раны относится к антисептике:
- а) механической;
 - б) физической;
 - в) химической;
 - г) биологической
- 267 Инструменты, бывшие в употреблении и предназначенные для повторного применения, размещаются:
- а) отдельно от незадействованных на малом столе
 - б) вместе с незадействованными на малом столе
 - в) на операционном столе
 - г) на пациенте, рядом с операционным полем
- 268 В положении "лягушки" транспортируют пациентов с переломом:
- а) костей таза;
 - б) позвоночника;
 - в) бедра;
 - г) костей стоп
- 269 К группе высокого риска заражения парентеральными вирусными гепатитами относят:
- а) персонал физиотерапевтических кабинетов;
 - б) лаборантов клинических и биохимических лабораторий;
 - в) персонал центральных стерилизационных отделений
- 270 Свободный газ в брюшной полости определяется при:
- а) холецистите;
 - б) перфоративной язве желудка;
 - в) аппендиците;
 - г) кишечной непроходимости

- 271 Укажите оптимальный режим стерилизации при паровом методе, рекомендуемый для изделий из резины:
- а) 120°C – 30 минут;
 - б) 132°C – 20 минут;
 - в) 120°C - 45 минут;
 - г) 132°C – 45 минут
- 272 Реальная опасность воздушной эмболии существует при повреждении:
- а) артерии бедра
 - б) лучевой артерии
 - в) сосудов грудной клетки
 - г) вен шеи
- 273 К инструментам для защиты тканей от случайного повреждения относятся:
- а) пинцеты, ранорасширители
 - б) жомы, пластинчатые крючки, зонды
 - в) зонд Кохера, лопаточка Бюяльского
- 274 Бритье кожи перед плановой операцией следует проводить:
- а) за сутки перед операцией
 - б) вечером накануне операции
 - в) утром в день операции
 - г) перед началом операции на операционном столе
- 275 Скорость переливания крови во время биологической пробы:
- а) 10 - 20 капель в минуту
 - б) 20 - 30 капель в минуту
 - в) 40 - 60 капель в минуту
 - г) струйно
- 276 Концентрация раствора новокаина, применяющаяся для местной инфильтрационной анестезии:
- а) 0,25%
 - б) 1%
 - в) 2%
 - г) 10%
- 277 Признаками не характерными для «госпитальных штаммов» являются:
- а) высокая вирулентность;
 - б) фагочувствительность;
 - в) полирезистентность к антибиотикам;
 - г) устойчивость к дезинфектантам
- 278 Мелена – это симптом, встречающийся при:
- а) легочном кровотечении;
 - б) кровоточащей язве желудка;
 - в) геморрое;
 - г) разрыве селезенки

- 279 Пациенту не разрешается принимать пищу перед операцией, так как:
- а) затрудняется управление дыханием
 - б) трудно вводить желудочный зонд
 - в) прием пищи влияет на проведение наркоза
 - г) возможна регургитация
- 280 Ношение белья из синтетического материала в операционной приводит к:
- а) аллергическим реакциям
 - б) накоплению статистического электричества
 - в) гипергидрозу
 - г) гипертермии
- 281 Для сложного волевого действия не характерны:
- а) осознание цели и стремление достичь ее;
 - б) борьба мотивов и выбор;
 - в) осознание ряда возможностей достижения цели;
 - г) проявление мотивов, утверждающих или отрицающих возможности;
- 282 Перчатки, загрязненные кровью больного перед снятием обрабатываются:
- а) 70% этиловым спиртом
 - б) раствором 0,02 % хлоргексидина
 - в) 8% раствором аламинола
- 283 Давящая повязка не применяется для внешней остановки кровотечения в следующих случаях:
- а) кровотечение из вен предплечья;
 - б) кровотечение из мягких тканей головы;
 - в) кровотечение из мягких тканей грудной стенки;
 - г) повреждение сонной артерии
- 284 Какие осложнения могут быть после гемотрансфузии в первые сутки:
- а) пирогенные реакции;
 - б) тромбоэмболия;
 - в) острое расширение сердца;
 - г) нарушение кровообращения в конечностях
- 285 Артериальным является кровотечение:
- а) пульсирующее кровотечение ярко-красного цвета;
 - б) кровотечение струей темно-вишневого цвета;
 - в) истечение крови из мельчайших кровеносных сосудов
- 286 Опасный этап традиционной холецистэктомии:
- а) выделение шейки пузыря
 - б) пункция пузыря
 - в) удаление желчного пузыря
 - г) ушивание ложа пузыря
- 287 Первичная хирургическая обработка – это:
- а) иссечение краев и дна раны, наложение швов
 - б) рассечение раны
 - в) вскрытие карманов и затеков
 - г) удаление гнойного отделяемого

- 288 Под первичной хирургической обработкой раны понимают:
- а) орошение ее антисептиками;
 - б) иссечение ее краев, стенок и дна;
 - в) удаление инородных тел и сгустков крови;
 - г) иссечение некротизированных тканей
- 289 Эндоскопический метод исследования плевральной полости – это:
- а) эзофагоскопия;
 - б) гастроскопия;
 - в) бронхоскопия;
 - г) торакоскопия
- 290 В закрытом биксе без фильтра материал считается стерильным в течение (в сутках):
- а) 1
 - б) 2
 - в) 3
 - г) 20
- 291 Назовите противопоказание к переливанию крови:
- а) тяжелая операция
 - б) хирургическая инфекция
 - в) шок
 - г) декомпенсация функции печени и почек
- 292 К предоперационным факторам риска госпитальных хирургических раневых инфекций НЕ относится:
- а) продолжительность предоперационного пребывания в стационаре;
 - б) отсутствие или неадекватность предоперационной антибиотикопрофилактики;
 - в) квалификация хирурга;
 - г) неадекватное бритье кожи в области хирургического вмешательства
- 293 Протяженность иммобилизации при переломе бедра:
- а) от кончиков пальцев стопы до подмышки;
 - б) от лодыжки до середины бедра;
 - в) от кончиков пальцев стопы до середины бедра;
 - г) от подмышки до тазобедренного сустава
- 294 Расположение пациента на операционном столе горизонтальное с приподнятым изголовьем называется положение:
- а) Фовлера;
 - б) Тренделенбурга;
 - в) Кларка
- 295 Первоочередной эвакуации подлежат пораженные сортировочной группы:
- а) первой;
 - б) второй;
 - в) третьей;
 - г) четвертой

- 296 К удерживающим инструментам относятся:
- а) зажим для прикрепления белья
 - б) пинцет анатомический
 - в) крючки Фарабефа
 - г) кусачки Листона
- 297 Осложнением гнойно-септического характера после катетеризации сосуда является:
- а) образование гематомы;
 - б) сепсис.
 - в) воздушная и тромбоэмболия сосудов головного мозга
- 298 Профилактику инфекции дыхательных путей не обеспечивает:
- а) санация персонала
 - б) дыхание через нос
 - в) ношение маски
 - г) проветривание
- 299 Периодичность постановки пробы на качество предстерилизационной очистки:
- а) 1 раз в день
 - б) 1 раз в неделю
 - в) на каждой обработанной партии
 - г) утром и вечером
- 300 Инструменты после вскрытия полых органов сбрасываются:
- а) хирургом
 - б) операционной сестрой
 - в) ассистентом хирурга
 - г) санитаркой