

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»**

(для фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшеров общей практики,
прошедших обучение по циклам

**2.5 "Охрана работников промышленных и других предприятий", 2.6 "Охрана здоровья
сельского населения",**

**2.8 "Медицина общей практики", профессиональной переподготовки по специальности
"Лечебное дело")**

- 1 К группам риска по ВИЧ-инфекции не относятся:
 - а) внутривенные потребители наркотиков,
 - б) беременные,
 - в) пациенты, имеющие половой контакт с ВИЧ-инфицированными,
 - г) пациенты с вирусными гепатитами В или С, туберкулезом
- 2 Болезненное изменение характера при сохранении интеллекта человека называется:
 - а) психопатия
 - б) невроз
 - в) деформация
 - г) акцентуация
- 3 Источником инфекции при гепатите А являются:
 - а) больные люди
 - б) грызуны
 - в) больные животные
 - г) вирусоносители
- 4 У детей малая хорея является:
 - а) проявлением ДЦП
 - б) дополнительным "малым" критерием ревматизма
 - в) основным "большим" критерием ревматизма
 - г) основным критерием ревматоидного артрита
- 5 Для гриппа характерна выраженность синдрома:
 - а) интоксикации
 - б) диспептического
 - в) дизурического
 - г) дизметаболического
- 6 Присутствие в мокроте эластических волокон характерно для:
 - а) острого бронхита
 - б) хронического бронхита
 - в) крупозной пневмонии
 - г) гангрены легких
- 7 Для ревматического полиартрита характерно:
 - а) поражение преимущественно мелких суставов
 - б) постоянные боли в суставах
 - в) деформация крупных суставов
 - г) летучие, симметричные боли в суставах

- 8 При аллергической реакции на йод в анамнезе, больному противопоказан:
- а) кордарон
 - б) обзидан
 - в) коринфар
 - г) верапамил (изоптин)
- 9 Порядок доставки использованных одноразовых шприцев на подстанцию скорой медицинской помощи:
- а) использованные инструменты доставляются в полиэтиленовом пакете, иглы закрыты колпачками,
 - б) иглы и шприцы после использования сразу помещаются в непрокальваемый контейнер, который доставляется на подстанцию скорой медицинской помощи. При сдаче шприцы пересчету не подлежат,
 - в) игла и шприц оставляются у пациента,
 - г) в машине скорой помощи хранится непрокальваемый контейнер для сбора шприцев. Шприцы с закрытой колпачком иглой доставляются до машины, затем помещаются в контейнер и транспортируются на подстанцию
- 10 Бочкообразная форма грудной клетки, выбухание надключичных областей, расширение межреберных промежутков, малая экскурсия грудной клетки, характерные признаки:
- а) пневмосклероза
 - б) эмфиземы легких
 - в) экссудативного плеврита
 - г) туберкулеза легких
- 11 Мужчина 47 лет, считавший себя практически здоровым, жалуется на внезапные давящие боли в эпигастральной области, тошноту однократную рвоту, головокружение. В анамнезе – беспокоят боли после приема острой пищи. К врачам не обращался. Какое исследование необходимо выполнить первым?
- а) клинический анализ мочи
 - б) фиброгастроскопия
 - в) рентген желудка
 - г) ультразвуковое исследование брюшной полости
- 12 Ультрафиолетовое излучение может вызвать:
- а) катаракту
 - б) блефароконъюнктивит
 - в) фотодерматит
 - г) фотоофтальмию
- 13 ЭКГ-признаки, позволяющие заподозрить инфаркт миокарда:
- а) отсутствие зубца Р
 - б) глубокий и широкий зубец Q
 - в) подъем сегмента ST над изолинией
 - г) низковольтная ЭКГ
- 14 Полуспиртовой компресс ставится на:
- а) 1 – 2 часа
 - б) 3 – 4 часа
 - в) 6 – 8 часов
 - г) 9 – 10 часов
- 15 Для оценки функционального состояния почек проводят анализ мочи:
- а) по Зимницкому
 - б) по Нечипоренко
 - в) общий анализ мочи
 - г) бактериологическое исследование мочи

- 16 Симптомами острой левожелудочковой недостаточности являются:
- а) приступ удушья инспираторного типа
 - б) приступ удушья экспираторного типа
 - в) клочущее дыхание
 - г) пенная розовая мокрота
- 17 Окраска кожных покровов при отравлении окисью углерода:
- а) синюшная
 - б) ярко розовая или малинового цвета
 - в) серая
 - г) бледная
- 18 Первичная доврачебная специализированная медико-санитарная помощь оказывается:
- а) фельдшерами скорой помощи, медицинскими сестрами специализированными
 - б) участковыми терапевтами, врачами-терапевтами
 - в) врачами-педиатрами, участковыми педиатрами
 - г) врачами-специалистами
- 19 Инспираторная одышка характерна для:
- а) крупа
 - б) пневмонии
 - а) бронхолита
 - г) бронхиальной астмы
- 20 Симптомами кровопотери являются:
- а) повышение артериального давления (АД), частый и напряженный пульс
 - б) повышение артериального давления (АД), нормальный пульс
 - в) снижение артериального давления (АД), частый и слабый пульс
 - г) снижение артериального давления (АД), нормальный пульс
- 21 К развитию пороков сердца при ревматизме приводит:
- а) перикардит
 - б) миокардит
 - в) эндокардит
 - г) только панкардит
- 22 Специфическим заболеванием легких является:
- а) бронхиальная астма
 - б) очаговая пневмония
 - в) туберкулез легких
 - г) бронхоэктатическая болезнь
- 23 Снижение уровня лейкоцитов в крови:
- а) лейкоз
 - б) лейкоцитоз
 - в) лейкопения
 - г) лейкопения
- 24 Для сахарного диабета первого типа характерно:
- а) бессимптомное начало заболевания
 - б) сухость во рту, жажда, полиурия, потеря в массе тела в начальный период болезни
 - в) увеличение массы тела
 - г) снижение уровня сахара в крови

- 25 Пациентам с мочекаменной болезнью рекомендуется в сутки потреблять жидкости:
- а) до 1 литра
 - б) 1,0 – 1,5 л
 - в) 1,5 – 2,0 л
 - г) 2,5 – 3,0 л
- 26 Кровотечение из уха при черепно-мозговой травме возникает при:
- а) сотрясении головного мозга
 - б) переломе основания черепа
 - в) травме уха
 - г) внутричерепной гипертензии
- 27 Тактика фельдшера здравпункта при открытом переломе:
- а) остановка кровотечения, наложение асептической повязки
 - б) остановка кровотечения, асептическая повязка, наложение шины, госпитализация
 - в) наложение шины
 - г) наложение асептической повязки, обезболивание
- 28 Влияние физической нагрузки на содержание сахара в крови:
- а) снижает содержание сахара крови
 - б) повышает содержание сахара в крови
 - в) не влияет на содержание сахара в крови
 - г) снижает только при сахарном диабете первого типа
- 29 Проявления вестибулярных расстройств у пожилых:
- а) плохая разборчивость речи
 - б) тошнота
 - в) нарушение равновесия
 - г) ухудшение восприятия звуков
 - д) головокружение
- 30 Пассивный искусственный иммунитет формируется после:
- а) введения иммуноглобулинов
 - б) введения вакцин
 - в) рождения
 - г) перенесённого заболевания
- 31 Основная триада жалоб гинекологических пациентов:
- а) боли, бели, кровотечения;
 - б) боли, тошнота, кровотечения;
 - в) боли, бесплодие, бели;
 - г) бели, кровотечения, бесплодие
- 32 Ведущим клиническим признаком нефротического синдрома является:
- а) гематурия
 - б) протеинурия более 3,5 г/сутки
 - в) артериальная гипертензия
 - г) пиурия
- 33 Основным симптомом анафилактического шока является:
- а) аллергические высыпания на коже
 - б) нарушение дыхания
 - в) падение АД
 - г) отсутствие пульсации на периферических артериях

- 34 Прием, используемый для освобождения от инородных тел при obturации:
- а) Селлика
 - б) Вальсавы
 - в) Хеймлиха
 - г) Сафара
- 35 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допустимо:
- а) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
 - б) лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей,
 - в) в целях проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях;
 - г) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения
- 36 Для крупозной пневмонии характерна мокрота:
- а) розовая пенная
 - б) вязкая, стекловидная
 - в) ржавая
 - г) трехцветная
- 37 Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться:
- а) на основании свободного, осознанного и информированного согласия больного
 - б) на основании медицинских показаний
 - в) на основании редкости картины заболевания и его познавательной ценности
 - г) на основании требования родственников
- 38 Изъятие органов и тканей от мертвого донора осуществляется в Российской Федерации:
- а) беспрепятственно в интересах науки и общества
 - б) согласно принципу "презумпция несогласия"
 - в) согласно принципу "презумпция согласия"
 - г) в соответствии с морально-религиозными ценностями
- 39 Лейкоцитурия наиболее характерный симптом при:
- а) пиелонефрите
 - б) гломерулонефрите
 - в) амилоидозе
 - г) нефролитиазе
- 40 Если при определении группы крови с помощью антицеликлонов агглютинация отсутствует в обеих каплях, то группа крови:
- а) четвертая
 - б) первая
 - в) третья
 - г) вторая

- 41 Пациент 24 года. Жалобы на внезапную «кинжальную боль» в эпигастрии, общую слабость. Анамнез: раньше отмечал в осенне-весеннее время голодные боли, проходящие после приема пищи. Объективно: «доскообразный живот», резкая болезненность в эпигастрии. АД 85/45. Пульс 104 в мин. Что за состояние у больного?
- а) обострение хронического гастрита
 - б) пищевая токсикоинфекция
 - в) прободная язва
 - г) аппендицит
- 42 При значительных и длительных физических нагрузках диастолическое давление:
- а) увеличивается
 - б) уменьшается
 - в) не изменяется
 - г) уравнивается с систолическим
- 43 Выберите признаки, характеризующие отёки при заболеваниях сердца:
- а) более выраженные с утра на лице, бледные, мягкие
 - б) усиливающиеся к вечеру на ногах, сочетающиеся с акроцианозом
 - в) плотные, не оставляющие ямку при надавливании
 - г) мягкие, появляются вечером на лице
- 44 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:
- а) две
 - б) три
 - в) четыре
 - г) пять
- 45 Катаральный синдром может быть специфической реакцией на введение:
- а) БЦЖ
 - б) коревой вакцины
 - в) АКДС
 - г) АДС
- 46 Тактика фельдшера при отморожении заключается в наложении:
- а) теплоизолирующей повязки
 - б) окклюзионной повязки
 - в) давящей повязки
 - г) мазевой повязки
- 47 Основным клиническим симптомом ущемлённой грыжи является:
- а) симптом Щёткина - Блюмберга
 - б) невправляемость грыжи
 - в) нарушение мочеиспускания
 - г) положительный симптом «кашлевого толчка»
- 48 Основным морфологическим элементом при кори является
- а) папула
 - б) экхимоз
 - в) везикула
 - г) пустула
- 49 Иррадиация болей при внематочной беременности:
- а) в поясницу
 - б) в ногу
 - в) в прямую кишку
 - г) опоясывающие

- 50 Фракция выброса крови левым желудочком в норме:
- а) 20 - 30% объема
 - б) 30 - 50% объема
 - в) 60 - 80% объема
 - г) 100% объема
- 51 Тактика фельдшера при открытом переломе заключается в:
- а) остановке кровотечения, наложении асептической повязки
 - б) остановке кровотечения, наложении асептической повязки и шины
 - в) наложении шины
 - г) остановке кровотечения
- 52 Норма удельной плотности мочи находится в интервале:
- а) 1000 - 1015
 - б) 1010 - 1015
 - в) 1015 - 1025
 - г) 1025 - 1035
- 53 Наиболее ранними признаками биологической смерти являются:
- а) трупные пятна
 - б) высыхание и помутнение роговицы
 - в) трупное окоченение
 - г) широкий зрачок, не реагирующий на свет
- 54 Тактика фельдшера при растяжении связок голеностопного сустава:
- а) новокаиновая блокада
 - б) полуспиртовой компресс
 - в) холод и фиксирующая повязка на сустав
 - г) наложение гипсовой лонгеты
- 55 Осложнения язвенной болезни:
- а) кровотечение
 - б) перфорация
 - в) гастрит
 - г) рубцово-язвенный стеноз привратника
- 56 Типичные признаки пневмонии:
- а) кашель
 - б) повышение температуры
 - в) очаговые изменения на рентгенограмме
 - г) крепитация и мелкопузырчатые хрипы
 - д) сухие хрипы при аускультации
 - е) ослабленное дыхание при аускультации
 - ё) усиление лёгочного рисунка на рентгенограмм
- 57 Факторы, усугубляющие действие вибрации:
- а) шум
 - б) низкие температуры
 - в) статистическое напряжение
 - г) повышенная влажность воздуха
- 58 Ведущим в клинике хронического астматического бронхита:
- а) кашель
 - б) гнойная мокрота
 - в) одышка
 - г) интоксикация

- 59 Контроль качества предстерилизационной обработки включает контроль на:
- а) жировые загрязнения
 - б) кровь
 - в) моющие средства
 - г) лекарственные загрязнения
- 60 Признаками клинической смерти являются:
- а) отсутствие сознания, кровообращения, дыхания, окоченение
 - б) отсутствие сознания, кровообращения, дыхания, реакции зрачка на свет
 - в) отсутствие сознания, кровообращения, всех рефлексов, размягчение глазного яблока
 - г) отсутствие сознания, кровообращения, дыхания, помутнение роговицы, окоченение
- 61 Неврологические симптомы при ботулизме:
- а) дисфония, дисфагия, дизартрия
 - б) светобоязнь, боль в глазных яблоках
 - в) ассиметрия лица, девиация языка
 - г) ригидность затылочных мышц
- 62 Профессиональным заболеванием сварщиков является:
- а) вибрационная болезнь
 - б) асбестоз
 - в) катаракта
 - г) эмфизема легких
- 63 При проведении сердечно-легочной реанимации двумя спасателями соотношение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) к компрессии грудной клетки составляет:
- а) 1:5
 - б) 2:5
 - в) 2:15
 - г) 2:30
- 64 Побочный эффект при приеме нитроглицерина:
- а) брадикардия
 - б) коллапс
 - в) гипертензивный криз
 - г) носовое кровотечение
- 65 Повышение артериального давления с кризовым течением характерно для:
- а) тиреотоксикоза
 - б) микседемы
 - в) болезни Иценко-Кушинга
 - г) недостаточности коры надпочечников
- 66 Боль при перфоративной язве желудка:
- а) опоясывающая
 - б) кинжальная
 - в) схваткообразная
 - г) постоянная ноющая
- 67 Препарат, относящийся к группе β – блокаторов:
- а) капотен
 - б) энап
 - в) атенолол
 - г) аллопуринол

- 68 Неотложная помощь при отеке легких:
- а) положение полусидя
 - б) наложение венозных жгутов на конечности
 - в) ингаляция увлажненного кислорода
 - г) ингаляция кислорода с парами спирта
- 69 Соотношение компрессий и вентиляции легких при остановке сердца:
- а) 30:2
 - б) 2:15
 - в) 10:2
 - г) 30:5
- 70 Способом временного гемостаза при венозном кровотечении является:
- а) наложение жгута
 - б) наложение давящей повязки
 - в) прошивание сосуда
 - г) перевязка сосуда
- 71 Стерильность бикса с фильтром сохраняется в течение:
- а) 6 часов
 - б) 3 дней
 - в) 20 дней
 - г) 24 часов
- 72 Уремия – это:
- а) видимая глазом примесь крови в моче
 - б) невидимая глазом, определяемая только под микроскопом примесь крови в моче
 - в) повышение содержания в крови мочевины, креатинина
 - г) наличие ацетона в моче
- 73 При проведении сердечно-легочной реанимации одним спасателем соотношение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) к компрессии грудной клетки составляет:
- а) 1:5
 - б) 2:5
 - в) 2:15
 - г) 2:30
- 74 Медицинские работники имеют право на:
- а) оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
 - б) совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях;
 - в) соблюдение врачебной тайны;
 - г) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя
- 75 Для приступа бронхиальной астмы характерны:
- а) учащение дыхания
 - б) урежение дыхания
 - в) свистящие дистанционные сухие хрипы
 - г) «немое лёгкое»

- 76 При регистрации ЭКГ черный электрод накладывается:
- а) на правую руку
 - б) на левую руку
 - в) на правую ногу
 - г) на левую ногу
- 77 Больной 18 лет. Жалобы на головную боль, отеки всего тела. Заболел впервые после перенесенной ангины. Появились отеки на лице, которые стали быстро увеличиваться, появилась одышка, уменьшился диурез. Объективно: лицо бледное, отечное. АД 210/120 мм рт. ст. Моча цвета «мясных помоев», удельный вес - 1035, белок 3%, в осадке эритроциты в большом количестве, цилиндры. Какое заболевание можно подозревать у больного:
- а) острый гломерулонефрит
 - б) хронический пиелонефрит
 - в) артериальная гипертония
 - г) обострение хронического гломерулонефрита
- 78 Достоверным симптомом перитонита является:
- а) симптом Щёткина - Блюмберга
 - б) симптом Орнтера
 - в) френикус - симптом
 - г) симптом Кохера
- 79 Рекомендации пациентам с хроническим холециститом:
- а) ограничение жиров
 - б) редкие приемы пищи
 - в) частые приемы пищи в умеренных порциях
 - г) ограничение углеводов
- 80 Сахарный диабет I типа:
- а) инсулинонезависимый
 - б) инсулинозависимый
 - в) диабет молодых
 - г) диабет «толстых»
- 81 Продолжительность загрудинной боли при инфаркте миокарда:
- а) менее 5 минут
 - б) 5 – 10 минут
 - в) 15 – 20 минут
 - г) 30 минут и более
- 82 Предпочтительным препаратом при купировании почечной эклампсии является:
- а) седуксен
 - б) сульфат магнезия
- 83 Безболевы атипичные формы инфаркта миокарда:
- а) астматическая
 - б) абдоминальная
 - в) аритмическая
 - г) периферическая
- 84 Понятие “милосердие” включает в себя все, кроме:
- а) чувства и способности сострадания
 - б) готовность оказать помощь тому, кто в ней нуждается
 - в) снисходительность
 - г) готовность выполнить любую просьбу человека

- 85 Осложнения острых пневмоний могут быть:
- а) отит, плеврит
 - б) перикардит, менингит
 - в) стафилококковая деструкция легких
 - г) все вышеперечисленное
- 86 Подготовка пациента к абдоминальной пункции требует:
- а) поставки очистительной клизмы
 - б) промывания желудка
 - в) постановки сифонной клизмы
 - г) опорожнения мочевого пузыря
- 87 При обильном потоотделении организм теряет витамины:
- а) А
 - б) С
 - в) В
 - г) Д
- 88 При ревматизме происходит поражение суставов:
- а) коленных
 - б) локтевых
 - в) голеностопных
 - г) лучезапястных
 - д) все вышеперечисленное
- 89 Суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале score считается низким при величине
- а) менее 1%
 - б) в пределах ≥ 1 до 5 %
 - в) ≥ 5 до 10 %
 - г) ≥ 10 %
- 90 Тактика ведения пациента с транзиторной ишемической атакой включает:
- а) можно не госпитализировать, назначив компьютерную томографию
 - б) необходима срочная госпитализация
 - в) можно не госпитализировать, рекомендовав пройти обследование в плановом порядке
 - г) нужно направить на консультацию к неврологу поликлиники
- 91 При назначении мочегонных препаратов (салуретико) отмечается следующий электролитный сдвиг:
- а) развивается гипокальциемия
 - б) развивается гипокалиемия
 - в) развивается гиперкальциемия
 - г) развивается гиперкалиемия
- 92 Этичность изъятия органов от мертвого донора предполагает:
- а) отсутствие моральных и законодательных ограничений
 - б) условие высказанного при жизни и юридически оформленного согласия донора
 - в) условие отсутствия высказанных донором при жизни возражений против забора органов у его трупа
 - г) условие согласия родственников

- 93 Температура капель для введения в ухо:
- а) 4 – 8 ° (из холодильника)
 - б) 18 – 24° (комнатная температура)
 - в) 37 – 38°
 - г) 40 – 42°
- 94 Профессиональное заболевание шахтеров:
- а) вибрационная болезнь
 - б) эмфизема легких
 - в) антракоз
 - г) рак мочевого пузыря
- 95 Число пораженных при территориальных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах):
- а) 10-50 пораженных
 - б) 50-500 пораженных
 - в) свыше 500 пораженных
 - г) до 10 пораженных
- 96 Положение, которое необходимо придать пациенту с явлениями отека легких:
- а) сидя с упором на руки
 - б) с приподнятым головным концом кровати
 - в) лежа на боку
 - г) ортопноэ
- 97 Симптом «немое легкое» развивается при:
- а) приступе бронхиальной астмы
 - б) остром бронхите
 - в) крупозной пневмонии
 - г) астматическом статусе
- 98 Повышенное содержание гемоглобина и эритроцитов в анализе крови наблюдается при пороках:
- а) синего типа
 - б) белого типа
 - в) с препятствием выбросу крови из желудочка
- 99 Подагра-нарушение обмена:
- а) пуринов (мочевой кислоты)
 - б) минерального обмена
- 100 Выберите устные средства санитарного просвещения:
- а) беседа, лекция
 - б) фотография, плакат
 - в) брошюра, журнал
 - г) бюллетень, буклет
- 101 Для лечения чесотки применяются:
- а) 33% серная мазь
 - б) мазь «Флуцинар»
 - в) шампунь «Сидхакс»
 - г) параплюс
- 102 Плевральная жидкость невоспалительного генеза:
- а) экссудат
 - б) транссудат
 - в) ликвор
 - г) синовиальная жидкость

- 103 Клиническим признаком кровотечения из тонкого кишечника является:
- а) кровавая рвота
 - б) чёрный стул
 - в) алая кровь на каловых массах
 - г) гематурия
- 104 Опоясывающая боль возникает при:
- а) аппендиците
 - б) холецистите
 - в) панкреатите
 - г) перфоративной язве
- 105 Для того чтобы дифференцировать желтуху от окрашивания продуктами питания или лекарственными препаратами надо обратить внимание на цвет:
- а) ладоней
 - б) стоп
 - в) кожи
 - г) слизистых оболочек
- 106 Перечислите признаки гипергликемической комы:
- а) кожа и видимые слизистые влажные
 - б) кожа и видимые слизистые сухие
 - в) повышен тонус глазных яблок
 - г) повышен тургор кожи
- 107 Вмешательство в геном человека может быть осуществлено во всех перечисленных целях, кроме:
- а) изменения генома половых клеток
 - б) профилактических целей
 - в) диагностических целей
 - г) терапевтических целей
- 108 Суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE считается высоким при величине:
- а) в пределах ≥ 1 до 5 %
 - б) ≥ 5 до 10 %
 - в) менее 1%
 - г) ≥ 10 %
- 109 Латентная форма сахарного диабета выявляется при помощи:
- а) анализа мочи на сахар
 - б) анализа крови на сахар
 - в) «сахарной кривой»
 - г) клинических признаков
- 110 Подъем сегмента ST над изолинией может быть признаком:
- а) гипертрофии левого желудочка
 - б) стенокардии
 - в) мерцательной аритмии
 - г) инфаркта миокарда
- 111 Перкуторный звук при эмфиземе легких:
- а) коробочный
 - б) тимпанический
 - в) тупой
 - г) притупленный

- 112 У пациента с ИБС участились приступы стенокардии, увеличилась продолжительность приступов, они стали купироваться большим количеством таблеток нитроглицерина. Такая ситуация характерна для:
- а) стенокардии покоя
 - б) стабильной стенокардии II функционального класса
 - в) стабильной стенокардии IV функционального класса
 - г) нестабильной (прогрессирующей) стенокардии
- 113 Ушная ликворея возникает при:
- а) травмах уха
 - б) травмах носа
 - в) сотрясении головного мозга
 - г) переломе основания черепа
- 114 При выявлении наследственного заболевания у развивающегося плода судьбу этого плода (продолжение беременности или аборт) в праве решать:
- а) только врачи-профессионалы
 - б) только родители
 - в) только мать
 - г) государственные органы здравоохранения
- 115 Основной путь передачи менингококковой инфекции:
- а) воздушно-капельный
 - б) алиментарный
 - в) трансмиссивный
 - г) водный
- 116 При назначении мочегонных препаратов (салуретиков) отмечается следующий электролитный сдвиг:
- а) гипокальциемия
 - б) гипокалиемия
 - в) гиперкальциемия
 - г) гиперкалиемия
- 117 К достоверным признакам внезапной остановки сердечной деятельности не относится:
- а) отсутствие пульса на сонных артериях
 - б) внезапная потеря сознания
 - в) отсутствие самостоятельного дыхания
 - г) отсутствие тонов сердца
- 118 Клиническое проявление гипотиреоза:
- а) тахикардия
 - б) брадикардия
 - в) сухость кожи и слизистых
 - г) повышенная влажность кожи и слизистых
- 119 Неотложная помощь при гипогликемической коме:
- а) сладкий чай
 - б) 40% р-р глюкозы внутривенно
 - в) 5% р-р глюкозы с 20 ЕД инсулина внутривенно
 - г) адреналин
- 120 Асцит, варикозное расширение вен пищевода, увеличение селезенки - признаки застоя:
- а) в системе воротной вены
 - б) в малом кругу
 - в) в большом кругу

- 121 Эффект нитроглицерина при приступе стенокардии обусловлен:
- а) расширением артерий и вен большого круга кровообращения
 - б) уменьшением венозного возврата крови в сердце из вен большого круга
 - в) уменьшением потребности сердечной мышцы в кислороде за счет уменьшения нагрузки на сердце
 - г) учащением частоты сердечных сокращений за счет расширения периферических артерий
- 122 Признаки ботулизма: а) геморрагическая сыпь
- б) расстройство глотания
 - в) расстройство зрения
 - г) рвота, частый жидкий стул
 - д) расстройство дыхания
 - е) запоры и вздутие живота
- 123 Профилактику столбняка необходимо проводить:
- а) только при укушенных ранах
 - б) при любых ранах
 - в) только в тех случаях, когда рана или ранящий предмет имели контакт с почвой
 - г) только при ожоговых ранах
- 124 Рентгенологическое контрастное исследование почек и мочевыводящих путей:
- а) ирригоскопия
 - б) томография
 - в) хромоцистоскопия
 - г) экскреторная урография
- 125 В России трансплантация может проводиться без согласия донора, если донор:
- а) особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение
 - б) гражданин страны, находящейся в состоянии войны с Россией
 - в) психически неполноценный
 - г) донор — умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов
- 126 Средством, укрепляющим сосудистую стенку является:
- а) викасол
 - б) глюконат кальция
 - в) димедрол
- 127 Дезинфекции должны подвергаться:
- а) все медицинские изделия после использования
 - б) только медицинские изделия, используемые в инвазивных процедурах
 - в) только хирургические инструменты после использования
 - г) только инструменты многократного использования
- 128 При открытом пневмотораксе необходимо наложить повязку:
- а) асептическую спиртовую
 - б) окклюзионную
 - в) теплоизолирующую
 - г) давящую
- 129 Ранние признаки появления тугоухости:
- а) гипертония
 - б) писк или звон в ушах при засыпании
 - в) трудность восприятия шепотной речи
 - г) снижение остроты слуха

- 130 Основные симптомы катаракты:
- а) повышение офтальмотонуса
 - б) потеря бинокулярного зрения
 - в) помутнение хрусталика
 - г) афакия
 - д) слепота
 - е) сужение полей зрения
- 131 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:
- а) две
 - б) три
 - в) четыре
 - г) пять
- 132 Стандартными отведениями ЭКГ называют:
- а) I, II, III
 - б) V1, V2, V3
 - в) V4, V5, V6
 - г) aVR, aVL, aVF
- 133 Антракоз – профессиональное заболевание:
- а) укладчиков асфальта
 - б) прядильщиц
 - в) шахтеров
 - г) водолазов
- 134 Вынужденное положение в постели пациента с плевритом:
- а) на спине
 - б) полусидя
 - в) на здоровом боку
 - г) на больном боку
- 135 Клиническими симптомами язвенной болезни двенадцатиперстной кишки являются:
- а) боль в эпигастральной области через 30 минут после еды, тошнота, рвота, понос
 - б) боль в эпигастральной области, отрыжка тухлым, обострение боли после приема жирной пищи
 - в) голодные и ночные боли, уменьшающиеся после приёма пищи, сезонность обострений
 - г) боль в правом подреберье, тошнота после еды, вздутие живота
- 136 Основные характеристики кожного геморрагического синдрома при тромбоцитопенической пурпуре:
- а) полиморфизм геморрагических высыпаний (от петехий до крупных кровоизлияний).
 - б) полихромность окраски кожных геморрагии.
 - в) асимметрия (нет излюбленной локализации) геморрагических элементов.
 - г) безболезненность
 - д) болезненность
 - е) симметричность
- 137 Признаками печеночной недостаточности являются:
- а) асцит
 - б) желтуха, геморрагический синдром
 - в) варикоз вен пищевода
 - г) запах ацетона от кожи и слизистых

- 138 Для современной модели профессиональной морали - биоэтики, основным принципом является:
- а) принцип "соблюдения долга"
 - б) принцип "не навреди"
 - в) принцип приоритета науки
 - г) принцип приоритета прав и уважения достоинства пациента
- 139 При клинической смерти сердечно-легочную реанимацию (СЛР) необходимо начать не позднее, чем через:
- а) 2 минуты
 - б) 3 минуты
 - в) 4 минуты
 - г) 5 минут
- 140 Аускультация сердечных тонов плода становится возможной со срока беременности:
- а) 20 недель
 - б) 22 недели
 - в) 16 недели
 - г) 25 недели
- 141 Частота проведения генеральной уборки (в процедурных кабинетах) 1 раз в:
- а) семь дней
 - б) десять дней
 - в) двадцать один день
 - г) месяц
- 142 Приступ почечной колики может спровоцировать:
- а) приём большого количества жидкости
 - б) переедание
 - в) хронический кашель
 - г) бег, тряская езда
- 143 При подозрении на дифтерию мазок из зева следует взять:
- а) с налета на миндалинах
 - б) на границе фибринозной пленки и здоровой ткани миндалина
 - в) со здоровой ткани миндалин
 - г) с любого участка миндалина
- 144 При возбуждении предсердий на ЭКГ образуется:
- а) зубец Р
 - б) зубец Т
 - в) QRS
 - г) зубец R
- 145 Признаки острого цистита:
- а) боли в пояснице, дизурия, повышение температуры до 39°C
 - б) боли в пояснице с иррадиацией в паховую область, наружные половые органы, дизурия
 - в) режущие боли при мочеиспускании, боли в области крестца, выделение нескольких капель крови в самом конце мочеиспускания
- 146 Объектом медицинского страхования является:
- а) страховой риск
 - б) страховой полис
 - в) страховой взнос
 - г) застрахованный человек

- 147 Дефицит пульса – симптом:
- а) инфаркта миокарда
 - б) инсульта
 - в) мерцательной аритмии
 - г) фибрилляции желудочков
- 148 Для ревматического артрита характерно:
- а) преимущественное поражение мелких суставов
 - б) преимущественное поражение крупных суставов
 - в) оставляет стойкие изменения с развитием функциональной недостаточности
 - г) проходит бесследно
- 149 Бронхиальная обструкция выявляется с помощью:
- а) спирометрии, пневмотахографии
 - б) бронхоскопии
 - в) рентгенография легких
 - г) ангиопульмонографии
- 150 При легочном кровотечении пациенту нужно придать положение:
- а) полусидя
 - б) горизонтальное без подушки
 - в) на животе
 - г) на левом боку
- 151 Непосредственную угрозу жизни в течение нескольких минут представляют:
- а) обморок
 - б) нарушение проходимости верхних дыхательных путей, клиническая смерть, наружное кровотечение
 - в) закрытый перелом
 - г) резаная рана
- 152 Острая психическая травма вызывает:
- а) эпилепсию
 - б) маниакально-депрессивный психоз
 - в) шизофрению
 - г) реактивный психоз
- 153 Температура воды для заполнения грелки:
- а) 18 – 24 °C
 - б) 36 – 37 °C
 - в) 42 – 45 °C
 - г) 60 – 70 °C
- 154 Понятие “информированное согласие” включает в себя все, кроме:
- а) информации о цели предполагаемого вмешательства
 - б) информации о характере предполагаемого вмешательства
 - в) информации о несомненном приоритете пользы вмешательства по сравнению с возможным риском
 - г) информации о связанном с вмешательством риске
- 155 При переломе костей предплечья шина накладывается:
- а) от лучезапястного сустава до верхней трети плеча
 - б) от лучезапястного до локтевого сустава
 - в) на место перелома
 - г) от кончиков пальцев до верхней трети плеча

- 156 Декомпенсация сочетанного митрального порока начинается с перегрузки:
- а) большого круга кровообращения
 - б) малого круга кровообращения
 - в) сразу обоих кругов кровообращения
 - г) порок не приводит к декомпенсации
- 157 На доврачебном этапе (при отсутствии ЭК можно думать о начавшемся инфаркте миокарда, если приступ стенокардии не купируется приемом нитроглицерина в течение:
- а) 20 - 30 минут
 - б) 30 минут – 1 часа
 - в) 1,5 – 2 часа
 - г) суток
- 158 ЭКГ-признаком острейшей стадии Q-инфаркта миокарда является:
- а) монофазная кривая
 - б) отрицательный зубец Т
 - в) удлинение интервала QT
 - г) отрицательный зубец Р
- 159 После введения простого инсулина пациент должен поесть не позднее, чем через:
- а) 5 минут
 - б) 10-15 минут
 - в) 20-30 минут
 - г) 40-60 минут
- 160 Инфаркт миокарда чаще развивается в:
- а) Левом предсердии
 - б) Левом желудочке
 - в) Правом желудочке
 - г) Правом предсердии
- 161 Лающий кашель, одышка смешанная, стридорозное дыхание, цианоз лица – симптомы:
- а) отека легких
 - б) ангионевротического отека с локализацией в области гортани
 - в) сердечной астмы
 - г) приступа бронхиальной астмы
- 162 Симптом флюктуации при гнойных поражениях кожи характеризуется:
- а) судорожным сокращением мимических мышц
 - б) крепитацией при пальпации
 - в) размягчением в центре инфильтрата
 - г) появлением пузырей на гиперемированной коже
- 163 Первичная медико-санитарная помощь включает мероприятия по медицинской профилактике:
- а) санитарно-гигиеническое просвещение населения, профилактику заболеваний
 - б) паллиативную медицинскую помощь
 - в) все виды медицинского обслуживания при заболеваниях в стационарах
 - г) оказание скорой помощи в экстренной форме
- 164 Граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска их развития, относятся к группе здоровья
- а) I
 - б) II
 - в) III а
 - г) III б

- 165 Минимальная температура, вызывающая гибель спорозоносных бактерий (в градусах по Цельсию):
- а) 60
 - б) 80
 - в) 100
 - г) 120
- 166 Возможное осложнение третьего периода лихорадки:
- а) озноб
 - б) повышенная потливость
 - в) бред
 - г) коллапс
- 167 Граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска их развития, относятся к группе здоровья
- а) I
 - б) II
 - в) III а
 - г) III б
- 168 Симптомом сотрясения головного мозга является:
- а) анизокория
 - б) ликворея из носа и ушей
 - в) ретроградная амнезия
 - г) длительная потеря сознания
- 169 Тактика фельдшера при ножевом ранении грудной клетки:
- а) удаление ранящего предмета из раны, обработка краев раны, наложение сухой асептической повязки
 - б) фиксация ранящего предмета к краям раны, наложение сухой асептической повязки
 - в) обработка раны, наложение окклюзионной повязки
 - г) остановка кровотечения, наложение повязки
- 170 При растяжении связок голеностопного сустава с целью фиксации накладывается:
- а) колосовидная повязка
 - б) спиральная повязка
 - в) циркулярная повязка
 - г) восьмиобразная повязка
- 171 При почечной колике в моче обнаруживают:
- а) белок
 - б) лейкоциты
 - в) цилиндры
 - г) эритроциты
- 172 Абсолютным признаком перелома кости является:
- а) патологическая подвижность
 - б) пружинящая фиксация
 - в) кровоподтеки
 - г) деформация
- 173 При диспансеризации пациентов с хроническим панкреатитом исследуют содержание в крови:
- а) фибриногена
 - б) белка
 - в) глюкозы
 - г) холестерина

- 174 Дренажное положение при абсцессе легкого с локализацией в нижней доле правого легкого:
- а) полусидя с наклоном в больную сторону
 - б) полусидя с наклоном в здоровую сторону
 - в) свесив, туловище с постели с наклоном в здоровую сторону
 - г) свесив, туловище с постели с наклоном в больную сторону
- 175 Подключичная артерия при кровотечении из нее прижимается к:
- а) углу нижней челюсти
 - б) ключице
 - в) VI шейному позвонку
 - г) I ребру
- 176 К аллергической реакции замедленного типа относится:
- а) анафилактический шок
 - б) отек Квинке
 - в) туберкулиновая реакция
 - г) крапивница
- 177 Использование реанимационного оборудования для пациента, находящегося в критическом состоянии, является:
- а) злоупотреблением терапевтическими средствами
 - б) реализацией принципа "борьбы за человеческую жизнь до конца"
 - в) признаком низкой квалификации специалиста
 - г) отсутствием у врача нравственного чувства и этической культуры
- 178 Согласно Постановлению Правительства РФ № 950 от 20.09.2012 реанимационные мероприятия прекращаются при признании их абсолютно бесперспективными, в частности, при неэффективности таковых:
- а) в течение 15 минут
 - б) в течение 25 минут
 - в) в течение 30 минут
 - г) в течение 1 часа
- 179 Симптомы инфаркта миокарда:
- а) боль за грудиной сжимающего характера, купирующаяся нитроглицерином
 - б) боль за грудиной в течение 4 - 5 дней, не купирующаяся нитроглицерином
 - в) боль за грудиной более 30 минут, не купирующаяся нитроглицерином
 - г) боль за грудиной менее 30 минут, возникающая ночью
- 180 Тактика фельдшера при носовом кровотечении:
- а) коагуляция сосудов слизистой оболочки носа
 - б) задняя тампонада
 - в) передняя тампонада, холод на переносицу
 - г) наложение пращевидной повязки
- 181 Основной диагностический критерий типичного острого инфаркта миокарда:
- а) артериальная гипотония
 - б) нарушение ритма сердца
 - в) загрудинная боль, продолжительностью более 30 минут
 - г) резкая слабость, холодный пот

- 182 Здоровый образ жизни включает в себя:
- а) благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе поведенческой, гигиенические навыки
 - б) состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
 - в) принятие мер, направленных на снижение влияния вредных факторов на организм человека
 - г) привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом
- 183 Больной 30 лет строитель обратился с жалобами на мучительный сухой кашель, насморк, чихание, слезотечение. Из анамнеза бронхолегочными заболеваниями не страдает. Заболел остро после переохлаждения, появились боль и жжение за грудиной при кашле, поднялась температура до 37,5°C. В легких при перкуссии - в пределах нормы. При аускультации - жесткое дыхание, единичные сухие хрипы. Рентгенография легких: отклонений от нормы не обнаружено. Общий анализ крови без изменений. Какое заболевание можно подозревать у больного:
- а) острый трахеобронхит
 - б) пневмония
 - в) хронический обструктивный бронхит
 - г) ОРВИ
 - д) плеврит
- 184 Клинические симптомы тугоухости:
- а) ухудшение восприятия звуков
 - б) способность различать интенсивный звук
 - в) плохая разборчивость речи
 - г) улучшение восприятия звуков
 - д) шум в ушах
- 185 Для лечения пневмонии используют:
- а) антибиотики, сульфаниламиды, ЛФК, массаж
 - б) аэрозоли с новодрином, астмопентом
 - в) увлажненный кислород, витамины группы В и С
- 186 Острая дыхательная недостаточность при истинном (альвеолярном) отеке легких возникает в результате:
- а) пропотевания плазмы крови в альвеолы
 - б) попадания жидкости в альвеолы (аспирация жидкости)
 - в) пропотевания форменных элементов крови в альвеолы
 - г) бронхоспазма
- 187 Экстренной госпитализации подлежат пациенты с:
- а) впервые возникшей стенокардией
 - б) стенокардией третьего функционального класса
 - в) стенокардией четвертого функционального класса
 - г) подозрением на инфаркт миокарда
- 188 Сердечная недостаточность обусловлена нарушением следующей функцией сердца:
- а) автоматизма
 - б) проводимости
 - в) сократимости
 - г) возбудимости

- 189 Укажите основное мероприятие по профилактике профессионального заражения при работе с биологическими жидкостями пациентов:
- а) применение в работе с инфицированными пациентами средств индивидуальной защиты, исключение контакта кожи медицинского работника и слизистых пациента,
 - б) плановая вакцинация медицинского персонала скорой медицинской помощи против вирусного гепатита В, предельно осторожное обращение с острыми и режущими инструментами,
 - в) проведение доплат за работу с кровью, за работу с инфицированными пациентами,
 - г) тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у пациентов
- 190 Рана является проникающей, если:
- а) повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка (плевра, брюшина)
 - б) в ней находится инородное тело
 - в) повреждены только кожа и подкожная клетчатка
 - г) повреждены мышцы и кости
- 191 Четвертый грудной электрод (V4) устанавливается в:
- а) третьем межреберье слева у края грудины
 - б) четвертом межреберье слева у края грудины
 - в) четвертом межреберье на срединно-ключевой линии
 - г) пятом межреберье на срединно-ключевой линии
- 192 Препараты для первой помощи при анафилактическом шоке:
- а) адреналин
 - б) анальгин
 - в) преднизолон
 - г) тавегил
- 193 Для гематурической формы гломерулонефрита наиболее характерны:
- а) макрогематурия
 - б) лейкоцитурия
 - в) отеки, гипертензия
- 194 Основные причины и симптомы молочницы:
- а) возникновение белых крошек на гиперемизированной слизистой оболочке губ, щек, языке, деснах
 - б) приобретение патогенных свойств дрожжеподобными грибами
 - в) нарушение гигиенического режима
- 195 Гемодиализ применяется для устранения:
- а) гипокалиемии
 - б) гипонатриемии
 - в) гиперкалиемии
 - г) гипернатриемии
- 196 При хроническом гастрите с выраженной секреторной недостаточностью наблюдается:
- а) тошнота
 - б) склонность к запорам
 - в) горечь во рту
 - г) изжога

- 197 Острая надпочечниковая недостаточность развивается при внезапной отмене:
- а) преднизолона
 - б) метилурацила
 - в) делагила
 - г) фуросемида
- 198 Клинические проявления свинцовой колики:
- а) резкие схваткообразные боли в животе
 - б) положительные симптомы раздражения брюшины
 - в) запор, не уступающий действию слабительных
 - г) повышение артериального давления (АД), брадикардия
- 199 Использованные шприцы, перчатки, ватные шарики относятся к медицинским отходам:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г
- 200 Иктеричность кожи характерна для:
- а) гипопластической анемии
 - б) железодефицитной анемии
 - в) гемолитической анемии
 - г) постгеморрагической анемии
- 201 Комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом:
- а) антисептика
 - б) асептика
 - в) дезинфекция
 - г) стерилизация
- 202 Входит в группу системных болезней соединительной ткани:
- 1) системная красная волчанка
 - 2) системная склеродермия
 - 3) дерматомиозит
 - 4) остеоартроз
- 203 Положение пациента при переломе костей таза на:
- а) животе
 - б) боку с приведенными к животу ногами
 - в) спине в положении Волковича («лягушки»)
 - г) спине с выпрямленными ногами
- 204 Распространенность воспалительного процесса при крупозной пневмонии:
- а) ацинус
 - б) долька
 - в) сегмент
 - г) доля, несколько долей
- 205 Наиболее ранние нарушения при вибрационной болезни:
- а) сенсорные
 - б) спазм капилляров
 - в) остеопороз
 - г) тремор конечностей

- 206 Лихорадку называют пиретической, если температура тела (в градусах по Цельсию):
- а) 37 – 38
 - б) 38 – 39
 - в) 39 – 40
 - г) 41 и выше
- 207 Бактериурия – характерна для:
- а) пиелонефрита
 - б) гломерулонефрита
 - в) мочекаменной болезни
 - г) амилоидоза почек
- 208 Положение пациента при экссудативном перикардите:
- а) лежа на боку
 - б) сидя с наклоном туловища вперед
 - в) горизонтальное с приподнятыми ногами
 - г) горизонтальное
- 209 Осложнение бронхиальной астмы:
- а) пневмосклероз
 - б) эмфизема легких
 - в) хронический обструктивный бронхит
 - г) крупозная пневмония
- 210 Гемартроз является характерным признаком:
- а) гемофилии
 - б) ревматизма
 - в) ревматоидного артрита
 - г) геморрагического васкулита
- 211 При абсцессе легких оптимальный способ введения антибиотиков:
- а) через рот
 - б) в плевральную полость
 - в) эндобронхиально
 - г) парентерально
- 212 При остром холецистите, остром гепатите в стадии выздоровления назначается вариант диеты:
- а) с механическим и химическим щажением
 - б) с повышенным содержанием белка
 - в) основной стандартной
 - г) с пониженной калорийностью
- 213 Инфракрасное излучение может вызвать:
- а) катаракту
 - б) блефароконъюнктивит
 - в) тепловой удар
 - г) тепловое истощение
- 214 Анемия – это:
- а) изменение цветового показателя
 - б) уменьшение гемоглобина
 - в) уменьшение эритроцитов
 - г) уменьшение количества крови

- 215 Под понятием «здоровье» подразумевают:
- а) отсутствие расстройств функций органов и систем организма
 - б) состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов
 - в) состояние полного физического, психического и социального благополучия
 - г) состояние, сопровождающееся получением удовольствия от жизни
- 216 Первичная медико-санитарная помощь в сельском здравоохранении представлена:
- а) ФАП, врачебной амбулаторий, участковой больницей
 - б) ЦРБ, РКБ
- 217 Характерные симптомы локализованной формы дифтерии зева:
- а) на миндалинах налет серо-белого цвета в виде островков или плотных пленок
 - б) гиперемизированные, увеличенные миндалины с желтоватым налетом
 - в) образование эрозивных поверхностей на миндалинах при попытках удаления налета
 - г) отечность, гиперемия задней стенки глотки
- 218 Для хронического бронхита характерен кашель с мокротой в течение:
- а) 2 месяцев не менее 3-х лет
 - б) 3 месяцев не менее 2-х лет
 - в) 3 месяцев не менее 3-х лет
 - г) 4 месяцев не менее 3-х лет
- 219 К нагноительным заболеваниям легких относятся:
- а) бронхиальная астма
 - б) абсцесс легких
 - в) гангрена легких
 - г) пневмония
- 220 В анализе мокроты при atopической бронхиальной астме обнаруживают:
- а) большое количество лейкоцитов
 - б) большое количество эритроцитов
 - в) большое количество эозинофилов
 - г) большое количество цилиндров
- 221 Разница между частотой сердечных сокращений и частотой периферического пульса называется:
- а) аритмией
 - б) пульсовым давлением
 - в) дефицитом пульса
 - г) тахикардией
- 222 Продукты, рекомендованные в качестве профилактического питания при повышенных концентрациях свинца:
- а) молоко
 - б) масло
 - в) кефир
 - г) соки
- 223 Правильное расположение активных электродов при регистрации ЭКГ:
- а) с красной маркировкой – на правую ногу
 - б) с красной маркировкой – на левую ногу
 - в) с зеленой маркировкой – на правую ногу
 - г) с зеленой маркировкой – на левую ногу

- 224 Неотложная помощь при почечной колике:
- а) нитрофураны
 - б) спазмолитики
 - в) тепло
 - г) антибиотики
- 225 Повышение температуры, озноб, боль в пояснице, дизурические явления характерны для:
- а) острого гломерулонефрита
 - б) острого пиелонефрита
 - в) хронического гломерулонефрита
 - г) почечной колики
- 226 Маршрут, по которому осуществляется вынос (вывоз) и транспортировка пораженных из очага поражения до этапов медицинской эвакуации, называется:
- а) путем медицинской эвакуации
 - б) плечом медицинской эвакуации
 - в) эвакуационным направлением
 - г) эвакуационным маршрутом
- 227 Противопоказания для катетеризации мочевого пузыря:
- а) уретрит
 - б) взятие мочи на анализ
 - в) промывание мочевого пузыря
 - г) гениурия
- 228 Укажите симптом, который не характерен для нефротической формы хронического гломерулонефрита:
- а) протеинурия
 - б) гематурия
 - в) артериальная гипертония
 - г) отеки
- 229 Геморрагический синдром при гемофилии у детей характеризуется наличием:
- а) папул
 - б) петехий
 - в) экхимозов
 - г) гематом
- 230 Функциональный класс стенокардии, при котором приступ боли возникает при ходьбе менее чем на 100 м или в покое:
- а) четвертый
 - б) третий
 - в) второй
 - г) первый
- 231 Гиперхромной анемией является:
- а) железодефицитная
 - б) В-12 и фолиеводефицитная
 - в) гемолитическая
 - г) острая постгеморрагическая
- 232 Выделение большого количества гнойной мокроты («полным ртом») характерно для:
- а) бронхита
 - б) первого периода абсцесса легких
 - в) второго периода абсцесса легких
 - г) очагового туберкулеза легких

- 233 Шум, оказывающий наиболее ранние и выраженные изменения в ухе:
- а) низкочастотный
 - б) высокочастотный
 - в) стабильный
 - г) импульсный
- 234 Тип нарушения дыхания при черепно-мозговой травме:
- а) Куссмауля
 - б) Чейн-Стокса
 - в) Биота
 - г) поверхностное
- 235 Мероприятия при обзорном осмотре пострадавшего для выявления и временной остановки наружного кровотечения включают:
- а) пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, давящей повязки
 - б) наложение асептической повязки
 - в) иммобилизацию конечности
 - г) только максимальное сгибание конечности в суставе
- 236 При наличии паров хлора в атмосфере рекомендуется использовать ватномарлевую повязку:
- а) смоченную в растворе уксуса
 - б) смоченную в растворе спирта
 - в) смоченную в растворе питьевой соды
 - г) сухую
- 237 Показания для очистительной клизмы
- а) запоры
 - б) неясные боли в животе
 - в) RRS
 - г) отравления
- 238 Клиническая картина при болезни и синдроме Иценко-Кушинга обусловлена повышением секреции:
- а) гормона роста
 - б) кортизола
 - в) пролактина
 - г) тиреотропного гормона
- 239 Дефицит пульса характерен для:
- а) мерцательной аритмии
 - б) синусовой тахикардии
 - в) синусовой брадикардии
 - г) блокаде левой ножки пучка Гиса
- 240 К предраку желудка можно отнести:
- а) желчнокаменную болезнь
 - б) болезнь Мэллори-Вейсса
 - в) хронический панкреатит
 - г) хроническую язву большой кривизны желудка
- 241 Зону некроза на ЭКГ при инфаркте миокарда отражает зубец:
- а) Q
 - б) P
 - в) R
 - г) S

- 242 Укажите симптомы, характерные для остеоартрита тазобедренного или коленного сустава в начальной стадии заболевания:
- а) постоянные ноющие боли
 - б) ночные боли, боли после длительного пребывания на ногах
 - в) боли в суставе в начале ходьбы, ночные боли
 - г) боли после длительной ходьбы и длительного пребывания на ногах
- 243 Основными симптомами травматического шока являются:
- а) снижение артериального давления (АД), частый и слабый пульс
 - б) снижение артериального давления (АД), редкий пульс
 - в) повышение артериального давления (АД), частый и слабый пульс
 - г) повышение артериального давления (АД), редкий пульс
- 244 Симптомы хронического гепатита:
- а) гиперемия кожи, сосудистые звездочки выше пояса, мутная розовая моча
 - б) ахиличный кал, моча цвета темного пива, иктеричность кожи и слизистых, сосудистые звездочки
 - в) цианоз щек, эритроцитоз, моча оранжевая
 - г) зеленоватая бледность кожи, тромбоцитопения, моча цвета «мясных помоев»
- 245 Профессиональным заболеванием ныряльщиков, стеклодувов, музыкантов духовых инструментов является:
- а) анемия
 - б) пневмосклероз
 - в) эмфизема легких
 - г) гемосидероз
- 246 Для гипертензивного криза II вида характерно:
- а) преимущественное повышение диастолического давления
 - б) преимущественное повышение систолического давления
 - в) постепенное развитие криза с вестибулярным нарушением
 - г) тахикардия
- 247 Стенокардические боли носят характер:
- а) колющих
 - б) сжимающих, давящих за грудиной
 - в) постоянных ноющих в левой половине грудной клетки
 - г) интенсивных болей за грудиной, более 20 минут, не купирующихся приемом нитроглицерина
- 248 Верхним пределом нормального АД считаются цифры:
- а) 120/80 мм рт.ст.
 - б) 135/85 мм рт.ст.
 - в) 139/89 мм рт.ст.
 - г) 159/89 мм рт.ст.
- 249 В гиппократовской модели биомедицинской этики основным принципом является:
- а) не навреди
 - б) не убий
 - в) приоритет интересов науки
 - г) принцип автономии личности

- 250 Интервал нормальной удельной плотности мочи:
- а) 1000 - 1015
 - б) 1010 - 1015
 - в) 1015 - 1025
 - г) 1025 - 1035
- 251 Для предупреждения западения корня языка при проведении реанимации голова пострадавшего должна быть:
- а) повернута на бок
 - б) запрокинута назад
 - в) согнута вперед
 - г) в исходном положении
- 252 Этическая неприемлемость "аномальной техники деторождения" связана:
- а) с нарушением права ребенка быть рожденным в традиционном браке естественным путем
 - б) с уничтожением "лишних" человеческих эмбрионов
 - в) с обесцениваем ценности и значения материнства и материнской любви в случаях легализации "суррогатного материнства"
 - г) со всеми перечисленными факторами
- 253 Для купирования приступа стенокардии на доврачебном этапе нитроглицерин можно применять повторно с интервалом:
- а) 20-30 минут
 - б) 10-15 минут
 - в) 5-10 минут
 - г) 5 минут
- 254 Текущая уборка перевязочной осуществляется:
- а) в начале и в конце рабочего дня
 - б) в начале рабочего дня
 - в) в конце рабочего времени
 - г) 1 раз в неделю
- 255 Комбинированным пороком сердца является:
- а) недостаточность митрального клапана
 - б) стеноз левого атриовентрикулярного отверстия
 - в) сочетанный митральный порок
 - г) недостаточность митрального клапана с недостаточностью клапанов аорты
- 256 У больной 46 лет, страдающей варикозным расширением вен нижних конечностей внезапно развилась загрудинная боль, одышка смешанного характера, свистящие хрипы, падение АД. Какое из нижеперечисленных заболеваний может обусловить приведенную клиническую картину:
- а) артериальная гипотония
 - б) спонтанный пневмоторакс
 - в) бронхиальная астма
 - г) тромбоэмболия легочной артерии
- 257 Если пораженные следуют общим потоком через все этапы, развернутые на пути эвакуации- это эвакуация:
- а) «от себя»
 - б) «по назначению»
 - в) «по направлению»
 - г) «на себя»

- 258 Появление патологического зубца Q на ЭКГ является:
- а) признаком синусовой аритмии
 - б) признаком стенокардии
 - в) признаком инфаркта миокарда
 - г) блокады одной из ножек пучка Гиса
- 259 Тяжесть отравления окисью углерода определяется процентным содержанием в крови:
- а) метгемоглобина
 - б) карбоксигемоглобина
 - в) эритроцитов с базофильной зернистостью
 - г) оксигемоглобина
- 260 Острый гастрит- это:
- а) дистрофические изменения в слизистой оболочек желудка
 - б) воспаление слизистой оболочки желудка
 - в) воспаление слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника
- 261 Предраковым заболеванием молочной железы является:
- а) фиброма железы
 - б) мастит
 - в) мастопатия
 - г) гемангиома молочной железы
- 262 Ранним проявлением скрытых отеков является:
- а) асцит
 - б) гидроторакс
 - в) ямка, остающаяся от надавливания на передней поверхности голени
 - г) уменьшение образования и выделения мочи с одновременным увеличением веса пациента
- 263 Биомедицинская этика и медицинское право должны находиться в состоянии:
- а) независимости
 - б) медицинское право - приоритетно
 - в) должен быть выдержан приоритет биомедицинской этики
 - г) биомедицинская этика - критерий корректности медицинского права
- 264 Воспаление крупных суставов, летучесть болей характерны для:
- а) ревматического полиартрита
 - б) ревматоидного артрита
 - в) подагры
 - г) деформирующего остеоартроза
- 265 Первоочередной эвакуации подлежат пораженные сортировочной группы:
- а) первой
 - б) второй
 - в) третьей
 - г) четвертой
- 266 Ценность человеческой жизни в биомедицинской этике определяется:
- а) возрастом (количество прожитых лет)
 - б) расовой и национальной принадлежностью
 - в) финансовой состоятельностью
 - г) уникальностью и неповторимостью личности

- 267 При острой пневмонии основным фактором возникновения гипоксемии является:
- а) поверхностное дыхание
 - б) повышение температуры
 - в) повышение метаболизма
 - г) анемия
- 268 Лист нетрудоспособности единовременно выдается пациенту на срок:
- а) 3 дня
 - б) 6 дней
 - в) 15 дней
 - г) 10 дней
 - д) 30 дней
- 269 Тактика фельдшера при повреждении глаза:
- а) закапывание глазных антибактериальных капель, асептическая повязка, госпитализация
 - б) асептическая повязка, анальгин, амбулаторное лечение
 - в) анальгин, седуксен, госпитализация
 - г) лидокаин, асептическая повязка, госпитализация
- 270 Характер сыпи при краснухе:
- а) пятнисто-папулезная
 - б) уртикарная
 - в) геморрагическая
 - г) мелкоточечная
- 271 В укладке для оказания первой помощи персоналу, получившему во время оказания медицинской помощи ранения необеззараженным медицинским инструментарием, связанные с риском профессионального инфицирования, необходимо предусмотреть наличие всех указанных медикаментов, кроме:
- а) 5% спиртового раствора йода,
 - б) лейкопластырь,
 - в) 1% раствор азотнокислого серебра,
 - г) 70% этиловый спирт
- 272 Паллиативная медицинская помощь оказывается неизлечимо больным гражданам и направлена на:
- а) избавление от боли, облегчение тяжёлых проявлений болезни, улучшение качества жизни
 - б) улучшение состояния органов и систем
 - в) восстановление работоспособности
 - г) выздоровление
- 273 Акромегалия – это заболевание, возникающее при патологии:
- а) гипофиза
 - б) гипоталамуса
 - в) надпочечников
 - г) яичников
- 274 Активная эвтаназия отличается от пассивной:
- а) отсутствием согласия или просьбы пациента о лишении жизни
 - б) приоритетностью решения врача перед решением пациента о прекращении жизни пациента
 - в) активным, деятельным, вмешательством врача в процесс прекращения жизни по просьбе пациента
 - г) умышленным или преднамеренным лишением жизни человека

- 275 Угрозу жизни больного с анафилактическим шоком создают:
- а) острая сосудистая недостаточность
 - б) желудочно-кишечный синдром
 - в) острая дыхательная недостаточность
 - г) кожный синдром
 - д) коматозная форма шока
 - е) кожные проявления шока
- 276 Достоверный ЭКГ-признак инфаркта миокарда:
- а) смещение сегмента ST
 - б) появление патологического зубца Q
 - в) отрицательный зубец T
 - г) корытообразный зубец T
- 277 Ограниченное скопление гноя в тканях – это:
- а) гематома
 - б) абсцесс
 - в) флегмона
 - г) фурункул
- 278 Способом временного гемостаза при артериальном кровотечении является:
- а) наложение жгута
 - б) наложение давящей повязки
 - в) прошивание сосуда
 - г) перевязка сосуда
- 279 Симптомами ушиба почки являются:
- а) гематурия
 - б) боль в пояснице
 - в) повышение температуры тела
 - г) гематома в области поясницы
- 280 АД, равное 140/90 мм рт. ст., является:
- а) гипотензией
 - б) вариантом нормы
 - в) гипертензией
 - г) изолированной диастолической гипертензией у лиц пожилого возраста
- 281 Пульсовое давление в норме колеблется в интервале:
- а) 10 - 20 мм рт.ст.
 - б) 20 - 30 мм рт.ст.
 - в) 30 - 50 мм рт.ст.
 - г) 50 - 70 мм рт.ст.
- 282 Характер и локализация боли при остром холецистите:
- а) постоянная в правом подреберье
 - б) постоянная в правой подвздошной области
 - в) схваткообразная вокруг пупка
 - г) «кинжальная» в эпигастральной области
- 283 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие пульса на:
- а) локтевой артерии
 - б) лучевой артерии
 - в) сонной артерии
 - г) бедренной артерии

- 284 Предраковым заболеванием желудка является:
- а) острый гастрит
 - б) хронический анацидный гастрит
 - в) дискинезия желчевыводящих путей
 - г) острая язва желудка
- 285 Тактика фельдшера при инородных телах уха:
- а) госпитализация в оториноларингологическое отделение в любой ситуации
 - б) амбулаторная консультация ЛОР - врача
 - в) удаление инородного тела, консультация ЛОР - врача
 - г) удаление инородного тела, антибиотики, обезболивающие
- 286 Характерным симптомом абсцесса является симптом:
- а) деформации
 - б) крепитации
 - в) флюктуации
 - г) малигнизации
- 287 Характерным клиническим признаком рака молочной железы является:
- а) цианоз кожи железы
 - б) резкая боль при пальпации
 - в) повышение температуры кожи железы
 - г) втянутый сосок
- 288 Шум трения плевры выслушивается
- а) на вдохе и выдохе
 - б) при форсированном выдохе
 - в) на выдохе
 - г) на вдохе
- 289 Пациент имеет право на:
- а) создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья;
 - б) соблюдение режима лечения, в том числе определенного на период временной нетрудоспособности;
 - в) выбор врача и выбор медицинской организации;
 - г) осуществление рекламы лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания
- 290 К клиническим симптомам острого сальпингоофорита относятся:
- боли в эпигастрии;
 - а) повышение температуры, озноб;
 - б) нарушение менструального цикла;
 - в) гнойные выделения из половых путей;
 - г) верно все вышеперечисленное
- 291 Для злокачественной опухоли характерно:
- а) чёткие границы, спаянность с тканями, отсутствие метастазов
 - б) нечёткие границы, неспаянность с тканями, метастазирование
 - в) отсутствие границ, спаянность с тканями, метастазирование
 - г) отсутствие границ, неспаянность с тканями, отсутствие метастазов
- 292 Тактика фельдшера на догоспитальном этапе при гипергликемической коме:
- а) инсулин, супрастин, экстренная госпитализация
 - б) кордиамин, инсулин, экстренная госпитализация
 - в) оксигенотерапия, инсулин, экстренная госпитализация
 - г) оксигенотерапия, экстренная госпитализация

- 293 Цветовой показатель – это:
- а) степень насыщения эритроцитов гемоглобином
 - б) соотношение между плазмой и форменными элементами
 - в) изменение формы эритроцитов
 - г) изменение диаметра эритроцитов
- 294 Тактика фельдшера при отрыве конечностей:
- а) остановка кровотечения, обезболивание, асептическая повязка, госпитализация
 - б) асептическая повязка, обезболивание, наложение шины, госпитализация
 - в) остановка кровотечения, ушивание раны, иммобилизация, госпитализация
 - г) ушивание раны, обезболивание, госпитализация
- 295 Суточные колебания температуры тела в пределах 1 градуса характерны для лихорадки:
- а) постоянной
 - б) послабляющей
 - в) перемежающейся
 - г) гектической
- 296 Основным клиническим симптомом кишечной непроходимости является:
- а) дискообразное напряжение брюшной стенки
 - б) частое и болезненное мочеиспускание
 - в) ладьевидный живот
 - г) отсутствие стула более трех суток и не отхождение газов
- 297 Пациентам с гломерулонефритом рекомендовано ограничение:
- а) поваренной соли
 - б) жидкости
 - в) белков
 - г) жиров
- 298 Наиболее информативным методом диагностики пневмонии является:
- а) рентгенография грудной клетки
 - б) анализ крови
 - в) плевральная пункция
 - г) анализ мокроты
- 299 Медицину и этику объединяет:
- а) человек как предмет изучения
 - б) методы исследования
 - в) овладение приемами преодоления конфликтов в человеческих взаимоотношениях
 - г) стремление к знанию механизмов человеческого поведения управлению им
- 300 Примесь неизменной крови в каловых массах характерна для кровотечения:
- а) массивного желудочного
 - б) капиллярного желудочного
 - в) из тонкой кишки
 - г) из толстой кишки