

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОБЩАЯ ПРАКТИКА»**

(для медицинских сестёр общей практики, прошедших обучение по циклам
19.1 "Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению", профессиональной
переподготовки по специальности
«Общая практика»)

- 1 Электрод, маркированный красным цветом, накладывается на:
 - а) левую руку
 - б) правую руку
 - в) левую ногу
 - г) правую ногу
- 2 Липодистрофия – это:
 - а) атрофия мышечной ткани
 - б) атрофия подкожно-жировой клетчатки
 - в) атрофия кожи
 - г) дегенерация хряща
- 3 Осмотр молочных желез пациентки проводят в положении:
 - а) стоя
 - б) сидя
 - в) лежа
 - г) стоя, положив руки пациентки на пояс или за голову
- 4 Диетотерапия при гломерулонефрите предполагает:
 - а) увеличение питьевого режима
 - б) ограничение соли и жидкости
 - в) дополнительное введение мяса, рыбы
 - г) ограничение овощных и фруктовых блюд
- 5 Колоноскопия - это исследование толстой кишки:
 - а) рентгенологическое
 - б) ультразвуковое
 - в) эндоскопическое
 - г) томографическое
- 6 К какой диспансерной группе относятся пациенты с бронхиальной астмой:
 - а) I
 - б) II
 - в) III
 - г) 0
- 7 При оказании неотложной помощи при переломе голени надо обеспечить иммобилизацию:
 - а) только места перелома
 - б) коленного сустава
 - в) коленного и голеностопного суставов
 - г) голеностопного, коленного и тазобедренного суставов

- 8 Физические нагрузки больному сахарным диабетом рекомендуется выполнять:
- а) до еды
 - б) после еды
 - в) после инъекции инсулина
 - г) не имеет значения
- 9 Истощение пациента, чувство переполнения в эпигастрии, рвота при язвенной болезни – это симптом:
- а) малигнизации
 - б) пенетрации
 - в) стеноза привратника
 - г) клинического кровотечения
- 10 Сроки диспансерного наблюдения за онкологическим больным после проведенного лечения:
- а) в течение всей жизни
 - б) в течение 5 лет
 - в) в течение 10 лет
 - г) в течение 15 лет
- 11 Для специфической профилактики инфекционных заболеваний применяют:
- а) витамины
 - б) вакцины
 - в) антибиотики
 - г) пробиотики
- 12 Амилоидоз - это:
- а) деформация суставов
 - б) ограничение пассивных движений в суставе
 - в) неподвижность сустава вследствие сращения суставных поверхностей
 - г) заболевание с отложением специфического белка в органах и тканях
- 13 К оболочкам глаза относится все перечисленное, кроме:
- а) роговица
 - б) сосудистая оболочка
 - в) сетчатка
 - г) хрусталик
- 14 Первоочередное независимое сестринское вмешательство перед вакцинацией:
- а) измерение температуры тела
 - б) проведение психологической подготовки
 - в) измерение артериального давления
 - г) исследование крови
- 15 Назовите основной вид расстройства интеллекта:
- а) нарушение сна
 - б) снижение памяти
 - в) деменция, умственная отсталость
 - г) бредовое расстройство, амнезия
- 16 Врачебную тайну составляет информация:
- а) о факте обращения гражданина за медицинской помощью
 - б) о состоянии здоровья гражданина
 - в) любая информация о личной жизни гражданина, полученная при обследовании и лечении
 - г) о состоянии здоровья родственников

- 17 Клиническими проявлениями гипертиреоза являются:
- а) раздражительность, потливость, повышенная масса тела, снижение температуры тела
 - б) вялость, заторможенность, сонливость
 - в) снижение массы тела, снижение температуры тела, брадикардия
 - г) снижение массы тела, тахикардия, повышение температуры тела, раздражительность, потливость
- 18 Гломерулонефрит-заболевание:
- а) аллергической природы
 - б) инфекционной природы
 - в) инфекционно-аллергической природы
 - г) врожденное с наследственной предрасположенностью
- 19 Риск развития сепсиса у новорождённого ребёнка связан с наличием:
- а) кандидозного стоматита
 - б) резус-конфликта
 - в) омфалита
 - г) физиологической эритемы
- 20 Клинические проявления рака тела матки:
- а) серозные и кровянистые выделения
 - б) зуд наружных половых органов
 - в) учащенное мочеиспускание
 - г) увеличение живота, боли
- 21 Причиной частых срыгиваний у детей является слабое развитие:
- а) кардиального сфинктера желудка
 - б) пилорического отдела желудка
 - в) дна желудка
 - г) секреторных желез
- 22 Признак врожденной глаукомы у новорожденного:
- а) косоглазие
 - б) увеличение размера роговицы
 - в) эндофтальм
 - г) нистагм
- 23 При ожирении назначается вариант диеты:
- а) основной стандартной
 - б) с пониженным количеством белка
 - в) с пониженной калорийностью
 - г) с механическим и химическим щажением
- 24 Температура лекарственного раствора при закапывании в ухо (в градусах по Цельсию):
- а) 20–22
 - б) 24–30
 - в) 37–38
 - г) 42–45
- 25 Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию сердца включает:
- а) промывание желудка
 - б) очистительная клизма
 - в) разъяснение сущности исследования
 - г) проведение бронхоскопии

- 26 Срок повторного осмотра пациента после обнаружения педикулеза и обработки волосистой части головы (в днях):
- а) 14
 - б) 7-10
 - в) 5
 - г) 3
- 27 Для холеры характерен стул:
- а) в виде малинового желе
 - б) темный дегтеобразный
 - в) в виде «рисового отвара»
 - г) водянистый, с примесью крови
- 28 Сестринские рекомендации при ветряной оспе включают:
- а) проведение ежедневных гигиенических ванн
 - б) ограничение витаминизированного питья
 - в) изоляцию ребёнка, стрижку ногтей
 - г) измерение диуреза, артериального давления
- 29 Пикфлоуметрия - это определение:
- а) дыхательного объема
 - б) жизненной емкости легких
 - в) остаточного объема
 - г) пиковой скорости выдоха
- 30 Острота зрения определяется при помощи:
- а) сетки Горяева
 - б) таблицы Сивцева
 - в) таблицы Рабкина
 - г) таблицы Юстовой
- 31 Формированию нервно-психического здоровья детей способствуют:
- а) стрессовые ситуации, эмоциональные игры
 - б) пассивное курение в семье
 - в) развивающие игры, словесный контакт с ребёнком
 - г) отказ от профилактических прививок
- 32 Нормальное АД находится в интервале (в мм рт. ст.):
- а) 100/60-140/95
 - б) 120/80-130/90
 - в) 100/60-139/89
 - г) 110/70-150/85
- 33 Методы исследования слуха:
- а) вестибулометрия
 - б) отоскопия
 - в) аудиометрия
 - г) вращательная проба
- 34 Соотношение компрессий на грудину и искусственных вдохов при проведении реанимации
- а) 2:15
 - б) 3:6
 - в) 30:2
 - г) 1:5

- 35 Укажите заболевание, при котором проводится специфическая вакцинопрофилактика:
- а) дизентерия
 - б) сальмонеллез
 - в) вирусный гепатит С
 - г) дифтерия
- 36 Клинический признак посттравматического стрессового расстройства при тяжёлой адаптации ребёнка в детском дошкольном учреждении:
- а) активная игра со сверстниками
 - б) хороший аппетит
 - в) развитие неврозов
 - г) спокойный сон
- 37 В полость матки инфекция чаще всего проникает через цервикальный канал:
- а) с помощью трихомонад
 - б) с помощью сперматозоидов
 - в) в результате отрицательного внутрибрюшного давления, возникающего при движении диафрагмы
 - г) всеми перечисленными способами
- 38 Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются:
- а) генетические
 - б) уровень и образ жизни населения
 - в) уровень, качество и доступность медицинской помощи
 - г) все вышеперечисленное
- 39 Поллиноз – аллергическое заболевание, вызываемое:
- а) шерстью животных
 - б) пылью растений
 - в) домашней пылью
 - г) продуктами питания
- 40 Туберкулез - заболевание:
- а) острое инфекционное
 - б) наследственное
 - в) хроническое инфекционное
 - г) неинфекционное
- 41 Диета, рекомендуемая при остром кариесе:
- а) богатая углеводами пища
 - б) однородная мясная пища
 - в) с достаточным содержанием белков, солей, витаминов
 - г) богатая белками пища
- 42 Постельный режим больным с пневмонией назначается:
- а) на первые три дня заболевания
 - б) только при тяжелом течении заболевания
 - в) в течение всего лихорадочного периода
 - г) в течение недели
- 43 Диетотерапия при хроническом гастродуодените включает:
- а) отварное мясо, рыбу
 - б) мясные, рыбные и грибные бульоны
 - в) свежий хлеб и различную выпечку
 - г) апельсины, киви, мандарины

- 44 В зависимости от вида анафилактического шока могут развиваться:
- а) ларингоспазм
 - б) бронхоспазм
 - в) снижение АД
 - г) стенокардия
- 45 Первый этап скрининг-программы включает проведение:
- а) флюорографии
 - б) электрокардиографии
 - в) антропометрии
 - г) энцефалографии
- 46 К эндоскопическим методам обследования органов дыхания относится:
- а) рентгенография
 - б) флюорография
 - в) бронхоскопия
 - г) спирография
- 47 Пациенту, помещённому в психиатрический стационар добровольно, при его требовании о выписке:
- а) не может быть отказано
 - б) может быть отказано комиссией врачей-психиатров при наличии оснований для госпитализации в недобровольном порядке
 - в) может быть отказано единоличным решением лечащего врача
 - г) может быть отказано решением главного врача
- 48 Апраксия, нарушение навыков самоухода в большей степени характерны для:
- а) шизофрении
 - б) сосудистой деменции
 - в) болезни Альцгеймера
 - г) депрессии
- 49 Афазия - это:
- а) утрата речевых способностей как средства выражения мыслей
 - б) нарушение мыслей, процессов узнавания предметов, вещей, животных, людей
 - в) нарушение понимания устной речи
 - г) нарушение письма
- 50 Для исследования суточной глюкозурии мочу собирают за:
- а) 4 часа
 - б) 9 часов
 - в) 24 часа
 - г) 8 порций, каждая за 3 часа
- 51 Некроз – это:
- а) недостаток питания тканей
 - б) разрастание соединительной ткани
 - в) омертвление тканей
 - г) избыточное питание тканей
- 52 Приоритетные проблемы пациента – это проблемы:
- а) которые нужно решать в первую очередь
 - б) которые можно предвидеть
 - в) которые были в прошлом
 - г) взаимоотношения между пациентом и медицинской сестрой

- 53 Важную роль в регуляции менструального цикла играют:
- а) гипоталамо-гипофизарная система
 - б) поджелудочная железа
 - в) щитовидная железа
 - г) паращитовидные железы
- 54 Источником инфекции при сыпном тифе является:
- а) больной сыпным тифом
 - б) окружающая среда
 - в) вошь
 - г) грызуны
- 55 Истечение ликвора из наружного слухового прохода является симптомом:
- а) перелома свода черепа
 - б) сотрясения головного мозга
 - в) перелома основания черепа
 - г) ушиба головного мозга
- 56 Примесь неизменной крови в каловых массах характерна для кровотечения:
- а) массивного желудочного
 - б) капиллярного желудочного
 - в) из тонкой кишки
 - г) из толстой кишки
- 57 Развитие туберкулеза зависит от:
- а) степени и длительности контакта с больным туберкулезом, состояния иммунитета
 - б) социальных условий
 - в) наличия сопутствующих заболеваний
 - г) количества МБТ, попавших в организм
- 58 При назначении мочегонных препаратов (салуретиков) отмечается следующий электролитный сдвиг:
- а) гипокальциемия
 - б) гипокалиемия
 - в) гиперкальциемия
 - г) гиперкалиемия
- 59 По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье — это:
- а) отсутствие болезней
 - б) нормальное функционирование систем организма
 - в) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
 - г) состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения
- 60 Вербальные средства передачи информации:
- а) мимика, визуальный контакт
 - б) поза, жесты, интонация
 - в) речь, письмо
 - г) пантомимика, взгляд
- 61 Основная функция трахеи:
- а) защитная
 - б) дренажная
 - в) дыхательная
 - г) резонансная

- 62 Причины, провоцирующие рак языка:
- а) курение и злоупотребление алкогольными напитками
 - б) механические травмы, раздражение
 - в) вирусные заболевания и дисбактериоз ротовой полости
 - г) все выше перечисленное
- 63 Ведущий клинический симптом бешенства:
- а) водобоязнь
 - б) головные боли
 - в) лихорадка
 - г) судороги жевательных мышц
- 64 К проявлениям гипогликемического состояния относится все, кроме:
- а) влажных кожных покровов
 - б) резкой слабости, тремора конечностей
 - в) сухости кожи
 - г) чувства голода
- 65 Страх смерти является проблемой:
- а) психологической
 - б) физиологической
 - в) социальной
 - г) духовной
- 66 Термические ожоги могут быть вызваны:
- а) дождём
 - б) льдом, пламенем
 - в) ветром
 - г) туманом
- 67 Продукты, рекомендуемые при нервно-артритической конституции:
- а) овощи, фрукты, молочные продукты
 - б) мясные супы, субпродукты
 - в) рыбные консервы
 - г) шоколад, какао
- 68 Симптом дыхательной недостаточности при пневмонии у детей:
- а) брадипноэ
 - б) кашель
 - в) периоральный цианоз
 - г) потливость
- 69 Наиболее частая локализация рака слизистой полости рта:
- а) язык
 - б) дно полости рта
 - в) слизистая щек
 - г) слизистая мягкого неба
- 70 Какие повязки называются окклюзионными:
- а) исправляющие неправильное положение тела
 - б) создающие неподвижность части тела
 - в) повязки, создающие вытяжение части тела
 - г) герметические повязки, закрывающие сообщение с окружающей средой
- 71 Для приступа сердечной астмы характерна одышка:
- а) инспираторного типа
 - б) экспираторного типа
 - в) смешанного типа
 - г) дыхание типа Куссмауля

- 72 По стандарту профилактики пролежней положение тяжелобольного в постели нужно менять:
- а) каждый час
 - б) каждые 2 часа
 - в) каждые 4 часа
 - г) как можно чаще
- 73 Преимущество женского молока:
- а) оптимальное соотношение кальция и фосфора
 - б) большое количество минеральных солей
 - в) отсутствие бифидус-фактора
 - г) высокое содержание казеина
- 74 Если анафилактический шок развился при внутривенной инъекции, то в первую очередь необходимо:
- а) введение препарата прекратить, иглу из вены убрать
 - б) введение препарата прекратить, из вены не выходить
 - в) введение препарата прекратить, иглу из вены убрать, пунктировать другую вену
 - г) введение препарата прекратить, иглу из вены убрать, холод на место инъекции
- 75 Сроки наблюдения за очагом педикулеза:
- а) 30 дней
 - б) 20 дней
 - в) 10 дней
 - г) 40 дней
- 76 Приоритетная проблема пациента с пищевой токсикоинфекцией:
- а) метеоризм
 - б) отсутствие аппетита
 - в) рвота
 - г) головная боль
- 77 К отходам класса В относят:
- а) материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекционными болезнями
 - б) пищевые отходы неинфекционных отделений
 - в) органические операционные отходы
 - г) пищевые отходы инфекционных отделений
- 78 Кашель с розовой мокротой, kloкочущее дыхание развиваются при:
- а) легочном кровотечении
 - б) отеке легких
 - в) сердечной астме
 - г) бронхиальной астме
- 79 На первом году жизни длина тела ребёнка в среднем увеличивается на:
- а) 10 см
 - б) 15 см
 - в) 20-25 см
 - г) 30 см
- 80 Задержка мочи называется:
- а) анурией
 - б) полиурией
 - в) олигурией
 - г) ишурией

- 81 Профилактический осмотр мужчин в смотровом кабинете включает в себя мероприятия, за исключением:
- а) осмотра кожных покровов и видимых слизистых
 - б) осмотра и пальпации наружных половых органов
 - в) пальпации периферических лимфоузлов
 - г) пальцевого исследования прямой кишки
- 82 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» «радиоактивными» отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 83 Грелка необходима после подкожного введения:
- а) водного раствора
 - б) масляного раствора
 - в) вакцины
 - г) триггера
- 84 Неинфекционное заболевание кожи у детей:
- а) пемфигус
 - б) везикулопустулёз
 - в) фурункулёз
 - г) потница
- 85 Реакция Грегерсена основана на определении в кале:
- а) алюминия
 - б) железа
 - в) калия
 - г) магния
- 86 Столбнячный анатоксин вводят в дозе:
- а) 5 мл
 - б) 0,5 мл
 - в) 1, 5 мл
 - г) 0,25 мл
- 87 28. Укажите сроки инкубационного периода при вирусном гепатите А:
- а) 5-7 дней
 - б) до 6 месяцев
 - в) 15-45 дней
 - г) 1 год
- 88 Активный искусственный иммунитет формируется после:
- а) введения иммуноглобулинов
 - б) введения вакцин
 - в) рождения
 - г) перенесенного заболевания
- 89 Классификация острых травм зубов:
- а) ушиб зуба
 - б) вывих зуба
 - в) перелом зуба
 - г) все вышеперечисленное

- 90 Анасарка - это:
- а) общий отёк
 - б) накопление отёчной жидкости в брюшной полости
 - в) накопление отёчной жидкости в полости плевры
 - г) накопление отёчной жидкости в подкожной клетчатке
- 91 Интервал между постановкой пробы Манту и ревакцинацией БЦЖ должен быть:
- а) не менее 3 дней и не более 1 месяца
 - б) не менее 2 дней и не более 2 недель
 - в) не менее 3 дней и не более 2 недель
 - г) не менее 5 дней и не более 2 недель
- 92 План реализации сестринского ухода не должен содержать:
- а) строгое обеспечение режима сна
 - б) исключение алкоголя
 - в) подбор антиконвульсивной терапии
 - г) профилактику пролежней
- 93 Медицинская психология - это:
- а) психопатология
 - б) отрасль клинической медицины, изучающая клиническое и душевное состояние пациента
 - в) отрасль психологической науки, изучающая психологические аспекты гигиены, профилактики, диагностики, лечения, экспертизы и реабилитации пациентов
 - г) отрасль медицины, изучающая душевное состояние пациентов при различных заболеваниях
- 94 Канцелярские отходы, упаковка, инвентарь, потерявший потребительские свойства, образующиеся в медицинском учреждении, относятся к медицинским отходам:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 95 Местное противосвертывающее действие пиявок основано на содержании в ее слюне:
- а) гепарина
 - б) гентомицина
 - в) гирудина
 - г) гиалуроновой кислоты
- 96 Дефицит пульса – это термин, обозначающий:
- а) урежение пульса
 - б) учащение пульса
 - в) учащение пульса на вдохе и урежение его на выдохе
 - г) разницу между частотой сердечных сокращений и периферическим пульсом
- 97 Вираз туберкулезной пробы – это:
- а) общая аллергическая реакция на туберкулин
 - б) впервые выявленная положительная реакция Манту
 - в) местная аллергическая реакция на туберкулин
 - г) папула более 5 мм в диаметре

- 98 С целью профилактики гельминтозов у детей медсестра рекомендует:
- а) лабораторное исследование кала и мочи
 - б) проведение профилактического лечения «Вермоксом»
 - в) соблюдение правил личной гигиены
 - г) проведение обследования у инфекциониста-паразитолога
- 99 Болезни из группы особо опасных инфекций:
- а) корь, дифтерия, парагрипп
 - б) чума, желтая лихорадка, холера
 - в) бешенство, столбняк, рожистое воспаление
 - г) ангина, дизентерия, сальмонеллез
- 100 Этические нормы медицинского работника определяются:
- а) умениями и навыками
 - б) законами и приказами
 - в) этническими особенностями региона
 - г) моральной ответственностью
- 101 Основным путем распространения туберкулезной инфекции на мочеполовую систему является:
- а) контактный
 - б) гематогенный
 - в) лимфогенный
 - г) лимфогематогенный
- 102 К развитию сенсоневральной тугоухости приводят:
- а) воспалительные заболевания уха
 - б) осложнения отпитое
 - в) внутричерепные осложнения
 - г) гипертоническая болезнь
- 103 Согласно СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» эпидемиологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 104 Нормальное внутриглазное давление колеблется в пределах:
- а) 16-24 мм рт. ст.
 - б) 36-42 мм рт. ст.
 - в) 4-6 мм рт. ст.
 - г) 25-30 мм рт. Ст
- 105 Обычное количество вдохов (доз) сальбутамола (вентолин, беротека) для купирования приступа бронхиальной астмы:
- а) 2-3 дозы
 - б) 3-4 дозы
 - в) 5-10 доз
 - г) нет ограничений
- 106 Высыпания на кожных покровах при инфекционных заболеваниях называются:
- а) энантема
 - б) экзантема
 - в) эритема
 - г) гиперемия

- 107 Путь передачи малярии:
- а) трансмиссивный
 - б) пищевой
 - в) воздушно-капельный
 - г) контактно-бытовой
- 108 Диагностика опухолей включает следующие мероприятия:
- а) осмотр, пальпация, рентгеноскопия, наложение свищей, анастомозов, биопсия, клинические исследования
 - б) анамнез, осмотр, пальпация, клинические и лабораторные исследования, рентгенодиагностика эндоскопические методы исследования, цитодиагностика, биопсия, радиоизотопная диагностика, сканирование, компьютерная томография
 - в) анамнез, осмотр, перкуссия, спирография, зондирование, промывание желудка, биопсия, рентгенодиагностика
 - г) анамнез, осмотр, аускультация, рентгенодиагностика, остановка кровотечения, лапаротомия
- 109 Жалобы при остром начальном кариесе:
- а) жалоб нет или болевая чувствительность от кислого и холодного
 - б) кратковременные боли от различных раздражителей
 - в) боли от раздражителей не прекращающиеся и после окончания их действий
 - г) самопроизвольные боли
- 110 Потенциальная проблема пациента с бронхоэктатической болезнью:
- а) лихорадка
 - б) снижение аппетита
 - в) кашель с гнойной мокротой
 - г) кровохарканье
- 111 Амнезия - это:
- а) потеря памяти
 - б) нарушение процессов узнавания предметов, вещей, животных, людей
 - в) утрата речевых способностей как средства выражения мыслей
 - г) нарушение понимания устной речи
- 112 Основной целью сестринского ухода в острейшем периоде менингита является:
- а) своевременное улавливание симптомов отека мозга (нарушение сознания, судороги, расширение зрачков)
 - б) профилактика пролежней
 - в) контроль функции ЖКТ
 - г) выработка ритуалов сна
- 113 Полная слепота – это:
- а) отсутствие светоощущения, равное 0 (нуль)
 - б) острота зрения ниже 0,03
 - в) острота зрения ниже 0,05
 - г) снижение поля зрения до 10 градусов
- 114 Ранним проявлением скрытых отеков является:
- а) гидроторакс
 - б) гидроперикард
 - в) увеличение живота
 - г) увеличение массы тела и уменьшение суточного диуреза

- 115 Основная причина развития диабетической кетоацидотической комы:
- а) недостаток инсулина в организме
 - б) избыток инсулина в организме
 - в) избыток сахароснижающих препаратов
 - г) избыточное потребление жидкости
- 116 Клинически отек Квинке проявляется в виде:
- а) большого, плотного, зудящего инфильтрата
 - б) сливающейся зудящей сыпи
 - в) большого, бледного, плотного, незудящего инфильтрата
 - г) болезненного, плотного, гиперемированного инфильтрата
- 117 Возбудители туберкулеза относятся к классу:
- а) простейших
 - б) бактерий
 - в) вирусов
 - г) грибов
- 118 Медицинский работник к пациенту должен обращаться:
- а) по имени
 - б) по имени и отчеству
 - в) по фамилии
 - г) «больной»
- 119 Выберите признаки отёков при заболеваниях сердца:
- а) более выраженные с утра на лице, бледные, мягкие
 - б) усиливающиеся к вечеру на ногах, сочетающиеся с акроцианозом
 - в) плотные, не оставляющие ямку при надавливании
 - г) мягкие, появляются вечером на лице
- 120 Требования к лабораторной посуде для сбора мокроты на общий анализ:
- а) охлажденная
 - б) стерильная
 - в) продезинфицированная
 - г) механически и химически чистая
- 121 Стресс - это:
- а) нервное напряжение
 - б) вид дистресса
 - в) неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему требование
 - г) состояние организма, возникающее в результате воздействия различных факторов и характеризующееся напряжением неспецифических адаптационных механизмов
- 122 Парентеральное питание – это введение лекарственных препаратов:
- а) минуя желудочно-кишечный тракт
 - б) ингаляционно
 - в) через рот
 - г) ректально
- 123 Профилактика энтеробиоза:
- а) проведение соскоба с перианальных складок
 - б) взятие кала на яйца гельминтов
 - в) соблюдение специфической диеты
 - г) проведение общего анализа мочи

- 124 Прерывание внематочной беременности чаще происходит на сроке:
- а) 10-12 недель
 - б) 2-3 недели
 - в) 5-6 недель
 - г) 8-9 недель
- 125 Хорошее зрение вдаль и плохое вблизи означает:
- а) миопию
 - б) гиперметропию
 - в) астигматизм
 - г) сходящееся косоглазие
- 126 К заменимым нутриентам относятся:
- а) пищевые волокна
 - б) полиненасыщенные жирные кислоты
 - в) углеводы
 - г) аминокислоты
- 127 Паллиативную помощь больному СПИДом начинают в случае:
- а) остановки питания
 - б) инсульта, инфаркта миокарда
 - в) если жизненно важные органы перестают работать и отказа больного от специфического лечения
 - г) диабетической комы
- 128 Местным лечением блефарита является:
- а) сухое тепло, прижигание 70% спиртом, закапывание 30% раствора сульфацил-натрия, закладывание витаминных мазей
 - б) закладывание рассасывающих мазей
 - в) прижигание краев век, закладывание рассасывающих мазей, массаж
 - г) хирургическое
- 129 Приоритетная проблема пациента при хроническом энтерите:
- а) боль в околопупочной области
 - б) снижение аппетита
 - в) похудание
 - г) метеоризм
- 130 К расстройствам памяти относится все перечисленное, кроме:
- а) дисмнезии
 - б) амнезии
 - в) парамнезии
 - г) сделанных воспоминаний
- 131 Открытый пневмоторакс — это:
- а) скопление воздуха в плевральной полости, попавшего туда при ранении
 - б) свободное движение воздуха через рану при вдохе и выдохе
 - в) постоянное поступление воздуха в плевральную полость при вдохе
 - г) скопление крови в плевральной полости
- 132 Отоскопия – это осмотр:
- а) глотки
 - б) гортани
 - в) уха
 - г) носа

- 133 Фальсифицированное лекарственное средство - это:
- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства
 - б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе
 - в) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа
 - г) лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства
- 134 Основные симптомы при хроническом гастрите со сниженной секрецией:
- а) изжога, отрыжка кислым, боли в эпигастрии после еды, поносы
 - б) тяжесть в эпигастрии после еды, отрыжка тухлым, метеоризм, поносы
 - в) интенсивные боли в мезогастррии после еды, ночные голодные боли, изжога, запоры
 - г) ноющие, жгучие, интенсивные боли в эпигастрии после еды, уменьшающиеся после еды
- 135 «Холодовая цепь» это -:
- а) система хранения вакцин на их производстве
 - б) осложнение вакцинации
 - в) система транспортировки и хранения вакцин
 - г) снижение температуры хранения вакцин до 0°C
- 136 У здорового человека с мочой выделяется потребляемой жидкости в %:
- а) 50
 - б) 50–70
 - в) 70–80
 - г) 100
- 137 Левый желудочек выбрасывает у здорового человека кровь в:
- а) легочную артерию в период систолы
 - б) легочную артерию в период диастолы
 - в) аорту в период систолы
 - г) аорту в период диастолы
- 138 Положение грудного ребенка в кроватке при наличии у него ринита:
- а) на спине
 - б) на животе
 - в) на боку с подушкой под голову
 - г) на боку без подушки
- 139 Особенностью дыхательной системы у здоровых детей раннего возраста является:
- а) хорошее развитие с рождения придаточных пазух носа
 - б) гортань воронкообразная узкая, голосовые связки короткие
 - в) отсутствие сурфактанта в альвеолах
 - г) гортань воронкообразная широкая, голосовые связки короткие
- 140 Инфаркт миокарда - это:
- а) ишемический некроз участка сердечной мышцы
 - б) диффузное воспаление сердечной мышцы
 - в) хроническая ишемия миокарда
 - г) дистрофические изменения части миокарда

- 141 Ревматизм поражает:
- а) суставы
 - б) сердце
 - в) кожу
 - г) все перечисленное
- 142 Разница между частотой сердечных сокращений и частотой периферического пульса называется:
- а) Аритмией
 - б) пульсовым давлением
 - в) дефицитом пульса
 - г) тахикардией
- 143 Какие заболевания из перечисленных не относятся к ИППП:
- а) хламидиоз
 - б) генитальный герпес
 - в) урогенитальный кандидоз
 - г) аногенитальные бородавки
- 144 Показателями оценки уровня сформированности компетенций являются:
- а) знания
 - б) умения
 - в) способы деятельности
 - г) знания, умения, способы деятельности
- 145 Начальными признаками сердечной недостаточности у пожилых являются:
- а) отеки
 - б) пароксизмальное нарушение сердечного ритма
 - в) покашливание при разговоре
 - г) проявления гипоксии мозга
- 146 Пациента с кровопотерей транспортируют в положении:
- а) сидя
 - б) лежа с приподнятым головным концом
 - в) лежа с приподнятым ножным концом
 - г) лежа на боку
- 147 При эпилептическом припадке у пациента медицинской сестре необходимо:
- а) удерживать пациента силой, для профилактики прикуса языка применить языкодержатель
 - б) ввести в/в 2,0 реланиума
 - в) фиксировать пациента
 - г) оберегать голову пациента, подложив мягкую ткань, не применять силу, положить пациента на бок, расстегнуть одежду
- 148 При тяжелом состоянии больной с прервавшейся трубной беременностью показано:
- а) немедленное переливание крови
 - б) безотлагательное удаление источника кровотечения (беременной трубы)
 - в) надежный гемостаз
 - г) все перечисленное
- 149 Рекомендуемое положение больного с геморрагическим инсультом:
- а) опустить голову
 - б) возвышенное положение головы
 - в) приподнять ножной конец
 - г) не менять положение головы

- 150 Психологическая помощь депрессивным пациентам пожилого возраста заключается в:
- а) гиперопеке
 - б) психотерапевтической беседе
 - в) изоляции
 - г) беседе о данном заболевании, его осложнениях
- 151 Антропометрия включает измерение:
- а) роста, остроты зрения, силы, остроты слуха
 - б) роста, веса
 - в) роста, веса, частоты дыхательных движений
 - г) роста, веса, артериального давления
- 152 Специфические методы профилактики инфекционных болезней:
- а) витаминизация
 - б) прием антибиотиков
 - в) иммунизация
 - г) закаливание
- 153 В плановой профилактике столбняка используют:
- а) анатоксин
 - б) противостолбнячную сыворотку
 - в) антибиотики
 - г) гамма-глобулин
- 154 Выделение «ржавой мокроты» отмечается при:
- а) хроническом бронхите
 - б) крупозной пневмонии
 - в) кавернозном туберкулезе легких
 - г) бронхиальной астме
- 155 Основные симптомы менингита:
- а) ригидность мышц затылка, симптом Кернига
 - б) парез конечностей
 - в) везикулезная сыпь
 - г) геморрагическая сыпь
- 156 Основаниями для госпитализации в психиатрический стационар являются:
- а) просьба родственников больного
 - б) решение главного врача психоневрологического диспансера
 - а) наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра о проведении обследования или лечения в стационарных условиях, либо постановление судьи
 - в) наличие у лица тяжёлого психического расстройства
- 157 Вирус краснухи опасен беременным женщинам в сроке беременности:
- а) 8-9 месяцев
 - б) 5-6 месяцев
 - в) 2-3 месяца
 - г) 4-6 месяцев
- 158 Ранним симптомом ревматоидного артрита является:
- а) болезненность при пальпации ахиллова сухожилия
 - б) подкожные узелки
 - в) утренняя скованность
 - г) латеральная девиация суставов кистей

- 159 Для предменструального синдрома характерно:
- а) появление отеков
 - б) галакторея
 - в) монофазная базальная температура
 - г) все перечисленное
- 160 Наиболее характерные признаки злокачественных опухолей мягких тканей:
- а) прогрессирующий рост, ограничение подвижности
 - б) высокая температура
 - в) флюктуирующее образование
 - г) тошнота
- 161 Специфическая профилактика рахита включает:
- а) проведение массажа и гимнастики
 - б) приём витамина Д
 - в) рациональное питание
 - г) водные процедуры
- 162 Больной в стационаре на дому должен наблюдаться:
- а) ежедневно
 - б) через день
 - в) раз в неделю
 - г) 2 раза в день
- 163 Жалобы при халязионе:
- а) зуд краев век
 - б) локальная боль в области ресничного края век
 - в) отсутствуют
 - г) уплотнение в толще века
- 164 У пациентов с травматическим шоком показатели гемодинамики будут:
- а) АД повышено, брадикардия
 - б) АД понижено, брадикардия
 - в) АД понижено, тахикардия
 - г) показатели гемодинамики не изменены
- 165 Отек всего тела называется:
- а) асцит
 - б) анурия
 - в) анасарка
 - г) отек Квинке
- 166 Основная цель сестринского вмешательства при подготовке больного к УЗИ брюшной полости:
- а) устранение метеоризма
 - б) устранение запоров
 - в) освобождение мочевого пузыря
 - г) заполнение мочевого пузыря
- 167 Приоритетом в сохранении здоровья ребёнка в системе первичной медикосанитарной помощи является:
- а) лекарственное обеспечение
 - б) диагностика заболеваний
 - в) профилактическая работа
 - г) лечение заболеваний

- 168 Гепатиты с парентеральным путем передачи:
- а) А, В,С
 - б) В,С,Д,Е
 - в) В,СД
 - г) А,Е
- 169 В какие сроки проводится первый дородовой патронаж медицинской сестрой:
- а) в течение 10 дней после поступления данных их женской консультации
 - б) в течение 1 месяца после поступления данных их женской консультации
 - в) в течение 15 дней после поступления данных их женской консультации
 - г) в течение 2 месяцев после поступления данных их женской консультации
- 170 Какие физиологические функции не выполняет кожа:
- а) защитная
 - б) терморегулирующая
 - в) рецепторная
 - г) опорно-двигательная
- 171 Фальсифицированное лекарственное средство - это:
- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства
 - б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе
- 172 Все отходы ЛПУ по степени опасности делят на:
- а) 2 класса
 - б) 3 класса
 - в) 4 класса
 - г) 5 классов
- 173 Медицинская сестра, перепутав внешне похожие флаконы, ввела вместо гепарина большую дозу инсулина, в результате чего наступило резкое ухудшение состояния (гипогликемическая кома). Действия медсестры оцениваются как:
- а) халатность
 - б) медицинская ошибка
 - в) случайная оплошность
 - г) профессиональная некомпетентность
- 174 Дискинезия желчевыводящих путей – это:
- а) расстройство двигательной функции желчного пузыря
 - б) воспаление слизистой оболочки желчного пузыря
 - в) скопление лямблий в желчном пузыре
 - г) сужение желчного пузыря
- 175 Биологический возраст ребёнка оценивается по:
- а) зонам роста костной ткани
 - б) массе тела
 - в) интеллекту
 - г) росту
- 176 Симптом железодефицитной анемии:
- а) строфулюс
 - б) бледность кожи и слизистых оболочек
 - в) одышка, цианоз
 - г) лихорадка, тошнота

- 177 Средства для лечения педикулеза:
- а) спрегаль, бензил бензоат, метиловый спирт
 - б) ПАРАплюс, ниттифор, медифокс
 - в) фторокорт, синаflan, микозолон
 - г) лококортен, флюцинар, беласалик
- 178 В какие сроки проводится первый дородовой патронаж медицинской сестрой:
- а) в течение 10 дней после поступления данных их женской консультации
 - б) в течение 1 месяца после поступления данных их женской консультации
 - в) в течение 15 дней после поступления данных их женской консультации
 - г) в течение 2 месяцев после поступления данных их женской консультации
- 179 Клинический симптом краснухи:
- а) мелкопятнистая сыпь
 - б) везикулёзная сыпь
 - в) увеличение слюнных желёз
 - г) приступообразный кашел
- 180 Булимия - это:
- а) повышенное чувство голода при сниженной насыщаемости
 - б) повышенная жажда при отсутствии чувства утоления
 - в) отказ от еды
 - г) поражение нижеберцового нерва
- 181 Для анализа мочи на глюкозурию моча собирается:
- а) утром 100— 150 мл
 - б) утром 50—100 мл моча из средней порции струи
 - в) 24 часа, перемешивается, измеряется, отливается 150 - 200 мл на анализ
 - г) за 24 часа, 8 порций
- 182 Характерным признаком вывиха является:
- а) отсутствие движений в суставе
 - б) отек мягких тканей
 - в) кровоподтек в области сустава
 - г) ограничение движений в суставе из-за боли
- 183 Анатомо-физиологической особенностью костной системы у детей грудного возраста является:
- а) высокая плотность костной ткани
 - б) высокое содержание минеральных солей
 - в) обилие хрящевой ткани в скелете
 - г) наличие тонкой надкостницы
- 184 Уменьшение содержания в крови нормальных лейкоцитов - это:
- а) лейкоз
 - б) лейкопения
 - в) лейкоцитоз
 - г) лейкемия
- 185 Сестринские рекомендации при атопическом дерматите у детей:
- а) сохранение естественного вскармливания
 - б) ежедневный контроль массы тела
 - в) приём антигистаминных препаратов
 - г) ограничение пребывания на свежем воздухе

- 186 Прием жидкости больным сахарным диабетом:
- а) следует ограничивать
 - б) не следует ограничивать
 - в) ограничивают прием жидкости два раза в неделю
 - г) ограничивают прием жидкости три раза в неделю
- 187 Подготовка пациента к эзофагогастродуоденоскопии включает в себя:
- а) обильное питье
 - б) психоэмоциональную подготовку
 - в) очистительную клизму
 - г) определение уровня билирубина крови
- 188 «Онкологическая настороженность» - это:
- а) подозрение на наличие рака, тщательное собирание анамнеза, исполнение стандартов обследования
 - б) санитарно-просветительная работа, первичная профилактика рака, формирование групп повышенного риска
 - в) тщательный учет онкологических больных, вторичная профилактика рака психологическая
 - г) поддержка пациентов и семьи
- 189 Показанием к наложению окклюзионной повязки является:
- а) ушиб грудной клетки
 - б) ранение груди
 - в) гемоторакс
 - г) закрытый перелом ребер
- 190 Признаками правильного наложения венозного жгута является:
- а) конечность синее, отекает, теплая на ощупь
 - б) отсутствие каких-либо изменений со стороны конечности
 - в) прекращение кровотечения
 - г) конечность бледная, холодная, исчезает пульс ниже жгута
- 191 Положение пациента, которое он не в состоянии самостоятельно поменять называется:
- а) вынужденное
 - б) активное
 - в) дренажное
 - г) пассивное
- 192 Принцип лечения острых кишечных инфекций:
- а) уменьшение объёма питания, увеличение приема жидкости
 - б) уменьшение кратности приема пищи
 - в) введение диуретиков
 - г) прием пребиотиков вместо приёма антибиотиков
- 193 Образованию пролежней способствует:
- а) сдавление тканей гипсовой повязкой
 - б) сдавление тканей при длительном лежачем положении пациента
 - в) активное положение пациента в постели
 - г) пассивное положение пациента в постели
- 194 Анализ мочи по Нечипоренко подсчитывает количество:
- а) эритроцитов
 - б) суточной мочи
 - в) эритроцитов и лейкоцитов в 1 мл мочи
 - г) глюкозы

- 195 Профессиональная компетентность - это:
- а) степень развития личности
 - б) степень обученности
 - в) совокупность профессиональных и личностных качеств
 - г) вид профессиональной деятельности
- 196 При чесотке характерным субъективным симптомом является:
- а) зуд вечером и ночью
 - б) появление уртикарий
 - в) пигментация в очагах
 - г) депигментация в очагах
- 197 Суточные колебания температуры тела в пределах 1 градуса характерны для лихорадки:
- а) постоянной
 - б) послабляющей
 - в) перемежающейся
 - г) гектической
- 198 Ирригоскопия – это:
- а) рентгенологическое исследование толстой кишки
 - б) эндоскопическое исследование толстой кишки
 - в) рентгенологическое исследование тонкой кишки
 - г) УЗИ брюшной полости
- 199 Для исследования мочи на содержание сахара необходимо собрать:
- а) утреннюю мочу
 - б) суточную мочу
 - в) среднюю порцию первого мочеиспускания
 - г) любую порцию мочи в течение суток
- 200 Паллиативная помощь - это:
- а) активная всеобъемлющая забота о пациентах, заболевания которых не поддаются излечению
 - б) психологическая поддержка пациентов и семьи
 - в) правовое консультирование пациентов и обеспечение им правовой защиты
 - г) санитарно-просветительная работа, первичная профилактика рака, формирование групп повышенного риска
- 201 При хроническом гломерулонефрите в стадии стихающего обострения назначается вариант диеты:
- а) с пониженным количеством белка
 - б) с повышенным количеством белка
 - в) с пониженной калорийностью
 - г) основной стандартной
- 202 При подозрении на острое заболевание органов брюшной полости неотложная помощь включает в себя:
- а) применение холода наместо наибольшей болезненности
 - б) применение анальгетиков по назначению врача
 - в) применение спазмолитиков по назначению врача
- 203 Абстиненция - это:
- а) привыкание к лекарственному средству
 - б) физическая лекарственная зависимость
 - в) кумуляция лекарственного средства
 - г) идиосинкразия

- 204 Сестринская рекомендация при рахите:
- а) проведение лечебного массажа и солевых ванн
 - б) приём микроэлементов
 - в) ежедневные прогулки на свежем воздухе
 - г) обеспечение гипоаллергенной диеты
- 205 Причинами носовых кровотечений являются:
- а) заболевания слизистой носа
 - б) анатомические особенности носа
 - в) соматические заболевания носа
 - г) опухоли носа
- 206 Для постановки серологической реакции берут:
- а) кал
 - б) мочу
 - в) кровь
 - г) желчь
- 207 Приоритетные проблемы пациента при остром гломерулонефрите:
- а) слабость, недомогание
 - б) повышенная утомляемость, лихорадка
 - в) снижение работоспособности и аппетита
 - г) головная боль, отеки
- 208 Заболевание сердечно – сосудистой системы, которое является одной из основных причин смертности среди взрослого населения:
- а) артериальная гипертония
 - б) ишемическая болезнь сердца
 - в) пороки сердца
 - г) ревматизм
- 209 Основной причиной развития диффузного и узлового зоба является:
- а) недостаточное содержание йода в пищевых продуктах, воде, воздухе
 - б) недостаточное употребление углеводов
 - в) низкое АД
 - г) только недостаточное содержание йода в воде
- 210 Для диагностики ВИЧ-инфекции используется:
- а) иммуноферментный анализ
 - б) гемокультура
 - в) анализ кала на бактериологическое исследование
 - г) общий анализ крови
- 211 Материалом для выделения возбудителя при дифтерии служит:
- а) кровь
 - б) моча
 - в) слизь из ротоглотки и носа
 - г) кал
- 212 Согласно СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» эпидемиологически безопасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д

- 213 Марлевые маски рекомендуется менять:
- а) через каждый час
 - б) каждые 2-3 часа
 - в) каждые 4-5 часов
 - г) 2 раза в сутки
- 214 Тахикардия – это число сердечных сокращений в минуту:
- а) менее 60
 - б) 60–70
 - в) 70–80
 - г) более 90
- 215 Насадка на дозированные ингаляторы, применяемые для аэрозольтерапии – это:
- а) языкодержатель
 - б) роторасширитель
 - в) спейсер
 - г) воздуховод
- 216 При желтухе первыми желтеют:
- а) кожные покровы
 - б) слизистые оболочки
 - в) стопы
 - г) ладони
- 217 Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать:
- а) его сотрудники по работе
 - б) участковый врач территориальной поликлиники
 - в) судебно-следственные органы
 - г) никому не дано такого права
- 218 Измерение внутриглазного давления при глаукоме проводится:
- а) тонометром Маклакова
 - б) сфигмоманометром
 - в) аппаратом Боброва
 - г) периметром
- 219 Стресс - это:
- а) нервное напряжение
 - б) вид дистресса
 - в) неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему требование
 - г) состояние организма, возникающее в результате воздействия различных факторов и характеризующееся напряжением неспецифических адаптационных механизмов
- 220 Диспансерное наблюдение за больными острой пневмонией осуществляется в течение (месяцев):
- а) 2
 - б) 3
 - в) 6
 - г) 12
- 221 Пути распространения туберкулеза все, кроме:
- а) аэрогенный
 - б) алиментарный
 - в) контактный
 - г) парентеральный

- 222 Потенциальная проблема пациента при циррозе печени:
- а) желтуха
 - б) снижение аппетита
 - в) кожный зуд
 - г) кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода
- 223 Приоритетная проблема пациента при хроническом гастрите с сохраненной секреторной функцией:
- а) изжога
 - б) плохой сон
 - в) запор
 - г) боль в эпигастральной области
- 224 Для определения соотношения между дневным и ночным диурезом назначают анализ мочи по:
- а) Нечипоренко
 - б) Зимницкому
 - в) Ребергу
 - г) Аддис-Каковскому
- 225 Появление на ЭКГ широкого и глубокого зубца Q характерно для:
- а) стенокардии
 - б) тромбоэмболии легочной артерии
 - в) инфаркта миокарда
 - г) мерцательной аритмии
- 226 Кровь на биохимический анализ берется:
- а) в любое время суток
 - б) утром натощак
 - в) утром после завтрака
 - г) перед обедом
- 227 Патогномичные признаки желудочного кровотечения:
- а) бледность, слабость
 - б) головная боль, головокружение
 - в) рвота «кофейной гущей», дегтеобразный стул
 - г) тахикардия, снижение АД
- 228 Кризис – это:
- а) резкий подъем температуры
 - б) длительная высокая лихорадка
 - в) постепенное снижение температуры
 - г) резкое снижение температуры
- 229 Изменения в общем анализе мочи у пациента с острым гломерулонефритом:
- а) гематурия, протеинурия, цилиндрурия
 - б) гематурия, глюкозурия, цилиндрурия
 - в) лейкоцитурия, протеинурия, цилиндрурия
 - г) лейкоцитурия, протеинурия, бактериурия
- 230 При отсром среднем отите больного беспокоят:
- а) заложенность уха, выделение из слухового прохода
 - б) сильные стреляющие боли
 - в) шум в голове, звон
 - г) тупые ноющие боли в ухе

- 231 Семейный анамнез представляет интерес с точки зрения:
- а) наличия или отсутствия контакта с родственниками, больными заразной формой туберкулеза
 - б) семейной предрасположенностью к данному инфекционному заболеванию
 - в) как контакта с родственником, больным туберкулезом, так и семейной предрасположенностью к бронхо-легочным заболеваниям
 - г) значения не имеет
- 232 Основным морфологическим проявлением изменений в органах при старении считается:
- а) атрофия
 - б) гиперпластические процессы
 - в) остеопороз
 - г) астения
- 233 Жалобы больного туберкулезом:
- а) строго специфичны для этого заболевания и позволяют с уверенностью судить о природе заболевания
 - б) имеют достаточно специфичности, что позволяет по ним провести дифференциальную диагностику с другой легочной патологией
 - в) имеют некоторые черты специфичности и позволяют заподозрить туберкулез органов дыхания
 - г) неспецифичны и не позволяют судить о природе заболевания
- 234 Для определения соотношения между дневным и ночным диурезом назначают анализ мочи по:
- а) Нечипоренко
 - б) Зимницкому
 - в) Ребергу
 - г) Аддис-Каковскому
- 235 Локализация ячменя:
- а) слезная железа у корня ресницы
 - б) мейбомиева железа в толще хряща
 - в) слезная железа
 - г) слезный мешок
- 236 В какие сроки проводится первый дородовой патронаж медицинской сестрой:
- а) в течение 10 дней после поступления данных из женской консультации
 - б) в течение 1 месяца после поступления данных из женской консультации
 - в) в течение 15 дней после поступления данных из женской консультации
 - г) в течение 2 месяцев после поступления данных из женской консультации
- 237 При одновременном приеме 2-х и более пероральных лекарств пациент должен принять их:
- а) сразу все вместе
 - б) с интервалом в 1 минуту
 - в) с интервалом в 5 минут
 - г) с интервалом в 10- 15 минут
- 238 Обильный, жидкий, пенистый зловонный кал с неперевааренными кусочками пищи характерен для:
- а) острого колита
 - б) острого энтерита
 - в) язвенной болезни 12-ти перстной кишки
 - г) язвенной болезни желудка

- 239 Оптимальной лактации способствует:
- а) кормление строго по часам
 - б) «свободное» вскармливание
 - в) исключение ночного кормления
 - г) ограничение питьевого режима кормящей матери
- 240 При первом обследовании пульс надо считать в течение (время в секундах):
- а) 10
 - б) 15
 - в) 30
 - г) 60
- 241 Для ранней диагностики рака молочной железы применяется:
- а) маммография
 - б) флюорография
 - в) пункционная биопсия молочной железы
 - г) пальпация молочной железы
- 242 Осложнения острых отитов:
- а) сенсоневральная тугоухость
 - б) тубарная дисфункция
 - в) мастоидит
 - г) диффузный наружный отит
- 243 Медицинская сестра смотрового кабинета проводит:
- а) бимануальное влагалищное исследование
 - б) осмотр шейки матки в зеркалах
 - в) пальпацию молочных желез
 - г) все перечисленное
- 244 При оказании неотложной помощи при обширных термических ожогах накладывается повязка:
- а) с мазью на жировой основе
 - б) с водорастворимой мазью
 - в) влажно-высыхающая повязка
 - г) сухая стерильная
- 245 При недостаточном содержании йода в пище развивается:
- а) диффузный токсический зоб
 - б) ожирение
 - в) сахарный диабет
 - г) эндемический зоб
- 246 Больного для постановки очистительной клизмы нужно уложить на:
- а) левый бок
 - б) правый бок
 - в) живот
 - г) спину
- 247 Возбудитель краснухи особенно опасен для:
- а) детей раннего возраста
 - б) подростков
 - в) пожилых детей
 - г) беременных женщин

- 248 При регистрации ЭКГ на конечности накладываются электроды со следующими маркировками:
- а) на правую руку - черный
 - б) на правую ногу - красный
 - в) на левую руку - желтый
 - г) на левую ногу - зеленый
- 249 Больной гриппом наиболее заразен:
- а) весь период болезни
 - б) первые 2-3 дня от начала болезни
 - в) с последних дней инкубационного периода
 - г) в стадии выздоровления
- 250 Моча цвета «мясных помоев» - это:
- а) протеинурия
 - б) лейкоцитурия
 - в) микрогематурия
 - г) макрогематурия
- 251 После обработки антисептиком полости рта тяжелобольным губы и язык необходимо смазывать:
- а) масляным раствором
 - б) физиологическим раствором
 - в) раствором бриллиантовой зелени
- 252 Причины возникновения опухолей яичников:
- а) хронический воспалительный процесс в придатках матки
 - б) раннее начало половой жизни
 - в) гормональная контрацепция
 - г) беременность
- 253 Преимущественным способом введения лекарственных препаратов при оказании неотложной помощи пациенту является:
- а) внутривенный
 - б) сублингвальный
 - в) внутримышечный
 - г) ингаляционный
- 254 Карантин при чуме составляет (количество дней):
- а) 5
 - б) 6
 - в) 7
 - г) 10
- 255 Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью, относятся к классу:
- а) А
 - б) Б
 - в) В
 - г) Г

- 256 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» чрезвычайно эпидемиологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 257 Мазок из зева на ВЛ берут, чтобы исключить:
- а) дифтерию
 - б) сифилис
 - в) туберкулез
 - г) сальмонеллез
- 258 Медицинская психология - это:
- а) психопатология
 - б) отрасль клинической медицины, изучающая клиническое и душевное состояние пациента
 - в) отрасль психологической науки, изучающая психологические аспекты гигиены, профилактики, диагностики, лечения, экспертизы и реабилитации пациентов
 - г) отрасль медицины, изучающая душевное состояние пациентов при различных заболеваниях
- 259 Доля дозы лекарственного средства взрослого, которая требуется на каждый год жизни ребенка:
- а) 1/2
 - б) 1/10
 - в) 1/20
 - г) 1/50
- 260 Соотношение количества выпитой и выделенной жидкости называется:
- а) суточным диурезом
 - б) водным балансом
 - в) анурезом
 - г) дневным диурезом
- 261 Какова характеристика зуда при чесотке:
- а) усиливающийся вечером
 - б) не зависящий от времени суток
 - в) усиливающийся днем
 - г) усиливающийся после физической нагрузки
- 262 У пациента после перенесенной ангины появились отеки на лице, повысилось артериальное давление – это признаки:
- а) острого пиелонефрита
 - б) острого гломерулонефрита
 - в) ревматизма
 - г) гипертонической болезни
- 263 На процесс установления и развития контактов между людьми влияют:
- а) восприятие и понимание людьми друг друга
 - б) социальные условия
 - в) самочувствие человека, состояние его здоровья
 - г) материальная заинтересованность

- 264 Типичная форма инфаркта миокарда:
- а) ангинозная
 - б) церебральная
 - в) периферическая
 - г) абдоминальная
- 265 Воспалительное заболевание слизистой оболочки глаза:
- а) блефарит
 - б) конъюнктивит
 - в) миопия
 - г) пресбиопия
- 266 При подозрении на опухоль желудка проводится:
- а) цистоскопия
 - б) эзофагоскопия
 - в) бронхоскопия
 - г) фиброгастроскопия
- 267 Активный естественный иммунитет формируется после:
- а) вакцинации
 - б) приёма препаратов интерферона
 - в) перенесенного инфекционного заболевания
 - г) введения иммуноглобулина
- 268 Предраковые состояния желудка:
- а) каллезная язва желудка
 - б) хронический анацидный гастрит
 - в) полипоз желудка
 - г) стеноз привратника желудка
- 269 Боли при глубоком кариесе возникают:
- а) от горячего
 - б) от холодного
 - в) самопроизвольно
 - г) в ночное время
- 270 К физиологическому состоянию новорождённого относится:
- а) синдром дыхательных расстройств
 - б) мастопатия
 - в) пемфигус
 - г) кефалогематома
- 271 Наиболее частые заболевания конъюнктивы:
- а) дистрофические поражения
 - б) опухоли
 - в) воспаления
 - г) врожденные аномалии
- 272 Некроз развивается при попадании под кожу или в мышцу:
- а) глюконата кальция
 - б) хлорида калия
 - в) глюкозы
 - г) хлорида кальция
- 273 Антигипертензивное средство, которое дает побочное действие в виде сухого кашля, - это:
- а) атеналол
 - б) верапамил
 - в) эналаприл

- 274 Максимально допустимы сроки начала постконтактной профилактики антиретровирусными препаратами при риске инфицирования ВИЧ:
- а) не позднее 24 часов
 - б) не позднее 36 часов
 - в) не позднее 72 часов
 - г) не позднее 12 часов
- 275 Медицинский работник к пациенту должен обращаться:
- а) по имени
 - б) по имени и отчеству
 - в) по фамилии
 - г) «больной»
- 276 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» токсикологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 277 Осложнением туберкулезного процесса является:
- а) ателектаз
 - б) пневмосклероз
 - в) кальцинаты
 - г) фиброзно-очаговые изменения
- 278 По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье — это:
- а) отсутствие болезней
 - б) нормальное функционирование систем организма
 - в) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
 - г) состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения
- 279 Сестринская рекомендация при лактостазе:
- а) исключить сцеживание молока
 - б) отказаться от грудного вскармливания
 - в) чаще прикладывать ребенка к груди, сцеживать молоко
 - г) назначить фитотерапию
- 280 Прерывание внематочной беременности чаще происходит на сроке:
- а) 10-12 недель
 - б) 2-3 недели
 - в) 5-6 недель
 - г) 8-9 недель
- 281 Экстренное извещение подается после выявления больного с инфекцией в течение (в часах):
- а) 1
 - б) 2
 - в) 12
 - г) 24

- 282 Аграфия - это:
- а) потеря способности письма
 - б) потеря двигательной функции руки
 - в) утрата речевых способностей как средство выражения мыслей
 - г) утрата силы конечностей
- 283 Доза лекарственного вещества, вызывающая отравление без смертельного исхода это:
- а) высшая разовая доза
 - б) высшая суточная доза
 - в) токсическая доза
 - г) летальная доза
- 284 Для галлюцинаций характерно:
- а) восприятие несуществующего
 - б) возникновение образа без реального объекта
 - в) видимый образ, неотличимый от реальных объектов
 - г) все перечисленное
- 285 Осложнения внутримышечных инъекций:
- а) флегмона, воздушная эмболия
 - б) абсцесс, паралич седалищного нерва, поломка иглы
 - в) флебит, тромбофлебит, пирогенная реакция
 - г) некроз, гематома, липодистрофия
- 286 Пальцевое исследование прямой кишки должно проводиться всем пациентам, начиная с:
- а) 30 лет
 - б) 40 лет
 - в) 50 лет
 - г) 60 лет
- 287 Приоритетная проблема пациента при почечной колике:
- а) тошнота
 - б) субфебрильная температура
 - в) боль в пояснице
 - г) одышка
- 288 У пациентов с травматическим шоком (торпидная фаза) показатели гемодинамики будут:
- а) АД понижено, брадикардия
 - б) показатели гемодинамики не изменены
 - в) АД повышено, брадикардия
 - г) АД понижено, тахикардия
- 289 Суицидальное поведение у больных выражается:
- а) в мыслях о бесцельности существования
 - б) в высказываниях о безвыходности ситуации, отсутствии надежд на излечение
 - в) суицидальных мыслях
 - г) во всем перечисленном
- 290 Основными клиническими симптомами пищевых токсикоинфекций являются:
- а) тошнота, многократная рвота, обильный водянистый стул
 - б) длительная лихорадка
 - в) жидкий стул, тенезмы
 - г) слабость, недомогание

- 291 Психиатрическая помощь считается добровольной, если она оказывается:
- а) по просьбе или с согласия самого пациента или его законного представителя
 - б) по просьбе близких родственников пациента
 - в) только при самостоятельном (активном) обращении пациента в психиатрическое учреждение
 - г) по направлению участкового врача территориальной поликлиники
- 292 Основной признак коматозного состояния:
- а) угнетение гемодинамики
 - б) угнетение дыхания
 - в) угнетение центральной нервной системы
 - г) угнетение периферической нервной системы
- 293 Подготовка пациента к эзофагогастродуоденоскопии включает:
- а) голод в течение суток перед обследованием, накануне прием слабительных
 - б) строго натощак, накануне вечером – очистительная клизма
 - в) строго натощак, вечером накануне легкий ужин (до 20 часов), не курить
 - г) строго натощак, накануне прием слабительных, не курить
- 294 Дренажное положение придается пациенту для:
- а) снижения лихорадки
 - б) уменьшения одышки
 - в) расширения бронхов
 - г) облегчения оттока мокроты
- 295 Вирусное заболевание, проявляющееся на кайме губ:
- а) лишай
 - б) простой герпес
 - в) грипп
 - г) глоссит
- 296 Отеки сердечного происхождения появляются:
- а) утром на лице
 - б) утром на ногах
 - в) вечером на лице
 - г) вечером на ногах
- 297 При лучевых ожогах чаще поражается:
- а) хрусталик
 - б) сетчатки
 - в) роговица
 - г) конъюнктивы
- 298 К предраковым заболеваниям относятся:
- а) хронический гиперацидный гастрит, холецистит, дискенизия желчных путей
 - б) полипоз толстого кишечника, мастопатия, хронический, анацидный гастрит, лейко- и эритроплакии
 - в) язвенная болезнь желудка, 12-ти перстной кишки, хронический панкреатит
 - г) липома, абсцесс ягодицы, рожистое воспаление
- 299 Для диагностики заболеваний опорно – двигательного аппарата максимально информативны методы:
- а) радиоизотопные
 - б) рентгенологические
 - в) лабораторные
 - г) ультразвуковые

300 При оказании неотложной помощи пациентам с химическими ожогами первоочередным мероприятием является:

а) наложение стерильной повязки

б) проведение нейтрализации

в) обезболивание

г) промывание ожоговой раны под проточной водой в течение 20-30 минут