

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ  
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НАРКОЛОГИЯ»**

**(для фельдшеров по наркологии, прошедших обучение по циклам 2.3  
"Наркология", профессиональной переподготовки по специальности  
"Наркология")**

- 1 Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием...
  - а) личность;
  - б) индивид;
  - в) человек ;
  - г) индивидуальность;
  - д) субъект
- 2 Основные признаки коматозного состояния:
  - а) падение гемодинамики
  - б) угнетение дыхания
  - в) потеря мышечного тонуса
  - г) угнетение центральной нервной системы (ЦНС)
- 3 Медицинские работники имеют право на:
  - а) оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
  - б) совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях;
  - в) соблюдение врачебной тайны;
  - г) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя
- 4 Мусситирующий делирий характеризуется:
  1. психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах постели;
  2. невнятным, бессвязным бормотанием;
  3. карфологическими нарушениями;
  4. возбуждением с совершением профессиональных действий;
  5. эпизодами кататонического возбуждения.
  - а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 5 Под изготовлением наркотических средств подразумевается действия, направленные на:
  - а) серийное получение наркотических средств
  - б) получение готовых к использованию и потреблению наркотических средств
  - в) культивирование растительного сырья для дальнейшего изготовления наркотических средств
  - г) изготовление психотропных препаратов

6 Острые интоксикационные психозы при злоупотреблении амфетаминами

чаще протекают по типу:

1. острого параноида;
2. острого галлюциноза;
3. делирия;
4. онейроидноподобного состояния;
5. аменции.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно все перечисленное

7 К гепатопротекторам относятся:

а) галоперидол

б) аминалон

в) гептрал

г) но-шпа

8 Формирование состояния отмены свидетельствует о становлении:

1. начальной стадии наркомании;
2. средней стадии наркомании;
3. конечной стадии наркомании;
4. синдрома физической зависимости;
5. синдрома изменённой реактивности.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно 4

9 Основными задачами предрейсовых медицинских осмотров являются выявление у водителей:

а) признаков употребления алкоголя

б) признаков употребления наркотических средств и сильнодействующих веществ

в) наличие у водителей симптомов острого заболевания или обострения хронического заболевания

г) наличие у водителей хронических заболеваний

10 Характерными признаками интоксикации при употреблении кетамина являются:

а) психомоторное возбуждение

б) зрительные и слуховые галлюцинации

в) нарушение речи

г) потеря способности запоминать текущие события

11 Изменения личности у больных алкоголизмом обусловлены:

1. токсическим действием алкоголя и его метаболитов;

2. длительностью заболевания;

3. психореактивными факторами;

4. преморбидными характерологическими особенностями;

5. сопутствующей соматической патологией.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно все перечисленное

- 12 Токсикомания – это заболевание, обусловленное употреблением:
- а) химических токсических веществ
  - б) психотропных препаратов
  - в) алкоголя
  - г) наркотиков
- 13 Среди социальных факторов, влияющих на формирование алкоголизма, наиболее значимыми являются:
- 1.алкогольная политика государства;
  - 2.социальное положение индивидуума и его экономическая обеспеченность;
  - 3.устойчивые обычаи ближайшего окружения;
  - 4.семейное положение
  - 5.расовая и этническая принадлежность.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в)верно 2,4
  - г)верно все перечисленное
- 14 Результаты предрейсового медицинского осмотра заносятся в:
- а) журнал контроля трезвости
  - б) протокол осмотра водителя автотранспортного средства
  - в) путевой лист
  - г) протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения
- 15 Для истинных запоев у больных алкоголизмом характерно:
- 1.отсутствие продрома запоя (изменение физического и психического состояния перед началом запоя);
  - 2.спонтанное появление интенсивного патологического влечения к алкоголю;
  - 3.отсутствие каких-либо расстройств в физической и психической сферах больного в динамике за поя;
  - 4.декомпенсация физического и психического состояния в процессе запоя и, особенно в конце запоя;
  - 5.появление на этапе 2ст. заболевания.
- а)верно 1,2,3
  - б)верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г)верно все перечисленное
- 16оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Российской Федерации регламентируется:
- а) правилами внутреннего распорядка в ЛПУ
  - б) Указами Президента Российской Федерации
  - в) Федеральным законом Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах
  - г) уголовным кодексом
- 17 К синдромам помрачения сознания могут быть отнесены следующие:
- а) оглушение
  - б) делирий
  - в) онейроид
  - г) психоорганический синдром

- 18 Факторами риска развития зависимости от алкоголя у подростков являются:
- 1.тяжёлое материальное положение семьи;
  - 2.алкоголизм отца или матери;
  - 3.наличие соматической патологии;
  - 4.отсутствие эмоциональной привязанности и сплочённости между членами семьи, постоянная конфликтность взаимоотношений;
  - 5.определённая национальная принадлежность.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в)верно 2,4  
г) верно 4
- 19 Для абстиненции при употреблении препаратов конопли характерно все перечисленное, кроме:
- а) неприятных ощущений в сердце
  - б) снижения настроения
  - в) артериальной гипертензии
  - г) тремора
- 20 Наркомания - это заболевание, вызванное употреблением:
- а) опиатов
  - б) препаратов конопли
  - в) препаратов стимулирующего действия
  - г) сильнодействующих препаратов
  - д) препаратов седативного действия
- 21 К обороту наркотических средств относятся:
- а) культивирование растений, содержащих наркотические вещества естественного происхождения
  - б) производство и изготовление наркотических средств
  - в) хранение, перевозка и пересылка наркотических средств
  - г) пропаганда употребления наркотиков
- 22 Для алкогольной энцефалопатии типа Корсаковского психоза характерно:
- 1.развитие после перенесённого состояния помрачения сознания ;
  - 2.появление невропатии нижних конечностей;
  - 3.наличие расстройств памяти с преобладанием фиксационной амнезии;
  - 4.полное отсутствие осознания болезни;
  - 5.острое начало болезни.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г)верно 4

- 23 К критериям синдрома зависимости по МКБ-10 относятся:
1. сильное желание или чувство насильственной тяги к приёму вещества;
  2. физиологическое состояние отмены, при котором приём вещества прекращается или уменьшается, о чем свидетельствует характерный для вещества синдром отмены;
  3. нарушение способности контролировать приём вещества, т.е. начало употребления, окончание или дозировку употребляемых веществ;
  4. формирующаяся соматическая патология;
  5. социальная дезадаптация.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно 4
- 24 Выберите устные средства санитарного просвещения:
- а) беседа, лекция
  - б) фотография, плакат
  - в) брошюра, журнал
  - г) бюллетень, буклет
- 25 Для первой стадии алкоголизма наиболее характерна форма пьянства в виде:
- а) постоянного пьянства на фоне повышенной толерантности
  - б) коротких двух-трех дневных псевдозапоев
  - в) частых однодневных эксцессов
  - г) перемежающего пьянства
  - д) истинных запоев
- 26 Гарантированный объем помощи больным наркоманией включает:
- а) обследование
  - б) диагностику
  - в) стационарное лечение
  - г) санаторное лечение
- 27 ВИЧ-инфекция чаще возникает у наркоманов, употребляющих наркотики:
- а) внутривенно
  - б) перорально
  - в) не зависимо от способа введения
  - г) интраназально
- 28 Выраженные неврологические нарушения в виде симптомов орального автоматизма, спонтанного нистагма, гиперкинезов характерны для:
- а) Корсаковского психоза
  - б) энцефалопатии Гайе-Вернике
  - в) алкогольного параноида
  - г) алкогольного слухового галлюциноза
  - д) алкогольной паранойи
- 29 Клиническими признаками кокаиновой наркомании являются:
- а) повышение интеллектуальной деятельности
  - б) расширение зрачков, блеск глаз
  - в) тактильные галлюцинации
  - г) эпилептические припадки

- 30 В клинической структуре алкогольного абстинентного синдрома наиболее специфичным является:
- а) расстройство сна;
  - б) аффективные проявления;
  - в) вегетативные расстройства;
  - г) вторичные формы влечения к алкоголю;
- 31 К дезинтоксикационным средствам относятся:
- 1. гипохлорит натрия;
  - 2. гемодез;
  - 3. сернокислая магнезия;
  - 4. апоморфин;
  - 5. кордиамин.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 32 Ранним называется алкоголизм, формирующийся в период:
- а) до 25 лет
  - б) до 18 лет
  - в) внутриутробного развития
  - г) 6 – 7 лет
- 33 Здоровый образ жизни включает в себя:
- а) благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе поведенческой, гигиенические навыки
  - б) состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
  - в) принятие мер, направленных на снижение влияния вредных факторов на организм человека
  - г) привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом
- 34 Больной О., 42 г. доставлен на консультацию к психиатру хирургом, который обнаружил, что больной спрятал большое количество кодеинсодержащего лекарства от кашля, когда поступил в больницу. Пять лет тому назад при операции на спине врачу пришлось прописать ему кодеин, чтобы облегчить боли. Однако, через пять лет он продолжал употреблять кодеинсодержащие таблетки и повысил дозу с 60 до 95 таблеток ежедневно. Пытался прекратить принимать кодеин, но не мог. Появилась раздражительность, тревога, бессонница. Что с больным?
- а) опиоидная наркомания
  - б) гашишная наркомания
  - в) алкоголизм
  - г) кодеиновая зависимость
  - д) первитиновая наркомания
- 35 Для абстиненции при употреблении антипаркинсонических препаратов характерно все вышеперечисленное, кроме:
- а) снижения настроения
  - б) тремора
  - в) тактильных галлюцинаций
  - г) делириозных расстройств

- 36 При опьянении, вызванном употреблением наркотических или сильнодействующих веществ, выявляется все перечисленное, кроме:
- а) наличия следов инъекций
  - б) акроцианоза, гипергидроза
  - в) нистагма
  - г) запаха алкоголя изо рта
- 37 Сенестопатии- это:
- а) локализованные неприятные, тягостные ощущения;
  - б) необычные, часто алгические, ощущения с меняющейся локализацией;
  - в) тягостные болевые ощущения в утраченной конечности;
  - г) тягостные ощущения ползания насекомых, червей и т.п. под кожей, внутри тела
- 38 Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена:
- а) крепостью и качеством алкоголя;
  - б) культурально-этническими факторами;
  - в) поло-возрастными факторами;
  - г) активностью фермента алкогольдегидрогеназы, /АДГ/;
- 39 При терапии алкогольных делириев с особой осторожностью следует назначать:
- а) полиионные растворы;
  - б) крово- и плазмозаменители;
  - в) транквилизаторы;
  - г) нейролептики;
- 40 Признаки употребления амфетаминов, кроме:
- а) излишняя двигательная активность
  - б) отсутствие чувство голода
  - в) нарушение режима сна
  - г) сенестопатии
  - д) сильное сексуальное раскрепощение
- 41 Для первой стадии делирия характерно:
- 1.наплывы ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях;
  - 2.развитие псевдогаллюцинаторных расстройств;
  - 3.расстройства сна, яркие сновидения;
  - 4.помрачение сознания;
  - 5.деперсонализация.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно 4
- 42 Для алкогольной комы характерно:
- 1.нарушение сознания;
  - 2.понижение температуры тела и появление цианоза;
  - 3.резкое снижение мышечного тонуса;
  - 4.повышение тонуса сердечно-сосудистой системы;
  - 5.двигательное возбуждение.
- 6.верно 1,2,3
  - 7.верно 1,3
  - 8.верно 2,4
  - 9.верно все перечисленное

- 43 Уголовная ответственность не предусматривается за:
- а) хищение наркотических лекарственных средств;
  - б) незаконное изготовление, сбыт, хранение наркотических средств;
  - в) потребление ПАВ без врачебного предписания;
  - г) содержание притонов для потребления наркотиков, склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств
- 44 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:
- а) две
  - б) три
  - в) четыре
  - г) пять
- 45 Чаще всего зависимость от ПАВ формируется у лиц:
- 1. с дефектами воспитания;
  - 2. с личностными девиациями;
  - 3. с нарушениями социальной адаптации;
  - 4. с невысоким уровнем профессиональной ориентации;
  - 5. с невысоким интеллектом.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 46 Для алкогольной комы характерно:
- 1. нарушение сознания;
  - 2. понижение температуры тела и появление цианоза;
  - 3. резкое снижение мышечного тонуса;
  - 4. повышение тонуса сердечно-сосудистой системы;
  - 5. двигательное возбуждение.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 47 При алкогольном слуховом галлюцинозе сознание:
- а) помрачено
  - б) выключено
  - в) ясное
  - г) периодически-ясное, периодически-с периодами помрачения
  - д) с периодами помрачения



- 48 Синдром последствий при наркомании у подростков:
- 1.появляется быстро;
  - 2.опережает развитие собственно наркологической симптоматики;
  - 3.проявляется остановкой в психическом развитии уже на этапе систематического потребления наркотика;
  - 4.характеризуется нарушением закономерности психического и социального созревания;
  - 5.выражается формированием психоорганического синдрома с очень быстрым исходом в слабоумие.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 49 Параноидная форма патологического опьянения характеризуется :
- 1.наличием аффекта страха, доходящего до ужаса;
  - 2.иллюзорно-бредовым восприятием окружающего;
  - 3.внешне целенаправленной деятельностью;
  - 4.наличием фантастических сценopodobных галлюцинаций;
  - 5.делириозным расстройством сознания.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 50 Каким документом регламентированы стандарты оказания наркологической помощи:
- а) Приказ Министерства здравоохранения № 704 от 12.09.88г.  
б) Приказы Министерства здравоохранения № 129, 131, 132, 133, 134, 135 от 04.09.2012г.  
в) Постановление Правительства РФ № 234-ПП от 12.09.2014г.  
г) Приказы Департамента здравоохранения № 346, 347, 348 от 04.09.2012г.
- 51 Полизависимость формируется при употреблении нескольких ПАВ, которые:
- 1.по типу действия на ЦНС обладают одинаковыми эффектами у больных;
  - 2.при комбинированном приёме способны усиливать действие друг друга;
  - 3.обладают разной продолжительностью действия;
  - 4.оказывают разнонаправленные эффекты;
  - 5.обладают одинаковой продолжительностью действия.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно 4
- 52 О психопатоподобных изменениях личности наркомана свидетельствуют:
- а) колебания эмоционального фона и снижение интеллекта;  
б)раздражительность, возбудимость, неспособность критически оценивать свои действия и сужения круга интересов;  
в)неспособность критически оценивать свои действия и снижение интеллекта;  
г) снижение интеллекта, сужение круга интересов

- 53 Перечислите виды патологического опьянения:
- а) сумеречное патологическое опьянение, параноидное патологическое
  - б) опьянение
  - в) дисфорическое опьянение
  - г) депрессивное опьянение
  - д) сомноленция
  - е) абстинентный синдром
- 54 При терапии алкогольных делириев с особой осторожностью следует назначать:
- а) полиионные растворы;
  - б) крово- и плазмозаменители;
  - в) транквилизаторы;
  - г) нейролетпики;
- 55 Сужение зрачков характерно для:
- а) эфедриновой интоксикации
  - б) опийного абстинентного синдрома
  - в) гашишной интоксикации
  - г) опийной интоксикации
- 56 Переход от эпизодического к систематическому злоупотреблению алкоголем проявляется в:
- а) учащении периодов опьянения
  - б) изменении характера опьянения
  - в) традиционно обусловленных эпизодах употребления алкоголя
  - г) росте толерантности к алкоголю
  - д) развитию выраженной интоксикации организма к алкоголю
- 57 К группе агонистов опиатных рецепторов не относятся:
- а) налоксон
  - б) раствор из маковой соломки
  - в) героин
  - г) метадон
- 58 Способность понимания психологических состояний других людей и сопереживание им, умение посмотреть на ситуацию глазами другого - это качество личности
- а) доброжелательность
  - б) открытость
  - в) конфронтация
  - г) эмпатия
  - д) аутентичность
- 59 К транквилизаторам относятся:
1. производные бензамида;
  2. производные бензодиазепина;
  3. производные ГАМК;
  4. производные пропандиола;
  5. ингибиторы моноаминооксидазы.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно 4

- 60 Все листы журнала контроля трезвости должны быть:
- а) пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью организации и заверены подписью руководителя
  - б) заверены только подписью медицинского работника, проводящего предрейсовый медицинский осмотр
  - в) только пронумерованы
  - г) заверены только подписью руководителя организации
- 61 Клиника дисфорического варианта измененного простого алкогольного (острой алкогольной интоксикации) опьянения характеризуется:
- 1. состоянием напряженности, сопровождаемой недовольством, угрюмостью в сочетании с неприязнью и злобой;
  - 2. преобладанием подавленного настроения
  - 3. придирчивостью с агрессивностью;
  - 4. появлением суицидальных мыслей, сопровождаемых суицидальными действиями;
  - 5. моторной заторможенностью.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 62 При эпилептическом припадке:
- а) развитию судорог предшествует аура
  - б) припадок начинается внезапно
  - в) каждый припадок начинается своеобразно
  - г) развитию судорог предшествует психотравмирующая ситуация
- 63 Острые интоксикационные психозы при злоупотреблении амфетаминами чаще протекают по типу:
- 1. острого параноида;
  - 2. острого галлюциноза;
  - 3. делирия;
  - 4. онейроидноподобного состояния;
  - 5. аменции.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 64 О распространенности пьянства и алкоголизма наиболее эффективно свидетельствует следующий показатель:
- а) рождаемость
  - б) смертность
  - в) количество абсолютного алкоголя, потребляемого на душу населения в год
  - г) количество состоящих на учете больных

- 65 Исходя из сложившихся классификаций, к острым металкогольным психозам относят:
- 1.алкогольный делирий;
  - 2.алкогольный галлюциноз;
  - 3.бредовые психозы;
  - 4.алкогольную эпилепсию;
  - 5.дипсоманию.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г)верно 4
- 66 Для острого алкогольного гепатита характерно:
- 1.состояние общей интоксикации;
  - 2.диспептические расстройства;
  - 3.увеличение печени;
  - 4.гиперхолестеринемия;
  - 5.паренхиматозная желтуха.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 67 Для симптома снижения толерантности у больных алкоголизмом характерно:
- 1.появление признаков опьянения при употреблении привычных доз алкоголя;
  - 2.переход на напитки с более низким содержанием алкоголя;
  - 3.снижения разовой дозы алкоголя при сохранении суточной;
  - 4.появление на этапе 2-3 ст. заболевания;
  - 5.появление в картинах опьянения тотальных амнезий.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 68 Для алкогольной энцефалопатии типа Корсаковского психоза характерно :
- 1.развитие после перенесенного состояния помрачения сознания ;
  - 2.появление невропатии нижних конечностей;
  3. наличие расстройств памяти с преобладанием фиксационной амнезии;
  - 4.полное отсутствие осознания болезни;
  - 5.острое начало болезни.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г) верно 4
- 69 Алкогольная деградация личности проявляется:
- а) ослаблением памяти и утратой критики
  - б) разноплановостью мышления
  - в) морально-этическим снижением
  - г) эмоциональной амбивалентностью

- 70 К дезинтоксикационным средствам относятся:
- 1.гипохлорит натрия;
  - 2.гемодез;
  - 3.сернистая магнезия;
  - 4.апоморфин;
  - 5.кордиамин.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 71 Для купирования состояния отмены (алкогольного абстинентного синдрома) обычно используются:
- 1.витаминные препараты;
  - 2.ноотропы;
  - 3.транквилизаторы;
  - 4.антибиотики;
  5. трихопол, фуразолидон.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно 4
- 72 Состояние отмены при барбитуровой наркомании характеризуется:
1. дисфорическим аффектом;
  - 2.гиперрефлексией с мышечной гипертензией и мелким тремором;
  - 3.подъемом АД с последующей гипотензией вплоть до коллапсов;
  - 4.бессонницей;
  - 5.болями в желудке и крупных суставах.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 73 В «группу риска» входят водители:
- а) склонные к употреблению психоактивных веществ
  - б) длительно и часто болеющие
  - в) старше 40 лет
  - г) старше 55 лет
- 74 Для симптома снижения толерантности у больных алкоголизмом характерно:
- 1.появление признаков опьянения при употреблении привычных доз алкоголя;
  - 2.переход на напитки с более низким содержанием алкоголя;
  - 3.снижения разовой дозы алкоголя при сохранении суточной;
  - 4.появление на этапе 2-3 ст. заболевания;
  - 5.появление в картинах опьянения тотальных амнезий.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное

- 75 Судорожные припадки в абстинентном синдроме характерны для:
- а) опийной наркомании
  - б) гашишной наркомании
  - в) эфедроновой наркомании
  - г) барбитуровой наркомании
- 76 Больной С., 1952 г.р. в течение длительного времени употреблял алкоголь. После развода с женой употребление спиртного усилилось, имели место изменения личности. Эти нарушения привели к госпитализации. При осмотре: несколько раздражителен. Знает название больницы, в которой находится, но не знает дату, не может запомнить пять названий различных предметов. При неврологическом обследовании обнаружено небольшое снижение локтевых рефлексов, шаткость походки. Что с больным?
- а) алкогольный параноид
  - б) энцефалопатия Гайе-Вернике
  - в) корсаковский психоз
  - г) атипичная картина опьянения
  - д) алкогольный делирий
- 77 Для интоксикации опиоидными наркотиками характерно:
- а) бледность кожи
  - б) покраснение кожи
  - в) сужение зрачков
  - г) расширение зрачков
- 78 Изменение картины опьянения у больных алкоголизмом обусловлено:
1. содержанием алкоголя в алкогольных напитках;
  2. длительностью (тяжестью) заболевания;
  3. технологией приготовления алкогольных напитков;
  4. преморбидными характерологическими особенностями;
  5. половыми различиями.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 79 Объектом профилактики в наркологии являются:
1. больные люди, страдающие зависимостью от ПАВ;
  2. под ростки из неблагополучных семей;
  3. под ростки, замеченные в употреблении ПАВ;
  4. все контингенты населения;
  5. школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3,5
  - в) верно 2,4
  - г) верно 4
- 80 Амфетамины-это:
- а) наркотики, обладающие психостимулирующим действием
  - б) вещества, обладающие депрессогенным эффектом
  - в) вещества, вызывающие психоз по типу отравления ЛСД
  - г) смесь смолы, пыльцы и измельченных верхушек конопли
  - д) препараты, обладающие снотворным эффектом

- 81 Вербальные и пантомимические стигмы (ужимки, жаргон, уплощенный юмор) в статусе больных могут свидетельствовать:
- 1.о наличии токсической энцефалопатии;
  - 2.о признаках снижения уровня личности;
  - 3.о неблагоприятном микросоциальном окружении;
  - 4.об отравлении марганцово-кислым калием;
  - 5.об олигофрении.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 82 Ретроградная амнезия характеризуется:
- 1.фрагментарной утратой памяти;
  - 2.выпадением из памяти событий периода, следовавшего непосредственно после выхода из бессознательного состояния;
  - 3.отсутствием памяти на текущие события;
  - 4.выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию;
  - 5.потеря способности запоминать.
- а) верно 1,2, 3  
б) верно 1,3  
в)верно 2,4,5  
г)верно 4
- 83 Для купирования состояния отмены (алкогольного абстинентного синдрома) обычно используются:
- 1.витаминные препараты;
  - 2.ноотропы;
  - 3.транквилизаторы;
  - 4.антибиотики;
  - 5.трихопол, фуразолидон.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно 4
- 84 Среди социальных факторов, влияющих на формирование алкоголизма, наиболее значимыми являются:
- 1.алкогольная политика государства;
  - 2.социальное положение индивидуума и его экономическая обеспеченность;
  - 3.устойчивые обычаи ближайшего окружения;
  - 4.семейное положение
  - 5.расовая и этническа я принадлежность.
- а) верно 1,2 ,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное

- 85 Эпилептиформный синдром при алкоголизме наиболее часто проявляется в виде:
- а) больших судорожных припадков
  - б) эпилептического слабоумия
  - в) дисфорических состояний
  - г) сумеречного помрачения сознания
- 86 Мотивами потребления наркотиков чаще всего являются:
- 1.удовлетворение любопытства, желание испытать новые ощущения;
  - 2.желание отвлечься от будничных трудностей;
  - 3.гедонистические установки;
  - 4.необходимость признания «своим» в группе;
  - 5.желание повысить настроение.
- а)верно 1,2,3
  - б)верно 1,3
  - в)верно 2,4
  - г)верно все перечисленное
- 87 Тяжелая степень острой алкогольной интоксикации определяется:
- 1.мозжечковой атаксией;
  - 2.мышечной атонией, амимией;
  - 3.вестибулярными расстройствами: головокружением, тошнотой, рвотой;
  - 4.бледностью кожных покровов;
  - 5.снижением тонуса сердечно-сосудистой системы.
- а)верно 1,2,3
  - б)верно 1,3
  - в)верно 2,4
  - г)верно все перечисленное
- 88 Клиническая картина развёрнутого делирия характеризуется:
- 1.наплывом парейдолий, сценopodobных зрительных галлюцинаций;
  - 2.двигательным беспокойством;
  - 3.помрачением сознания;
  - 4.кататоническими нарушениями;
  - 5.массивными псевдогаллюцинациями.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно 4
- 89 Медицинские работники автотранспортных предприятий осуществляют:
- а) контроль за состоянием здоровья водителей
  - б) анализ причин отстранения водителей от работы
  - в) участие в служебном расследовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
  - г) проведение медицинских осмотров водителей
- 90 Наркологическая помощь наркологическим больным оказывается по:
- а) просьбе больного
  - б) просьбе и с согласия родителей или других законных представителей больного
  - в) требованию общественных организаций по месту жительства больного
  - г) требованию правоохранительных органов



- 91 Реабилитация больных наркологического профиля осуществляется:
- 1.социальными работниками;
  - 2.психотерапевтами;
  - 3.психологами;
  - 4.врачами;
  - 5.специалистами по социальной работе.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 92 Кардиомиопатия у больных алкоголизмом проявляется:
- 1.нарушением сердечного ритма;
  - 2.сниженной сократительной функцией миокарда;
  - 3.разнообразными болевыми ощущениями;
  - 4.нарушением проводимости;
- а)верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 93 Для водителей «группы риска» проводятся медицинские осмотры:
- а) предрейсовые
  - б) текущие
  - в) послерейсовые
  - г) еженедельные
- 94 Патологическое опьянение - это:
- а)конфабуляции в сочетании с реминисценциями
  - б)повышение толерантности к алкоголю
  - в)транзиторный (кратковременный) психоз
  - г)атипичное опьянение
  - д)сомноленция
- 95 Предварительный этап лечения больных с зависимостью от ПАВ включает:
- 1.проведение дезинтоксикационной терапии;
  - 2.купирование состояния отмены;
  - 3.коррекцию поведения больного;
  - 4.восстановление нарушенных соматических и психических функций;
  - 5.выявление основного симптомокомплекса психической зависимости и определение причин предшествующих рецидивов.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г)верно все перечисленное

96 К дезинтоксикационным средствам относятся:

1. гипохлорит натрия;
2. гемодез;
3. сернокислая магнезия;
4. апоморфин;
5. кордиамин.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно все перечисленное

97 В группу риска входят:

1. подростки, замеченные в употреблении алкоголя или других ПАВ;
2. подростки, ведущие асоциальный образ жизни;
3. подростки из неблагополучных семей;
4. подростки и взрослые, страдающие алкоголизмом;
5. подростки с пограничной умственной отсталостью.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно все перечисленное

98 Состояние отмены при героиновой наркомании характеризуется:

1. лавинообразным нарастанием симптомов;
2. алгическими и диспептическими расстройствами;
3. профузным потом, «ледящим ознобом», слезотечением, светобоязнью;
4. подавленным настроением с тревогой, неусидчивостью, приступами отчаяния;
5. быстрой, практически, критической редукцией симптомов.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно все перечисленное

99 Для абстиненции при употреблении опиатов характерны все перечисленные симптомы, кроме:

а) зуда в носу, чихания

б) нарушения сна

в) боли в суставах и мышцах

г) сужения зрачков

100 О психопатоподобных изменениях личности наркомана свидетельствуют:

а) колебания эмоционального фона и снижение интеллекта;

б) раздражительность, возбудимость, неспособность критически оценивать свои действия и сужения круга интересов;

в) неспособность критически оценивать свои действия и снижение интеллекта;

г) снижение интеллекта, сужение круга интересов

101 Токсикомании, формирующиеся вследствие злоупотребления лекарственными препаратами, чаще всего возникают из-за:

а) нерационального, неправильного лечения;

б) частого приема бензодиазепинов при бессоннице или других расстройствах;

в) частого приема медикаментов при различных неблагоприятных жизненных ситуациях;

г) лечения барбитуратами;

- 102 Основными признаками алкогольного параноида являются:
- галлюцинаторные расстройства
  - чувственный аффект страха
  - бред преследования
  - психические автоматизмы
- 103 Полизависимость формируется при употреблении нескольких ПАВ, которые:
- по типу действия на ЦНС обладают одинаковыми эффектами у больных;
  - при комбинированном приеме способны усиливать действие друг друга;
  - обладают разной продолжительностью действия;
  - оказывают разнонаправленные эффекты;
  - обладают одинаковой продолжительностью действия.
- верно 1,2,3
  - верно 1,3
  - верно 2,4
  - верно 4
- 104 Для эксплозивного варианта изменённого простого алкогольного опьянения (острой алкогольной интоксикации) характерно:
- слабо выраженная и кратковременная эйфория;
  - вспышки резкого недовольства, раздражения или злобы, неоднократно повторяющиеся в состоянии опьянения;
  - проявление конфликтности;
  - состояние тревожно-тоскливого аффекта;
  - проявление демонстративности.
- верно 1,2,3
  - верно 1,3
  - верно 2,4
  - верно все перечисленное
- 105 Толерантность к алкоголю в большей степени зависит:
- от технологии изготовления алкогольной продукции.
  - от частоты употребления алкоголя;
  - от функционального состояния организма;
  - от изначальной активности альдегидоксилирующих ферментов;
  - от возраста и пола индивидуума.
- верно 1,2,3
  - верно 1,3
  - верно 2,4
  - верно 4
- 106 Для временной остановки венозного наружного кровотечения применяют:
- пальцевое прижатие артерии на протяжении
  - наложение жгута
  - максимальное сгибание конечности
  - наложение давящей повязки

- 107 Схема заместительной терапии состояния отмены при барбитуровой наркомании фенobarбиталом не предусматривает:
- а) подбор дозы фенobarбитала из расчета  $1/3$  от суточной дозы барбитурата, которую принимал больной;
  - б) назначения высчитанной дозы в 4 приема ежедневно в течение первых 2-х дней;
  - в) уменьшение с 3-х суток лечения каждой следующей суточной дозы фенobarбитала на 10 %;
  - г) назначения высчитанной дозы фенobarбитала до момента купирования состояния отмены
- 108 К последствиям хронической интоксикации ПАВ при любой форме зависимости относятся:
1. прогрессирующее падение активности, энергетического потенциала;
  2. угасание влечений, утрата потребностей как в биологическом, так и в социальном смысле;
  3. снижение сопротивляемости организма, прогрессирующее истощение;
  4. развитие миокардиопатий;
  5. угасание интеллекта.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 109 Ретроградная амнезия характеризуется:
1. фрагментарной утратой памяти;
  2. выпадением из памяти событий периода, следовавшего непосредственно после выхода из бессознательного состояния;
  3. отсутствием памяти на текущие события;
  4. выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию;
  5. потерей способности запоминать.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4,5
  - г) верно 4
- 110 При передозировке кокаина смерть наступает от:
1. эпистатуса (серии судорожных припадков);
  2. остановки сердца вследствие аритмии;
  3. остановки дыхания;
  4. некронефроза;
  5. печеночной комы.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 111 Для наркомании характерно:
- а) развитие физической и психической зависимости от наркотиков
  - б) рост толерантности к наркотическим веществам
  - в) выраженные изменения личности
  - г) отсутствие абстинентного синдрома

- 112 Мусситирующий делирий характеризуется:
1. психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах постели;
  2. невнятным, бессвязным бормотанием;
  3. карфологическими нарушениями;
  4. возбуждением с совершением профессиональных действий;
  5. эпизодами кататонического возбуждения.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно все перечисленное
- 113 Основными признаками мусситирующего делирия являются:
- а) глубокое помрачение сознания
  - б) преобладание простых двигательных актов
  - в) бредовое поведение
  - г) вербальная продукция в виде бормотания
  - д) наличие вербальных галлюцинаций
  - е) наличие различных неприятных соматических ощущений в теле, на фоне пониженного настроения
- 114 Лёгкая степень острой алкогольной интоксикации характеризуется:
1. ощущением психического и физического комфорта;
  2. повышением речедвигательной активности;
  3. лёгким нарушением координации движений;
  4. замедлением ассоциативного процесса;
  5. появлением психосенсорных расстройств.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно все перечисленное
- 115 Реабилитация больных наркологического профиля осуществляется:
1. социальными работниками;
  2. психотерапевтами;
  3. психологами;
  4. врачами;
  5. специалистами по социальной работе.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно все перечисленное
- 116 Мусситирующий делирий характеризуется:
1. психомоторным возбуждением с хаотическими движениями и в пределах постели;
  2. невнятным, бессвязным бормотанием;
  3. карфологическими нарушениями;
  4. возбуждением с совершением профессиональных действий;
  5. эпизодами кататонического возбуждения.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно все перечисленное

- 117 Обязательное медицинское страхование - это:
- а) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи;
  - б) страховой риск, связанный с возникновением страхового случая;
  - в) обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи;
  - г) обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, целевым назначением которых является обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения
- 118 К наиболее выраженным психопатологическим эффектам острой интоксикации галлюциногенами относятся:
- а) нарушения зрительного восприятия;
  - б) парестезии;
  - в) деперсонализационные и дереализационные расстройства;
  - г) стойкие вербальные галлюцинации;
- 119 Осложненная наркомания – это сочетание зависимости от наркотиков и:
- а) антибиотиков
  - б) алкоголя
  - в) глюкокортикоидов
  - г) витаминных препаратов
- 120 Для симптома «плато» толерантность и у больных алкоголизмом характерно:
1. потребление стабильно установленной дозы алкоголя;
  2. появление состояний опьянения только при употреблении высоких доз алкоголя ;
  3. переносимость максимальных доз алкоголя на протяжении определённого отрезка времени ;
  4. появление на этой стадии начальной стадии заболевания в среднюю;
  5. переход на употребление алкогольных напитков с более низким содержанием алкоголя.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 121 Помещение для проведения предрейсовых медицинских осмотров должно иметь:
- а) мебель (кушетка медицинская, письменный стол, стол и т.д.)
  - б) электрокардиограф
  - в) приборы для определения алкоголя в биологических средах организма
  - г) тест-полоски
- 122 Для алкогольной комы характерно:
1. нарушение сознания;
  2. понижение температуры тела и появление цианоза;
  3. резкое снижение мышечного тонуса;
  4. повышение тонуса сердечно-сосудистой системы;
  5. двигательное возбуждение.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное

- 123 Атипичная картина опьянения не развивается:
- а) после перенесенных в прошлом черепно-мозговых травм
  - б) после нейроинтоксикаций
  - в) при вынужденной бессоннице. сильном эмоциональном стрессе
  - г) при сильном эмоциональном стрессе
  - д) после лечения антибиотиками
- 124 Наркотическая эйфория - это изменение в сторону максимально положительного для субъекта значения восприятий:
- 1. настроения;
  - 2. мышления;
  - 3. физического состояния;
  - 4. психического состояния;
  - 5. памяти.
- а) верно 1,3,4
  - б) верно 1,2,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 125 Для средней степени алкогольного опьянения характерно все перечисленное, кроме:
- а) нарушения речи
  - б) нарушения походки
  - в) неустойчивости в позе Ромберга
  - г) слабого запаха алкоголя изо рта
- 126 Кратковременная, бурно протекающая, чрезвычайно интенсивная эмоциональная реакция:
- а) фрустрация
  - б) аффект
  - в) настроение
  - г) депрессия
  - д) стресс
- 127 Какие лабораторные исследования применяются для подтверждения ремиссии у больных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя:
- а) определение уровня прямого билирубина в крови
  - б) анализ на карбогидрат-дефицитный трансферрин методом капиллярного электрофореза (CDT)
  - в) определение уровня креатинина в крови
  - г) определение уровня глюкозы в крови
- 128 На доврачебном этапе (при отсутствии ЭКГ) можно думать о начавшемся инфаркте миокарда, если приступ стенокардии не купируется приемом нитроглицерина в течение:
- а) 20 - 30 минут
  - б) 30 минут - / часа
  - в) 1,5-2 часа
  - г) суток

- 129 Легкая степень острой алкогольной интоксикации характеризуется:
- 1.ощущением психического и физического комфорта;
  - 2.повышением речедвигательной активности;
  - 3.легким нарушением координации движений;
  - 4.замедлением ассоциативного процесса;
  - 5.появлением психосенсорных расстройств.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 130 При химико-токсикологических исследованиях для определения наркотических или сильнодействующих веществ в биологических средах организма используют:
- а) тест-полоски
  - б) газожидкостную и тонкослойную хроматографию
  - в) иммуноферментный анализ
  - г) алкометры
- 131 Антидепрессанты обладают следующими эффектами действия:
- 1.антипсихотическим;
  - 2.седативным;
  - 3.миорелаксирующим;
  - 4.противосудорожным;
  - 5.транквилизирующим.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 132 Актуализация ситуационно обусловленного первичного патологического влечения к алкоголю в значительной степени проявляется:
- 1.стойкими навязчивыми мыслями об алкоголе;
  - 2.повышенной двигательной активностью и суетливостью при появлении алкогольных раздражителей, или ситуаций связанных с алкоголем
  - 3.беспричинной раздражительностью;
  - 4.чрезмерным стремлением к контактам с окружающими;
  - 5.появлением сновидений с алкогольной тематикой.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 133 С юридической точки зрения «производство» и «изготовление» наркотических средств – это:
- а) синонимы
  - б) разные понятия
  - в) оборот наркотических средств
  - г) реализация наркотических средств
- 134 Характерными признаками при употреблении седативных препаратов являются все перечисленное, кроме:
- а) бледности кожных покровов
  - б) зрительных галлюцинации
  - в) снижения тонуса мышц и рефлексов
  - г) смазанности речи



- 135 К основным факторам, участвующим в симптомообразовании алкоголизма относят: 1. фактор почвы; 2. фактор фона; 3. токсический фактор; 4. временной фактор; 5. этнический фактор.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно 4
  - д) верно все перечисленное
- 136 Остаточные явления предшествующего алкогольного опьянения коррелируют с концентрацией алкоголя в крови:
- а) 0,022 - 1%
  - б) 1 - 2%
  - в) 2 - 3%
  - г) 3 - 4%
- 137 Клиническая картина острого отравления опиатами характеризуется:
- 1. угнетением ЦНС от стадии засыпания до расстройства сознания в виде комы;
  - 2. сужением зрачков (симптом «точки») со снижением или полным отсутствием реакции на свет;
  - 3. угнетением дыхания до брадипноэ с частотой до 4-6 в минуту или полной его остановкой;
  - 4. снижением сухожильных и периостальных рефлексов или арефлексией;
  - 5. снижением или отсутствием реакции на болевое раздражение, корнеальных, кашлевых и глоточных рефлексов.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 138 Основные симптомы Корсаковского психоза:
- а) полиневриты
  - б) амнезия
  - в) конфабуляции
  - г) сохранность памяти
- 139 Для алкогольного бреда ревности характерно все выше перечисленное, кроме:
- а) бреда преследования
  - б) идеи отношения
  - в) тревоги
  - г) тактильных галлюцинации
- 140 Цель санитарного просвещения:
- а) формирование высокой санитарной культуры, сознательного гигиенического поведения граждан
  - б) нетерпимое и критичное отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к условиям окружающей среды, наносящим ущерб здоровью
  - в) правильное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленное на выздоровление
  - г) овладение знаниями, необходимыми для соблюдения правил гигиенического поведения

- 141 Повторное медицинское освидетельствование проводится по:
- личному заявлению водителя
  - направлению руководителя автотранспортного предприятия
  - направлению медицинского работника
  - направлению сотрудников ГИБДД
- 142 Для средней степени острой алкогольной интоксикации характерно:
- функциональные нарушение моторики;
  - замедление и затруднение ассоциативного процесса;
  - однообразность представлений и трудности в переключении внимания, дизартричность речи;
  - непроизвольное мочеиспускание;
  - выраженные соматические расстройства.
- верно 1,2,3
  - верно 1,3
  - верно 2,4
  - верно все перечисленное
- 143 Сужение зрачков характерно для:
- эфедроновой интоксикации
  - опийного абстинентного синдрома
  - гашишной интоксикации
  - опийной интоксикации
- 144 К транквилизаторам относятся:
- производные бензамида;
  - производные бензодиазепина;
  - производные ГАМК;
  - производные пропандиола;
  - ингибиторы моноамин ооксидазы.
- верно 1 ,2, 3
  - верно 1,3
  - верно 2,4
  - верно 4
- 145 Для синдрома отмены при амфетаминовой наркомании наиболее характерно:
- развитие острой депрессии с суицидальными тенденциями;
  - повышенная утомляемость, раздражительность;
  - сонливость при отсутствии сна;
  - стойкое отсутствие аппетита
- 146 К основным клиническими проявлениями алкогольного абстинентного синдрома относят:
- влечение к алкоголю с целью опохмеления;
  - расстройства в сфере памяти
  - аффективно-вегетативные проявления;
  - судорожные состояния;
  - психосенсорные расстройства.
- верно 1,2,3
  - верно 1,3
  - верно 2,4
  - верно 4

- 147 В неизмененном виде алкоголь выводится из организма:
- а) печенью
  - б) легкими
  - в) почками
  - г) молочными железами
- 148 Метадон является:
- а) нейролептиком
  - б) психостимулятором
  - в) опийным производным
  - г) сильнодействующим веществом
- 149 Летучие органические соединения (средства бытовой и промышленной химии) имеют ряд общих качеств, к которым относятся:
- 1.хорошая растворимость в жирах;
  - 2.высокая токсичность;
  - 3.быстрая испаряемость;
  - 4.высокая наркогенность;
  - 5.преимущественное поражение ЦНС, сердца, печени и почек при злоупотреблении ими.
- а)верно 1,2,3
  - б)верно 1,3
  - в)верно 2,4
  - г)верно все перечисленное
- 150 Основными признаками алкогольного галлюциноза являются:
- а) помрачение сознания
  - б) полная амнезия психоза
  - в) преобладание вербальных псевдогаллюцинаций
  - г) преобладание истинных вербальных галлюцинаций
- 151 По медицинским показаниям наркотики назначают:
- а) онкологическим пациентам
  - б) терапевтическим пациентам
  - в) стоматологическим пациентам
  - г) наркологическим пациентам
- 152 К основным принципам антиалкогольной терапии относятся:
- а) непрерывность и длительность
  - б) комплексность
  - в) максимальная индивидуальность
  - г) принудительность
- 153 В группу риска входят:
- 1.подростки, замеченные в употреблении алкоголя или других ПАВ;
  - 2.подростки, ведущие асоциальный образ жизни;
  - 3.подростки из неблагополучных семей;
  - 4.подростки и взрослые, страдающие алкоголизмом;
  - 5.подростки с пограничной умственной отсталостью.
- а)верно 1,2,3
  - б)верно 1,3
  - в)верно 2,4
  - г)верно все перечисленное

- 154 В России трансплантация может проводиться без согласия донора, если донор:
- а) особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение
  - б) гражданин страны, находящейся в состоянии войны с Россией
  - в) психически неполноценный
  - г) донор — умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов
- 155 Нерезко выраженные признаки абстинентного синдрома наблюдаются при употреблении:
- а) опиатов
  - б) препаратов конопли
  - в) стимуляторов
  - г) барбитуратов
- 156 Для патологического опьянения характерно: 1. внезапность, острота и транзиторность психотического эпизода; 2. импульсивность и целенаправленность характера разрушительных действий; 3. сумеречное расстройство сознания; 4. нетипичность развития повторных аналогичных состояний; 5. кризисное разрешение глубоким сном с последующей амнезией и астенией.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно 4
  - д) верно все перечисленное
- 157 Для алкогольного делирия характерно все, кроме:
- а) сенестезии
  - б) иллюзии
  - в) галлюцинации
  - г) бессонницы
  - д) чувства страха
- 158 Для средней степени алкогольного опьянения характерно все перечисленное, кроме:
- а) нарушения речи
  - б) нарушения походки
  - в) неустойчивости в позе Ромберга
  - г) слабого запаха алкоголя изо рта
- 159 Клиническими проявлениями наркомании при употреблении галлюциногенов являются:
- а) зрительные галлюцинации
  - б) страх, подозрительность
  - в) бредовые идеи преследования
  - г) параличи нижних конечностей
- 160 Патогенез алкогольного делирия заключается:
- а) в аутоинтоксикации вследствие алкогольного поражения печени
  - б) вследствие поражения почек
  - в) вследствие коллапса сосудов
  - г) вследствие нарушения сердечной деятельности
  - д) вследствие расширения сосудов

- 161 Состояние отмены при бензодиазепиновой токсикомании проявляется:
- 1.тревогой, неусидчивостью, подавленностью и злобой;
  - 2.фибриллярными подергиваниями лицевой мускулатуры и мышц конечностей;
  - 3.тахикардией и ортостатической гипотензией;
  - 4.горизонтальным нистагмом и мелкоразмашистым тремором;
  - 5.бессонницей, головными болями, тошнотой, отсутствием аппетита.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 162 Формирование состояния отмены свидетельствует о становлении:
- 1.начальной стадии наркомании;
  - 2.средней стадии наркомании;
  - 3.конечной стадии наркомании;
  - 4.синдрома физической зависимости;
  - 5.синдрома измененной реактивности.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г) верно 4
- 163 Последствия, не характерные для применения экстази:
- а)быстрое возникновение психической зависимости
  - б)физическое истощение
  - в)нервное истощение
  - г)отрицательное влияние на генетический код и будущее потомство
  - д)укрепление здоровья
- 164 К признакам острой интоксикации опиатами относят:
- 1.миоз с отсутствием или крайне вялой реакцией зрачков на свет;
  - 2.брадипное и тахипное;
  - 3.зуд кожи лица;
  - 4.«меловую» бледность и сухость кожи;
  - 5.отсутствие нарушений координации движений и артикуляции.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г) верно все перечисленное
- 165 Биомедицинская этика и медицинское право должны находиться в состоянии:
- а)независимости
  - б)медицинское право - приоритетно
  - в)должен быть выдержан приоритет биомедицинской этики
  - г)биомедицинская этика - критерий корректности медицинского права
- 166 Для синдрома отмены при амфетаминовой наркомании наиболее характерно:
- а) развитие острой депрессии с суицидальными тенденциями;
  - б) повышенная утомляемость, раздражительность;
  - в) сонливость при отсутствии сна;
  - г) стойкое отсутствие аппетита;

- 167 Уголовная ответственность за изготовление, хранение и сбыт наркотиков предусмотрена статья УК РФ:
- а) 119
  - б) 167
  - в) 228
  - г) 235
- 168 Максимальное угнетение дыхательного центра после внутривенного введения морфина развивается через:
- а) 1 - 3 минуты
  - б) 5 - 10 минут
  - в) 15 - 20 минут
  - г) 30 минут
- 169 Основные симптомы энцефалопатии Гайе-Вернике:
- а) нарушение сознания
  - б) психотические расстройства
  - в) гиперкинезы
  - г) отсутствие неврологических расстройств
- 170 Для эфедренового и первитинового опьянения характерно:
- а) гипомания, ощущение невесомости, тяга к общению, чувство
  - б) безграничной любви
  - в) депрессии с суицидальными мыслями
  - г) сенестопатии
  - д) выраженные амнезии
  - е) мании
- 171 Для проведения лабораторных исследований биологических сред на содержание алкоголя используются:
- а) алкометры
  - б) газовые хроматографы
  - в) метод Раппопорта
  - г) тест-полоски
- 172 Чаще всего острые токсические энцефалопатии развиваются при передозировке:
- 1. циклодола;
  - 2. летучих органических соединений;
  - 3. гашиша;
  - 4. эфедрона;
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно 4
  - д) верно все перечисленное
- 173 Исчезновение рвотного рефлекса при алкоголизме характерно:
- а) для первой стадии алкоголизма
  - б) для второй стадии алкоголизма
  - в) для третьей стадии алкоголизма
  - г) для алкогольного параноида
  - д) все верно

- 174 Для симптома снижения толерантности у больных алкоголизмом характерно:
1. появление признаков опьянения при употреблении привычных доз алкоголя;
  2. переход на напитки с более низким содержанием алкоголя;
  3. снижения разовой дозы алкоголя при сохранении суточной;
  4. появление на этапе 2-3 ст. заболевания;
  5. появление в картинах опьянения тотальных амнезий.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно все перечисленное
- 175 Чаще всего острые токсические энцефалопатии развиваются при передозировке:
1. циклодола;
  2. летучих органических соединений;
  3. гашиша;
  4. эфедрона;
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно 4  
д) верно все перечисленное
- 176 Токсикомании, формирующиеся вследствие злоупотребления лекарственными препаратами, чаще всего возникают из-за:
- а) нерационального, неправильного лечения;
  - б) частого приема бензодиазепинов при бессоннице или других расстройствах;
  - в) частого приема медикаментов при различных неблагоприятных жизненных ситуациях;
  - г) лечения барбитуратам;
- 177 В кабинеты экспертизы опьянения после проведения предрейсового медицинского осмотра водители направляются в случаях:
- а) противоречивости данных клинического и лабораторного исследования
  - б) согласия водителя с заключением проведенного контроля трезвости
  - в) неясной или неполной клинической картины опьянения
  - г) сомнительных результатов лабораторного исследования
- 178 Основными клиническими признаками «профессионального» делирия являются:
- а) бред преследования
  - б) стереотипные автоматизированные действия
  - в) слуховые галлюцинации
  - г) ложные узнавания
- 179 Штамп в путевом листе водителей ставится при:
- а) допуске к работе
  - б) наличии признаков употребления алкоголя
  - в) наличии у водителей симптомов острого заболевания
  - г) наличии признаков употребления наркотиков
- 180 К метаболитам алкоголя относятся:
- а) ацетальдегид
  - б) молочная кислота
  - в) уксусная кислота
  - г) масляная кислота

- 181 К достоверным признакам внезапной остановки сердечной деятельности не относится:
- а) отсутствие пульса на сонных артериях
  - б) внезапная потеря сознания
  - в) отсутствие самостоятельного дыхания
  - г) отсутствие тонов сердца
- 182 Для клиники токсикомании транквилизаторами бензодиазепинового ряда характерно:
- 1. сходство с клиникой барбитуровой наркомании;
  - 2. более медленное формирование основных симптомокомплексов;
  - 3. менее brutальное интеллектуально-мнестическое снижение;
  - 4. значительная выраженность аффективных нарушений;
  - 5. отсутствие судорожных припадков.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 183 Чаще всего зависимость от ПАВ формируется у лиц:
- 1. с дефектами воспитания;
  - 2. с личностными девиациями;
  - 3. с нарушениями социальной адаптации;
  - 4. с невысоким уровнем профессиональной ориентации;
  - 5. с невысоким интеллектом.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 184 Истечение ликвора из уха или носа является характерным признаком:
- а) сотрясения головного мозга
  - б) сдавления головного мозга
  - в) перелома свода черепа
  - г) перелома основания черепа
- 185 Для легкой степени алкогольного опьянения характерно:
- а) нарушение поведения
  - б) нарушение сознания и ориентировки
  - в) нарушение походки
  - г) тремор
- 186 Срок диспансерного наблюдения больных, с синдромом зависимости от наркотиков :
- а) пять лет
  - б) три года
  - в) два года
  - г) один год



- 187 Наркогенность ПАВ определяется:
1. скоростью формирования зависимости;
  2. высотой толерантности;
  3. степенью психической и социальной инвалидизации;
  4. значением субъективного эффекта удовольствия от вещества;
  5. видом вещества.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно все перечисленное
- 188 Объектом профилактики в наркологии являются:
1. больные люди, страдающие зависимостью от ПАВ;
  2. подростки из неблагополучных семей;
  3. подростки, замеченные в употреблении ПАВ;
  4. все контингенты населения;
  5. школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3,5  
в) верно 2,4  
г) верно 4
- 189 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие пульса на:
- а) локтевой артерии
  - б) лучевой артерии
  - в) сонной артерии
  - г) бедренной артерии
- 190 Первичная профилактика наркомании - это:
- а) лечение уже начавшего заболевания
  - б) недопущение развития болезни
  - в) предупреждение осложнений болезни
  - г) лечение последствий заболевания
  - д) этой проблемы не существует
- 191 Аверсионная терапия по В.С.Битенскому при гашишной наркомании включает:
- а) внутривенное введение диазепама.
  - б) внутривенное введение коразола
  - в) внутримышечное введение дисульфирама
  - г) внутримышечное введение налтрексона.
  - Д) внутривенное введение диазепама
- 192 К конечной стадии течения наркомании относится все перечисленное, кроме:
- а) кахексии
  - б) полной деградации личности
  - в) абстиненции
  - г) повышения толерантности

- 193 К основным критериям, определяющих состояние острой алкогольной интоксикации (простое алкогольное опьянение), относят:
- 1.изменения в эмоциональной сфере;
  - 2.функциональные изменения моторики;
  3. изменение ассоциативного процесса и восприятия окружающего;
  - 4.наличие неврологических и вегетативных нарушений или изменений;
  - 5.характерный запах алкоголя изо рта.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 194 Изменение картины опьянения у больных алкоголизмом обусловлено:
- 1.содержанием алкоголя в алкогольных напитках;
  - 2.длительностью (тяжестью) заболевания;
  - 3.технологией приготовления алкогольных напитков;
  - 4.преморбидными характерологическими особенностями;
  - 5.половыми различиями .
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 195 В спектр психотропного действия нейрорептиков входят эффекты:
- 1.седативный;
  - 2.снотворный;
  - 3.подавляющий влечение;
  - 4.противосудорожный;
  - 5.тимонормализующий.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 196 Для второй стадии алкоголизма наиболее характерны следующие признаки:
- а) физическая и психическая зависимость от алкоголя
  - б) алкогольный абстинентный синдром
  - в) высокая толерантность к алкоголю
  - г) алкогольная деградация личности
- 197 К основным клиническим проявлениям алкоголизма относятся:
- 1.патологическое влечение к алкоголю;
  - 2.синдром отмены (ААС);
  - 3.синдром измененной реактивности;
  - 4.аффективный синдром;
  - 5.психоорганический синдром.
- а) верно, 1 2,3  
б) верно 1,3  
в) вер но 2,4  
г) верно 4

- 198 Поражение периферической нервной системы при алкоголизме проявляется:
- а) полинейропатией
  - б) рассеянным склерозом
  - в) параличами
  - г) парезами
- 199 У больных алкоголизмом поведенческая компонента при актуализации патологического влечения к алкоголю проявляется:
- 1.затруднениями в профессиональной деятельности;
  - 2.дисфориями;
  - 3.неуступчивость и потребностью во всем противоречит ь окружающим;
  - 4.размышления ми о неизбежности употребления алкоголя;
  - 5.раздражительностью.
- а)верно 1,2,3
  - б)верно 1,3
  - в)верно 2,4
  - г)верно все перечисленное
- 200 Наименьшим угнетающим действием на дыхательный центр обладает:
- а) морфин
  - б) омнопон
  - в) промедол
  - г) фентанил
- 201 Исходя из сложившихся классификаций, к острым металкогольным психозам относят:
- 1.алкогольный делирий;
  - 2.алкогольный галлюциноз;
  - 3.бредовые психозы;
  - 4.алкогольную эпилепсию;
  - 5.дипсоманию.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно 4
- 202 Максимальная толерантность к алкоголю развивается при алкоголизме:
- а) в первой стадии заболевания
  - б) во второй стадии заболевания
  - в) в третьей стадии заболевания
  - г) в состоянии алкогольной абстиненции
- 203 О психопатоподобных изменениях личности наркомана свидетельствуют:
- а)колебания эмоционального фона и снижение интеллекта;
  - б) раздражительность, возбудимость, неспособность критически оценивать свои действия и сужения круга интересов;
  - в)неспособность критически оценивать свои действия и снижение интеллекта;
  - г)снижение интеллекта, сужение круга интересов;

- 204 Больной М, 1946г. р. поступил в стационар с жалобами на то, что слышит мужские "голоса" на улице под окном. Они говорят о нем, пугают его, угрожая расправой. В анамнезе - почти ежедневное употребление алкоголя в течение 20 лет. При осмотре - больной в сознании, правильно ориентирован. Что с больным?
- а)алкогольный делирий
  - б)алкогольный галлюциноз
  - в)энцефалопатия Гайе-Вернике
  - г)алкогольная паранойя
  - д)алкогольный параноид
- 205 Полинаркомания – это:
- а) одновременное злоупотребление несколькими наркотическими веществами
  - б) повышение дозы наркотического вещества
  - в) алкоголизм в сочетании с наркоманией
  - г) употребление сильнодействующих препаратов
- 206 Для алкоголизма в подростковом возрасте свойственно:
- 1.недостаточна я выраженность и незавершенность специфических симптомов, а иногда и отсутствие некоторых из них;
  - 2.высокая прогрессивность;
  - 3.трудность разграничения стадий алкоголизма и нечеткость стереотипа их развития;
  - 4.формирование алкогольной деградации с эйфорической установкой;
  - 5.высокий риск развития психотических форм алкоголизма.
- а)верно 1,2,3
  - б)верно 1,3
  - в)верно 2,4
  - г)верно все перечисленное
- 207 Для купирования приступа стенокардии на доврачебном этапе нитроглицерин можно применять повторно с интервалом:
- а) 20-30 минут
  - б) 10-15 минут
  - в) 5-10 минут
  - г) 5 минут
- 208 Для клиники алкоголизма у лиц пожилого возраста характерно:
- 1.относительная невысокая интенсивность влечения к алкоголю;
  - 2.непродолжительные запои;
  - 3.преобладание соматических и неврологических расстройств в структуре ААС;
  - 4.усиление в опьянении эмоциональной лабильности;
  - 5.относительно невысокая толерантность.
- а)верно 1,2,3
  - б)верно 1,3
  - в)верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 209 Для первой стадии алкоголизма характерны все перечисленные симптомы, кроме:
- а) утраты количественного
  - б) роста толерантности
  - в) амнезии отдельных периодов опьянения
  - г) абстинентного синдрома

210 Ретроградная амнезия характеризуется:

- 1.фрагментарной утратой памяти;
- 2.выпадением из памяти событий периода, следовавшего непосредственно после выхода из бессознательного состояния;
- 3.отсутствием памяти на текущие события;
- 4.выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию;
- 5.потеря способности запоминать.

а)верно 1,2,3

б)верно 1,3

в)верно 2,4,5

г)верно 4

211 Антероградная амнезия характеризуется:

- 1.утратой воспоминаний на период бессознательного состояния и период предшествовавший ему;
- 2.правильное поведение в запятованном периоде;
- 3.распространение забвения на различные периоды жизни;
- 4.утратой воспоминаний на период, непосредственно следовавший за выходом из бессознательного состояния;

а)верно 1,2,3

б)верно 1,3

в)верно 2,4

г)верно 4

212 Характерными особенностями псевдозапоев у больных алкоголизмом являются;

- 1.видимая связь алкогольного эксцесса с внешними факторами (начало и окончание псевдозапоя)
- 2.длительность периода ежедневного злоупотребления алкоголя от 3-4 дней до двух недель;
- 3.сохранение высокой толерантности в течение всего периода злоупотребления;
- 4.отчетливое изменение у больных как психического, так и физического состояния за несколько дней до начала эксцесса;
- 5.спонтанность начала алкогольного эксцесса.

а)верно 1,2,3

б)верно 1,3

в)верно 2,4

213 Эфедрон чаще всего употребляется:

а) внутривенно

б) внутримышечно

в) путем курения

г) путем ингаляции

- 214 Острая интоксикация амфетаминами проявляется:
- 1.ощущением прилива энергии и усилением активности, переоценкой собственных возможностей;
  - 2.склонностью к стереотипным однообразным действиям и раздражительностью, тревогой;
  - 3.нарушениями сердечного ритма и дыхания, повышением АД;
  - 4.резким снижением аппетита;
  - 5.повышенной потливостью, гиперрефлексией, тремором, расширением зрачков.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 215 К клиническим проявлениям наркомании при употреблении препаратов конопли относят:
- а) ощущение легкости движений
  - б) психомоторное возбуждение
  - в) расстройство сознания, бред, галлюцинации
  - г) благодушие, расслабленность
- 216 Для алкоголизма в подростковом возрасте свойственно:
- 1.недостаточная выраженность и незавершенность специфических симптомов, а иногда и отсутствие некоторых из них;
  - 2.высокая прогрессивность;
  - 3.трудность разграничения стадий алкоголизма и нечеткость стереотипа их развития;
  - 4.формирование алкогольной деградации с эйфорической установкой;
  - 5.высокий риск развития психотических форм алкоголизма.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 217 Летучие органические соединения (средства бытовой и промышленной химии) имеют ряд общ их качеств, к которым относятся:
- 1.хорошая растворимость в жирах;
  - 2.высокая токсичность;
  - 3.быстрая испаряемость;
  - 4.высокая наркогенность;
  - 5.преимущественное поражение ЦНС, сердца, печени и почек при злоупотреблении ими.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное

- 218 Острая интоксикация амфетаминами проявляется:
- 1.ощущением прилива энергии и усилением активности, переоценкой собственных возможностей;
  - 2.склонностью к стереотипным однообразным действиям и раздражительностью, тревогой;
  - 3.нарушениями сердечного ритма и дыхания, повышением АД;
  - 4.резким снижением аппетита;
  5. повышенной потливостью, гиперрефлексией, тремором, расширением зрачков.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 219 К последствиям хронической интоксикации ПАВ при любой форме зависимости относятся:
- 1.прогрессирующее падение активности, энергетического потенциала;
  - 2.угасание влечений, утрата потребностей как в биологическом, так и в социальном смысле;
  - 3.снижение сопротивляемости организма, прогрессирующее истощение;
  - 4.развитие миокардиопатий;
  5. угасание интеллекта.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в)верно 2,4  
г) верно все перечисленное
- 220 Для тяжелой степени алкогольного опьянения характерно все перечисленное, кроме:
- а) нарушения сознания, ориентировки
  - б) нарушения походки
  - в) неточности выполнения точных движений
  - г) дрожания век, языка, пальцев рук
- 221 Число пораженных при территориальных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах):
- а)10-50 пораженных
  - б)50-500 пораженных
  - в)свыше 500 пораженных
  - г)до 10 пораженных
- 222 При обмороке АД у больных:
- а)резко снижается
  - б)снижается постепенно в течении нескольких часов
  - в)не изменяется
  - г)резко повышается на несколько минут

- 223 Объектом профилактики в наркологии являются:
- 1.больные люди, страдающие зависимостью от ПАВ;
  - 2.подростки из неблагополучных семей;
  - 3.подростки, замеченные в употреблении ПАВ;
  - 4.все контингенты населения;
  - 5.школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3,5  
в)верно 2,4  
г)верно 4
- 224 При купировании возбуждения в случаях отравления димедролом назначают:
- а) прозерин и реланиум
  - б) прозерин и дроперидол
  - в) прозерин и аминазин
  - г) тромал
- 225 Для абстиненции при употреблении наркотиков стимулирующего ряда характерно все выше перечисленное, кроме:
- а) ощущения разбитости
  - б) сонливости днем, бессонницы ночью
  - в) психотических эпизодов
  - г) ломящих болей в суставах и мышцах
- 226 Кустарно изготовленный первитин относится к:
- а) опиатам
  - б) психостимуляторам
  - в) галлюциногенам
  - г) транквилизаторам
- 227 Понятие "милосердие" включает в себя все, кроме:
- а) чувства и способности сострадания
  - б) готовность оказать помощь тому, кто в ней нуждается
  - в) снисходительность
  - г) готовность выполнить любую просьбу человека
- 228 Клиническими проявлениями наркомании при употреблении препаратов стимулирующего ряда являются:
- а) приподнятое настроение
  - б) повышение работоспособности
  - в) болтливость
  - г) острые бредовые состояния
- 229 Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующееся:
- а) прогрессивным течением
  - б) отсутствием патологического влечения к алкоголю
  - в) формированием абстинентного синдрома
  - г) развитием стойких соматических, неврологических расстройств и деградацией личности



- 230 Согласно Постановлению Правительства РФ № 950 от 20.09.2012 реанимационные мероприятия прекращаются при признании их абсолютно бесперспективными, в частности, при неэффективности таковых:
- а) в течение 15 минут
  - б) в течение 25 минут
  - в) в течение 30 минут
  - г) в течение 1 часа
- 231 Наркогенность ПАВ определяется:
1. скоростью формирования зависимости;
  2. высотой толерантности;
  3. степенью психической и социальной инвалидизации;
  4. значением субъективного эффекта удовольствия от вещества;
  5. видом вещества.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 232 Для клиники алкоголизма у лиц пожилого возраста характерно:
1. относительная невысокая интенсивность влечения к алкоголю;
  2. непродолжительные запои;
  3. преобладание соматических и неврологических расстройств в структуре ААС;
  4. усиление в опьянении эмоциональной лабильности;
  5. относительно невысокая толерантность.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 233 Расширение зрачков характерно для:
- а) эфедроновой интоксикации
  - б) барбитуровой интоксикации
  - в) опийного абстинентного синдрома
  - г) опийной интоксикации
- 234 Вегетативные проявления при кокаиновой наркомании характеризуется:
- а) сердцебиение, повышение АД
  - б) снижение АД, сужение зрачков
  - в) тремор, повышение АД
  - г) сухость во рту
  - д) расширение зрачков
- 235 Алкогольная деградация включает в себя:
1. аффективные расстройства;
  2. психопатоподобные симптомы;
  3. этическое снижение;
  4. стойкое снижение памяти и интеллекта;
  5. утрату критического отношения к злоупотреблению алкоголем и самому к себе.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное

- 236 Изменение картины опьянения у больных алкоголизмом обусловлено:
1. содержанием алкоголя в алкогольных напитках;
  2. длительностью (тяжестью) заболевания;
  3. технологией приготовления алкогольных напитков;
  4. преморбидными характерологическими особенностями;
  5. половыми различиями.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно все перечисленное
- 237 Для синдрома отмены при амфетаминовой наркомании наиболее характерно:
- а) развитие острой депрессии с суицидальными тенденциями;
  - б) повышенная утомляемость, раздражительность;
  - в) сонливость при отсутствии сна;
  - г) стойкое отсутствие аппетита;
- 238 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
- а) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
  - б) лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей,
  - в) в целях проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях;
  - г) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения
- 239 Следы внутривенных инъекций обнаруживаются при употреблении:
- а) барбитуратов
  - б) галлюциногенов
  - в) стимуляторов
  - г) антипаркинсонических препаратов
- 240 Наркогенность ПАВ определяется:
1. скоростью формирования зависимости;
  2. высотой толерантности;
  3. степенью психической и социальной инвалидизации;
  4. значением субъективного эффекта удовольствия от вещества;
  5. видом вещества.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно все перечисленное
- 241 Кокаин относится к:
- а) седативным средствам
  - б) психостимуляторам
  - в) галлюциногенам
  - г) препаратам конопли

- 242 Больной 43года, злоупотребляет алкоголем 5 лет. Доставлен в стационар с жалобами на бессонницу, страх, тревогу. Уверяет, что его собираются убить, следят за ним на улице. Не выходит из дома, просит спрятать его где-нибудь - "чтобы не убили". Выберите правильный ответ:
- а)алкогольная паранойя
  - б)алкогольный делирий
  - в)опийная наркомания
  - г)гашишная наркомания
  - д)энцефалопатия Гайе-Вернике
- 243 Синдром физической зависимости от наркотика включает:
- 1.компульсивное влечение;
  - 2.состояние отмены;
  - 3.способность достижения физического комфорта в интоксикации;
  - 4.общую депримированность;
  5. несобранность больного.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г)верно все перечисленное
- 244 Соматические изменения в III стадии алкоголизма:
- а) отсутствуют
  - б) носят характер функциональных нарушений
  - в) носят необратимый характер
  - г) носят характер вегетативных расстройств
- 245 Прогрессиентность алкоголизма оценивается по:
- а) скорости нарастания изменений личности
  - б) длительности запоев
  - в) длительности ремиссий
  - г) длительности периода от начала систематического пьянства до формирования алкогольного абстинентного синдрома
- 246 Условно-рефлекторная терапия алкоголизма направлена на:
- а) выработку стойкого рефлекса отвращения к вкусу и запаху алкоголя
  - б) повышение толерантности к алкоголю
  - в) прерывание алкогольного эксцесса
  - г) лечение абстинции
- 247 В отличие от взрослых, для подростков при становлении зависимости от ПАВ, характерно:
- 1.преобладание группового мотива употребления ПАВ;
  - 2.направленность влечения не на определённые ощущения, а на недифференцированное состояние оглушения («балдение»);
  - 3.предпочтение преимущественно веществ с галлюцинаторным эффектом;
  - 4.выбор дешёвых (а отсюда - тяжелодействующих) ПАВ;
  - 5.замедленное формирование влечения вследствие незрелости чувственной сферы.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное

- 248 Клинические проявления алкогольного абстинентного синдрома:
- а) тремор, потливость
  - б) психическая напряжённость
  - в) упорное отсутствие сна
  - г) повышение аппетита
  - д) сухость кожи
  - е) влечение к опохмелению
- 249 Для патологического опьянения характерно:
- 1.внезапность, острота и транзиторность психотического эпизода;
  - 2.импульсивность и целенаправленность характера разрушительных действий;
  - 3.сумеречное расстройство сознания;
  - 4.нетипичность развития повторных аналогичных состояний;
- кризисное разрешение глубоким сном с последующей амнезией и астенией.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 250 Неврологические расстройства у больных алкоголизмом проявляются;
- 1.патологическими рефлексам;
  - 2.полиневропатиями;
  - 3.нарушением вибрационной чувствительности;
  - 4.синдромом рассеянного энцефаломиелита;
  - 5.расширением желудочков мозга.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 251 Первоочередной эвакуации подлежат пораженные сортировочной группы:
- а) первой
  - б) второй
  - в) третьей
  - г) четвертой
- 252 Какой путь введения лекарственных препаратов предпочтителен при оказании помощи больным с анафилактическим шоком:
- а) внутривенный
  - б) внутримышечный
  - в) подкожный
  - г) ингаляционный
- 253 Для купирования состояния отмены (алкогольного абстинентного синдрома) обычно используются:
- 1.витаминные препараты;
  - 2.ноотропы;
  - 3.транквилизаторы;
  - 4.антибиотики;
  - 5.трихопол, фуразолидон.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно 4

- 254 В начале приступа бронхиальной астмы у больных отмечается кашель:
- а) с выделением пенистой розовой мокроты
  - б) с выделением «ржавой» мокроты
  - в) сухой
  - г) с выделением стекловидной мокроты
- 255 В отличие от взрослых, для подростков при становлении зависимости от ПАВ, характерно:
- 1. преобладание группового мотива употребления ПАВ;
  - 2. направленность влечения не на определенные ощущения, а на недифференцированное состояние оглушения («балдение»);
  - 3. предпочтение преимущественно веществ с галлюцинаторным эффектом;
  - 4. выбор дешевых (а отсюда - тяжелодействующих) ПАВ;
  - 5. замедленное формирование влечения вследствие незрелости чувственной сферы.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 256 К основным клиническим проявлениям алкогольного абстинентного синдрома относят:
- 1. влечение к алкоголю с целью опохмеления;
  - 2. расстройства в сфере памяти
  - 3. аффективно-вегетативные проявления;
  - 4. судорожные состояния;
  - 5. психосенсорные расстройства.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно 4
- 257 Больной В., 1946 г., злоупотребляет алкоголем в течение 15 лет. В стационар поступил с жалобами на то, что слышит незнакомые мужские "голоса" с 2-х сторон. Одни "голоса" ругают его, другие защищают. Тревожен, напряжен, что-то шепчет. Выберите правильный ответ:
- а) алкогольный галлюциноз императивного характера
  - б) алкогольный галлюциноз антагонистического характера (+)
  - в) алкогольный параноид
  - г) алкогольный делирий
  - д) атипичная картина опьянения
- 258 Для современной модели профессиональной морали - биоэтики, основным принципом является:
- а) принцип "соблюдения допга"
  - б) принцип "не навреди"
  - в) принцип приоритета науки
  - г) принцип приоритета прав и уважения достоинства пациента
- 259 Показанием к наложению окклюзионной повязки является:
- а) ранение груди
  - б) пневмоторакс
  - в) закрытые переломы ребер
  - г) ушибы грудной клетки

- 260 К основным клиническим проявлениям алкоголизма относятся:
- 1.патологическое влечение к алкоголю;
  - 2.синдром отмены (ААС);
  - 3.синдром изменённой реактивности;
  - 4.аффективный синдром;
  - 5.психоорганический синдром.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно 4
- 261 Состояние глоточного рефлекса при коме 2 степени:
- а) сохранен
  - б) снижен
  - в) отсутствует
  - г) усилен
- 262 Наиболее отличительной особенностью алкоголизма у женщин является:
- а)злокачественность течения;
  - б)раннее появление психотических форм;
  - в)низкая курабельность;
  - г)аффективная окрашенность клинической симптоматики;
- 263 Метадон-это:
- а)синтетический препарат сходный с ЛСД
  - б)синтетический препарат сходный с морфином
  - в)синтетический преапарат сходный с кофеином
  - г)синтетический препарат сходный с кодеином
  - д)галлюциноген
- 264 Социальные последствия наркологических заболеваний проявляются в:
- а) способности выполнять в полном объеме семейные и производственные обязанности
  - б) выраженном профессиональном снижении с утратой прежней квалификации
  - в) иждивенческих тенденциях
  - г) деградации личности
- 265 Для начальных проявлений алкоголизма (1ст. заболевания) характерно;
- 1.2-3 кратный рост толерантности в сравнении с изначальной;
  - 2.нарушение сна;
  - 3.актуализация влечения к алкоголю в основном в «питейных»ситуациях;
  - 4.выраженные изменения состояний опьянения;
  - 5.появление так называемого «симптома критической дозы».
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное

- 266 Состояние отмены при героиновой наркомании характеризуется:
1. лавинообразным нарастанием симптомов;
  2. алгическими и диспептическими расстройствами;
  3. профузным потом, «ледящим ознобом», слезотечением, светобоязнью;
  4. подавленным настроением с тревогой, неусидчивостью, приступами отчаяния;
  5. быстрой, практически, критической редукцией симптомов.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно все перечисленное
- 267 К транквилизаторам относятся:
1. производные бензамида;
  2. производные бензодиазепина;
  3. производные ГАМК;
  4. производные пропандиола;
  5. ингибиторы моноаминоксидазы.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно 4
- 268 Легкая степень острой алкогольной интоксикации характеризуется:
1. ощущением психического и физического комфорта;
  2. повышением речедвигательной активности;
  3. легким нарушением координации движений;
  4. замедлением ассоциативного процесса;
  5. появлением психосенсорных расстройств.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно все перечисленное
- 269 Изъятие органов и тканей от мертвого донора осуществляется в Российской Федерации:
- а) беспрепятственно в интересах науки и общества
  - б) согласно принципу " презумпция несогласия"
  - в) согласно принципу "презумпция согласия"
  - г) в соответствии с морально-религиозными ценностями
- 270 Правильным определением этики как науки является:
- а) этика - наука об отношении, живых существ между собой
  - б) этика - наука о природе и смысле моральных взаимоотношений и нравственных принципов
  - в) этика - наука о минимизировании зла в человеческих отношениях
  - г) этика - наука об умении правильно себя вести в обществе

- 271 В группу риска входят:
1. подростки, замеченные в употреблении алкоголя или других ПАВ;
  2. подростки, ведущие асоциальный образ жизни;
  3. подростки из неблагополучных семей;
  4. подростки и взрослые, страдающие алкоголизмом;
  5. подростки с пограничной умственной отсталостью.
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно все перечисленное
- 272 При терапии алкогольных делириев с особой осторожностью следует назначать:
- а) полиионные растворы;
  - б) крово- и плазмозаменители;
  - в) транквилизаторы;
  - г) нейролептики;
- 273 ЛСД относится к:
- а) психостимуляторам
  - б) производным конопли
  - в) галлюциногенам
  - г) опиатам
- 274 Предрейсовые медицинские осмотры проводятся:
- а) врачами
  - б) фельдшерами
  - в) медицинскими сестрами
  - г) работниками автотранспортных предприятий
- 275 К специфическим наркоманическим синдромам относятся синдромы:
1. изменённой реактивности;
  2. психической зависимости;
  3. физической зависимости;
  4. последствий злоупотребления ПАВ;
  5. неустойчивого равновесия .
- а) верно 1,2,3  
б) верно 1,3  
в) верно 2,4  
г) верно 4
- 276 Токсикомании, формирующиеся вследствие злоупотребления лекарственными препаратами, чаще всего возникают из-за:
- а) нерационального, неправильного лечения;
  - б) частого приёма бензодиазепинов при бессоннице или других расстройствах;
  - в) частого приёма медикаментов при различных неблагоприятных жизненных ситуациях;
  - г) лечения барбитуратами;



277 Больной С., 1963г.р., в течение 15 лет злоупотреблял дешевым вином. В течение 5 лет живет один, разведен. Со дня развода выпивает больше 5 литров водки в день. Последние три дня не пьет. Через 3 дня после воздержания от алкоголя почувствовал сильную дрожь в теле, панику, появилась бессонница. При осмотре возбужден, отмечается тремор всего тела, пытается ловить "клопов", которых видит. дезориентирован во времени, считает, что находится в супермаркете, а не в больнице. Все время к чему-то прислушивается, озирается по сторонам. Что с больным?

- а)алкогольный делирий
- б)отравление опиатами
- в)алкогольный галлюциноз
- г)циклодоловый делирий
- д)патологическое опьянение

278 Изменения личности у больных алкоголизмом проявляются:

- 1.заострением преморбидных характерологических особенностей;
- 2.снижением «энергетического потенциала»;
- 3.нивелировкой преморбидных характерологических особенностей
- 4.грубыми расстройствами памяти;
- 5.патологическим развитием личности.

- а)верно 1,2,3
- б)верно 1,3
- в)верно 2,4
- г) верно все перечисленное

279 Для диагностики состояния острой интоксикации каннабиноидами значимыми являются следующие признаки:

- 1.расширение зрачков и инъекированность сосудов склер;
- 2.хриплый, «лающий» голос,
- 3.выраженная сухость видимых слизистых;
- 4.резкие колебания эмоционального фона;
- 5.готовность к индукции поведения.

- а)верно 1,2,3
- б)верно 1,3
- в)верно 2,4
- г)верно все перечисленное

280 Кардиомиопатия у больных алкоголизмом проявляется:

- 1.нарушением сердечного ритма;
- 2.сниженной сократительной функцией миокарда;
- 3.разнообразными болевыми ощущениями;
- 4.нарушением проводимости;

- а)верно 1,2,3
- б)верно 1,3
- в)верно 2,4
- г)верно все перечисленное

- 281 Изменения личности у больных алкоголизмом проявляются:
- 1.заострением преморбидных характерологических особенностей;
  - 2.снижением «энергетического потенциала»;
  - 3.нивелировкой преморбидных характерологических особенностей
  - 4.грубыми расстройствами памяти;
  - 5.патологическим развитием личности.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 282 49.Реабилитация больных наркологического профиля осуществляется:
- 1.социальными работниками;
  - 2.психотерапевтами;
  - 3.психологами;
  - 4.врачами;
  - 5.специалистами по социальной работе.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 283 Симптомы интоксикации при употреблении препаратов антипаркинсонического действия:
- а) эйфория
  - б) утрата реальности существования
  - в) сценopodobные галлюцинации
  - г) нарушение речи
- 284 Для эксплозивного варианта изменённого простого алкогольного опьянения (острой алкогольной интоксикации) характерно:
- 1.слабо выраженная и кратковременная эйфория;
  - 2.вспышки резкого недовольства, раздражения или злобы, неоднократно повторяющиеся в состоянии опьянения;
  - 3.проявление конфликтности;
  - 4.состояние тревожно-тоскливого аффекта;
  - 5.проявление демонстративности.
- а)верно 1,2,3  
б)верно 1,3  
в)верно 2,4  
г)верно все перечисленное
- 285 Кокаин относится к:
- а) седативным средствам
  - б) психостимуляторам
  - в) галлюциногенам
  - г) препаратам конопли

286 Для первой стадии делирия характерно:

- 1.наплывы ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях;
- 2.развитие псевдогаллюцинаторных расстройств;
- 3.расстройства сна, яркие сновидения;
- 4.помрачение сознания;
- 5.деперсонализация.

а)верно 1,2,3

б)верно 1,3

в)верно 2,4

г)верно 4

287 Для первой стадии делирия характерно:

- 1.наплывы ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях;
- 2.развитие псевдогаллюцинаторных расстройств;
- 3.расстройства сна, яркие сновидения;
- 4.помрачение сознания;
- 5.деперсонализация.

а)верно 1,2,3

б)верно 1,3

в)верно 2,4

г)верно 4

288 Наркоманы, отказывающиеся от лечения:

- а) привлекаются к уголовной ответственности
- б) привлекаются к принудительному лечению
- в) к ответственности не привлекаются
- г) направляются на лечение в психиатрические больницы

289 Соматоневрологическая патология у больных алкоголизмом обусловлена:

- 1.преморбидными морфофункциональными особенностями органов и систем индивидуума;
- 2.токсическим действием этанола;
- 3.токсическим действием ацетальдегида;
- 4.длительностью заболевания;
- 5.злоупотреблением суррогатами алкоголя.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно все перечисленное

290 Для вынесения заключения о факте употребления наркотического вещества обязательным является:

- а) заявление испытуемого об употреблении наркотического вещества
- б) обнаружение наркотического вещества в биологических средах организма
- в) представление врачу сведений об употреблении испытуемым наркотического вещества
- г) выявление клиники опьянения (одурманивания), вызванного употреблением наркотических веществ

- 291 Больной К., 34 г., в течение 7 лет злоупотребляет алкоголем. Алкоголь для него - необходимое средство, чтобы поднять настроение, чувствовать себя уверенно, свободно. Начав пить, уже не может остановиться, не учитывает ситуацию, окружающую обстановку. Периодически из памяти выпадают отдельные периоды опьянения. Выберите правильный ответ:
- а) имеет место 1 стадия алкоголизма
  - б) имеет место 2 стадия алкоголизма
  - в) имеет место алкогольный делирий
  - г) имеет место Корсаковский психоз
  - д) речь идет об энцефалопатии Гайе-Вернике
- 292 Алкоголь в организме в основном всасывается в:
- а) желудке
  - б) двенадцатиперстной кишке
  - в) толстом кишечнике
  - г) тощей кишке
- 293 Карбамазепин в наркологической практике применяют для:
- 1. коррекции аффективных нарушений;
  - 2. снижения интенсивности патологического влечения;
  - 3. лечения судорожных расстройств;
  - 4. профилактики судорожных расстройств;
  - 5. коррекции психопатоподобных нарушений.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 294 При проведении предрейсового медицинского осмотра медицинские работники заполняют:
- а) протокол контроля трезвости
  - б) акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения
  - в) протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения
  - г) справка о состоянии освидетельствования
- 295 К признакам острой интоксикации опиатами относят:
- 1. миоз с отсутствием или крайне вялой реакцией зрачков на свет;
  - 2. брадипное и тахипное;
  - 3. зуд кожи лица;
  - 4. «меловую» бледность и сухость кожи;
  - 5. отсутствие нарушений координации движений и артикуляции.
- а) верно 1,2,3
  - б) верно 1,3
  - в) верно 2,4
  - г) верно все перечисленное
- 296 Начальный этап лечения алкоголизма предусматривает:
- а) выработку условного рефлекса отвращения к алкоголю
  - б) прерывание злоупотребления алкоголем
  - в) устранение абстинентного синдрома
  - г) снижение признаков возбудимости

- 297 К вегетативным признакам опьянения ЛСД относятся все, кроме:
- а)конфабуляции
  - б)повышение АД
  - в)сужение зрачков
  - г)расширение зрачков
  - д)дрожание рук
- 298 Основными клиническими проявлениями алкогольной депрессии являются все перечисленное, кроме:
- а) снижения настроения
  - б) чувства тоски и тревоги
  - в) идей самообвинения и самоуничтожения
  - г) бреда ревности
- 299 Симптомы, характерные для употребления летучих органических соединений (бензин, толуол, бензол, ацетон и т.д.):
- а) сужение зрачков
  - б) тахикардия
  - в) нарушение координации движений
  - г) дезориентировка
- 300 В третьей стадии алкоголизма наиболее часто встречаются следующие формы злоупотребления алкоголем:
- а) постоянное пьянство с высокой толерантностью
  - б) истинные запои
  - в) псевдозапои
  - г) постоянное пьянство с низкой толерантностью