

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ (ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО»**

**(для операционных медицинских сестёр, прошедших обучение
по циклам "Сестринское операционное дело",
профессиональной переподготовки по специальности "Операционное дело")**

- 1 Операция наложения искусственного свища на орган:
 - а) трепанация
 - б) стомия
 - в) резекция
 - г) томия
- 2 К физическому методу окончательной остановки кровотечения относится:
 - а) максимальное сгибание в суставе
 - б) тампонада раны
 - в) диатермокоагуляция
 - г) ушивание сосуда
- 3 Гематурия - это:
 - а) опухоль почки
 - б) наличие крови в моче
 - в) разрыв мочевого пузыря
 - г) внутрибрюшное кровотечение
- 4 Хирургическая обработка рук включает:
 - а)мытье рук с мыло и водой, высушивание стерильным тканевым полотенцем, обработка антисептиком кистей рук, запястий предплечий
 - б)мытье рук с мыло и водой, высушивание стерильным тканевым полотенцем, обработка антисептиком кистей рук, запястий
 - в)мытье рук с мыло и водой, обработка антисептиком кистей рук, запястий предплечий
 - г)мытье рук с мыло и водой, высушивание бумажной салфеткой, обработка антисептиком кистей рук, запястий предплечий
- 5 Смазывание анестетиком поверхности слизистой – это анестезия:
 - а) инфильтрационная
 - б) поверхностная
 - в) проводниковая
 - г) эпидуральная
- 6 При хирургической обработке рук для высушивания на первом этапе применяют:
 - а)стерильные тканевые полотенца
 - б) чистые тканевые полотенца
 - в)одноразовые бумажные салфетки
- 7 Способ остановки паренхиматозного кровотечения:
 - а) давящая повязка
 - б) тампонада
 - в) сосудистый шов
 - г) лигирование кровоточащего сосуда

- 8 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
- а) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий
 - б) лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей
 - в) в целях проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях
 - г) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения
- 9 Положением Тренделенбурга называется положение пациента на операционном столе:
- а) на правом боку
 - б) на левом боку
 - в) на животе
 - г) на спине с опущенным головным концом
- 10 Признаки ожога II степени:
- а) только гиперемия кожи
 - б) мраморного цвета струп
 - в) пузыри с прозрачным содержимым на гиперемированной коже
 - г) пузыри, наполненные кровью
- 11 При подозрении на острое заболевание органов брюшной полости неотложная помощь включает в себя:
- а) применение тепла на область наибольшей болезненности
 - б) применение холода на область наибольшей болезненности
 - в) применение анальгетиков по назначению врача
 - г) применение спазмолитиков по назначению врача
- 12 Перед подготовкой стерильного стола операционная медицинская сестра:
- а) проводит хирургическую обработку рук, надевает стерильный халат
 - б) проводит хирургическую обработку рук, надевает стерильный халат и стерильные перчатки
 - в) надевает стерильный халат и смотровые перчатки
- 13 Наружным искусственным свищом является:
- а)трахеопищеводный
 - б)артериовенозный шунт
 - в)гастростома
 - г)холедоходуденоанастомоз
- 14 Показанием к хирургической обработке рук является:
- а) оперативное вмешательство
 - б) после снятия перчаток
 - в) контакт с инфекционным пациентом
 - г) контакт с биологическими жидкостями
- 15 Сечение иглы выглядит как:
- а) круг
 - б) овал
 - в) треугольник
 - г) все ответы верны

- 16 Биопсийный материал фиксируется в:
- а) физиологическом растворе
 - б) 0,02% растворе анолита
 - в) 10% растворе формалина
 - г) дистиллированной воде
- 17 Операционное поле протирают отдельными стерильными марлевыми салфетками с кожным антисептиком:
- а) последовательно дважды
 - б) однократно
 - в) последовательно трижды
- 18 Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью:
- а) уничтожение всех непатогенных и патогенных микроорганизмов
 - б) уничтожение вегетативных форм наиболее патогенных микроорганизмов
 - в) уничтожение на инструментах следов крови и других биологических жидкостей
 - г) уничтожение споровых микроорганизмов
- 19 Компонент крови, обладающий наиболее выраженным гемостатическим эффектом:
- а) плазма
 - б) лейкоцитарная масса
 - в) альбумин
 - г) протеин
- 20 Предварительную уборку операционной производят с применением:
- а) дез. средства
 - б) воды
 - в) сухим способом
- 21 Применение обезболивающих средств при подозрении на «острый живот» опасно следующим:
- а) стимуляцией активности микрофлоры
 - б) углублением пареза ЖКТ
 - в) развитием привыкания к анальгетикам
 - г)искажением клинической картины и затруднением
- 22 Наибольшую угрозу для жизни представляет гемоторакс:
- а) открытый
 - б) закрытый
 - в) клапанный
- 23 Кожный антисептик при обработке неповрежденной кожи перед операцией следует наносить концентрическими кругами:
- а) от периферии к центру
 - б) не имеет значения
 - в) от центра к периферии
- 24 Условно инфицированными считаются раны:
- а) рубленные
 - б) ушибленные
 - в) укушенные
 - г) операционные

- 25 Флакон с остатками крови после переливания необходимо:
- а) выбросить
 - б) поставить в холодильник
 - в) герметически упаковать
 - г) герметически упаковать и поставить в холодильник
- 26 Пеногасители при отеке легких:
- а) пары амилнитрита
 - б) спиртовый раствор антифомсилена
 - в) фоторотан
 - г) закись азота с кислородом
- 27 Полное удаление органа - это:
- а) резекция
 - б) экстракция
 - в) экстирпация
 - г) эвентрация
- 28 Срок окончания послеоперационного периода:
- а) до первых признаков улучшения
 - б) до снятия швов
 - в) до выписки из стационара
 - г) до восстановления трудоспособности
- 29 Как часто обследуют на HBs-антитела медицинских работников, имеющих контакт с кровью и ее компонентами:
- а) при поступлении на работу
 - б) 1 раз в год
 - в) 1 раз в 2 года
 - г) при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год
- 30 Кожный антисептик при обработке кожи перед операцией при наличии гнойной раны следует наносить концентрическими кругами:
- а) не имеет значения
 - б) от периферии к центру
 - в) от центра к периферии
- 31 К механической антисептике относится:
- а) орошение раны
 - б) дренирование раны
 - в) применение гигроскопических и капиллярных материалов
 - г) первичная хирургическая обработка (ПХО)
- 32 Профилактические мероприятия в оперблоке проводятся исходя из положения, что каждый пациент расценивается как потенциальный источник:
- а) гемоконтактных инфекций (гепатит В, С, ВИЧ)
 - б) кишечных инфекций
 - в) туберкулеза
- 33 К инструментам для разделения тканей относятся все, кроме:
- а) ножниц
 - б) скальпеля
 - в) кусачек Люера
 - г) иглодержателя

- 34 Если необходимо удалять волосы вокруг операционного поля, следует это делать:
- а)за сутки до операции
 - б)после операции
 - в)непосредственно перед операцией
- 35 Рана является проникающей, если:
- а) в ней находится инородное тело
 - б) повреждены только кожа и подкожная клетчатка
 - в) повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка (плевра, брюшина)
 - г) повреждены мышцы и кости
- 36 Возбудитель хирургического сепсиса:
- а) стафилококк
 - б) стрептококк
 - в) пневмококк
 - г) кишечная палочка
- 37 Возможные осложнения в первые сутки после операции:
- а) расхождение швов
 - б) кровотечение
 - в) пролежень
 - г) тромбофлебит
- 38 Вид обработки рук операционной медицинской сестры перед накрытием стерильного стола:
- а) хирургическая обработка рук
 - б) гигиеническая обработка рук мылом и водой
 - в) гигиеническая обработка рук кожным антисептиком
- 39 Какое количество инструментов необходимо взять для проведения контроля качества предстерилизационной очистки:
- а) 1% от всего одновременно обработанного инструментария
 - б) 5% от всей обработанной партии инструментов
 - в) 1% от одновременно обработанных изделий одного наименования, но не менее 3 единиц
 - г) 5% от обработанной партии одного наименования
- 40 Как называется период от момента попадания пациента в операционную до его перевода в палату?
- а) предоперационный
 - б) операционный
 - в) интраоперационный
 - г) послеоперационный
- 41 Метод исследования для диагностики внутрибрюшного кровотечения:
- а) гастроскопия
 - б) лапароскопия
 - в) обзорная рентгеноскопия
 - г) клинический анализ крови
- 42 Ожидаемая частота гнойно-септических инфекций в области хирургического вмешательства при IV классе хирургических операций (гнойные операции):
- а) 1-5
 - б) 10%
 - в) до 20%
 - г) до 29%

43 Целью хирургической обработки рук медицинского персонала является:

- а) обеспечение кратковременной стерильности
- б) создание продолжительной стерильности
- в) профилактики профессионального заражения
- г) удаление бытового загрязнения

44 Операционная сестра может дотрагиваться до стерильных объектов:

- а) руками в стерильных перчатках
- б) руками, обработанными 70% этиловым спиртом
- в) стерильным инструментом
- г) руками, обработанными раствором хлоргексидина

45 Количество классов отходов, образующихся в лечебно-профилактических учреждениях:

- а) 4
- б) 2
- в) 3
- г) 5

46 Выполнить косметический шов удобнее иглой с кривизной:

- а) 1/2
- б) ¼
- в) 3/8

47 При положительной пробе на кровь на инструменте появляется окраска:

- а) зеленая
- б) розовая
- в) сине-фиолетовая
- г) желтая

48 К биологической антисептике относятся:

- а) вакцины
- б) сыворотки
- в) антибиотики
- г) сульфаниламиды

49 По соображениям асептики нельзя стоять и даже проходить в операционном зале во время операции между:

- а) анестезиологом и капельницей
- б) столиком операционной сестры и большим инструментальным столом

50 Выберите повреждение, которое является сочетанным:

- а) двойной перелом бедра;
- б) перелом бедер и переднего полукольца таза;
- в) перелом ребер, разрыв селезенки;
- г) термический ожог грудной клетки и поражение проникающей радиацией в дозе 350 рентген

51 Показание для наложения первично-отсроченного шва на рану:

- а) большая кровопотеря
- б) возможность развития инфекции
- в) невозможность стянуть края раны при первичной хирургической обработке
- г) ранение нерва

- 52 Причины остановки сердца и дыхания при массивных переливаниях крови:
- а) распад эритроцитов
 - б) гемотрансфузионный шок
 - в) избыток лимоннокислого натрия
- 53 Для окончательной остановки кровотечения механическим способом применяется:
- а) наложение жгута
 - б) применение пузыря со льдом
 - в) сосудистый зажим
 - г) легирование сосуда
- 54 К достоверным признакам внезапной остановки сердечной деятельности не относится:
- а) отсутствие пульса на сонных артериях
 - б) внезапная потеря сознания
 - в) отсутствие самостоятельного дыхания
 - г) отсутствие тонов сердца
- 55 Время бритья операционного поля перед плановой операцией:
- а) за сутки до операции;
 - б) утром в день операции;
 - в) накануне вечером
- 56 Биологический препарат общего действия применяемый для остановки кровотечения:
- а) дицинон
 - б) тромбин
 - в) гемостатическая губка
 - г) нативная плазма
- 57 Абсолютный признак перелома:
- а) кровоподтек
 - б) припухлость
 - в) крепитация костных отломков
 - г) нарушение функции конечности
- 58 К задачам послеоперационного периода относятся:
- а) профилактика и лечение послеоперационных осложнений
 - б) ускорение процессов восстановления (регенерации) в органах и тканях
 - в) контроль за сердечно-сосудистой системой, дыханием, диурезом
 - г) все перечисленное
- 59 Какова основная цель при дренировании гнойной раны?
- а) ускорение эпителизации
 - б) остановка кровотечения
 - в) обеспечение оттока отделяемого из раны
 - г) произведение тампонады
- 60 Ожидаемая частота гноино-септических инфекций в области хирургического вмешательства при I классе хирургических операций (чистые операции):
- а) 10%;
 - б) до 20%;
 - в) 1-5%;
 - г) до 29%

- 61 К развитию перитонита могут привести все перечисленные факторы, кроме:
- а) воспалительный процесс в брюшной полости
 - б) травма полых органов
 - в) травма паренхиматозных органов
 - г) кровотечение в ЖКТ
- 62 При подготовке пациента к экстренной операции необходимо:
- а) определить рост пациента
 - б) дать стакан сладкого чая
 - в) подготовить операционное поле
 - г) сделать очистительную клизму
- 63 Назначение окклюзионной повязки при клапанном пневмотораксе:
- а) прекращение доступа воздуха
 - б) прекращение доступа микробов
 - в) иммобилизация
 - г) остановка кровотечения
- 64 В набор инструментов для аппендэктомии входят:
- а) зажимы Пеана, зонд Кохера, крючки Фарабефа
 - б) зажимы Пеана, брюшные зеркала, крючки Лангенбека
 - в) крючки Фарабефа, зажимы Микулича, зажимы Бильрота
 - г) зажимы Микулича, крючки Лангенбека, брюшные зеркала
- 65 Специальный инструмент для тромбэктомии:
- а) катетер Фолея
 - б) зонд Блэкмора
 - в) катетер Фогарти
 - г) зонд Бэбокка
- 66 Операционный зал относится к зоне:
- а) общего режима
 - б) ограниченного режима
 - в) строгого режима
 - г) стерильная
- 67 Дезинфицирующие средства, обладающие моющими свойствами, используются:
- а) для дезинфекции
 - б) для удаления биоматериала
 - в) для дезинфекции и предстерилизационной обработки
- 68 Причина гемотрансфузионного шока:
- а) переливание инфицированной крови
 - б) переливание крови с нарушенным сроком хранения
 - в) быстрая, избыточная трансфузия
 - г) переливание несовместимой крови
- 69 Анестезия должна быть завершена к моменту:
- а) наложения последнего шва
 - б) началу послойного ушивания раны
 - в) выхода хирурга из операционной
 - г) наложения повязки

70 К факторам риска пациента при развитии госпитальных хирургических раневых инфекций относится:

- а) характер основного и сопутствующих заболеваний
- б) длительность операции
- в) продолжительность предоперационного пребывания пациента в стационаре

71 Эндогенный путь проникновения инфекции в рану:

- а) воздушно-капельный
- б) контактный
- в) воздушно-пылевой
- г) лимфогенный

72 К радикальной операции относится:

- а) обходной анастомоз при раке кишки
- б) гастростомия при раке пищевода
- в) холецистэктомия
- г) биопсия

73 Пункция плевральной полости при пневмотораксе проводится в положении больного сидя по среднеключичной линии в межреберьях:

- а) I
- б) II-III
- в) IV-V
- г) VI-VII

74 Длительно заживающие ткани должны быть сшиты:

- а) рассасывающимся материалом натурального происхождения
- б) нерассасывающимся материалом натурального происхождения
- в) рассасывающимся материалом искусственного происхождения
- г) нерассасывающимся материалом искусственного происхождения

75 Возможные причины вторичных артериальных кровотечений:

- а) применение антикоагулянтов
- б) отрыв тромба в результате вторичной травмы
- в) гнойное расплавление стенки сосуда
- г) механическое давление на сосуд дренажа

76 Гематома – это:

- а) скопление крови в брюшной полости;
- б) скопление крови в подкожно-жировой клетчатке;
- в) скопление крови в суставе;
- г) скопление крови в плевральной полости

77 Причина ожогового шока:

- а) спазм периферических сосудов
- б) психогенная травма
- в) кровопотеря
- г) болевой фактор и плазмопотеря

78 Накрытый большой операционный стол считается стерильным в течение (в часах):

- а) 2
- б) 3
- в) 6
- г) 12

- 79 Первично-отсроченный шов накладывается на предварительно обработанную рану:
- а) до появления грануляций
 - б) на гранулирующую рану
 - в) на гранулирующую рану после иссечения ее краев и дна
- 80 Учет травм и чрезвычайных ситуаций (порезы, уколы и т.д.), связанных с профессиональной деятельностью персонала, проводятся:
- а) по показаниям
 - б) по желанию медицинского работника
 - в) обязательно всех
- 81 Воздушная эмболия может возникнуть при ранении:
- а) пищевода
 - б) вен голени
 - в) яремной вены
 - г) плечевой артерии
- 82 Показанием к наложению окклюзионной повязки является
- а) гемоторакс
 - б) ранение груди
 - в) закрытые переломы ребер
 - г) ушибы грудной клетки
- 83 Длительно заживающие ткани должны быть сшиты:
- а) рассасывающимся материалом
 - б) не рассасывающимся материалом
- 84 Способ подачи инструментов в руки хирургу - наиболее:
- а) совершенный
 - б) совершенный и трудный
 - в) простой и распространенный
 - г) распространенный
- 85 Абсолютный признак вывиха:
- а) нарушение функции
 - б) пружинящая фиксация
 - в) боль
 - г) отёк
- 86 Иглы, используемые при операции на кишечнике, желудке:
- а) режущие
 - б) колющие
 - в) комбинированные
 - г) тупоконечные
- 87 Что не характерно для злокачественной опухоли:
- а) атипизм строения
 - б) полиморфизм строения
 - в) метастазирование
 - г) наличие капсулы

- 88 Нарушение асептики может осложниться развитием:
- а) аллергической реакции
 - б) воздушной эмболии
 - в) абсцесса
 - г) жировой эмболии
- 89 Полное уничтожение микроорганизмов и их спор:
- а) дезинсекция
 - б) дезинфекция
 - в) стерилизация
 - г) дератизация
- 90 При запущенных формах злокачественных новообразований показана операция:
- а) радикальная
 - б) паллиативная
 - в) электроокоагуляция
- 91 Что такое петля тока:
- а) вход тока
 - б) выход тока
 - в) вариант распространения тока в теле человека
 - г) обугливание эпидермиса
- 92 Опоясывающая боль наблюдается при:
- а) холецистите
 - б) травме селезенки
 - в) перфоративной язве желудка
 - г) панкреатите
- 93 Предоперационные мероприятия, уменьшающие опасность инфицирования операционной раны:
- а) антибиотикотерапия
 - б) бритье кожных покровов
 - в) гигиенический душ
 - г) все перечисленное
- 94 Профилактика нагноения операционной раны:
- а) частые швы на рану
 - б) рассасывающие швы на рану
 - в) дренирование раны
 - г) герметичная повязка
- 95 После вшивания сосудистого протеза возможны все осложнения, кроме:
- а) раннего тромбоза протеза
 - б) инфицирования экспланта
 - в) аневризмы анастомоза
 - г) атеросклероза экспланта
- 96 Острая кишечная непроходимость характеризуется всем перечисленным, кроме:
- а) повышением температуры тела
 - б) нарушением эвакуации кишечного содержимого
 - в) рвотой
 - г) болями в животе

- 97 Эвентрация это:
- а) наружное кровотечение из операционной раны
 - б) расхождение раны с выпадением органов наружу
 - в) нагноение раны
 - г) образование послеоперационной вентральной грыжи в раннем сроке
- 98 Влажность в операционной должна быть:
- а) 50% - 60%
 - б) 100%
 - в) 20%
- 99 Укажите оптимальный режим стерилизации при паровом методе, рекомендуемый для инструментов из стекла и металла:
- а) 120°C – 30 минут
 - б) 132°C – 20 минут
 - в) 120°C - 45 минут
 - г) 132°C – 45 минут
- 100 Наиболее вероятным источником хирургического сепсиса является:
- а) ожоги II степени
 - б) закрытые переломы
 - в) раны
 - г) карбункулы лица
- 101 Положение пациента на операционном столе на боку с валиком в поясничной области применяется при операциях на:
- а) мочевом пузыре
 - б) органах живота (передний доступ)
 - в) почках
 - г) груди
- 102 Способы подачи инструментов операционной медицинской сестрой хирургу:
- а) непосредственно в руки
 - б) выкладывая их на инструментальный столик
 - в) выкладывая их на операционный стол
- 103 Для местной инфильтрационной анестезии применяется:
- а) дикаин
 - б) новокаин
 - в) тримекаин
 - г) совкаин
- 104 Иглы Дешана относятся к инструментам для:
- а) операции по поводу геморроя
 - б) операции по поводу зоба
 - в) венесекции
 - г) грыжесечения
- 105 Биологическая жидкость, наиболее опасная в эпидемиологическом отношении при вирусном гепатите В:
- а) моча
 - б) слюна
 - в) кровь

- 106 Вести счет инструментов, салфеток и игл необходимо:
- а) 3 раза: до операции, перед ушиванием операционной раны (полости), после операции
 - б) после операции
 - в) до и после операции
- 107 Гемоторакс — это скопление крови в:
- а) капсуле сустава
 - б) плевральной полости
 - в) брюшной полости
 - г) околосердечной сумке
- 108 К экстренным операциям относятся:
- а) лапаротомия при разрыве селезенки
 - б) операция по поводу перитонита
 - в) трахеотомия при отеке гортани
 - г) операция при хронической венозной недостаточности
- 109 К диагностическим операциям относится:
- а) аппендэктомия
 - б) биопсия лимфоузла
- 110 Проникающей резаной раной живота называется рана с повреждением:
- а) внутренних органов
 - б) кожи
 - в) мышц
 - г) париетальной брюшины
- 111 Способ временного гемостаза при ранении сонной артерии:
- а) наложение давящей повязки
 - б) жгут-закрутка
 - в) жгут с противоупором
 - г) асептическая повязка
- 112 Преимуществами плазменной стерилизации являются все указанные, кроме:
- а) короткая экспозиция
 - б) невозможность использования целлюлозной упаковки
 - в) отсутствие необходимости дегазации и охлаждения стерильного материала по окончании цикла стерилизации
 - г) отсутствие повреждающего действия на стерилизуемые инструменты, снижение затрат на ремонт инструментария и оборудования
- 113 Снятие швов с кожной операционной раны после аппендэктомии происходит на (в сутках):
- а) 3 - 4
 - б) 5 - 6
 - в) 7 - 8
 - г) 14
- 114 Если больной принимал пищу за 40 минут перед экстренной операцией, то следует:
- а) отложить операцию на сутки
 - б) удалить содержимое желудка через зонд
 - в) вызвать рвоту
 - г) ничего не предпринимать

115 Диаметр безушковых игл:

- а) больше диаметра нити
- б) меньше диаметра нити
- в) диаметр иглы и нити одинаков

116 Медицинские отходы класса «Б» (опасные отходы) после дезинфекции упаковываются в пакеты:

- а) белого цвета
- б) красного цвета
- в) черного цвета
- г) желтого цвета

117 Дезинфицирующим агентом при воздушном методе стерилизации является:

- а) водяной пар
- б) насыщенный пар под давлением
- в) газ
- г) сухой горячий воздух

118 Температура водяной бани при проведении «тепловой пробы»:

- а) 420С - 450С
- б) 380С - 400С
- в) 460С - 500С
- г) 500С - 550С

119 Правильное положение пациента после наркоза:

- а) лежа на подушке вверх лицом
- б) лежа на подушке, голова повернута на бок
- в) лежа без подушки, голова повернута на бок
- г) лежа на подушке вниз лицом

120 Хирургические иглы изготавливаются по номерам – от № 1 до № 12, чем больше номер, тем игла:

- а) толще
- б) тоньше
- в) длиннее
- г) короче

121 При определении группы крови с применением цоликлонов заключение о групповой принадлежностидается через:

- а) 30 секунд
- б) 1 минуту
- в) 3 минуты
- г) 10 минут

122 Истечение ликвора из уха или носа является характерным признаком

- а) сотрясения головного мозга
- б) сдавления головного мозга
- в) перелома свода черепа
- г) перелома основания черепа

123 Лапчайный пинцет относится к набору:

- а) сосудистому
- б) травматологическому
- в) общехирургическому
- г) нейрохирургическому

124 Показатели гемодинамики у пациентов с травматическим шоком

- а) брадикардия, АД снижено
- б) тахикардия, АД снижено
- в) аритмия, АД снижено
- г) тахикардия, АД повышенено

125 Оптимальная температура воздуха в операционной должна быть:

- а) 18°C
- б) 22°C
- в) 10° – 12°C
- г) 30°C

126 Метод обезболивания при оперативном лечении панариция:

- а) инфильтрационная анестезия
- б) анестезия охлаждением
- в) проводниковая анестезия по Оберсту-Лукашевичу
- г) внутривенный наркоз

127 Для обеззараживания инструментов используют:

- а) проточную воду
- б) моющий раствор
- в) дезинфицирующий раствор
- г) стерилянт

128 Участниками обязательного медицинского страхования являются:

- а) застрахованные лица
- б) страхователи
- в) федеральный фонд
- г) страховые медицинские организации

129 Лучшее запоминание предметов, изображений, звука, цвета и т.п. свидетельствует о преобладании у человека:

- а) словесно-абстрактной памяти
- б) кратковременной памяти
- в) промежуточной памяти
- г) наглядно-образной памяти
- д) долговременной памяти

130 Проба на индивидуальную совместимость крови проводится между:

- а) сывороткой реципиента и кровью донора
- б) сывороткой донора и кровью реципиента
- в) цельной кровью донора и реципиента

131 Осложнения, встречающиеся при переливании крови:

- а) гипертонический криз
- б) острая почечная недостаточность
- в) инфаркт миокарда

- 132 При появлении боли и отека в месте перелома после наложения циркулярной гипсовой повязки необходимо:
- фиксировать конечность в приподнятом положении
 - ввести обезболивающее средство
 - рассечь повязку по всей длине и развести ее края
 - ввести мочегонное средство
- 133 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
- в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий
 - лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей,
 - в целях проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях
 - организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения
- 134 Генеральную уборку в операционной проводят:
- 1 раз в 7 дней
 - 1 раз в 10 дней
 - 1 раз в месяц
- 135 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:
- две
 - три
 - четыре
 - пять
- 136 Вести счет инструментов, салфеток, игл необходимо:
- до операции, перед ушиванием операционной раны (полости), после операции
 - перед ушиванием полости, после операции
 - до и после операции
 - после операции
- 137 Медицинские работники имеют право на:
- оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями
 - совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях
 - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя
 - соблюдение врачебной тайны
- 138 При наличии участка некроза в ране необходимо применить:
- кортикостероиды
 - ферменты
 - сульфаниламиды
 - гипертонический раствор

- 139 Приоритетная психологическая проблема пациента в предоперационном периоде:
- а) беспокойство за оставленную работу
 - б) чувство страха
 - в) дефицит самоухода
 - г) недооценка тяжести своего состояния
- 140 Симптомы инфицирования послеоперационной раны:
- а) кровотечение
 - б) отёк
 - в) местное повышение температуры
 - г) рвота
- 141 Метод обработки рук, при котором можно добиться их полной стерильности:
- а) Альфреда
 - б) Фюрбрингера
 - в) системой С-4
 - г) ни одним из перечисленных
- 142 Инструменты в автоклаве при давлении в 2 атм. стерилизуют в течение (в минутах):
- а) 20
 - б) 30
 - в) 45
 - г) 60
- 143 Горизонтальное расположение пациента на операционном столе с приподнятым ножным концом стола называется:
- а) положение Фовлера
 - б) положение Тренделенбурга
 - в) положение обратного Тренделенбурга
 - г) положение Ллойда Дейвиса
- 144 Одним из опасных для жизни осложнений тромбофлебита является:
- а) тромбоэмболия легочной артерии
 - б) слоновость нижней конечности
 - в) кровотечение из вены
 - г) хроническая венозная недостаточность
- 145 К ятrogenным относятся заболевания:
- а) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
 - б) обусловленные вредными факторами производства
 - в) с неблагоприятным прогнозом
 - г) наследственного генеза
- 146 Первая хирургическая обработка раны является мероприятием:
- а) механической асептики
 - б) механической антисептики
 - в) физической асептики
 - г) биологической антисептики

- 147 Кровь для переливания необходимо достать из холодильника за (в минутах):
а) 15 - 30
б) 30 - 60
в) 60 - 90
г) 90 - 120
- 148 К операционным факторам риска госпитальных хирургических раневых инфекций относится:
а) степень чистоты операционной раны
б) характер основного и сопутствующих заболеваний пациента
в) нарушение правил асептики и антисептики при обработке дренажей
г) организация перевязок в послеоперационном периоде
- 149 Операция при варикозном расширении вен носит название:
а) флебэктомия
б) спленэктомия
в) фундопликация
г) гемиколэктомия
- 150 Предоперационный период считается с:
а) момента поступления больного в стационар
б) момента установления диагноза
в) момента установления показаний к операции
г) начала подготовки больного к операции
- 151 Инкубационный период при ВИЧ инфекции:
а) до 7 дней
б) до 30 дней
в) от 3 недель до 3 месяцев, иногда до года и более
- 152 Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в стерилизационной коробке с фильтром:
а) не более 3-х суток
б) не более 1-х суток
в) не более 6 часов
г) не более 20-ти суток
- 153 К проводниковой анестезии относится метод обезболивания:
а) аппликационный
б) перидуральный
в) внутрикостный
г) инфильтрационный
- 154 К анаэробной хирургической инфекции относится:
а) костный туберкулётз
б) газовая гангрена
в) септикопиемия
г) остеомиелит
- 155 Вид раны, при котором кровотечение выражено слабо:
а) ушибленная
б) рваная
в) укушенная
г) размозженная

- 156 Самое важное для медицинского работника в предупреждении профессионального инфицирования вирусным гепатитом и ВИЧ – инфекцией:
- а) оценить факторы риска в своей работе
 - б) ежегодное обследование
 - в) обследование всех пациентов
- 157 Профилактика анаэробной (газовой) гангрены включает все, кроме:
- а) ранней хирургической обработки раны
 - б) введения больших доз антибиотиков
 - в) введения поливалентной противогангренозной сыворотки
 - г) дезинтоксикационной инфузационной терапии
- 158 Вид санитарной обработки перед плановой операцией:
- а) обтирание кожи и смена белья
 - б) частичная санитарная обработка
 - в) санитарная обработка не производится
 - г) полная санитарная обработка и смена белья
- 159 К инструментам для первичной хирургической обработки раны голени, кроме общего набора, относятся:
- а) кусачки Люэра
 - б) расширитель Трунса
 - в) крючки Фарабефа
 - г) зонд Кохера
- 160 “Грязным” этапом холецистэктомии считается:
- а) удаление пузыря
 - б) перевязка пузырной артерии
 - в) повреждение стенки пузыря при мобилизации
 - г) перитонизация ложа пузыря
- 161 Для медицинских работников наиболее надежным способом профилактики при ВИЧ – инфекции, вирусных гепатитах является:
- а) обследование всех пациентов
 - б) профилактические прививки
 - в) соблюдение стандартных мер защиты
- 162 Ведущий путь заражения вирусным гепатитом «В», «С» и ВИЧ – инфекцией в лечебных учреждениях:
- а) контактно – бытовой
 - б) фекально – оральный
 - в) парентеральный
- 163 Лапаро - и цистоскопы следует стерилизовать:
- а) кипячением
 - б) автоклавированием
 - в) в антисептиках
 - г) газовым методом
- 164 Укажите мероприятие, направленное на профилактику легочных осложнений после операции:
- а) дыхательная гимнастика
 - б) вдыхание закиси азота
 - в) введение пациенту препаратов железа

- 165 Неотложная помощь при почечной колике исключает:
- а) тепло на поясничную область
 - б) холод на живот
 - в) обезболивание
 - г) спазмолитики
- 166 Операционный блок делят на зоны:
- а) стерильная, строгого режима, чистая и общебольничная
 - б) стерильная и чистая
 - в) стерильная, транспортная и вспомогательная
 - г) грязная, чистая, стерильная
- 167 Дезинфекция – это:
- а) комплекс мероприятий по предупреждению попадания микробов в рану при медицинских манипуляциях
 - б) процесс уничтожения патогенных и условно патогенных микроорганизмов
 - в) процесс уничтожения абсолютно всех микроорганизмов, включая споровые формы
 - г) комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения микроорганизмов в ране
- 168 Бесшовное закрытие ран в зависимости от объема раны осуществляется:
- а) кожными скобами
 - б) кожным пластырем
 - в) салфеткой с антисептиком
 - г) раневым kleem
- 169 Жомы Пайра используют для:
- а) аппендицэктомии
 - б) резекции желудка
 - в) холецистэктомии
 - г) экстирпации матки
- 170 В условиях гипотермии при сердечно-лёгочной реанимации выживаемость:
- а) удлиняется
 - б) укорачивается
 - в) не изменяется
- 171 Вынужденное положение конечности и деформация в области плечевого сустава характерны для:
- а) ушиба
 - б) артрита
 - в) опухоли
 - г) вывиха
- 172 Для контроля качества предоперационной обработки рук используют:
- а) термоиндикаторы
 - б) бактериологический контроль
 - в) фенолфталеиновую пробу
 - г) амидопириновую пробу

- 173 К методам временной остановки кровотечения относятся:
- а) перевязка сосуда в ране
 - б) наложение жгута
 - в) наложение зажима в ране
 - г) пальцевое прижатие сосуда
- 174 Для колотой раны характерно:
- а) малая информативность о характере повреждений
 - б) благоприятные условия для развития гнойных осложнений
 - в) частые повреждения артерий
 - г) малое зияние раны
- 175 Основная причина внутрибольничного инфицирования вирусным гепатитом и ВИЧ – инфекцией связана с нарушением:
- а) режима дезинфекции
 - б) режима дезинфекции и стерилизации инструментов
 - в) режима дезинфекции, стерилизации инструментов и правил пользованиями инструментами и одноразовыми изделиями медицинского назначения
- 176 1 фаза раневого процесса – это:
- а) регенерация
 - б) эпителизация
 - в) воспаление
 - г) рубцевание
- 177 Ожоговая болезнь у взрослых возникает при площади поражения поверхностными ожогами более:
- а) 3%
 - б) 7%
 - в) 10%
 - г) 21%
- 178 Наиболее частый путь заражения ВИЧ-инфекцией в мире:
- а) парентеральный
 - б) половой
 - в) вертикальный
 - г) выделить невозможно
- 179 Инструмент, используемый для расширения раны трахеи при трахеостомии:
- а) крючки Фарабефа
 - б) зеркало Куско
 - в) расширитель Труссо
- 180 Стерилизация изделий медицинского назначения проводится с целью:
- а) уничтожение патогенных микроорганизмов
 - б) уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов;
 - в) очистка инструментов от остатков крови и лекарств
 - г) уничтожение всех микроорганизмов как вегетативных, так и в споровых формах
- 181 Для какой из перечисленных травм мозга характерно наличие «светлого промежутка»:
- а) сотрясение головного мозга
 - б) ушиб головного мозга
 - в) сдавление головного мозга

182 Количество инструментов для контроля качества ПСО:

- а) 3% от обработанной партии
- б) 5% от обработанной партии
- в) 1% от обработанной партии, но не менее 3 единиц

183 Термин эвентрация означает:

- а) ущемление содержимого грыжевого мешка
- б) рассечение стенки желудка
- в) выпадение органов брюшной полости в рану
- г) нагноение послеоперационной раны

184 В электрохирургии нейтральный электрод необходимо размещать на теле пациента к месту оперативного вмешательства:

- а) как можно дальше
- б) как можно ближе
- в) в любом месте

185 Количество инструментов, которое берется для проверки качества предстерилизационной очистки (на кровь):

- а) вся партия инструментов
- б) 5% от обработанной партии
- в) 1% от обработанной партии
- г) 3 - 5 изделий каждого наименования

186 Анестезия, при которой используют 0,25% раствор ксикаина, называется:

- а) инфильтрационная
- б) аппликационная (поверхностная)
- в) периуральная
- г) проводниковая

187 Дополнительные инструменты при резекции кишки:

- а) кишечные иглы
- б) жом Пайра
- в) кишечные жомы
- г) толстая трубка

188 Дезинфицирующим агентом при паровом методе стерилизации является:

- а) водяной пар
- б) насыщенный водяной пар
- в) сухой горячий воздух
- г) насыщенный водяной пар под давлением

189 Имеется рваная рана. Края раны гиперемированы с фибринозным налетом. Тактика операционной медицинской сестры:

- а) провести первичную хирургическую обработку
- б) провести вторичную хирургическую обработку
- в) сделать туалет раны и наложить повязку с антисептиком
- г) наложить швы

190 Перед входом в какую зону операционного блока предусматривается санпропускник:

- а) в стерильную;
- б) строгого режима;
- в) ограниченного режима;

- 191 Наиболее слабо выражен компонент действия перекиси водорода:
- а) антимикробный
 - б) дезодорирующий
 - в) механически очищающий раны
 - г) органолептический
- 192 Сроки первичной хирургической обработки от момента ранения:
- а) до 12 часов
 - б) до 48 часов
 - в) до появления признаков развития инфекции
 - г) не имеют значение
- 193 Отсутствие токсического и аллергенного эффектов шовной нити на организм - это:
- а) биосовместимость
 - б) резорбтивность
 - в) атравматичность
 - г) манипуляционные свойства
- 194 Генеральная уборка проводится 1 раз в:
- а) 7 дней
 - б) 10 дней
 - в) месяц
 - г) квартал
- 195 Чем отличается поздняя первичная хирургическая обработка раны от вторичной хирургической обработки:
- а) техникой операции
 - б) наличием воспаления в ране
 - в) сроками операции
 - г) отсутствием первичной хирургической обработки
- 196 Клетки, являющиеся главной мишенью ВИЧ:
- а) лейкоциты
 - б) В-лимфоциты
 - в) Т-лимфоциты
- 197 При прободной язве желудка живот:
- а) мягкий, болезненный
 - б) доскообразный, резко болезненный
 - в) болезненный в правой подвздошной области
 - г) слегка напряжен
- 198 Основным методом лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции в РФ является:
- а) полимеразная цепная реакция (ПЦР)
 - б) иммуноферментный анализ (ИФА)
- 199 Что не является абсолютным показанием для оперативного лечения при доброкачественной опухоли:
- а) ускоренный рост опухоли
 - б) сдавление соседнего органа
 - в) постоянное травмирование опухоли одеждой
 - г) длительное существование опухоли

- 200 Больные с подозрением на перелом позвоночника должны транспортироваться
- а) лежа на специальных щитовых носилках
 - б) лежа на боку
 - в) сидя
 - г) полусидя
- 201 Вовлечение в процесс подкожной клетчатки при рожистом воспалении ведет к развитию:
- а) подкожной эмфиземы
 - б) флегмоны подкожной клетчатки
 - в) подкожной гематомы
- 202 Цель паллиативной операции при опухолях:
- а) уточнение диагноза
 - б) излечение больного
 - в) облегчение состояния больного
 - г) завершение многомоментной операции
- 203 Операционная сестра подает скальпель хирургу за:
- а) лезвие рукояткой к хирургу
 - б) шейку скальпеля, лезвием вверх, рукояткой к хирургу
 - в) шейку скальпеля, лезвием вниз, рукояткой к хирургу
 - г) рукоятку лезвием к хирургу
- 204 Пациента с кровопотерей транспортируют в положении
- а) лежа на спине
 - б) лежа на боку
 - в) лежа с приподнятым головным концом
 - г) лежа с приподнятым ножным концом
- 205 Цель наложения груза на рану в послеоперационном периоде:
- а) для обезболивания
 - б) для предотвращения отека
 - в) для профилактики нагноения
 - г) для профилактики кровотечения
- 206 Вторичное инфицирование раны возникает при:
- а) нарушении асептики при оказании первой помощи
 - б) нарушении асептики при перевязках
 - в) нарушении асептики во время операции
 - г) плохой стерилизации шовного материала
- 207 Сразу же после окончания стерилизации необходимо:
- а) провести контроль стерильности
 - б) бинты маркировать (дата стерилизации)
 - в) закрыть шторки боковых отверстий бинта
 - г) пропарить бинты насухо
- 208 Первичная хирургическая обработка ран – это метод антисептики:
- а) химический
 - б) биологический
 - в) механический
 - г) физический

- 209 Развитие инфекции более вероятно в ране:
- а) резаной
 - б) укушенной
 - в) рубленой
 - г) колотой
- 210 Ретрактор применяется для:
- а) разделения тканей
 - б) удерживания тканей
 - в) оттеснения и выделения тканей
 - г) соединения тканей
- 211 Для подготовки желудочно-кишечного тракта перед экстренной операцией необходимо:
- а) дать слабительное
 - б) с помощью зонда очистить желудок
 - в) поставить очистительную клизму
 - г) поставить сифонную клизму
- 212 Причиной развития терминального состояния при электротравме является:
- а) фибрилляция желудочков
 - б) остановка дыхания
 - в) резкое падение АД
 - г) клонико-тонические судороги
- 213 Аблазтика – это система мероприятий, направленных на:
- а) предотвращение диссеминации раковых клеток во время операции
 - б) уничтожение раковых клеток в ране
 - в) изоляцию больного от окружающих
 - г) профилактику заболеваний среди медперсонала
- 214 При видовой укладке биксов в него закладывают:
- а) только один вид материалов
 - б) все необходимое для определенной операции
 - в) все необходимое для одного рабочего дня
- 215 Вытекание крови непрерывной струей темно-вишневого цвета характеризует кровотечение:
- а) капиллярное
 - б) смешанное
 - в) артериальное
 - г) венозное
- 216 К инструментом с отбой заточкой относят:
- а) зажимы кривоостанавливающие
 - б) корнцанги
 - в) зонды
 - г) троакары
- 217 Определять группу крови и Rh-фактор при повторных гемотрансфузиях:
- а) нужно только перед первой трансфузией
 - б) нужно перед каждой трансфузией
 - в) не нужно; взять из истории болезни
 - г) не нужно; взять из паспорта больного

- 218 Наиболее устойчив к воздействию окружающей среды:
- а) вирус гепатита В
 - б) ВИЧ
 - в) вирус гриппа
 - г) кишечная палочка
- 219 Способность понимания психологических состояний других людей и сопереживание им, умение посмотреть на ситуацию глазами другого - это качество личности:
- а) доброжелательность
 - б) открытость
 - в) конфронтация
 - г) эмпатия
- 220 Уборка операционной подразделяется на следующие виды:
- а) текущая
 - б) внеочередная
 - в) генеральная
 - г) постоянная
- 221 К инструментам разъединяющим ткани относятся:
- а) зажим Кохера
 - б) зажим Бильрота
 - в) скальпель
 - г) иглодержатель
- 222 К психическим процессам относятся:
- а) воля
 - б) характер
 - в) память
 - г) темперамент
 - д) способности
- 223 Основных позиций пациента на операционном столе:
- а) 3
 - б) 4
 - в) 5
 - г) 6
- 224 В целях предупреждения заражения парентеральными вирусными гепатитами от донорства отстраняются лица:
- а) несколько лет назад получившие переливание крови
 - б) переболевшие в прошлом вирусным гепатитом, независимо от давности заболевания
 - в) посещавшие врача - стоматолога за последние 6 месяцев
- 225 Пациент имеет право на:
- а) на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья
 - б) соблюдение режима лечения, в том числе определенного на период временной нетрудоспособности
 - в) выбор врача и выбор медицинской организации
 - г) осуществление рекламы лекарственных препаратов, биологически активных

- 226 Медицинские отходы, соприкасавшиеся с кровью и другими биологическими жидкостями относятся:
- а) к классу «А»
 - б) к классу «Б»
 - в) к классу «В»
 - г) к классу «Г»
- 227 Лимфангиитом называется острое воспаление:
- а) лимфатических сосудов
 - б) потовых желез
 - в) сальных желез
 - г) лимфоузлов
- 228 При подозрении на нагноение послеоперационной раны показано:
- а) иссечение раны
 - б) ревизия раны
 - в) наложение повязок с антибиотиками
 - г) физиотерапия
- 229 Наиболее эффективной пробой на скрытую кровь является:
- а) азопирамовая проба
 - б) амидопириновая проба
 - в) бензидиновая проба
 - г) орто-толуидиновая проба
- 230 Радикальная операция - это:
- а) операция, выполненная одномоментно
 - б) операция, полностью устраняющая патологический очаг
 - в) операция, устраняющая болевой синдром
 - г) технически простая операция
- 231 Оказание помощи при внутреннем кровотечении исключает:
- а) абсолютный покой
 - б) холод на область предполагаемого кровотечения
 - в) грелку на область предполагаемого кровотечения
 - г) экстренную госпитализацию
- 232 Какой антисептик наиболее эффективен против анаэробных микробов:
- а) раствор калия перманганата
 - б) спирт этиловый
 - в) раствор водорода пероксида
 - г) борная кислота
- 233 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие пульса на:
- а) локтевой артерии
 - б) сонной артерии
 - в) лучевой артерии
 - г) бедренной артерии
- 234 Подготовка пациента к плановой операции включает:
- а) клинические, лабораторные исследования
 - б) психологическую подготовку
 - в) профилактику эндогенной инфекции
 - г) все перечисленное

- 235 К биологической антисептике относится:
- а) первичная хирургическая обработка раны
 - б) промывание раны перекисью водорода
 - в) применение антибиотиков
 - г) применение ферментов
- 236 Клинические проявления грыжи:
- а) боль
 - б) высокая температура
 - в) опухолевидное выпячивание, вправляющееся в брюшную полость
- 237 Антитела к ВИЧ у ВИЧ-инфицированных наиболее часто определяются:
- а) через 1 месяц после инфицирования
 - б) в течение 1-2 недели после заражения
 - в) через 6 месяцев после инфицирования
 - г) через 3 месяца после заражения
- 238 Для временной остановки венозного наружного кровотечения применяют
- а) пальцевое прижатие артерии на протяжении
 - б) наложение жгута
 - в) максимальное сгибание конечности
 - г) наложение давящей повязки
- 239 Эвентрация – это:
- а) образование свищев в области раны
 - б) образование спаек в брюшной полости
 - в) выпадение внутренних органов при расхождении краев раны
 - г) вздутие живота
- 240 Операционные должны бы пронумерованы и функционально разделены с учетом:
- а) тяжести состояния пациента
 - б) хирургических бригад
 - в) вида анестезии
 - г) степени чистоты оперативного вмешательства
- 241 Цель паллиативной операции:
- а) облегчение состояния больного
 - б) уточнение диагноза
 - в) излечение больного
 - г) получение материала для исследования
- 242 Коловорот относится к инструментам для:
- а) разделения тканей
 - б) удержания тканей
 - в) соединения тканей
 - г) оттеснения и выделения тканей
- 243 Частота смены маски:
- а) перед каждой операцией
 - б) каждые 4 часа
 - в) каждые 6 часов
 - г) в конце рабочего дня

- 244 Типичное проявление перелома основания черепа:
- а) отек век
 - б) кровотечение и ликворея из носа и ушей
 - в) подкожная эмфизема
 - г) двоение в глазах
- 245 Какая окраска появляется на медицинском инструментарии при азопирамовой пробе, положительной на кровь:
- а) зеленая
 - б) розовая, переходящая в сине-фиолетовую
 - в) розовая
 - г) сине-фиолетовая
- 246 Кратковременная, бурно протекающая, чрезвычайно интенсивная эмоциональная реакция:
- а) фрустрация
 - б) аффект
 - в) настроение
 - г) депрессия
- 247 Экстренная операция показана при:
- а) напряженном пневмотораксе
 - б) внутрибрюшном кровотечении
 - в) перитоните
 - г) злокачественных опухолях
- 248 Пробы на качество предстерилизационной очистки медицинского инструментария:
- а) азопирамовая
 - б) сулемовая
 - в) фенолфталеиновая
 - г) судан - III
- 249 Какую пробу проводят при переливании плазмы:
- а) биологическую
 - б) на резус-совместимость
 - в) на групповую совместимость
- 250 Обязательное медицинское страхование – это:
- а) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи
 - б) страховой риск, связанный с возникновением страхового случая
 - в) обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи
 - г) обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, целевым назначением которых является обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения
- 251 Подготовка пациента вечером накануне плановой операции заключается в:
- а) общей гигиенической обработке
 - б) смене нательного и постельного белья
 - в) бритье кожи
 - г) постановке очистительной клизмы

252 Заключительный этап операции начинается с:

- а) смены перчаток
- б) установки дренажей
- в) смены инструментов
- г) подсчета салфеток и инструментов

253 Маска после операции снимается:

- а) за завязку
- б) за фильтр
- в) в перчатках
- г) без перчаток

254 Ношение белья из синтетической ткани в операционной приводит к:

- а) накоплению статистического электричества
- б) гипертермии
- в) аллергическим реакциям
- г) гипергидрозу

255 Комплекс мероприятий по предупреждению попадания микробов в рану при медицинских манипуляциях это:

- а) асептика
- б) антисептика
- в) заключительная дезинфекция
- г) текущая дезинфекция

256 Развитием воздушной эмболии опасно кровотечение из:

- а) пищевода
- б) вен голени
- в) крупных вен шеи
- г) плечевой артерии

257 Что не является признаком клинической смерти:

- а) отсутствие пульса
- б) остановка сердца
- в) спутанное сознание
- г) остановка дыхания

258 Доврачебная помощь при переломе кости:

- а) транспортная иммобилизация
- б) наложение фиксирующей повязки
- в) наложение гипсовой повязки
- г) согревающий компресс

259 Число пораженных при территориальных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах):

- а) до 10 пораженных
- б) 10-50 пораженных
- в) 50-500 пораженных

260 Способ окончательной остановки кровотечения:

- а) наложение сосудистого зажима
- б) наложение артериального жгута
- в) наложение сосудистого шва
- г) пузырь со льдом

- 261 Влажные кожные покровы характерны для комы:
- а) гипергликемической
 - б) гипогликемической
 - в) уремической
 - г) почечной
- 262 Рассасывающийся шовный материал должен деградировать:
- а) до полного заживления раны
 - б) после полного заживления раны
 - в) на стадии красного рубца
 - г) на стадии серого (позднего) рубца
- 263 Проводить окончательный подсчет тампонов и инструментов до окончания операции:
- а) можно
 - б) нельзя
 - в) категорически запрещено
- 264 Инструменты для эндохирургических операций стерилизуют:
- а) в автоклаве
 - б) в сухожаровом шкафу
 - в) кипячением
 - г) холодным способом
- 265 Дезинфицирующие средства, обладающие моющими свойствами, используются:
- а) для дезинфекции
 - б) для удаления биоматериала
 - в) для дезинфекции и предстерилизационной обработки
- 266 Первичная хирургическая обработка раны относится к антисептике:
- а) механической
 - б) физической
 - в) химической
 - г) биологической
- 267 Инструменты, бывшие в употреблении и предназначенные для повторного применения, размещаются:
- а) отдельно от незадействованных на малом столе
 - б) вместе с незадействованными на малом столе
 - в) на операционном столе
 - г) на пациенте, рядом с операционным полем
- 268 В положении "лягушки" транспортируют пациентов с переломом:
- а) костей таза
 - б) позвоночника
 - в) бедра
 - г) костей стоп
- 269 К группе высокого риска заражения парентеральными вирусными гепатитами относят:
- а) персонал физиотерапевтических кабинетов
 - б) лаборантов клинических и биохимических лабораторий
 - в) персонал центральных стерилизационных отделений

- 270 Свободный газ в брюшной полости определяется при:
- а) холецистите
 - б) перфоративной язве желудка
 - в) аппендицитите
 - г) кишечной непроходимости
- 271 Укажите оптимальный режим стерилизации при паровом методе, рекомендуемый для изделий из резины:
- а) 120°C – 30 минут
 - б) 132°C – 20 минут
 - в) 120°C - 45 минут
 - г) 132°C – 45 минут
- 272 Реальная опасность воздушной эмболии существует при повреждении:
- а) артерии бедра
 - б) лучевой артерии
 - в) сосудов грудной клетки
 - г) вен шеи
- 273 К инструментам для защиты тканей от случайного повреждения относятся:
- а) пинцеты, ранорасширители
 - б) жомы, пластинчатые крючки, зонды
 - в) зонд Кохера, лопаточка Буяльского
- 274 Бритье кожи перед плановой операцией следует проводить:
- а) за сутки перед операцией
 - б) вечером накануне операции
 - в) утром в день операции
 - г) перед началом операции на операционном столе
- 275 Скорость переливания крови во время биологической пробы:
- а) 10 - 20 капель в минуту
 - б) 20 - 30 капель в минуту
 - в) 40 - 60 капель в минуту
 - г) струйно
- 276 Концентрация раствора новокaina, применяющаяся для местной инфильтрационной анестезии:
- а) 0,25%
 - б) 1%
 - в) 2%
 - г) 10%
- 277 Признаками не характерными для «госпитальных штаммов» являются:
- а) высокая вирулентность
 - б) фагочувствительность
 - в) полирезистентность к антибиотикам
 - г) устойчивость к дезинфектантам
- 278 Мелена – это симптом, встречающийся при:
- а) легочном кровотечении
 - б) кровоточащей язве желудка
 - в) геморрое
 - г) разрыве селезенки

279 Пациенту не разрешается принимать пищу перед операцией, так как:

- а) затрудняется управление дыханием
- б) трудно вводить желудочный зонд
- в) прием пищи влияет на проведение наркоза
- г) возможна регургитация

280 Ношение белья из синтетического материала в операционной

приводит к:

- а) аллергическим реакциям
- б) накоплению статистического электричества
- в) гипергидрозу
- г) гипертермии

281 Для сложного волевого действия не характерны:

- а) осознание цели и стремление достичь ее
- б) борьба мотивов и выбор
- в) осознание ряда возможностей достижения цели
- г) проявление мотивов, утверждающих или отрицающих возможности

282 Перчатки, загрязненные кровью больного перед снятием

обрабатываются:

- а) 70% этиловым спиртом
- б) раствором 0,02 % хлоргексидина
- в) 8% раствором аламинола

283 Давящая повязка не применяется для внешней остановки кровотечения в

следующих случаях:

- а) кровотечение из вен предплечья
- б) кровотечение из мягких тканей головы
- в) кровотечение из мягких тканей грудной стенки
- г) поврежление сонной артерии

284 Какие осложнения могут быть после гемотрансфузии в первые сутки:

- а) пирогенные реакции
- б) тромбоэмболия
- в) острое расширение сердца
- г) нарушение кровообращения в конечностях

285 Артериальным является кровотечение:

- а) пульсирующее кровотечение ярко-красного цвета
- б) кровотечение струй тёмно-вишнёвого цвета
- в) истечение крови из мельчайших кровеносных сосудов

286 Опасный этап традиционной холецистэктомии:

- а) выделение шейки пузыря
- б) пункция пузыря
- в) удаление желчного пузыря
- г) ушивание ложа пузыря

287 Первичная хирургическая обработка – это:

- а) иссечение краев и дна раны, наложение швов
- б) рассечение раны
- в) вскрытие карманов и затеков
- г) удаление гнойного отделяемого

288 Под первичной хирургической обработкой раны понимают:

- а) орошение ее антисептиками
- б) иссечение ее краев, стенок и дна
- в) удаление инородных тел и сгустков крови
- г) иссечение некротизированных тканей

289 Эндоскопический метод исследования плевральной полости – это:

- а) эзофагоскопия
- б) гастроскопия
- в) бронхоскопия
- г) торакоскопия

290 В закрытом биксе без фильтра материал считается стерильным в течение (в сутках):

- а) 1
- б) 2
- в) 3
- г) 20

291 Инструменты после вскрытия полых органов сбрасываются:

- а) ассистентом хирурга
- б) операционной сестрой
- в) хирургом
- г) санитаркой

292 К предоперационным факторам риска госпитальных хирургических раневых инфекций НЕ относится:

- а) продолжительность предоперационного пребывания в стационаре
- б) отсутствие или неадекватность предоперационной антибиотикопрофилактики
- в) квалификация хирурга
- г) неадекватное бритье кожи в области хирургического вмешательства

293 Протяженность иммобилизации при переломе бедра:

- а) от кончиков пальцев стопы до подмышки
- б) от лодыжки до середины бедра
- в) от кончиков пальцев стопы до середины бедра
- г) от подмышки до тазобедренного сустава

294 Расположение пациента на операционном столе горизонтальное с приподнятым изголовьем называется положение:

- а) Фовлера
- б) Тренделенбурга
- в) Кларка

295 Первоочередной эвакуации подлежат пораженные сортировочной группы:

- а) первой
- б) второй
- в) третьей
- г) четвертой

296 К удерживающим инструментам относятся:

- а) зажим для прикрепления белья
- б) пинцет анатомический
- в) крючки Фарабефа
- г) кусачки Листона

297 Осложнением гнойно-септического характера после катетеризации сосуда является:

- а) образование гематомы
- б) сепсис
- в) воздушная и тромбоэмболия сосудов головного мозга

298 Профилактику инфекции дыхательных путей не обеспечивает:

- а) санация персонала
- б) дыхание через нос
- в) ношение маски
- г) проветривание

299 Периодичность постановки пробы на качество предстерилизационной очистки:

- а) 1 раз в день
- б) 1 раз в неделю
- в) на каждой обработанной партии
- г) утром и вечером

300 Инструменты после вскрытия полых органов сбрасываются:

- а) хирургом
- б) операционной сестрой
- в) ассистентом хирурга
- г) санитаркой