

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ  
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОБЩАЯ ПРАКТИКА»**

**(для медицинских сестёр общей практики, прошедших обучение по циклам "Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению", профессиональной переподготовки по специальности «Общая практика»)**

1 Электрод, маркованный красным цветом, накладывается на:

- а) левую руку
- б) правую руку
- в) левую ногу
- г) правую ногу

2 Липодистрофия – это:

- а) атрофия мышечной ткани
- б) атрофия подкожно-жировой клетчатки
- в) атрофия кожи
- г) дегенерация хряща

3 Осмотр молочных желез пациентки проводят в положении:

- а) стоя
- б) сидя
- в) лежа
- г) стоя, положив руки пациентки на пояс или за голову

4 Диетотерапия при гломерулонефрите предполагает:

- а) увеличение питьевого режима
- б) ограничение соли и жидкости
- в) дополнительное введение мяса, рыбы
- г) ограничение овощных и фруктовых блюд

5 Колоноскопия - это исследование толстой кишки:

- а) рентгенологическое
- б) ультразвуковое
- в) эндоскопическое
- г) томографическое

6 К какой диспансерной группе относятся пациенты с бронхиальной астмой:

- а) I
- б) II
- в) III
- г) 0

7 При оказании неотложной помощи при переломе голени надо обеспечить иммобилизацию:

- а) только места перелома
- б) коленного сустава
- в) коленного и голеностопного суставов
- г) голеностопного, коленного и тазобедренного суставов

8 Физические нагрузки больному сахарным диабетом рекомендуется выполнять:

- а) до еды
- б) после еды
- в) после инъекции инсулина
- г) не имеет значения

9 Истощение пациента, чувство переполнения в эпигастрии, рвота при язвенной болезни – это симптом:

- а) малигнизации
- б) пенетрации
- в) стеноза привратника
- г) клинического кровотечения

10 Сроки диспансерного наблюдения за онкологическим больным после проведенного лечения:

- а) в течение всей жизни
- б) в течение 5 лет
- в) в течение 10 лет
- г) в течение 15 лет

11 Для специфической профилактики инфекционных заболеваний применяют:

- а) витамины
- б) вакцины
- в) антибиотики
- г) пробиотики

12 Амилоидоз - это:

- а) деформация суставов
- б) ограничение пассивных движений в суставе
- в) неподвижность сустава вследствие сращения суставных поверхностей
- г) заболевание с отложением специфического белка в органах и тканях

13 К оболочкам глаза относится все перечисленное, кроме:

- а) роговица
- б) сосудистая оболочка
- в) сетчатка
- г) хрусталик

14 Первоочередное независимое сестринское вмешательство перед вакцинацией:

- а) измерение температуры тела
- б) проведение психологической подготовки
- в) измерение артериального давления
- г) исследование крови

15 Назовите основной вид расстройства интеллекта:

- а) нарушение сна
- б) снижение памяти
- в) деменция, умственная отсталость
- г) бредовое расстройство, амнезия

16 Врачебную тайну составляет информация:

- а) о факте обращения гражданина за медицинской помощью
- б) о состоянии здоровья гражданина
- в) любая информация о личной жизни гражданина, полученная при обследовании и лечении
- г) о состоянии здоровья родственников

- 17 Клиническими проявлениями гипертиреоза являются:
- а) раздражительность, потливость, повышенная масса тела, снижение температуры тела
  - б) вялость, заторможенность, сонливость
  - в) снижение массы тела, снижение температуры тела, брадикардия
  - г) снижение массы тела, тахикардия, повышение температуры тела, раздражительность, потливость
- 18 Гломерулонефрит-заболевание:
- а) аллергической природы
  - б) инфекционной природы
  - в) инфекционно-аллергической природы
  - г) врожденное с наследственной предрасположенностью
- 19 Риск развития сепсиса у новорождённого ребёнка связан с наличием:
- а) кандидозного стоматита
  - б) резус-конфликта
  - в) омфалита
  - г) физиологической эритемы
- 20 Клинические проявления рака тела матки:
- а) серозные и кровянистые выделения
  - б) зуд наружных половых органов
  - в) учащенное мочеиспускание
  - г) увеличение живота, боли
- 21 Причиной частых срыгиваний у детей является слабое развитие:
- а) кардиального сфинктера желудка
  - б) пилорического отдела желудка
  - в) дна желудка
  - г) секреторных желез
- 22 Признак врожденной глаукомы у новорожденного:
- а) косоглазие
  - б) увеличение размера роговицы
  - в) эндофталм
  - г) нистагм
- 23 При ожирении назначается вариант диеты:
- а) основной стандартной
  - б) с пониженным количеством белка
  - в) с пониженной калорийностью
  - г) с механическим и химическим щажением
- 24 Температура лекарственного раствора при закапывании в ухо (в градусах по Цельсию):
- а) 20–22
  - б) 24–30
  - в) 37–38
  - г) 42–45
- 25 Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию сердца включает:
- а) промывание желудка
  - б) очистительная клизма
  - в) разъяснение сущности исследования
  - г) проведение бронхоскопии

- 26 Срок повторного осмотра пациента после обнаружения педикулеза и обработки волосистой части головы (в днях):  
а) 14  
б) 7-10  
в) 5  
г) 3
- 27 Для холеры характерен стул:  
а) в виде малинового желе  
б) темный дегтеобразный  
в) в виде «рисового отвара»  
г) водянистый, с примесью крови
- 28 Сестринские рекомендации при ветряной оспе включают:  
а) проведение ежедневных гигиенических ванн  
б) ограничение витаминизированного питья  
в) изоляцию ребёнка, стрижку ногтей  
г) измерение диуреза, артериального давления
- 29 Пикфлюметрия - это определение:  
а) дыхательного объема  
б) жизненной емкости легких  
в) остаточного объема  
г) пиковой скорости выдоха
- 30 Острота зрения определяется при помощи:  
а) сетки Горяева  
б) таблицы Сивцева  
в) таблицы Рабкина  
г) таблицы Юстовой
- 31 Формированию нервно-психического здоровья детей способствуют:  
а) стрессовые ситуации, эмоциональные игры  
б) пассивное курение в семье  
в) развивающие игры, словесный контакт с ребёнком  
г) отказ от профилактических прививок
- 32 Нормальное АД находится в интервале (в мм рт. ст.):  
а) 100/60-140/95  
б) 120/80-130/90  
в) 100/60-139/89  
г) 110/70-150/85
- 33 Методы исследования слуха:  
а) вестибулем етрия  
б) отоскопия  
в) аудиометрия  
г) вращательная проба
- 34 Соотношение компрессий на грудину и искусственных вдохов при проведении реанимации  
а) 2:15  
б) 3:6  
в) 30:2  
г) 1:5

- 35 Укажите заболевание, при котором проводится специфическая вакцинопрофилактика:
- а) дизентерия
  - б) сальмонеллез
  - в) вирусный гепатит С
  - г) дифтерия
- 36 Клинический признак посттравматического стрессового расстройства при тяжёлой адаптации ребёнка в детском дошкольном учреждении:
- а) активная игру со сверстниками
  - б) хороший аппетит
  - в) развитие неврозов
  - г) спокойный сон
- 37 В полость матки инфекция чаще всего проникает через цервикальный канал:
- а) с помощью трихомонад
  - б) с помощью сперматозоидов
  - в) в результате отрицательного внутрибрюшного давления, возникающего при движении диафрагмы
  - г) всеми перечисленными способами
- 38 Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются:
- а) генетические
  - б) уровень и образ жизни населения
  - в) уровень, качество и доступность медицинской помощи
  - г) все вышеперечисленное
- 39 Поллиноз – аллергическое заболевание, вызываемое:
- а) шерстью животных
  - б) пыльцой растений
  - в) домашней пылью
  - г) продуктами питания
- 40 Туберкулез - заболевание:
- а) острое инфекционное
  - б) наследственное
  - в) хроническое инфекционное
  - г) неинфекционное
- 41 Диета, рекомендуемая при остром кариесе:
- а) богатая углеводами пища
  - б) однородная мясная пища
  - в) с достаточным содержанием белков, солей, витаминов
  - г) богатая белками пища
- 42 Постельный режим больным с пневмонией назначается:
- а) на первые три дня заболевания
  - б) только при тяжелом течении заболевания
  - в) в течение всего лихорадочного периода
  - г) в течение недели
- 43 Диетотерапия при хроническом гастродуодените включает:
- а) отварное мясо, рыбу
  - б) мясные, рыбные и грибные бульоны
  - в) свежий хлеб и различную выпечку
  - г) апельсины, киви, мандарины

- 44 В зависимости от вида анафилактического шока могут развиться:
- а) ларингоспазм
  - б) бронхоспазм
  - в) снижение АД
  - г) стенокардия
- 45 Первый этап скрининг-программы включает проведение:
- а) флюорографии
  - б) электрокардиографии
  - в) антропометрии
  - г) энцефалографии
- 46 К эндоскопическим методам обследования органов дыхания относится:
- а) рентгенография
  - б) флюорография
  - в) бронхоскопия
  - г) спирография
- 47 Пациенту, помещённому в психиатрический стационар добровольно, при его требовании о выписке:
- а) не может быть отказано
  - б) может быть отказано комиссией врачей-психиатров при наличии оснований для госпитализации в недобровольном порядке
  - в) может быть отказано единоличным решением лечащего врача
  - г) может быть отказано решением главного врача
- 48 Апраксия, нарушение навыков самохода в большей степени характерны для:
- а) шизофрении
  - б) сосудистой деменции
  - в) болезни Альцгеймера
  - г) депрессии
- 49 Афазия - это:
- а) утрата речевых способностей как средства выражения мыслей
  - б) нарушение мыслей, процессов узнавания предметов, вещей, животных, людей
  - в) нарушение понимания устной речи
  - г) нарушение письма
- 50 Для исследования суточной глюкозурии мочу собирают за:
- а) 4 часа
  - б) 9 часов
  - в) 24 часа
  - г) 8 порций, каждая за 3 часа
- 51 Некроз – это:
- а) недостаток питания тканей
  - б) разрастание соединительной ткани
  - в) омертвение тканей
  - г) избыточное питание тканей
- 52 Приоритетные проблемы пациента – это проблемы:
- а) которые нужно решать в первую очередь
  - б) которые можно предвидеть
  - в) которые были в прошлом
  - г) взаимоотношения между пациентом и медицинской сестрой

- 53 Важную роль в регуляции менструального цикла играют:
- а) гипоталамо-гипофизарная система
  - б) поджелудочная железа
  - в) щитовидная железа
  - г) паращитовидные железы
- 54 Источником инфекции при сыпном тифе является:
- а) больной сыпным тифом
  - б) окружающая среда
  - в) вошь
  - г) грызуны
- 55 Истечение ликвора из наружного слухового прохода является симптомом:
- а) перелома свода черепа
  - б) сотрясения головного мозга
  - в) перелома основания черепа
  - г) ушиба головного мозга
- 56 Примесь неизмененной крови в каловых массах характерна для кровотечения:
- а) массивного желудочного
  - б) капиллярного желудочного
  - в) из тонкой кишки
  - г) из толстой кишки
- 57 Развитие туберкулеза зависит от:
- а) степени и длительности контакта с больным туберкулезом, состояния иммунитета
  - б) социальных условий
  - в) наличия сопутствующих заболеваний
  - г) количества МБТ, попавших в организм
- 58 При назначении мочегонных препаратов (салуретиков) отмечается следующий электролитный сдвиг:
- а) гипокальциемия
  - б) гипокалиемия
  - в) гиперкальциемия
  - г) гиперкалиемия
- 59 По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье — это:
- а) отсутствие болезней
  - б) нормальное функционирование систем организма
  - в) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
  - г) состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения
- 60 Верbalные средства передачи информации:
- а) мимика, визуальный контакт
  - б) поза, жесты, интонация
  - в) речь, письмо
  - г) пантомимика, взгляд
- 61 Основная функция трахеи:
- а) защитная
  - б) дренажная
  - в) дыхательная
  - г) резонансная

- 62 Причины, провоцирующие рак языка:  
а) курение и злоупотребление алкогольными напитками  
б) механические травмы, раздражение  
в) вирусные заболевания и дисбактериоз ротовой полости  
г) все выше перечисленное
- 63 Ведущий клинический симптом бешенства:  
а) водобоязнь  
б) головные боли  
в) лихорадка  
г) судороги жевательных мышц
- 64 К проявлениям гипогликемического состояния относится все, кроме:  
а) влажных кожных покровов  
б) резкой слабости, tremора конечностей  
в) сухости кожи  
г) чувства голода
- 65 Страх смерти является проблемой:  
а) психологической  
б) физиологической  
в) социальной  
г) духовной
- 66 Термические ожоги могут быть вызваны:  
а) дождём  
б) льдом, пламенем  
в) ветром  
г) туманом
- 67 Продукты, рекомендуемые при нервно-артритической конституции:  
а) овощи, фрукты, молочные продукты  
б) мясные супы, субпродукты  
в) рыбные консервы  
г) шоколад, какао
- 68 Симптом дыхательной недостаточности при пневмонии у детей:  
а) брадипноэ  
б) кашель  
в) периоральный цианоз  
г) потливость
- 69 Наиболее частая локализация рака слизистой полости рта:  
а) язык  
б) дно полости рта  
в) слизистая щек  
г) слизистая мягкого неба
- 70 Какие повязки называются окклюзионными:  
а) исправляющие неправильное положение тела  
б) создающие неподвижность части тела  
в) повязки, создающие вытяжение части тела  
г) герметические повязки, закрывающие сообщение с окружающей средой
- 71 Для приступа сердечной астмы характерна одышка:  
а) инспираторного типа  
б) экспираторного типа  
в) смешанного типа  
г) дыхание типа Куссмауля

72 По стандарту профилактики пролежней положение тяжелобольного в постели нужно менять:

- а) каждый час
- б) каждые 2 часа
- в) каждые 4 часа
- г) как можно чаще

73 Преимущество женского молока:

- а) оптимальное соотношение кальция и фосфора
- б) большое количество минеральных солей
- в) отсутствие бифидус-фактора
- г) высокое содержание казеина

74 Если анафилактический шок развился при внутривенной инъекции, то в первую очередь необходимо:

- а) введение препарата прекратить, иглу из вены убрать
- б) введение препарата прекратить, из вены не выходить
- в) введение препарата прекратить, иглу из вены убрать, пунктиrovать другую вену
- г) введение препарата прекратить, иглу из вены убрать, холод на место инъекции

75 Сроки наблюдения за очагом педикулеза:

- а) 30 дней
- б) 20 дней
- в) 10 дней
- г) 40 дней

76 Приоритетная проблема пациента с пищевой токсицинфекцией:

- а) метеоризм
- б) отсутствие аппетита
- в) рвота
- г) головная боль

77 К отходам класса В относят:

- а) материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекционными болезнями
- б) пищевые отходы неинфекционных отделений
- в) органические операционные отходы
- г) пищевые отходы инфекционных отделений

78 Кашель с розовой мокротой, склоняющее дыхание развиваются при:

- а) легочном кровотечении
- б) отеке легких
- в) сердечной астме
- г) бронхиальной астме

79 На первом году жизни длина тела ребёнка в среднем увеличивается на:

- а) 10 см
- б) 15 см
- в) 20-25 см
- г) 30 см

80 Задержка мочи называется:

- а) анурией
- б) полиурией
- в) олигурией
- г) ишурией

- 81 Профилактический осмотр мужчин в смотровом кабинете включает в себя мероприятия, за исключением:
- а) осмотра кожных покровов и видимых слизистых
  - б) осмотра и пальпации наружных половых органов
  - в) пальпации периферических лимфоузлов
  - г) пальцевого исследования прямой кишки
- 82 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» «радиоактивными» отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
  - б) класса Б,
  - в) класса В,
  - г) класса Г,
  - д) класса Д
- 83 Грелка необходима после подкожного введения:
- а) водного раствора
  - б) масляного раствора
  - в) вакцины
  - г) триггера
- 84 Неинфекционное заболевание кожи у детей:
- а) пемфигус
  - б) везикулопустулёз
  - в) фурункулёз
  - г) потница
- 85 Реакция Грегорсена основана на определении в кале:
- а) алюминия
  - б) железа
  - в) калия
  - г) магния
- 86 Столбнячный анатоксин вводят в дозе:
- а) 5 мл
  - б) 0,5 мл
  - в) 1, 5 мл
  - г) 0,25 мл
- 87 28. Укажите сроки инкубационного периода при вирусном гепатите А:
- а) 5-7 дней
  - б) до 6 месяцев
  - в) в) 15-45 дней
  - г) 1 год
- 88 Активный искусственный иммунитет формируется после:
- а) введения иммуноглобулинов
  - б) введения вакцин
  - в) рождения
  - г) перенесенного заболевания
- 89 Классификация острых травм зубов:
- а) ушиб зуба
  - б) вывих зуба
  - в) перелом зуба
  - г) все вышеперечисленное

90 Анасарка - это:

- а) общий отёк
- б) накопление отёчной жидкости в брюшной полости
- в) накопление отёчной жидкости в полости плевры
- г) накопление отёчной жидкости в подкожной клетчатке

91 Интервал между постановкой пробы Манту и ревакцинацией БЦЖ должен быть:

- а) не менее 3 дней и не более 1 месяца
- б) не менее 2 дней и не более 2 недель
- в) не менее 3 дней и не более 2 недель
- г) не менее 5 дней и не более 2 недель

92 План реализации сестринского ухода не должен содержать:

- а) строгое обеспечение режима сна
- б) исключение алкоголя
- в) подбор антikonвульсивной терапии
- г) профилактику пролежней

93 Медицинская психология - это:

- а) психопатология
- б) отрасль клинической медицины, изучающая клиническое и душевное состояние пациента
- в) отрасль психологической науки, изучающая психологические аспекты гигиены, профилактики, диагностики, лечения, экспертизы и реабилитации пациентов
- г) отрасль медицины, изучающая душевное состояние пациентов при различных заболеваниях

94 Канцелярские отходы, упаковка, инвентарь, потерявший потребительские свойства, образующиеся в медицинском учреждении, относятся к медицинским отходам:

- а) класса А,
- б) класса Б,
- в) класса В,
- г) класса Г,
- д) класса Д

95 Местное противосвертывающее действие пиявок основано на содержании

в ее слюне:

- а) гепарина
- б) гентомицина
- в) гирудина
- г) гиалуроновой кислоты

96 Дефицит пульса – это термин, обозначающий:

- а) урежение пульса
- б) учащение пульса
- в) учащение пульса на вдохе и урежение его на выдохе
- г) разницу между частотой сердечных сокращений и периферическим пульсом

97 Вираж туберкулезной пробы – это:

- а) общая аллергическая реакция на туберкулин
- б) впервые выявленная положительная реакция Манту
- в) местная аллергическая реакция на туберкулин
- г) папула более 5 мм в диаметре

- 98 С целью профилактики гельминтозов у детей медсестра рекомендует:
- а) лабораторное исследование кала и мочи
  - б) проведение профилактического лечения «Вермоксом»
  - в) соблюдение правил личной гигиены
  - г) проведение обследования у инфекциониста-паразитолога
- 99 Болезни из группы особо опасных инфекций:
- а) корь, дифтерия, парагрипп
  - б) чума, желтая лихорадка, холера
  - в) бешенство, столбняк, рожистое воспаление
  - г) ангинা, дизентерия, сальмонеллез
- 100 Этические нормы медицинского работника определяются:
- а) умениями и навыками
  - б) законами и приказами
  - в) этническими особенностями региона
  - г) моральной ответственностью
- 101 Основным путем распространения туберкулезной инфекции на мочеполовую систему является:
- а) контактный
  - б) гематогенный
  - в) лимфогенный
  - г) лимфогематогенный
- 102 К развитию сенсоневральной тугоухости приводят:
- а) воспалительные заболевания уха
  - б) осложнения отитое
  - в) внутричерепные осложнения
  - г) гипертоническая болезнь
- 103 Согласно СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» эпидемиологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
  - б) класса Б,
  - в) класса В,
  - г) класса Г,
  - д) класса Д
- 104 Нормальное внутриглазное давление колеблется в пределах:
- а) 16-24 мм рт. ст.
  - б) 36-42 мм рт. ст.
  - в) 4-6 мм рт. ст.
  - г) 25-30 мм рт. Ст
- 105 Обычное количество вдохов (доз) сальбутамола (вентолин, беротека) для купирования приступа бронхиальной астмы:
- а) 2–3 дозы
  - б) 3–4 дозы
  - в) 5–10 доз
  - г) нет ограничений
- 106 Высыпания на кожных покровах при инфекционных заболеваниях называются:
- а) энантема
  - б) экзантема
  - в) эритема
  - г) гиперемия

107 Путь передачи малярии:

- а) трансмиссивный
- б) пищевой
- в) воздушно-капельный
- г) контактно-бытовой

108 Диагностика опухолей включает следующие мероприятия:

- а) осмотр, пальпация, рентгеноскопия, наложение свищей, анастомозов, биопсия, клинические исследования
- б) анамнез, осмотр, пальпация, клинические и лабораторные исследования, рентгенодиагностика эндоскопические методы исследования, цитодиагностика, биопсия, радиоизотопная диагностика, сканирование, компьютерная томография
- в) анамнез, осмотр, перкуссия, спирография, зондирование, промывание желудка, биопсия, рентгенодиагностика
- г) анамнез, осмотр, аускультация, рентгенодиагностика, остановка кровотечения, лапаротомия

109 Жалобы при остром начальном кариесе:

- а) жалоб нет или болевая чувствительность от кислого и холодного
- б) кратковременные боли от различных раздражителей
- в) боли от раздражителей не прекращающиеся и после окончания их действий
- г) самопроизвольные боли

110 Потенциальная проблема пациента с бронхэкстазической болезнью:

- а) лихорадка
- б) снижение аппетита
- в) кашель с гнойной мокротой
- г) кровохарканье

111 Амнезия - это:

- а) потеря памяти
- б) нарушение процессов узнавания предметов, вещей, животных, людей
- в) утрата речевых способностей как средства выражения мыслей
- г) нарушение понимания устной речи

112 Основной целью сестринского ухода в острейшем периоде менингита является:

- а) своевременное улавливание симптомов отека мозга (нарушение сознания, судороги, расширение зрачков)
- б) профилактика пролежней
- в) контроль функции ЖКТ
- г) выработка ритуалов сна

113 Полная слепота – это:

- а) отсутствие светоощущения, равное 0 (нуль)
- б) острота зрения ниже 0,03
- в) острота зрения ниже 0,05
- г) снижение поля зрения до 10 градусов

114 Ранним проявлением скрытых отеков является:

- а) гидроторакс
- б) гидроперикард
- в) увеличение живота
- г) увеличение массы тела и уменьшение суточного диуреза

- 115 Основная причина развития диабетической кетоацидотической комы:
- а) недостаток инсулина в организме
  - б) избыток инсулина в организме
  - в) избыток сахароснижающих препаратов
  - г) избыточное потребление жидкости
- 116 Клинически отек Квинке проявляется в виде:
- а) большого, плотного, зудящего инфильтрата
  - б) сливающейся зудящей сыпи
  - в) большого, бледного, плотного, незудящего инфильтрата
  - г) болезненного, плотного, гиперемированного инфильтрата
- 117 Возбудители туберкулеза относятся к классу:
- а) простейших
  - б) бактерий
  - в) вирусов
  - г) грибов
- 118 Медицинский работник к пациенту должен обращаться:
- а) по имени
  - б) по имени и отчеству
  - в) по фамилии
  - г) «больной»
- 119 Выберите признаки отёков при заболеваниях сердца:
- а) более выраженные с утра на лице, бледные, мягкие
  - б) усиливающиеся к вечеру на ногах, сочетающиеся с акроцианозом
  - в) плотные, не оставляющие ямку при надавливании
  - г) мягкие, появляются вечером на лице
- 120 Требования к лабораторной посуде для сбора мокроты на общий анализ:
- а) охлажденная
  - б) стерильная
  - в) продезинфицированная
  - г) механически и химически чистая
- 121 Стресс - это:
- а) нервное напряжение
  - б) вид дистресса
  - в) неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему требование
  - г) состояние организма, возникающее в результате воздействия различных факторов и характеризующееся напряжением неспецифических адаптационных механизмов
- 122 Парентеральное питание – это введение лекарственных препаратов:
- а) минуя желудочно-кишечный тракт
  - б) ингаляционно
  - в) через рот
  - г) ректально
- 123 Профилактика энтеробиоза:
- а) проведение соскоба с перианальных складок
  - б) взятие кала на яйца гельминтов
  - в) соблюдение специфической диеты
  - г) проведение общего анализа мочи

124 Прерывание внематочной беременности чаще происходит на сроке:

- а) 10-12 недель
- б) 2-3 недели
- в) 5-6 недель
- г) 8-9 недель

125 Хорошее зрение вдали и плохое вблизи означает:

- а) миопию
- б) гиперметропию
- в) астигматизм
- г) сходящееся косоглазие

126 К заменимым нутриентам относятся:

- а) пищевые волокна
- б) полиненасыщенные жирные кислоты
- в) углеводы
- г) аминокислоты

127 Паллиативную помощь больному СПИДом начинают в случае:

- а) остановки питания
- б) инсульта, инфаркта миокарда
- в) если жизненно важные органы перестают работать и отказа больного от специфического лечения
- г) диабетической комы

128 Местным лечением блефарита является:

- а) сухое тепло, прижигание 70% спиртом, закапывание 30% раствора сульфацил-натрия, закладывание витаминных мазей
- б) закладывание рассасывающих мазей
- в) прижигание краев век, закладывание рассасывающих мазей, массаж
- г) хирургическое

129 Приоритетная проблема пациента при хроническом энтерите:

- а) боль в околопупочной области
- б) снижение аппетита
- в) похудание
- г) метеоризм

130 К расстройствам памяти относится все перечисленное, кроме:

- а) дисмнезии
- б) амнезии
- в) парамнезии
- г) сделанных воспоминаний

131 Открытый пневмоторакс — это:

- а) скопление воздуха в плевральной полости, попавшего туда при ранении
- б) свободное движение воздуха через рану при вдохе и выдохе
- в) постоянное поступление воздуха в плевральную полость при вдохе
- г) скопление крови в плевральной полости

132 Отоскопия — это осмотр:

- а) глотки
- б) гортани
- в) уха
- г) носа

- 133 Фальсифицированное лекарственное средство - это:
- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства
  - б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе
  - в) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа
  - г) лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства
- 134 Основные симптомы при хроническом гастрите со сниженной секрецией:
- а) изжога, отрыжка кислым, боли в эпигастрии после еды, поносы
  - б) тяжесть в эпигастрии после еды, отрыжка тухлым, метеоризм, поносы
  - в) интенсивные боли в мезогастрии после еды,очные голодные боли, изжога, запоры
  - г) ноющие, жгучие, интенсивные боли в эпигастрии после еды, уменьшающиеся после еды
- 135 «Холодовая цепь» это -:
- а) система хранения вакцин на их производстве
  - б) осложнение вакцинации
  - в) система транспортировки и хранения вакцин
  - г) снижение температуры хранения вакцин до 0°C
- 136 У здорового человека с мочой выделяется потребляемой жидкости в %:
- а) 50
  - б) 50–70
  - в) 70–80
  - г) 100
- 137 Левый желудочек выбрасывает у здорового человека кровь в:
- а) легочную артерию в период систолы
  - б) легочную артерию в период диастолы
  - в) аорту в период систолы
  - г) аорту в период диастолы
- 138 Положение грудного ребенка в кроватке при наличии у него ринита:
- а) на спине
  - б) на животе
  - в) на боку с подушкой под голову
  - г) на боку без подушки
- 139 Особенностью дыхательной системы у здоровых детей раннего возраста является:
- а) хорошее развитие с рождения придаточных пазух носа
  - б) гортань воронкообразная узкая, голосовые связки короткие
  - в) отсутствие сурфактанта в альвеолах
  - г) гортань воронкообразная широкая, голосовые связки короткие
- 140 Инфаркт миокарда - это:
- а) ишемический некроз участка сердечной мышцы
  - б) диффузное воспаление сердечной мышцы
  - в) хроническая ишемия миокарда
  - г) дистрофические изменения части миокарда

- 141 Ревматизм поражает:
- а) суставы
  - б) сердце
  - в) кожу
  - г) все перечисленное
- 142 Разница между частотой сердечных сокращений и частотой периферического пульса называется:
- а) Аритмией
  - б) пульсовым давлением
  - в) дефицитом пульса
  - г) тахиаритмиией
- 143 Какие заболевания из перечисленных не относятся к ИППП:
- а) хламидиоз
  - б) генитальный герпес
  - в) урогенитальный кандидоз
  - г) аногенитальные бородавки
- 144 Показателями оценки уровня сформированности компетенций являются:
- а) знания
  - б) умения
  - в) способы деятельности
  - г) знания, умения, способы деятельности
- 145 Начальными признаками сердечной недостаточности у пожилых являются:
- а) отеки
  - б) пароксизмальное нарушение сердечного ритма
  - в) покашливание при разговоре
  - г) проявления гипоксии мозга
- 146 Пациента с кровопотерей транспортируют в положении:
- а) сидя
  - б) лежа с приподнятым головным концом
  - в) лежа с приподнятым ножным концом
  - г) лежа на боку
- 147 При эпилептическом припадке у пациента медицинской сестре необходимо:
- а) удерживать пациента силой, для профилактики прикуса языка применить языкодержатель
  - б) ввести в/в 2,0 реланиума
  - в) фиксировать пациента
  - г) оберегать голову пациента, подложив мягкую ткань, не применять силу, положить пациента на бок, расстегнуть одежду
- 148 При тяжелом состоянии больной с прервавшейся трубной беременностью показано:
- а) немедленное переливание крови
  - б) безотлагательное удаление источника кровотечения (беременной трубы)
  - в) надежный гемостаз
  - г) все перечисленное
- 149 Рекомендуемое положение больного с геморрагическим инсультом:
- а) опустить голову
  - б) возвышенное положение головы
  - в) приподнять ножной конец
  - г) не менять положение головы

- 150 Психологическая помощь депрессивным пациентам пожилого возраста заключается в:
- а) гиперопеке
  - б) психотерапевтической беседе
  - в) изоляции
  - г) беседе о данном заболевании, его осложнениях
- 151 Антропометрия включает измерение:
- а) роста, остроты зрения, силы, остроты слуха
  - б) роста, веса
  - в) роста, веса, частоты дыхательных движений
  - г) роста, веса, артериального давления
- 152 Специфические методы профилактики инфекционных болезней:
- а) витаминизация
  - б) прием антибиотиков
  - в) иммунизация
  - г) закаливание
- 153 В плановой профилактике столбняка используют:
- а) анатоксин
  - б) противостолбнячную сыворотку
  - в) антибиотики
  - г) гамма-глобулин
- 154 Выделение «ржавой мокроты» отмечается при:
- а) хроническом бронхите
  - б) крупозной пневмонии
  - в) кавернозном туберкулезе легких
  - г) бронхиальной астме
- 155 Основные симптомы менингита:
- а) ригидность мышц затылка, симптом Кернига
  - б) парез конечностей
  - в) везикулезная сыпь
  - г) геморрагическая сыпь
- 156 Основаниями для госпитализации в психиатрический стационар являются:
- а) просьба родственников больного
  - б) решение главного врача психоневрологического диспансера
  - в) наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра о проведении обследования или лечения в стационарных условиях, либо постановление судьи
  - г) наличие у лица тяжелого психического расстройства
- 157 Вирус краснухи опасен беременным женщинам в сроке беременности:
- а) 8-9 месяцев
  - б) 5-6 месяцев
  - в) 2-3 месяца
  - г) 4-6 месяцев
- 158 Ранним симптомом ревматоидного артрита является:
- а) болезненность при пальпации ахиллова сухожилия
  - б) подкожные узелки
  - в) утренняя скованность
  - г) латеральная девиация суставов кистей

159 Для предменструального синдрома характерно:

- а) появление отеков
- б) галакторея
- в) монофазная базальная температура
- г) все перечисленное

160 Наиболее характерные признаки злокачественных опухолей мягких тканей:

- а) прогрессирующий рост, ограничение подвижности
- б) высокая температура
- в) флюктуирующее образование
- г) тошнота

161 Специфическая профилактика рахита включает:

- а) проведение массажа и гимнастики
- б) приём витамина Д
- в) рациональное питание
- г) водные процедуры

162 Больной в стационаре на дому должен наблюдаться:

- а) ежедневно
- б) через день
- в) раз в неделю
- г) 2 раза в день

163 Жалобы при халазионе:

- а) зуд краев век
- б) локальная боль в области ресничного края век
- в) отсутствуют
- г) уплотнение в толще века

164 У пациентов с травматическим шоком показатели гемодинамики будут:

- а) АД повышено, брадикардия
- б) АД понижено, брадикардия
- в) АД понижено, тахикардия
- г) показатели гемодинамики не изменены

165 Отек всего тела называется:

- а) асцит
- б) анурия
- в) анасарка
- г) отек Квинке

166 Основная цель сестринского вмешательства при подготовке больного к УЗИ

брюшной полости:

- а) устранение метеоризма
- б) устранение запоров
- в) освобождение мочевого пузыря
- г) заполнение мочевого пузыря

167 Приоритетом в сохранении здоровья ребёнка в системе первичной медикосанитарной

помощи является:

- а) лекарственное обеспечение
- б) диагностика заболеваний
- в) профилактическая работа
- г) лечение заболеваний

168 Гепатиты с парентеральным путем передачи:

- а) А, В, С
- б) В, С, Д, Е
- в) В, С, Д
- г) А, Е

169 В какие сроки проводится первый дородовой патронаж медицинской сестрой:

- а) в течение 10 дней после поступления данных их женской консультации
- б) в течение 1 месяца после поступления данных их женской консультации
- в) в течение 15 дней после поступления данных их женской консультации
- г) в течение 2 месяцев после поступления данных их женской консультации

170 Какие физиологические функции не выполняет кожа:

- а) защитная
- б) терморегулирующая
- в) рецепторная
- г) опорно-двигательная

171 Фальсифицированное лекарственное средство - это:

- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства
- б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе

172 Все отходы ЛПУ по степени опасности делят на:

- а) 2 класса
- б) 3 класса
- в) 4 класса
- г) 5 классов

173 Медицинская сестра, перепутав внешне похожие флаконы, ввела вместо гепарина большую дозу инсулина, в результате чего наступило резкое ухудшение состояния (гипогликемическая кома). Действия медсестры оцениваются как:

- а) халатность
- б) медицинская ошибка
- в) случайная оплошность
- г) профессиональная некомпетентность

174 Дискинезия желчевыводящих путей – это:

- а) расстройство двигательной функции желчного пузыря
- б) воспаление слизистой оболочки желчного пузыря
- в) скопление лямбlij в желчном пузыре
- г) сужение желчного пузыря

175 Биологический возраст ребёнка оценивается по:

- а) зонам роста костной ткани
- б) массе тела
- в) интеллекту
- г) росту

176 Симптом железодефицитной анемии:

- а) строфулюс
- б) бледность кожи и слизистых оболочек
- в) одышка, цианоз
- г) лихорадка, тошнота

177 Средства для лечения педикулеза:

- а) спрегаль, бензил бензоат, метиловый спирт
- б) ПАРАплюс, ниттифор, медифокс
- в) фторокорт, синафлан, микозолон
- г) лококортен, флюцинар, беласалик

178 В какие сроки проводится первый дородовой патронаж медицинской сестрой:

- а) в течение 10 дней после поступления данных их женской консультации
- б) в течение 1 месяца после поступления данных их женской консультации
- в) в течение 15 дней после поступления данных их женской консультации
- г) в течение 2 месяцев после поступления данных их женской консультации

179 Клинический симптом краснухи:

- а) мелкопятнистая сыпь
- б) везикулёзная сыпь
- в) увеличение слюнных желёз
- г) приступообразный кашель

180 Булимия - это:

- а) повышенное чувство голода при сниженной насыщаемости
- б) повышенная жажда при отсутствии чувства утоления
- в) отказ от еды
- г) поражение нижнеберцового нерва

181 Для анализа мочи на глюкозурию моча собирается:

- а) утром 100— 150 мл
- б) утром 50—100 мл моча из средней порции струи
- в) 24 часа, перемешивается, измеряется, отливается 150 - 200 мл на анализ
- г) за 24 часа, 8 порций

182 Характерным признаком вывиха является:

- а) отсутствие движений в суставе
- б) отек мягких тканей
- в) кровоподтек в области сустава
- г) ограничение движений в суставе из-за боли

183 Анатомо-физиологической особенностью костной системы у детей грудного возраста является:

- а) высокая плотность костной ткани
- б) высокое содержание минеральных солей
- в) обилие хрящевой ткани в скелете
- г) наличие тонкой надкостницы

184 Уменьшение содержания в крови нормальных лейкоцитов - это:

- а) лейкоз
- б) лейкопения
- в) лейкоцитоз
- г) лейкемия

185 Сестринские рекомендации при атопическом дерматите у детей:

- а) сохранение естественного вскармливания
- б) ежедневный контроль массы тела
- в) приём антигистаминных препаратов
- г) ограничение пребывания на свежем воздухе

186 Прием жидкости больным сахарным диабетом:

- а) следует ограничивать
- б) не следует ограничивать
- в) ограничивают прием жидкости два раза в неделю
- г) ограничивают прием жидкости три раза в неделю

187 Подготовка пациента к эзофагогастродуоденоскопии включает в себя:

- а) обильное питье
- б) психоэмоциональную подготовку
- в) очистительную клизму
- г) определение уровня билирубина крови

188 «Онкологическая настороженность» - это:

- а) подозрение на наличие рака, тщательное собирание анамнеза, исполнение стандартов обследования
- б) санитарно-просветительная работа, первичная профилактика рака, формирование групп повышенного риска
- в) тщательный учет онкологических больных, вторичная профилактика рака
- г) психологическая поддержка пациентов и семьи

189 Показанием к наложению окклюзионной повязки является:

- а) ушиб грудной клетки
- б) ранение груди
- в) гемоторакс
- г) закрытый перелом ребер

190 Признаками правильного наложения венозного жгута является:

- а) конечность синеет, отекает, теплая на ощупь
- б) отсутствие каких-либо изменений со стороны конечности
- в) прекращение кровотечения
- г) конечность бледная, холодная, исчезает пульс ниже жгута

191 Положение пациента, которое он не в состоянии самостоятельно поменять называется:

- а) вынужденное
- б) активное
- в) дренажное
- г) пассивное

192 Принцип лечения острых кишечных инфекций:

- а) уменьшение объёма питания, увеличение приема жидкости
- б) уменьшение кратности приема пищи
- в) введение диуретиков
- г) прием пребиотиков вместо приёма антибиотиков

193 Образованию пролежней способствует:

- а) сдавление тканей гипсовой повязкой
- б) сдавление тканей при длительном лежачем положении пациента
- в) активное положение пациента в постели
- г) пассивное положение пациента в постели

194 Анализ мочи по Нечипоренко подсчитывает количество:

- а) эритроцитов
- б) суточной мочи
- в) эритроцитов и лейкоцитов в 1 мл мочи
- г) глюкозы

- 195 Профессиональная компетентность - это:
- а) степень развития личности
  - б) степень обученности
  - в) совокупность профессиональных и личностных качеств
  - г) вид профессиональной деятельности
- 196 При чесотке характерным субъективным симптомом является:
- а) зуд вечером и ночью
  - б) появление уртикарий
  - в) пигментация в очагах
  - г) депигментация в очагах
- 197 Суточные колебания температуры тела в пределах 1 градуса характерны для лихорадки:
- а) постоянной
  - б) послабляющей
  - в) перемежающейся
  - г) гектической
- 198 Ирригоскопия – это:
- а) рентгенологическое исследование толстой кишки
  - б) эндоскопическое исследование толстой кишки
  - в) рентгенологическое исследование тонкой кишки
  - г) УЗИ брюшной полости
- 199 Для исследования мочи на содержание сахара необходимо собрать:
- а) утреннюю мочу
  - б) суточную мочу
  - в) среднюю порцию первого мочеиспускания
  - г) любую порцию мочи в течение суток
- 200 Паллиативная помощь - это:
- а) активная всеобъемлющая забота о пациентах, заболевания которых не поддаются излечению
  - б) психологическая поддержка пациентов и семьи
  - в) правовое консультирование пациентов и обеспечение им правовой защиты
  - г) санитарно-просветительная работа, первичная профилактика рака, формирование групп повышенного риска
- 201 При хроническом гломерулонефрите в стадии стихающего обострения назначается вариант диеты:
- а) с пониженным количеством белка
  - б) с повышенным количеством белка
  - в) с пониженнной калорийностью
  - г) основной стандартной
- 202 При подозрении на острое заболевание органов брюшной полости неотложная помощь включает в себя:
- а) применение холода вместо наибольшей болезненности
  - б) применение анальгетиков по назначению врача
  - в) применение спазмолитиков по назначению врача
- 203 Абстиненция - это:
- а) привыкание к лекарственному средству
  - б) физическая лекарственная зависимость
  - в) кумуляция лекарственного средства
  - г) идиосинкрезия

204 Сестринская рекомендация при рахите:

- а) проведение лечебного массажа и солевых ванн
- б) приём микроэлементов
- в) ежедневные прогулки на свежем воздухе
- г) обеспечение гипоаллергенной диеты

205 Причинами носовых кровотечений являются:

- а) заболевания слизистой носа
- б) анатомические особенности носа
- в) соматические заболевания носа
- г) опухоли носа

206 Для постановки серологической реакции берут:

- а) кал
- б) мочу
- в) кровь
- г) желчь

207 Приоритетные проблемы пациента при остром гломерулонефrite:

- а) слабость, недомогание
- б) повышенная утомляемость, лихорадка
- в) снижение работоспособности и аппетита
- г) головная боль, отеки

208 Заболевание сердечно – сосудистой системы, которое является одной из основных причин смертности среди взрослого населения:

- а) артериальная гипертония
- б) ишемическая болезнь сердца
- в) пороки сердца
- г) ревматизм

209 Основной причиной развития диффузного и узлового зоба является:

- а) недостаточное содержание йода в пищевых продуктах, воде, воздухе
- б) недостаточное употребление углеводов
- в) низкое АД
- г) только недостаточное содержание йода в воде

210 Для диагностики ВИЧ-инфекции используется:

- а) иммуноферментный анализ
- б) гемокультура
- в) анализ кала на бактериологическое исследование
- г) общий анализ крови

211 Материалом для выделения возбудителя при дифтерии служит:

- а) кровь
- б) моча
- в) слизь из ротоглотки и носа
- г) кал

212 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» эпидемиологически безопасными отходами являются медицинские отходы:

- а) класса А,
- б) класса Б,
- в) класса В,
- г) класса Г,
- д) класса Д

213 Марлевые маски рекомендуется менять:

- а) через каждый час
- б) каждые 2-3 часа
- в) каждые 4-5 часов
- г) 2 раза в сутки

214 Тахикардия – это число сердечных сокращений в минуту:

- а) менее 60
- б) 60–70
- в) 70–80
- г) более 90

215 Насадка на дозированные ингаляторы, применяемые для аэрозольтерапии – это:

- а) языкодержатель
- б) роторасширитель
- в) спейсер
- г) воздуховод

216 При желтухе первыми желтеют:

- а) кожные покровы
- б) слизистые оболочки
- в) стопы
- г) ладони

217 Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать:

- а) его сотрудники по работе
- б) участковый врач территориальной поликлиники
- в) судебно-следственные органы
- г) никому не дано такого права

218 Измерение внутриглазного давления при глаукоме проводится:

- а) тонометром Маклакова
- б) сфигмоманометром
- в) аппаратом Боброва
- г) периметром

219 Стресс - это:

- а) нервное напряжение
- б) вид дистресса
- в) неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему требование
- г) состояние организма, возникающее в результате воздействия различных факторов и характеризующееся напряжением неспецифических адаптационных механизмов

220 Диспансерное наблюдение за больными острой пневмонией осуществляется в течение (месяцев):

- а) 2
- б) 3
- в) 6
- г) 12

221 Пути распространения туберкулеза все, кроме:

- а) аэрогенный
- б) алиментарный
- в) контактный
- г) парентеральный

- 222 Потенциальная проблема пациента при циррозе печени:
- а) желтуха
  - б) снижение аппетита
  - в) кожный зуд
  - г) кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода
- 223 Приоритетная проблема пациента при хроническом гастрите с сохраненной секреторной функцией:
- а) изжога
  - б) плохой сон
  - в) запор
  - г) боль в эпигастральной области
- 224 Для определения соотношения между дневным и ночным диурезом назначают анализ мочи по:
- а) Нечипоренко
  - б) Зимницкому
  - в) Ребергу
  - г) Аддис-Каковскому
- 225 Появление на ЭКГ широкого и глубокого зубца Q характерно для:
- а) стенокардии
  - б) тромбоэмболии легочной артерии
  - в) инфаркта миокарда
  - г) мерцательной аритмии
- 226 Кровь на биохимический анализ берется:
- а) в любое время суток
  - б) утром натощак
  - в) утром после завтрака
  - г) перед обедом
- 227 Патогномоничные признаки желудочного кровотечения:
- а) бледность, слабость
  - б) головная боль, головокружение
  - в) рвота «кофейной гущей», дегтеобразный стул
  - г) тахикардия, снижение АД
- 228 Кризис – это:
- а) резкий подъем температуры
  - б) длительная высокая лихорадка
  - в) постепенное снижение температуры
  - г) резкое снижение температуры
- 229 Изменения в общем анализе мочи у пациента с острым гломерулонефритом:
- а) гематурия, протеинурия, цилиндртурия
  - б) гематурия, глюкозурия, цилиндртурия
  - в) лейкоцитурия, протеинурия, цилиндртурия
  - г) лейкоцитурия, протеинурия, бактериурия
- 230 При отсром среднем отите больного беспокоят:
- а) заложенность уха, выделение из слухового прохода
  - б) сильные стреляющие боли
  - в) шум в голове, звон
  - г) тупые ноющие боли в ухе

- 231 Семейный анамнез представляет интерес с точки зрения:
- а) наличия или отсутствия контакта с родственниками, больными заразной формой туберкулеза
  - б) семейной предрасположенностью к данному инфекционному заболеванию
  - в) как контакта с родственником, больным туберкулезом, так и семейной предрасположенностью к бронхо-легочным заболеваниям
  - г) значения не имеет
- 232 Основным морфологическим проявлением изменений в органах при старении считается:
- а) атрофия
  - б) гиперпластические процессы
  - в) остеопороз
  - г) астения
- 233 Жалобы больного туберкулезом:
- а) строго специфичны для этого заболевания и позволяют с уверенностью судить о природе заболевания
  - б) имеют достаточно специфичности, что позволяет по ним провести дифференциальную диагностику с другой легочной патологией
  - в) имеют некоторые черты специфичности и позволяют заподозрить туберкулез органов дыхания
  - г) неспецифичны и не позволяют судить о природе заболевания
- 234 Для определения соотношения между дневным и ночным диурезом назначают анализ мочи по:
- а) Нечипоренко
  - б) Зимницкому
  - в) Ребергу
  - г) Аддис-Каковскому
- 235 Локализация ячменя:
- а) сальная железа у корня ресницы
  - б) мейбомиева железа в толще хряща
  - в) слёзная железа
  - г) слёзный мешок
- 236 В какие сроки проводится первый дородовой патронаж медицинской сестрой:
- а) в течение 10 дней после поступления данных из женской консультации
  - б) в течение 1 месяца после поступления данных из женской консультации
  - в) в течение 15 дней после поступления данных из женской консультации
  - г) в течение 2 месяцев после поступления данных из женской консультации
- 237 При одновременном приеме 2-х и более пероральных лекарств пациент должен принять их:
- а) сразу все вместе
  - б) с интервалом в 1 минуту
  - в) с интервалом в 5 минут
  - г) с интервалом в 10- 15 минут
- 238 Обильный, жидкий, пенистый зловонный кал с непереваренными кусочками пищи характерен для:
- а) острого колита
  - б) острого энтерита
  - в) язвенной болезни 12-ти перстной кишки
  - г) язвенной болезни желудка

239 Оптимальной лактации способствует:

- а) кормление строго по часам
- б) «свободное» вскармливание
- в) исключение ночного кормления
- г) ограничение питьевого режима кормящей матери

240 При первом обследовании пульс надо считать в течение (время в секундах):

- а) 10
- б) 15
- в) 30
- г) 60

241 Для ранней диагностики рака молочной железы применяется:

- а) маммография
- б) флюорография
- в) пункционная биопсия молочной железы
- г) пальпация молочной железы

242 Осложнения острых отитов:

- а) сенсоневральная тугоухость
- б) тубарная дисфункция
- в) мастоидит
- г) диффузный наружный отит

243 Медицинская сестра смотрового кабинета проводит:

- а) бимануальное влагалищное исследование
- б) осмотр шейки матки в зеркалах
- в) пальпацию молочных желез
- г) все перечисленное

244 При оказании неотложной помощи при обширных термических ожогах накладывается повязка:

- а) с мазью на жировой основе
- б) с водорастворимой мазью
- в) влажно-высыхающая повязка
- г) сухая стерильная

245 При недостаточном содержании йода в пище развивается:

- а) диффузный токсический зоб
- б) ожирение
- в) сахарный диабет
- г) эндемический зоб

246 Больного для постановки очистительной клизмы нужно уложить на:

- а) левый бок
- б) правый бок
- в) живот
- г) спину

247 Возбудитель краснухи особенно опасен для:

- а) детей раннего возраста
- б) подростков
- в) пожилых детей
- г) беременных женщин

248 При регистрации ЭКГ на конечности накладываются электроды со следующими маркировками:

- а) на правую руку - черный
- б) на правую ногу - красный
- в) на левую руку - желтый
- г) на левую руку - зеленый

249 Больной гриппом наиболее заразен:

- а) весь период болезни
- б) первые 2-3 дня от начала болезни
- в) с последних дней инкубационного периода
- г) в стадии выздоровления

250 Моча цвета «мясных помоев» - это:

- а) протеинурия
- б) лейкоцитурия
- в) микрогематурия
- г) макрогематурия

251 После обработки антисептиком полости рта тяжелобольным губы и язык необходимо смазывать:

- а) масляным раствором
- б) физиологическим раствором
- в) раствором бриллиантовой зелени

252 Причины возникновения опухолей яичников:

- а) хронический воспалительный процесс в придатках матки
- б) раннее начало половой жизни
- в) гормональная контрацепции
- г) беременность

253 Преимущественным способом введения лекарственных препаратов при оказании неотложной помощи пациенту является:

- а) внутривенный
- б) сублингвальный
- в) внутримышечный
- г) ингаляционный

254 Карантин при чуме составляет (количество дней):

- а) 5
- б) 6
- в) 7
- г) 10

255 Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью, относятся к классу:

- а) А
- б) Б
- в) В
- г) Г

- 256 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» чрезвычайно эпидемиологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
  - б) класса Б,
  - в) класса В,
  - г) класса Г,
  - д) класса Д
- 257 Мазок из зева на ВЛ берут, чтобы исключить:
- а) дифтерию
  - б) сифилис
  - в) туберкулез
  - г) сальмонеллез
- 258 Медицинская психология - это:
- а) психопатология
  - б) отрасль клинической медицины, изучающая клиническое и душевное состояние пациента
  - в) отрасль психологической науки, изучающая психологические аспекты гигиены, профилактики, диагностики, лечения, экспертизы и реабилитации пациентов
  - г) отрасль медицины, изучающая душевное состояние пациентов при различных заболеваниях
- 259 Доля дозы лекарственного средства взрослого, которая требуется на каждый год жизни ребенка:
- а) 1/2
  - б) 1/10
  - в) 1/20
  - г) 1/50
- 260 Соотношение количества выпитой и выделенной жидкости называется:
- а) суточным диурезом
  - б) водным балансом
  - в) анурезом
  - г) дневным диурезом
- 261 Какова характеристика зуда при чесотке:
- а) усиливающийся вечером
  - б) не зависящий от времени суток
  - в) усиливающийся днем
  - г) усиливающийся после физической нагрузки
- 262 У пациента после перенесенной ангины появились отеки на лице, повысилось артериальное давление – это признаки:
- а) острого пиелонефрита
  - б) острого гломерулонефрита
  - в) ревматизма
  - г) гипертонической болезни
- 263 На процесс установления и развития контактов между людьми влияют:
- а) восприятие и понимание людьми друг друга
  - б) социальные условия
  - в) самочувствие человека, состояние его здоровья
  - г) материальная заинтересованность

264 Типичная форма инфаркта миокарда:

- а) ангинозная
- б) церебральная
- в) периферическая
- г) абдоминальная

265 Воспалительное заболевание слизистой оболочки глаза:

- а) блефарит
- б) конъюнктивит
- в) миопия
- г) пресбиопия

266 При подозрении на опухоль желудка проводится:

- а) цистоскопия
- б) эзофагоскопия
- в) бронхоскопия
- г) фиброгастроскопия

267 Активный естественный иммунитет формируется после:

- а) вакцинации
- б) приёма препаратов интерферона
- в) перенесенного инфекционного заболевания
- г) введения иммуноглобулина

268 Предраковые состояния желудка:

- а) каллезная язва желудка
- б) хронический аناцидный гастрит
- в) полипоз желудка
- г) стеноз привратника желудка

269 Боли при глубоком кариесе возникают:

- а) от горячего
- б) от холодного
- в) самопризвольно
- г) в ночное время

270 К физиологическому состоянию новорождённого относится:

- а) синдром дыхательных расстройств
- б) мастопатия
- в) пемфигус
- г) кефалогематома

271 Наиболее частые заболевания конъюнктивы:

- а) дистрофические поражения
- б) опухоли
- в) воспаления
- г) врожденные аномалии

272 Некроз развивается при попадании под кожу или в мышцу:

- а) глюконата кальция
- б) хлорида калия
- в) глюкозы
- г) хлорида кальция

273 Антигипертензивное средство, которое дает побочное действие в виде сухого

кашля, - это:

- а) атеналол
- б) верапамил
- в) эналаприл

- 274 Максимально допустимы сроки начала постконтактной профилактики антиретровирусными препаратами при риске инициирования ВИЧ:
- а) не позднее 24 часов
  - б) не позднее 36 часов
  - в) не позднее 72 часов
  - г) не позднее 12 часов
- 275 Медицинский работник к пациенту должен обращаться:
- а) по имени
  - б) по имени и отчеству
  - в) по фамилии
  - г) «больной»
- 276 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» токсикологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
  - б) класса Б,
  - в) класса В,
  - г) класса Г,
  - д) класса Д
- 277 Осложнением туберкулезного процесса является:
- а) ателектаз
  - б) пневмосклероз
  - в) кальцинаты
  - г) фиброзно-очаговые изменения
- 278 По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье — это:
- а) отсутствие болезней
  - б) нормальное функционирование систем организма
  - в) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
  - г) состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения
- 279 Сестринская рекомендация при лактостазе:
- а) исключить сцеживание молока
  - б) отказаться от грудного вскармливания
  - в) чаще прикладывать ребенка к груди, сцеживать молоко
  - г) назначить фитотерапию
- 280 Прерывание внематочной беременности чаще происходит на сроке:
- а) 10-12 недель
  - б) 2-3 недели
  - в) 5-6 недель
  - г) 8-9 недель
- 281 Экстренное извещение подается после выявления больного с инфекцией в течение (в часах):
- а) 1
  - б) 2
  - в) 12
  - г) 24

- 282 Аграфия - это:
- а) потеря способности письма
  - б) потеря двигательной функции руки
  - в) утрата речевых способностей как средство выражения мыслей
  - г) утрата силы конечностей
- 283 Доза лекарственного вещества, вызывающая отравление без смертельного исхода это:
- а) высшая разовая доза
  - б) высшая суточная доза
  - в) токсическая доза
  - г) летальная доза
- 284 Для галлюцинаций характерно:
- а) восприятие несуществующего
  - б) возникновение образа без реального объекта
  - в) видимый образ, неотличимый от реальных объектов
  - г) все перечисленное
- 285 Осложнения внутримышечных инъекций:
- а) флегмона, воздушная эмболия
  - б) абсцесс, паралич седалищного нерва, поломка иглы
  - в) флебит, тромбофлебит, пирогенная реакция
  - г) некроз, гематома, липодистрофия
- 286 Пальцевое исследование прямой кишки должно проводиться всем пациентам, начиная с:
- а) 30 лет
  - б) 40 лет
  - в) 50 лет
  - г) 60 лет
- 287 Приоритетная проблема пациента при почечной колике:
- а) тошнота
  - б) субфебрильная температура
  - в) боль в пояснице
  - г) одышка
- 288 У пациентов с травматическим шоком (торpidная фаза) показатели гемодинамики будут:
- а) АД понижено, брадикардия
  - б) показатели гемодинамики не изменены
  - в) АД повышено, брадикардия
  - г) АД понижено, тахикардия
- 289 Суицидальное поведение у больных выражается:
- а) в мыслях о бесцельности существования
  - б) в высказываниях о безвыходности ситуации, отсутствии надежд на излечение
  - в) суицидальных мыслях
  - г) во всем перечисленном
- 290 Основными клиническими симптомами пищевых токсикоинфекций являются:
- а) тошнота, многократная рвота, обильный водянистый стул
  - б) длительная лихорадка
  - в) жидкий стул, тенезмы
  - г) слабость, недомогание

- 291 Психиатрическая помощь считается добровольной, если она оказывается:
- а) по просьбе или с согласия самого пациента или его законного представителя
  - б) по просьбе близких родственников пациента
  - в) только при самостоятельном (активном) обращении пациента в психиатрическое учреждение
  - г) по направлению участкового врача территориальной поликлиники
- 292 Основной признак коматозного состояния:
- а) угнетение гемодинамики
  - б) угнетение дыхания
  - в) угнетение центральной нервной системы
  - г) угнетение периферической нервной системы
- 293 Подготовка пациента к эзофагогастродуоденоскопии включает:
- а) голод в течение суток перед обследованием, накануне прием слабительных
  - б) строго натощак, накануне вечером – очистительная клизма
  - в) строго натощак, вечером накануне легкий ужин (до 20 часов), не курить
  - г) строго натощак, накануне прием слабительных, не курить
- 294 Дренажное положение придается пациенту для:
- а) снижения лихорадки
  - б) уменьшения одышки
  - в) расширения бронхов
  - г) облегчения оттока мокроты
- 295 Вирусное заболевание, проявляющееся на кайме губ:
- а) лишай
  - б) простой герпес
  - в) грипп
  - г) глоссит
- 296 Отеки сердечного происхождения появляются:
- а) утром на лице
  - б) утром на ногах
  - в) вечером на лице
  - г) вечером на ногах
- 297 При лучевых ожогах чаще поражается:
- а) хрусталик
  - б) сетчатки
  - в) роговица
  - г) конъюнктива
- 298 К предраковым заболеваниям относятся:
- а) хронический гиперацидный гастрит, холецистит, дискинезия желчных путей
  - б) полипоз толстого кишечника, мастопатия, хронический , анацидный гастрит, лейко- и эритроплакии
  - в) язвенная болезнь желудка, 12-ти перстной кишки, хронический панкреатит
  - г) липома, абсцесс ягодицы, рожистое воспаление
- 299 Для диагностики заболеваний опорно – двигательного аппарата максимально информативны методы:
- а) радиоизотопные
  - б) рентгенологические
  - в) лабораторные
  - г) ультразвуковые

- 300 При оказании неотложной помощи пациентам с химическими ожогами первоочередным мероприятием является:
- а) наложение стерильной повязки
  - б) проведение нейтрализации
  - в) обезболивание
  - г) промывание ожоговой раны под проточной водой в течение 20-30 минут