

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ  
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ»**

**(для гигиенистов стоматологических, прошедших обучение по циклу "Современные аспекты профилактической стоматологии")**

- 1 Порядок прорезывания временных зубов:
  - а) первый, второй резец, клык, первый моляр, второй моляр
  - б) первый моляр, первый, второй резец, второй моляр, клык
  - в) первый, второй резец, первый моляр, клык, второй моляр
  - г) первый, второй резец, первый моляр, второй моляр, клык
- 2 Какие полисахариды фиксируют зубную бляшку к поверхности зуба?
  - а) гликоген
  - б) декстран
  - в) инулин
  - г) леван
- 3 Для дифференциальной диагностики кариеса в стадии пятна и не кариозных поражений твердых тканей зубов проводят:
  - а) определение гигиенических индексов
  - б) витальное окрашивание эмали раствором метиленового синего
  - в) электроодонтодиагностику
  - г) рентгенологическое исследование
- 4 Причины возникновения кариеса:
  - а) кариесогенная флора, углеводы, низкая резистентность эмали
  - б) кислотоустойчивость эмали, белки, низкая резистентность эмали
  - в) легкоусвояемые углеводы, высокая резистентность эмали, жиры
  - г) высокая резистентность эмали, углеводы, кариесогенная флора
  - д) углеводы, органические кислоты, высокая резистентность эмали
- 5 Понятие «здоровья»:
  - а) состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов
  - б) состояние полного физического, психического и социального благополучия
  - в) состояние, сопровождающееся получением удовольствия от жизни.
- 6 Инструменты в одноразовой индивидуальной упаковке должны вскрываться:
  - а) во время приема, на глазах у пациента
  - б) до начала приема, в стерилизационной
  - в) до начала приема, на глазах у пациента
  - г) накануне приема
- 7 По «правилу циферблата» зона передачи инструментов располагается между:
  - а) 12.00 и 5.00
  - б) 2.00 и 5.00
  - в) 5.00 и 8.00
  - г) 8.00 и 12.00

- 8 Пациент имеет право на:
- а) на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья;
  - б) соблюдение режима лечения, в том числе определенного на период временной нетрудоспособности;
  - в) выбор врача и выбор медицинской организации;
  - г) осуществление рекламы лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания
- 9 Время замачивания инструментов в растворе аламинола составляет (минут):
- а) 15
  - б) 30
  - в) 60
  - г) 120
- 10 Эндодонтические инструменты для прохождения корневого канала:
- а) ример и К - файл
  - б) Н - файл (бурав Хедстрема)
  - в) каналонаполнитель
  - г) спредер
  - д) пульпэкстрактор
- 11 Первичная профилактика стоматологических заболеваний – это комплекс мер, направленных на:
- а) восстановление утраченных в результате стоматологических заболеваний функций
  - б) предупреждение возникновения осложнений имеющихся заболеваний
  - в) предупреждение возникновения стоматологических заболеваний
  - г) определение стоматологической заболеваемости населения
- 12 Интенсивность кариеса зубов оценивается индексом:
- а) РНР
  - б) КПУ и/или кп
  - в) СР1ТН
  - г) РМА
- 13 Бактерицидные свойства слюны обусловлены содержанием:
- а) стрептококков, стафилококков
  - б) органических кислот
  - в) лейкина, лизоцима, бактериолизина
  - г) эпителиальных клеток, пищевых остатков
- 14 Индекс СР1ТН определяется с помощью зонда:
- а) стоматологического
  - б) серповидного
  - в) штыковидного
  - г) пуговчатого
  - д) не требует применения инструмента
- 15 Концентрация фтора в питьевой воде, при которой выявляются легкие формы флюороза (мг/л):
- а) 0,5
  - б) 1,0
  - в) 1,5
  - г) 2,0
  - д) 2,5

- 16 При катаральном гингивите количество десневой жидкости:
- а) увеличивается
  - б) уменьшается в 2 раза
  - в) уменьшается в 4 раза
  - г) не изменяется
- 17 Для замачивания инструментов после терапевтического стоматологического приема используется раствор аламинола в концентрации (%):
- а) 3
  - б) 5
  - в) 15
  - г) 20
- 18 Первичная профилактика стоматологических заболеваний - комплекс мер, направленных на:
- а) предупреждение возникновения стоматологических заболеваний
  - б) предупреждение возникновения осложнений имеющихся заболеваний
  - в) восстановление утраченных в результате стоматологических заболеваний функций
  - г) определение стоматологической заболеваемости населения
- 19 Стерилизация стоматологических зеркал осуществляется преимущественно методом:
- а) паровым
  - б) воздушным
  - в) химическим
  - г) газовым
- 20 Возбудитель хронического рецидивирующего герпетического стоматита:
- а) актиномицеты
  - б) палочка Леффлера
  - в) дрожжеподобные грибы
  - г) вирус простого герпеса
  - д) фузоспирохета Венсана
- 21 Анкетирование дает возможность оценить:
- а) уровень знаний населения о профилактике стоматологических заболеваний
  - б) гигиеническое состояние полости рта пациентов
  - в) качество оказания стоматологической помощи населению
  - г) уровень стоматологического здоровья населения
- 22 Интенсивность кариеса зубов пациента выражается:
- а) суммой кариозных, пломбированных и удаленных по поводу осложнений кариеса зубов у индивидуума
  - б) отношением суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу осложнений кариеса зубов к возрасту пациента
  - в) отношением суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу осложнений кариеса зубов к количеству зубов пациента
  - г) средним показателем суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу осложнений кариеса зубов в группе индивидуумов
- 23 Лучшее запоминание предметов, изображений, звука, цвета и т.п. свидетельствует о преобладании у человека:
- а) наглядно-образной памяти
  - б) словесно-абстрактной памяти
  - в) кратковременной памяти
  - г) промежуточной памяти
  - д) долговременной памяти

- 24 К коммунальным методам профилактики относятся фторирование:
- а) воды
  - б) молока
  - в) муки
  - г) соли
- 25 Вмешательство в геном человека может быть осуществлено во всех перечисленных целях, кроме:
- а) изменения генома половых клеток
  - б) профилактических целей
  - в) диагностических целей
  - г) терапевтических целей
- 26 Средство для реминерализации эмали – это:
- а) спирт этиловый
  - б) 6 % раствор  $H_2O_2$
  - в) 2 % раствор фтористого натрия
  - г) 3 % раствор хлорамина
- 27 Значение pH зубного налета, оцениваемое как критическое, составляет:
- а) 3,5-4,0
  - б) 5,5-5,7
  - в) 6,5-7,0
  - г) 7,0-7,5
- 28 При длительном течении язвенно-некротических процессов в полости рта:
- а) необходимо назначение антибиотиков
  - б) необходимо назначение гормональных препаратов
  - в) необходимо консультация гематолога и других специалистов
  - г) необходимо противовирусное лечение
- 29 Дополнительные методы обследования стоматологического больного на терапевтическом приеме:
- а) расспрос
  - б) зондирование
  - в) рентгенография
  - г) пальпация
  - д) перкуссия
- 30 Волокна периодонта, идущие под углом к оси зуба:
- а) свободные волокна десны
  - б) циркулярные волокна
  - в) альвеолярные гребешковые волокна
  - г) косые волокна
  - д) транссептальные волокна
- 31 Для эффективной профилактики стоматологических заболеваний у детей необходимо проводить, первый профилактический осмотр в возрасте:
- а) 2 месяцев
  - б) 6 месяцев
  - в) 1 года
  - г) 3 лет
- 32 Обмороку может предшествовать:
- а) период дурноты
  - б) потемнение в глазах или мелькание «мушек»
  - в) онемение конечностей
  - г) потеря сознания

- 33 Функция пародонта, которая проявляется в сохранении целостности его структурных компонентов при внешних воздействиях:
- а) барьерная
  - б) трофическая
  - в) пластическая
  - г) регулирующая, нейросенсорная
  - д) амортизирующая, опорно-удерживающая
- 34 К зубным отложениям относятся:
- а) мягкий зубной налет, зубная бляшка, пищевые остатки, зубной камень
  - б) мягкий зубной налет, зубная бляшка, пищевые остатки
  - в) мягкий зубной налет
  - г) мягкий зубной налет, зубная бляшка
- 35 Необоснованность эвтаназии с медицинской точки зрения определяется:
- а) шансом на выздоровление и возможностью изменения решения пациента
  - б) нарушением предназначения спасать и сохранять человеческую жизнь
  - в) нарушением моральной заповеди “неубий”
  - г) всеми перечисленными факторами
- 36 Мякотканное анатомическое образование в полости рта, состоящее из многослойного плоского ороговевающего эпителия, собственной пластинки с поверхностным сосочковым и более глубоким сетчатым слоем:
- а) десна
  - б) твердое небо
  - в) переходная складка
  - г) слизистая оболочка альвеолярного отростка
  - д) слизистая оболочка дорзальной поверхности языка
- 37 Классификация кариозных полостей по Блэку включает:
- а) 3 класса
  - б) 4 класса
  - в) 5 классов
  - г) 6 классов
  - д) 7 классов
- 38 Ульттраин D-S содержит в адреналин в разведении:
- а) 1:50000
  - б) 1:100000
  - в) 1:200000
  - г) 1:500000
- 39 Профилактика бывает:
- 1) вторичная
  - 2) начальная
  - 3) первичная
  - 4) третичная
- 40 При хранении на стерильном столе, инструменты сохраняют стерильность в течение:
- а) 3 часов
  - б) 6 часов
  - в) 12 часов
  - г) 24 часов

- 41 Для профилактики осложнений во время отбеливания зубов необходимо:
- а) прополоскать рот раствором Шиллера-Писарева
  - б) снять все ортопедические конструкции
  - в) снять поверхностный слой эмали
  - г) провести санацию полости рта
- 42 Индекс CPITN у взрослых регистрирует следующие признаки:
- а) зубной налет, зубной камень
  - б) кровоточивость, зубной камень
  - в) зубной камень, пародонтальный карман
  - г) кровоточивость, зубной камень, пародонтальный карман
- 43 Маргинальная десна - это:
- а) десневой сосочек и десна вокруг зуба
  - б) десна, окружающая зуб
  - в) десна, покрывающая альвеолярный отросток
  - г) десна, покрывающая альвеолярный отросток и переходная складка
  - д) десна, покрывающая альвеолярный отросток и небо
- 44 Воспаление межзубной и маргинальной десны характерно для:
- а) пародонтита легкой степени
  - б) пародонтита средней степени
  - в) пародонтита тяжелой степени
  - г) пародонтоза средней степени
  - д) пародонтоза тяжелой степени
- 45 Частота обращаемости больных с пульпитом:
- а) 15-25%
  - б) 28-30%
  - в) 38-40%
  - г) 48-50%
  - д) 60-70%
- 46 Гласперленовый метод обработки боров обеспечивает:
- а) стерилизацию,
  - б) дезинфекцию,
  - в) предстерилизационную очистку,
  - г) снижение контаминации
- 47 Предупреждению заболеваний пародонта у беременных будут способствовать мероприятия:
- а) санация полости рта
  - б) профессиональная гигиена полости рта
  - в) реминерализирующая терапия
  - г) правильный режим труда и отдыха
- 48 Пациента с кровопотерей транспортируют в положении:
- а) лежа на спине
  - б) лежа на боку
  - в) лежа с приподнятым ножным концом
  - г) лежа с приподнятым головным концом
- 49 Причиной острой травмы периодонта может быть:
- а) грубая эндодонтическая обработка канала
  - б) вредные привычки
  - в) скученность зубов
  - г) травматическая окклюзия
  - д) употребление мягкой пищи

- 50 По международной системе обозначения зубов 73 зуб - это:
- а) верхний правый временный клык
  - б) верхний левый постоянный клык
  - в) нижний правый постоянный клык
  - г) нижний левый временный клык
- 51 К ферментам, расщепляющим углеводы зубного налёта, относятся
- 1) декстраназа
  - 2) липаза
  - 3) миоказа
  - 4) мутаназа
- 52 К реминерализирующим средствам относится:
- а) ремодент
  - б) резорцин-формалиновая смесь
  - в) раствор Шиллера - Писарева
  - г) эритрозин
- 53 Показанием к наложению окклюзионной повязки является:
- а) ранение груди
  - б) гемоторакс
  - в) закрытые переломы ребер
  - г) ушибы грудной клетки
- 54 Вторичный кариес - это:
- а) возобновление процесса при неполном удалении кариозного поражения
  - б) новые кариозные поражения, развивающиеся рядом с пломбой в ранее леченом зубе
  - в) средних размеров кариозная полость, заполненная пищевыми остатками, кариозным дентином
  - г) обширная глубокая кариозная полость с большим количеством размягченного дентина
  - д) кариозный процесс в постоянных зубах
- 55 Расширение периодонтальной щели в области верхушки корня (рентгенологическая картина) характерно для:
- а) хронического фиброзного периодонтита
  - б) хронического гранулематозного периодонтита
  - в) хронического гранулирующего периодонтита
  - г) острого периодонтита
  - д) среднего кариеса
- 56 С помощью индекса РМА определяют:
- а) кровоточивость десны
  - б) зубной камень
  - в) степень воспаления десны
  - г) зубной налет
- 57 Острый мелкий стоматологический инструментальный многократного применения перед утилизацией помещают в:
- а) полиэтиленовый пакет желтого цвета
  - б) плевательницу
  - в) жесткий (пластмассовый) контейнер желтого цвета
  - г) контейнер для дезинфекции белого цвета

- 58 При подозрении на острое заболевание органов брюшной полости неотложная помощь включает в себя
- а) применение тепла на область наибольшей болезненности
  - б) применение холода на область наибольшей болезненности
  - в) применение анальгетиков по назначению врача
  - г) применение спазмолитиков по назначению врача
- 59 Степень абразивности зубных паст, рекомендуемых пациентам при повышенной чувствительности зубов, должна быть:
- а) средней
  - б) высокой
  - в) низкой
  - г) не содержать абразива
- 60 Анкета первичного пациента с его подписью должна заполняться:
- а) в начале приёма
  - б) во время лечения
  - в) после лечения
  - г) заполняется по желанию
- 61 Боры после использования подлежат:
- а) дезинфекции
  - б) дезинфекции и предстерилизационной очистке
  - в) дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации дезинфекции и стерилизации
  - г) дезинфекции и стерилизации
- 62 Альвеолярная десна - это:
- а) десневой сосочек и десна вокруг зуба
  - б) десна, окружающая зуб
  - в) десна, покрывающая альвеолярный отросток
  - г) десна, покрывающая альвеолярный отросток и переходная складка
  - д) десна, покрывающая альвеолярный отросток и небо
- 63 Воспаление десневого сосочка по индексу РМА соответствует коду:
- а) 1
  - б) 2
  - в) 3
  - г) 4
- 64 Для современной модели профессиональной морали - биоэтики, основным принципом является:
- а) принцип "соблюдения долга"
  - б) принцип "не навреди"
  - в) принцип приоритета науки
  - г) принцип приоритета прав и уважения достоинства пациента
- 65 К дефектам слизистой оболочки относится:
- а) волдырь
  - б) пятно
  - в) бугорок
  - г) узелок
  - д) афта



- 66 «Муаровая» эмаль характерна для:
- а) эрозии
  - б) кариеса в стадии пятна
  - в) системной гипоплазии
  - г) флюороза
  - д) несовершенного амелогенеза
- 67 Пелликула зуба образована:
- а) коллагеном
  - б) кератином
  - в) скоплением микроорганизмов и углеводов
  - г) гликопротеидами слюны
  - д) полиненасыщенными жирными кислотами
- 68 Латинское название первичного элемента при плоском лишае:
- а) nodus
  - б) ulcus
  - в) papula
  - г) macula
- 69 Медицинские работники имеют право на:
- а) оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
  - б) совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях;
  - в) соблюдение врачебной тайны;
  - г) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя.
- 70 Иррадиация боли по ходу ветвей тройничного нерва является симптомом пульпита:
- а) острого очагового
  - б) острого диффузного
  - в) хронического фиброзного (ремиссия)
  - г) хронического гипертрофического (ремиссия)
  - д) хронического гангренозного (ремиссия)
- 71 Источником ВИЧ-инфекции является:
- а) крупный рогатый скот
  - б) человек - носитель ВИЧ
  - в) кровососущее насекомое
  - г) птица
  - д) грызун
- 72 Клиническая картина клиновидного дефекта:
- а) дефект твердых тканей с признаками деминерализации, шероховатым дном и стенками
  - б) дефект в форме клина у шеек зубов на щечных и губных поверхностях
  - в) овальный или округлый дефект эмали на наиболее выпуклой части вестибулярной поверхности коронки
  - г) потеря блеска эмали, образование меловидных пятен с последующим образованием дефекта
  - д) пятна белого или желтоватого оттенка на всей поверхности эмали

- 73 Дифференциальный диагноз среднего кариеса проводится с:
- а) кариесом в стадии пятна
  - б) гипоплазией
  - в) глубоким кариесом
  - г) острым диффузным пульпитом
  - д) острым периодонтитом
- 74 Порядок применения медицинских перчаток на приеме у врача-стоматолога (зубного врача):
- а) применение индивидуальной пары нестерильных перчаток для каждого пациента
  - б) стерильные перчатки для каждого пациента
  - в) перчатки применяются только при выполнении манипуляций инфицированным пациентам
  - г) одна пара перчаток используется не более, чем на 5 пациентов при условии их обработки спирт-содержащим кожным антисептиком между пациентами
- 75 Патологический процесс твердых тканей зубов, развивающийся после их прорезывания, при котором происходят деминерализация и протеолиз с последующим образованием дефекта под воздействием внешних и внутренних факторов:
- а) гипоплазия
  - б) эрозия
  - в) истирание
  - г) кариес
  - д) флюороз
- 76 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:
- а) две
  - б) три
  - в) четыре
  - г) пять
- 77 Ведущая роль в развитии кариеса принадлежит:
- а) *Str. Salivaris*
  - б) *Str. Mutans*
  - в) лактобациллы
  - г) *Str. sangius*
  - д) *Str. Aureus*
- 78 Для определения распространенности и интенсивности кариеса нужно знать:
- а) CPITN
  - б) РМА
  - в) ИДЖ
  - г) КПУ
  - д) УИГ
- 79 К веществам, восполняющим дефицит питания растущего кристалла гидроксиапатита, относятся:
- а) брушит
  - б) глицерофосфат кальция
  - в) фитиновая кислота
  - г) фторапатит

- 80 Первоочередной эвакуации подлежат пораженные сортировочной группы:
- а) первой
  - б) второй
  - в) третьей
  - г) четвертой
- 81 Преобладающей микрофлорой инфекционного периодонтита являются:
- а) стафилококки
  - б) стрептококки
  - в) вейлонеллы
  - г) лактобактерии
  - д) простейшие
- 82 К формам санации относятся
- а) индивидуальная
  - б) плановая
  - в) разовая
  - г) централизованная
- 83 Использование реанимационного оборудования для пациента, находящегося в критическом состоянии, является:
- а) злоупотреблением терапевтическими средствами
  - б) реализацией принципа «борьбы за человеческую жизнь до конца»
  - в) признаком низкой квалификации специалиста
  - г) отсутствием у врача нравственного чувства и этической культуры
- 84 Здоровый образ жизни включает в себя:
- а) благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе поведенческой, гигиенические навыки
  - б) состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
  - в) принятие мер, направленных на снижение влияния вредных факторов на организм человека
  - г) привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом
- 85 Вторичный элемент поражения при остром герпетическом стоматите носит название:
- а) афта
  - б) папула
  - в) эрозия
  - г) пузырек
  - д) чешуйка
- 86 С целью снижения риска профессионального заражения на стоматологическом приеме наиболее целесообразно:
- а) лабораторное обследование на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты всех пациентов при обращении за стоматологической помощью
  - б) тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у всех пациентов
  - в) предельно осторожное обращение с колюще-режущим инструментарием после его использования, использование средств индивидуальной защиты, вакцинация медицинского персонала против вирусного гепатита В
  - г) организация стоматологического приема инфицированных пациентов в специализированных учреждениях (кабинетах)

- 87 Перечислите признаки гипергликемической комы:
- а) кожа и видимые слизистые влажные
  - б) кожа и видимые слизистые сухие
  - в) повышен тонус глазных яблок
  - г) повышен тургор кожи
- 88 Наиболее часто поражается трещинами:
- а) комиссура
  - б) верхняя губа
  - в) нижняя губа
  - г) периоральная кожа
  - д) слизистая оболочка губы
- 89 Основная функция одонтобластов:
- а) образование межклеточного вещества
  - б) защитная функция
  - в) образование коллагеновых волокон
  - г) образование дентина
  - д) резорбция дентина
- 90 Уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, за исключением высокорезистентных споровых форм - это:
- а) дезинфекция
  - б) стерилизация
  - в) санитарная обработка
  - г) контаминация
- 91 Ретенция относится к аномалиям:
- а) формы зубов
  - б) размеров зубов
  - в) количества зубов
  - г) сроков прорезывания
- 92 Острая дыхательная недостаточность при истинном (альвеолярном) отеке легких возникает в результате:
- а) пропотевания плазмы крови в альвеолы
  - б) попадания жидкости в альвеолы (аспирация жидкости)
  - в) пропотевания форменных элементов крови в альвеолы
  - г) бронхоспазма
- 93 Чувство «выросшего» зуба связано с:
- а) разволокнением и частичным разрушением фиброзных коллагеновых волокон
  - б) скоплением экссудата в верхушечном участке периодонта
  - в) гиперемией и отеком десны
  - г) избыточной нагрузкой на зуб
  - д) температурным воздействием на зуб
- 94 Эрозия зубов - это:
- а) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде
  - б) порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей
  - в) нарушение эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и постоянных зубов
  - г) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии
  - д) сращение, слияние и раздвоение зубов

- 95 При эпилептическом припадке:
- а) развитию судорог предшествует аура
  - б) припадок начинается внезапно
  - в) каждый припадок начинается своеобразно
  - г) развитию судорог предшествует психотравмирующая ситуация
- 96 Гингивит — это заболевание:
- а) воспалительное
  - б) воспалительно-дистрофическое
  - в) дистрофическое
  - г) инфекционное
  - д) опухолевидное
- 97 Основная функция гигиениста стоматологического при проведении эпидемиологического - стоматологического обследования заключается в:
- а) проведение осмотра населения
  - б) регистрации данных обследования
  - в) проведение профилактических мероприятий
  - г) стерилизации инструментов
- 98 Течение плоского лишая:
- а) острое
  - б) хроническое
  - в) хроническое с обострениями
- 99 К веществам, разрушающим органическую матрицу, относятся:
- а) НПВС
  - б) антиоксиданты
  - в) поверхностно активные вещества (ПАВ)
  - г) ферменты
- 100 К методам первичной профилактики относятся:
- а) групповые
  - б) индивидуальные
  - в) коммунальные
  - г) локальные
- 101 При проведении эпидемиологического стоматологического обследования населения по методике ВОЗ состояние тканей пародонта оценивается с помощью индекса:
- а)РМА
  - б)РНР
  - в)СРІ
  - г)ОНІ-S
- 102 При диспансеризации школьников компенсированной форме кариеса по классификации Т.Ф. Виноградовой соответствует количество пораженных зубов у пациента:
- а)4-5
  - б)5-6
  - в)7-8
  - г)свыше 8-9
- 103 Суточная потребность в кальции у взрослых людей составляет:
- а)100 мг
  - б)200 мг
  - в)500 мг
  - г)1000 мг

- 104 Внутриротовое стоматологическое обследование включает осмотр:
- а) задней стенки глотки, подчелюстных лимфатических узлов, переходной складки
  - б) ретромолярной области, подчелюстных лимфатических узлов
  - в) преддверия полости рта, уздечек губ
  - г) слизистой оболочки полости рта, пародонта, зубов, определение вида прикуса
- 105 Герметизацию фиссур вторых постоянных моляров рекомендуется проводить в возрасте:
- а) 6-8 лет
  - б) 9-12 лет
  - в) 12-14 лет
  - г) в любое время после прорезывания зуба
- 106 Индекс ПМА определяет тяжесть:
- а) гингивита
  - б) пародонтита
  - в) пародонтоза
  - г) пародонтолиза
  - д) стоматита
- 107 Для уменьшения кровоточивости десен наиболее целесообразно использовать зубные пасты
- а) кальцийсодержащие
  - б) с растительными добавками
  - в) отбеливающие
  - г) фторидсодержащие
- 108 Герметизацию фиссур первых постоянных моляров показано проводить в возрасте:
- а) 6-8 лет
  - б) 9-12 лет
  - в) 12-14 лет
  - г) в любое время после прорезывания зуба
- 109 Наиболее распространенными стоматологическими заболеваниями среди населения России являются:
- а) кариес зубов и заболевания пародонта
  - б) заболевания слизистой оболочки полости рта
  - в) кариес корня и гиперчувствительность зубов
  - г) зубочелюстные аномалии и деформации
- 110 С возрастом секреция слюны:
- а) повышается
  - б) понижается
  - в) не изменяется
  - г) варьируется
- 111 Для беременных и детей препаратом выбора для местной анестезии является:
- а) новокаин 2%
  - б) лидокаин 2%
  - в) лидокаин 10% (спрей)
  - г) ультракаин D-S
- 112 Подвижность зубов при пародонтите легкой степени:
- а) I-II степени
  - б) I-II1 степени
  - в) III степени
  - г) более III степени
  - д) отсутствует

- 113 Сбор анамнеза у стоматологического пациента начинают с:
- а) анамнеза жизни
  - б) анамнеза болезни
  - в) выяснения жалоб
  - г) осмотра полости рта
  - д) пальпации лимфатических узлов
- 114 В норме в сутки у взрослого человека секретируется слюны около:
- а) 2000 мл
  - б) 1500 мл
  - в) 1000 мл
  - г) 100 мл
- 115 Волокна периодонта, охватывающие шейку зуба:
- а) транссептальные
  - б) свободные волокна десны
  - в) циркулярные волокна
  - г) альвеолярные гребешковые волокна
  - д) косые волокна
- 116 В состав ротовой жидкости (смешанной слюны) входят:
- а) секрет слюнных желез, клетки эпителия, лейкоциты, микроорганизмы, остатки пищи
  - б) секрет слюнных желез, остеобласты, остатки пищи
  - в) лейкоциты, зубной налет, пелликула
  - г) остеобласты, лейкоциты, микроорганизмы
- 117 Минимальная ингибирующая концентрация триклозана в отношении патогенных микроорганизмов полости рта составляет:
- а) 0,1 мкг/мл
  - б) 0,3 мкг/мл
  - в) 0,5 мкг/мл
  - г) 0,8 мкг/мл
- 118 Штриховая форма флюороза характеризуется:
- а) наличием хорошо выраженных меловидных пятен без полосок
  - б) появлением небольших меловидных полосок-штрихов
  - в) хорошо очерченными пигментированными пятнами и крапинками на фоне
  - г) матовой эмали
  - д) на фоне выраженной пигментации эмали участками с ее отсутствием
  - е) изменением формы коронки вследствие эрозивного разрушения и стирания
- 119 Сохранение боли после устранения раздражителя характерно для:
- а) среднего кариеса
  - б) глубокого кариеса
  - в) хронического фиброзного пульпита
  - г) хронического фиброзного периодонтита
  - д) гипоплазии
- 120 Какой фермент микробного гликолиза блокирует фтор?
- а) ДНКазу
  - б) липазу
  - в) фосфатазу
  - г) энолазу

- 121 Для диагностики состояния тканей пародонта используется вид рентгенограммы:
- в) ортопантограмма
  - б) внутриротовая в прикусе
  - в) телерентгенограмма
  - г) боковая
- 122 Число пораженных при территориальных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах):
- а) 10-50 пораженных
  - б) 50-500 пораженных
  - в) свыше 500 пораженных
  - г) до 10 пораженных
- 123 Сохранение жизнеспособности пульпы возможно при:
- а) остром очаговом пульпите
  - б) остром диффузном пульпите
  - в) хроническом фиброзном пульпите
  - г) хроническом гипертрофическом пульпите
  - д) обострении хронического пульпита
- 124 Функция пародонта, которая связана с поддержанием и восстановлением микроциркуляции в состояниях функциональной нагрузки и физиологического покоя:
- а) барьерная
  - б) трофическая
  - в) пластическая
  - г) регулирующая, нейросенсорная
  - д) амортизирующая, опорно-удерживающая
- 125 Катализирует окисление тиоцианатов фермент:
- а) алкогольдегидрогеназа
  - б) лизоцим
  - в) пероксидаза
  - г) рибонуклеаза
- 126 Дезинфекции после каждого пациента подлежат все указанные объекты, кроме:
- а) рукоятки осветительной аппаратуры, рукоятка светоотверждающей лампы,
  - б) рабочая поверхность столика врача-стоматолога,
  - в) ручки медицинского шкафа,
  - г) стоматологическое кресло пациента
- 127 Правильным положением пациента по «правилу циферблата» является положение головы и ног (соответственно) на:
- а) 6.00 и 12.00
  - б) 2.00 и 6.00
  - в) 9.00 и 3.00
  - г) 10.00 и 4.00
- 128 Плоский лишай чаще встречается:
- а) у мужчин
  - б) у женщин
- 129 Концентрация фтора в питьевой воде, при которой выявляются легкие формы флюороза (мг/л):
- а) 0,5
  - б) 1,0
  - в) 1,5
  - г) 2,0
  - д) 2,5



- 130 Несовершенный амелогенез - это:
- а) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде
  - б) порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей
  - в) сращение, слияние и раздвоение зубов
  - г) нарушение эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и постоянных зубов
  - д) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии
- 131 Инкубационный период ВИЧ-инфекции составляет:
- а) от 3 до 12 часов
  - б) от 3 до 12 дней
  - в) от 3 до 12 недель
  - г) от 3 до 12 месяцев
- 132 Уничтожение всех форм микроорганизмов, включая вегетативные и споровые формы - это:
- а) дезинфекция
  - б) стерилизация
  - в) санитарная обработка
  - г) контаминация
- 133 Основной метод стерилизации световодов лампы для светоотверждаемых материалов:
- а) паровой
  - б) гласперленовый
  - в) воздушный
  - г) химический
- 134 Для определения индекса РМА производят окрашивание десны раствором:
- а) Люголя
  - б) метиленовый синий
  - в) Шиллера-Писарева
  - г) ромазулана
- 135 Пучки волокон, идущие в горизонтальном направлении и соединяющие соседние зубы:
- а) транссептальные
  - б) свободные волокна десны
  - в) циркулярные волокна
  - г) альвеолярные гребешковые волокна
  - д) косые волокна
- 136 Истечение ликвора из уха или носа является характерным признаком:
- а) сотрясения головного мозга
  - б) сдавления головного мозга
  - в) перелома свода черепа
  - г) перелома основания черепа
- 137 При двустороннем вывихе височно-нижнечелюстного сустава подбородок нижней челюсти смещен:
- а) в сторону повреждения
  - б) в здоровую сторону
  - в) вперед
  - г) не смещен

- 138 Острый герпетический стоматит является заболеванием:
- а) вирусным
  - б) бактериальным
  - в) грибковым
  - г) аутоиммунным
  - д) аллергическим
- 139 Наибольшее количество кальция содержат:
- а) рыба, мясо, птица
  - б) желток яйца, печень, хлеб
  - в) молоко, сыр, зеленые овощи
  - г) хлебобулочные и кондитерские изделия
- 140 На профилактический осмотр дети и взрослые должны приходить не реже:
- а) 2 разв месяц
  - б) 1 раза в 2 года
  - в) 1 раза в год
  - г) 2 разв год
- 141 Подвижность зубов при пародонтите средней степени:
- а) I-II степени
  - б) II—III степени
  - в) III степени
  - г) более III степени
  - д) отсутствует
- 142 Дифференциальный диагноз бессимптомного течения среднего кариеса проводят с:
- а) кариесом в стадии пятна
  - б) хроническим гранулематозным периодонтитом
  - в) деструктивной формой флюороза
  - г) хроническим фиброзным периодонтитом
  - д) местной гипоплазией
- 143 Несмыкание фронтальных зубов у детей 2-3 лет может быть обусловлено:
- а) нарушением жевания
  - б) неправильной осанкой
  - в) сосанием соски
  - г) прорезыванием зубов
- 144 Приступы самопроизвольной боли возникают при:
- а) среднем кариесе
  - б) остром пульпите
  - в) хроническом пульпите
  - г) остром периодонтите
  - д) глубоком кариесе
- 145 Основным методом обследования стоматологического больного:
- а) рентгенологический
  - б) цитологический
  - в) гистологический
  - г) сбор анамнеза
  - д) аллергологический

- 146 Для кистогранулемы характерен признак:
- а) четкие контуры очага деструкции на рентгенограмме до 5 мм
  - б) отсутствие костной структуры в очаге деструкции
  - в) расширение периодонтальной щели
  - г) очаг деструкции с нечеткими контурами
  - д) сужение периодонтальной щели
- 147 Согласно приказу МЗ РФ от 04.03.2003 №73 длительность реанимационных мероприятий составляет:
- а) не менее 15 минут
  - б) не менее 25 минут
  - в) не менее 30 минут
  - г) не менее 1 часа
- 148 Пути передачи инфекции при сифилисе:
- а) воздушно-капельный
  - б) через рукопожатие
  - в) алиментарный
  - г) половой
- 149 При обнаружении в полости рта изменений, похожих на опухолевый процесс, необходимо направить пациента к врачу-стоматологу:
- а) хирургу
  - б) терапевту
  - в) ортодонту
  - г) пародонтологу
- 150 Размеры очага пигментации эмали, требующего динамического наблюдения и реминерализации:
- а) 0,5 -1,0 мм
  - б) 1,0-1,5 мм
  - в) 1,5-2,0 мм
  - г) 2,0-2,5 мм
  - д) 2,5-3,0 мм
- 151 После герметизации зубов первый контрольный осмотр пациента проводят через:
- а) 1 неделю
  - б) 1 месяц
  - в) 6 месяцев
  - г) 1 год
- 152 Первичная профилактика направлена на:
- а) восстановление функции
  - б) лечение существующего заболевания
  - в) предотвращение заболевания+
  - г) предотвращение рецидивов заболеваний
- 153 Часть десны, которая лежит непосредственно на надкостнице вестибулярного и орального скатов альвеолярной кости:
- а) край десны
  - б) межзубная десна
  - в) маргинальная десна
  - г) прикрепленная десна
  - д) слизисто-десневая граница

- 154 Критерием окончательного препарирования кариозной полости является:
- а) наличие размягченного дентина на дне и стенках кариозной полости
  - б) наличие пигментированного дентина на дне и стенках кариозной полости
  - в) наличие светлого и плотного дентина на дне и стенках кариозной полости, окрашивающегося детектором кариеса
  - г) наличие светлого плотного дентина на дне и стенках кариозной полости без окрашивания детектором кариеса
  - д) наличие пигментированного дентина на стенках и размягченного дентина на дне кариозной полости
- 155 Показатели гемодинамики у пациентов с травматическим шоком
- а) брадикардия, АД снижено
  - б) тахикардия, АД снижено
  - в) аритмия, АД снижено
  - г) тахикардия, АД повышено
- 156 Пародонтит - заболевание:
- а) воспалительное
  - б) воспалительно-дистрофическое
  - в) дистрофическое
  - г) опухлевидное
  - д) инфекционное
- 157 Функция пародонта, которая состоит в рефлекторной регуляции трофики тканей и жевательного давления при реализации пародонто-мускуляторного рефлекса:
- а) барьерная
  - б) трофическая
  - в) пластическая
  - г) регулирующая, нейросенсорная
  - д) амортизирующая, опорно-удерживающая
- 158 Пародонтом называют комплекс тканей, состоящий из:
- а) десны, альвеолярного гребня, периодонта и цемента корня зуба
  - б) десны, костной ткани альвеолы, периодонта и цемента корня зуба
  - в) десны, костной ткани альвеолы, шарпеевских волокон и цемента корня зуба
  - г) десны, круговой связки зуба, альвеолярного гребня, периодонта и цемента корня зуба
  - д) десны, круговой связки зуба, альвеолярного гребня, периодонта и клеточного цемента корня зуба
- 159 Вредная привычка прокладывания языка между зубами может привести к:
- а) расширению зубных рядов
  - б) сужению зубных рядов
  - в) ассиметрии зубных рядов
  - г) неполному прорезыванию зубов
- 160 Обязательное медицинское страхование — это:
- а) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи;
  - б) страховой риск, связанный с возникновением страхового случая;
  - в) обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи;
  - г) обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, целевым назначением которых является обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения;

- 161 Морфологические элементы хронических трещин губ:
- а) язва
  - б) афта
  - в) трещина
  - г) кровянистая корка
  - д) верно в) и г)
- 162 К вторичным элементам поражения относятся:
- а) чешуйка
  - б) бугорок
  - в) узелок
  - г) узел.
  - д) пятно
- 163 В качестве добавок, снижающих воспалительные явления, в частности кровоточивость дёсен, применяются:
- а) аллантоин
  - б) алюминия лактат
  - в) фенол
  - г) формальдегид
- 164 На доврачебном этапе (при отсутствии ЭКГ) можно думать о начавшемся инфаркте миокарда, если приступ стенокардии не купируется приемом нитроглицерина в течение:
- а) 20 - 30 минут
  - б) 30 минут - 1 часа
  - в) 1,5-2 часа
  - г) суток
- 165 Процентное соотношение лиц, имеющих стоматологическое заболевание, к общему числу обследованных называется:
- а)распространенностью стоматологического заболевания
  - б)интенсивностью стоматологического заболевания
  - в)стоматологической заболеваемостью населения
  - г)уровнем стоматологической помощи населению
- 166 Деструктивная форма флюороза:
- а) наличием хорошо выраженных меловидных пятен без полосок
  - б) появлением небольших меловидных полосок-штрихов
  - в) хорошо очерченными пигментированными пятнами и крапинками на фоне матовой эмали
  - г) на фоне выраженной пигментации эмали участками с ее отсутствием
- 167 Разделение целого на части, выделение отдельных признаков, сторон целого:
- а) анализ
  - б) классификация
  - в) сравнение
  - г) синтез
  - д) систематизация
- 168 В работе гигиениста применяется анестезия:
- а)аппликационная
  - б)инфильтрационная
  - в)проводниковая
  - г)наркоз

- 169 Рецидивы хронических трещин губ возникают:
- а) летом
  - б) зимой
  - в) весной
  - г) осенью
  - д) независимо от времени года
- 170 Детектор кариеса используется для выявления:
- а) наружного слоя кариозного дентина
  - б) вторичного дентина
  - в) внутреннего слоя кариозного дентина
  - г) третичного дентина.
  - д) иррегулярного дентина
- 171 Удаление пульпы (витальное, девитальное) показано при:
- а) острых формах пульпита
  - б) хроническом фиброзном пульпите
  - в) хроническом гангренозном пульпите
  - г) всех формах пульпита
  - д) обострении хронического пульпита
- 172 Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием...
- а) личность;
  - б) индивид;
  - в) человек;
  - г) индивидуальность;
  - д) субъект.
- 173 Кариесрезистентность - это устойчивость к действию:
- а) кислот
  - б) щелочей
  - в) кариесогенных факторов
  - г) абразивного фактора
  - д) температурных факторов
- 174 Понятие "информированное согласие" включает в себя все, кроме:
- а) информации о цели предполагаемого вмешательства
  - б) информации о характере предполагаемого вмешательства
  - в) информации о несомненном приоритете пользы вмешательства по сравнению с возможным риском
  - г) информации о связанном с вмешательством риске
- 175 Какие элементы способны замещать ионы кальция в кристалле гидроксиапатита?
- а) железо
  - б) медь
  - в) олово
  - г) стронций
- 176 Язвенно-некротический гингивит Венсана относят к заболеваниям:
- а) вирусным
  - б) аллергическим
  - в) бактериальным
  - г) аутоиммунным
  - д) неврогенным

- 177 Порядок обработки рук врача-стоматолога (зубного врача) после окончания приема пациента:
- а) мытье перчаток с мылом или обработка их антисептиком на руках, использование одной пары перчаток не более, чем на 5 пациентов
  - б) мытье рук с мылом и последующая обработка рук спиртосодержащим кожным антисептиком после каждого пациента
  - в) обработка рук спиртосодержащим антисептиком
  - г) если стоматолог (зубной врач) ведет прием пациента в перчатках и меняет их после каждого пациента, то руки обрабатывать не обязательно
- 178 К основным средствам гигиены полости рта относятся:
- а) зубочистки и флоссы
  - б) зубная паста и ополаскиватель
  - в) зубная паста и зубной порошок
  - г) зубная щетка и зубная паста
- 179 Перед посадкой пациента кресло должно быть:
- а) сложено, подлокотник закрыт
  - б) сложено, подлокотник открыт
  - в) разложено, подлокотник закрыт
  - г) разложено, подлокотник открыт
- 180 Язвенно-некротический гингивит Венсана вызывается симбиозом:
- а) стафилококков и пептострептококков
  - б) фузобактерий и спирохет
  - в) стрептококков и фузобактерий
  - г) стрептококков и лактобацилл
  - д) верно а) и г)
- 181 Тетрациклин вызывает окрашивание временных зубов при лечении:
- а) беременной женщины
  - б) ребенка старше 3 лет
  - в) ребенка старше 5 лет
  - г) ребенка старше 10 лет
- 182 Профилактикой флюороза в эндемическом очаге является:
- а) предупреждение заболеваний матери в период беременности
  - б) замена водоисточника
  - в) гигиена полости рта
  - г) герметизация фиссур
  - д) фторирование молока
- 183 Объем тканей, обследуемых при осмотре полости рта:
- а) зубы
  - б) язык
  - в) все области и ткани полости рта
  - г) слизистая оболочка полости рта и «причинный зуб»
- 184 Об эффективности реминерализации можно судить по:
- а) увеличению прироста кариеса
  - б) появлению новых белых кариозных пятен
  - в) стабилизации или исчезновению белых пятен эмали, снижению прироста кариеса
  - г) уменьшению воспаления тканей десны

- 185 Для определения распространенности и интенсивности кариеса нужно знать:
- а) СРІТН
  - б) РМА
  - в) ИДЖ
  - г) КПУ
  - д) УИГ
- 186 К веществам, подавляющим образование и рост органической матрицы и снижающим вирулентность составляющих ее микроорганизмов, относятся:
- а) антибиотики
  - б) антиоксиданты
  - в) антисептики
  - г) витамины
- 187 Участниками обязательного медицинского страхования являются:
- а) застрахованные лица;
  - б) страховые медицинские организации;
  - в) страхователи;
  - г) федеральный фонд.
- 188 Непрерывное углубление на десне, которое повторяет контур десневого края, лежит апикальнее его и определяется визуально:
- а) рецессия десны
  - б) десневая борозда
  - в) десневой желобок
  - г) зубо-десневое соединение
  - д) слизисто-десневая граница
- 189 Очаг деструкции костной ткани с нечеткими контурами в области верхушки корня соответствует рентгенологической картине:
- а) хронического фиброзного периодонтита
  - б) хронического гранулематозного периодонтита
  - в) хронического гранулирующего периодонтита
  - г) острого периодонтита
  - д) хронического гангренозного пульпита
- 190 При диспансеризации школьников декомпенсированной форме кариеса по классификации Т.Ф. Виноградовой соответствует количество пораженных зубов у пациента:
- а) 4-5
  - б) 5-6 - 8-9
  - в) 7-8
  - г) свыше 8-9
- 191 Генеральную уборку стоматологических кабинетов хирургического профиля следует проводить один раз в:
- а) неделю
  - б) день
  - в) 3 дня
  - г) месяц



- 192 Очаг деструкции костной ткани в области верхушки корня с четкими контурами до 0,5 см соответствует рентгенологической картине:
- а) хронического фиброзного периодонтита
  - б) хронического гранулематозного периодонтита
  - в) хронического гранулирующего периодонтита
  - г) кистогранулемы
  - д) хронического гангренозного пульпита
- 193 Этическая неприемлемость “аномальной техники деторождения” связана:
- а) с нарушением права ребенка быть рожденным в традиционном браке естественным путем
  - б) с уничтожением “лишних” человеческих эмбрионов
  - в) с обесцениваем ценности и значения материнства и материнской любви в случаях легализации “суррогатного материнства”
  - г) со всеми перечисленными факторами
- 194 Воспаление межзубной, маргинальной и части альвеолярной десны характерно для:
- а) пародонтита легкой степени
  - б) пародонтита средней степени
  - в) пародонтита тяжелой степени
  - г) пародонтоза средней степени
  - д) пародонтоза тяжелой степени
- 195 Проведение стоматологического просвещения считается эффективным, если:
- а) увеличивается показатель интенсивности кариеса поверхностей
  - б) увеличивается показатель интенсивности кариеса зубов
  - в) ухудшаются показатели индексов гигиены полости рта
  - г) улучшаются показатели пародонтальных индексов
- 196 Волокна периодонта от вершины альвеолярных гребней к цементу корня:
- а) транссептальные
  - б) свободные волокна десны
  - в) циркулярные волокна
  - г) альвеолярные гребешковые волокна
  - д) косые волокна
- 197 Наибольшее влияние на созревание эмали оказывает:
- а) фтор
  - б) молибден
  - в) стронций
  - г) кальций
  - д) магний
- 198 Недостаточное насыщение ротовой жидкости гидроксиапатитом и фторапатитом характерно для:
- а) гипоплазии
  - б) эрозии эмали
  - в) кариеса
  - г) флюороза
  - д) гиперплазии
- 199 При инфаркте миокарда в сердечной мышце развивается:
- а) резкий спазм сердечной мышцы
  - б) некроз
  - в) резкое расслабление сердечной мышцы
  - г) аневризма

- 200 Рентгенологическим признаком пародонтита является:
- а) разрежение вокруг верхушек корней зубов округлой формы
  - б) снижение высоты межальвеолярных перегородок
  - в) склеротические изменения альвеолярной кости
  - г) изменения в костной ткани отсутствуют
- 201 При анафилактическом шоке средствами неотложной помощи являются:
- а) нитроглицерин, валидол
  - б) клофелин, баралгин, папаверин 2%
  - в) преднизолон, адреналин 0,1%, кальция хлорид 10%
  - г) эуфилин 2,4%, атропин 0,1%, супрастин 2%
- 202 Вещества, препятствующие минерализации органической матрицы, включают в себя:
- а) дефлокулянты
  - б) ингибиторы кристаллизации
  - в) конкурентные ингибиторы катионов и анионов
  - г) поверхностно активные вещества
- 203 К первичной профилактике заболеваний пародонта относится
- а) диагностика и устранение аномалий прикрепления уздечек верхней и нижней губы, языка, преддверия полости рта
  - б) предотвращение или устранение формирования кариесогенной ситуации в полости рта
  - в) профилактика и своевременное лечение аномалий прикуса
  - г) создание условий для нормального формирования и первичной минерализации твёрдых тканей зуба
- 204 К ятрогенным относятся заболевания:
- а) обусловленные вредными факторами производства
  - б) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
  - в) с неблагоприятным прогнозом
  - г) наследственного генеза
- 205 Инкубационный период ВИЧ-инфекции составляет:
- а) от 3 до 12 часов
  - б) от 3 до 12 дней
  - в) от 3 до 12 недель
  - г) от 3 до 12 месяцев
  - д) от 3 до 12 лет
- 206 Дифференциальный диагноз поверхностного кариеса проводится с:
- а) гиперплазией
  - б) эрозией твердых тканей
  - в) глубоким кариесом
  - г) острым пульпитом
  - д) хроническим фиброзным пульпитом
- 207 Структурной единицей эмалевой призмы являются кристаллы:
- а) гидроксиапатита
  - б) фторапатита
  - в) хлорапатита
  - г) карбонатапатита

- 208 Какая концентрация ионов фтора на 1 литр воды?
- а) 0,5-0,8
  - б) 0,8-1,2
  - в) 1,0-1,5
  - г) 1,5-2,0
- 209 Вторичным элементом поражения при плоском лишае является:
- а) афта
  - б) эрозия
  - в) трещина
  - г) корка
- 210 Аномалия развития зуба - это:
- а) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде
  - б) порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей
  - в) сращение, слияние и раздвоение зубов
  - г) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии
  - д) нарушение эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и постоянных зубов
- 211 Причина местной гипоплазии эмали:
- а) заболевания ребенка после рождения
  - б) генетические факторы
  - в) периодонтит молочного зуба
  - г) низкое содержание фтора в питьевой воде.
  - д) высокое содержание фтора в воде
- 212 Вторичная профилактика стоматологических заболеваний - комплекс мер, направленных на:
- а) предупреждение возникновения стоматологических заболеваний
  - б) предупреждение возникновения осложнений имеющихся заболеваний
  - в) восстановление утраченных в результате стоматологических заболеваний функций
  - г) определение стоматологической заболеваемости населения
- 213 Содержание неорганических веществ эмали составляет в %:
- а) 2
  - б) 52
  - в) 95
  - г) 100
- 214 Наибольшая проницаемость эмали отмечается:
- а) в пришеечной области, ямках, фиссурах
  - б) в области бугров, режущего края
  - в) на контактных поверхностях
  - г) на вестибулярной и язычной поверхностях
- 215 К противогрибковым препаратам относят:
- а) метронидазол
  - б) флуконазол
  - в) тиосульфат натрия
  - г) тетрациклин
  - д) гистаглобулин

- 216 По международной системе обозначения зубов, каждый зуб обозначается цифрами:
- а)Одной
  - б)Двумя
  - в)Тремя
  - г)Пятью
- 217 Глубина пародонтального кармана более 5 мм характерна для:
- а) пародонтита легкой степени
  - б) пародонтита средней степени
  - в) пародонтита тяжелой степени
  - г) пародонтоза средней степени
  - д) пародонтоза тяжелой степени
- 218 При проведении эпидемиологического стоматологического обследования населения по методике ВОЗ используются набор инструментов:
- а)зеркало, стоматологический зонд, пинцет
  - б)зеркало, пародонтальный зонд
  - в)стоматологический зонд, пинцет, экскаватор
  - г)зеркало, стоматологический зонд, пародонтальный зонд
- 219 Количественное выражение одного или нескольких признаков поражения органов полости рта у одного индивидуума или группы обследованных, называется:
- а)распространенностью стоматологического заболевания
  - б) интенсивностью стоматологического заболевания
  - в)стоматологической заболеваемостью населения
  - г)уровнем стоматологической помощи населению
- 220 Причиной системной гипоплазии постоянных зубов являются:
- а) заболевания матери в период беременности
  - б) заболевания ребенка в первый год после рождения
  - в) генетические факторы
  - г) высокое содержание фтора в питьевой воде
  - д) низкое содержание фтора в воде
- 221 К достоверным признакам внезапной остановки сердечной деятельности не относится:
- а) отсутствие пульса на сонных артериях
  - б) внезапная потеря сознания
  - в) отсутствие самостоятельного дыхания
  - г) отсутствие тонов сердца
- 222 Гипоплазия твердых тканей зубов - это:
- а) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде
  - б) порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей
  - в) сращение, слияние и раздвоение зубов
  - г) нарушение эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и постоянных зубов
  - д) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии
- 223 Выберите устные средства санитарного просвещения:
- а) беседа, лекция
  - б) фотография, плакат
  - в) брошюра, журнал
  - г) бюллетень, буклет

- 224 Рецидив герпетической инфекции происходит в результате:
- а) аллергии
  - б) дисбактериоза
  - в) активизации латентной инфекции
  - г) активизации условно-патогенной микрофлоры
  - д) стоматологического вмешательства
- 225 Цель санитарного просвещения:
- а) формирование высокой санитарной культуры, сознательного гигиенического поведения граждан
  - б) нетерпимое и критичное отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к условиям окружающей среды, наносящим ущерб здоровью
  - в) правильное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленное на выздоровление
  - г) овладение знаниями, необходимыми для соблюдения правил гигиенического поведения
- 226 Выраженный болевой синдром при остром пульпите обусловлен:
- а) изменением атмосферного давления
  - б) раздражением нервных окончаний продуктами анаэробного гликолиза
  - в) понижением гидростатического давления в полости зуба
  - г) уменьшением количества вазоактивных веществ
  - д) повышением температуры тела
- 227 Пациентам с мостовидными протезами для наиболее эффективного очищения промывной части протеза рекомендуется использовать:
- 1) электрическую зубную щетку
  - 2) зубочистки
  - 3) мануальную зубную щетку
  - 4) суперфлосс
- 228 Основным этиологическим фактором пародонтита является:
- а) микробный зубной налет (микробная бляшка)
  - б) зубной налет курильщика
  - в) плотный зубной налет
  - г) наддесневой зубной камень
  - д) поддесневой зубной камень
- 229 Рецидив кариеса — это:
- а) возобновление процесса при неполном удалении кариозного поражения
  - б) новые кариозные поражения, развивающиеся рядом с пломбой в ранее леченом зубе
  - в) средних размеров кариозная полость, заполненная пищевыми остатками, кариозным дентином
  - г) обширная глубокая кариозная полость с большим количеством размягченного дентина
  - д) кариозный процесс в постоянных зубах
- 230 Какой путь введения лекарственных препаратов предпочтителен при оказании помощи больным с анафилактическим шоком:
- а) внутривенный
  - б) внутримышечный
  - в) подкожный
  - г) ингаляционный

- 231 Третичная профилактика стоматологических заболеваний - комплекс мер, направленных на:
- а) предупреждение возникновения стоматологических заболеваний
  - б) предупреждение возникновения осложнений имеющихся заболеваний
  - в) восстановление утраченных в результате стоматологических заболеваний функций
  - г) определение стоматологической заболеваемости населения
- 232 Методы санации:
- а) децентрализованная
  - б) лечебно-профилактическая
  - в) периодическая
  - г) централизованная
- 233 Правильным определением этики как науки является:
- а) этика - наука об отношении живых существ между собой
  - б) этика - наука о природе и смысле моральных взаимоотношений и нравственных принципов
  - в) этика - наука о минимизировании зла в человеческих отношениях
  - г) этика - наука об умении правильно себя вести в обществе
- 234 Кариесрезистентность — это устойчивость к действию:
- а) кислот
  - б) щелочей
  - в) кариесогенных факторов
  - г) абразивного фактора
  - д) температурных факторов
- 235 Инкубационный период при сифилисе:
- а) 7-10 дней
  - б) 14-17 дней
  - в) 21-28 дней
  - г) 3-6 недель
  - д) 1 год
- 236 Для диффузного пульпита характерна боль:
- а) постоянная
  - б) ночная
  - в) локализованная
  - г) дневная
  - д) ноющая
- 237 Возникновению трещин губ способствуют:
- а) вирусы
  - б) вредные привычки
  - в) сухость губ
  - г) врожденные особенности архитектоники губ
  - д) верно б), в) и г)
- 238 При глотании правильным является положение языка:
- а) между передними зубами
  - б) в области небной поверхности верхних фронтальных зубов
  - в) между губами
  - г) на дне полости рта

- 239 Какие металлы подавляют выход кальция из тканей зуба?
- а) алюминий
  - б) висмут
  - в) железо
  - г) молибден
- 240 Флюороз — это:
- а) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде
  - б) порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей
  - в) сращение, слияние и раздвоение зубов
  - г) нарушение эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и постоянных зубов
  - д) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии
- 241 Ингибируют образование фосфата кальция ионы:
- а) магния
  - б) стронция
  - в) фтора
  - г) цинка
- 242 При остром гнойном периостите, возникшем от верхних премоляров припухлость локализуется в области:
- а) скуловой кости
  - б) подглазничной области и щеки
  - в) верхней губы
  - г) нижней губы
- 243 Какой степени жесткости должна быть детская зубная щетка:
- а) жесткая
  - б) мягкая
  - в) любая
  - г) средняя
- 244 Видимое «укорочение» коронки зуба наблюдается при:
- а) ушибе
  - б) неполном вывихе
  - в) полном вывихе
  - г) вколоченном вывихе
- 245 Способность понимания психологических состояний других людей и сопереживание им, умение посмотреть на ситуацию глазами другого - это качество личности:
- а) доброжелательность
  - б) открытость
  - в) конфронтация
  - г) эмпатия
  - д) аутентичность
- 246 Причины возникновения кариеса:
- а) кариесогенная флора, углеводы, низкая резистентность эмали
  - б) кислотоустойчивость эмали, белки, низкая резистентность эмали
  - в) легкоусвояемые углеводы, высокая резистентность эмали, жиры
  - г) высокая резистентность эмали, углеводы, кариесогенная флора
  - д) углеводы, органические кислоты, высокая резистентность эмали

- 247 Пятнистая форма флюороза характеризуется:
- а) наличием хорошо выраженных меловидных пятен без полосок
  - б) появлением небольших меловидных полосок-штрихов
  - в) хорошо очерченными пигментированными пятнами и крапинками на фоне матовой эмали
  - г) на фоне выраженной пигментации эмали участками с ее отсутствием
  - д) изменением формы коронки вследствие эрозивного разрушения и стирания
- 248 Ранним клиническим признаком воспаления десны является:
- а) деформация десневых сосочков
  - б) пародонтальный карман глубиной до 3 мм
  - в) кровоточивость при зондировании
  - г) неприятный запах изо рта
- 249 При экспираторной одышке:
- а) затруднен вдох
  - б) затруднен выдох
  - в) затруднен и вдох, и выдох
  - г) меняется только частота дыхания
- 250 После приема сахаров pH ротовой жидкости восстанавливается до нормального значения в течение:
- а) 3-5 мин
  - б) 10-20 мин
  - в) 30-40 мин
  - г) более 1 часа
- 251 Для оценки эффективности чистки зубов пациентом наиболее важным фактором является:
- а) время, требуемое для чистки всех зубов
  - б) качество зубной щетки
  - в) метод, по которому происходит движение от зуба к зубу
  - г) способность пациента удалять налет со всех поверхностей зубов
- 252 Иммунные зоны зуба:
- а) фиссуры и углубления на зубах
  - б) пришеечная треть видимой коронки зуба
  - в) жевательные поверхности зубов
  - г) бугры, экватор и вестибулярные поверхности зубов
  - д) небные и язычные поверхности зубов
- 253 Для диагностики кариеса в стадии пятна используют окрашивающий раствор:
- а) Шиллера-Писарева
  - б) метиленового синего
  - в) эритрозина
  - г) Люголя
- 254 При профилактическом осмотре определить наличие поддесневого камня можно с помощью:
- а) визуального осмотра
  - б) окрашивания йодсодержащим раствором
  - в) зондирования
  - г) рентгеновского исследования



- 255 Вторичный кариес - это:
- а) возобновление процесса при неполном удалении кариозного поражения
  - б) новые кариозные поражения, развивающиеся рядом с пломбой в ранее леченом зубе
  - в) средних размеров кариозная полость, заполненная пищевыми остатками, кариозным дентином
  - г) обширная глубокая кариозная полость с большим количеством размягченного дентина
  - д) кариозный процесс в постоянных зубах
- 256 Для временной остановки венозного наружного кровотечения применяют:
- а) пальцевое прижатие артерии на протяжении
  - б) наложение жгута
  - в) максимальное сгибание конечности
  - г) наложение давящей повязки
- 257 Структура сознательной деятельности в себя включает:
- а) получение и переработку информации;
  - б) постановку задачи и создание ее образа;
  - в) выбор нужного способа решения задачи;
  - г) сличение результатов решения и коррекция ошибок;
  - д) все ответы верны.
- 258 Ярко-красный полированный язык наблюдается при:
- а) пернициозной (В12 - дефицитной) анемии
  - б) кандидозе
  - в) хронических заболеваниях ЖКТ
  - г) ВИЧ – инфекции
- 259 В гиппократовской модели биомедицинской этики основным принципом является:
- а) не навреди
  - б) не убий
  - в) приоритет интересов науки
  - г) принцип автономии личности
- 260 Уровни интенсивности кариеса по ВОЗ определены для возрастных групп:
- а) 6 и 12 лет
  - б) 15 и 18 лет
  - в) 12 лет и 35-44 года
  - г) 12 и 15 лет
- 261 Первичный элемент поражения при хроническом рецидивирующем герпесе носит название:
- а) афта
  - б) корка
  - в) папула
  - г) пятно
  - д) везикула
- 262 Проведение беседы с пациентом по вопросам гигиены полости рта на стоматологическом приеме:
- а) это форма проведения стоматологического просвещения:
  - б) индивидуальная
  - в) массовая
  - г) комплексная
  - д) групповая

- 263 Изъятие органов и тканей от мертвого донора осуществляется в Российской Федерации:
- а) беспрепятственно в интересах науки и общества
  - б) согласно принципу “презумпция несогласия”
  - в) согласно принципу “презумпция согласия”
  - г) в соответствии с морально-религиозными ценностями
- 264 К материалам для герметизации фиссур относят
- а) жидкотекучий композит
  - б) силанты
  - в) стеклоиономерный цемент
  - г) цинкфосфатный цемент
- 265 Осмотр стоматологического пациента начинают с:
- а) осмотра полости рта
  - б) внешнего осмотра
  - в) осмотра лимфатических узлов
  - г) изучения рентгенограммы зубов
  - д) оценки клинического анализа крови
- 266 При коллапсе давление:
- а) снижается систолическое до 80-50 мм рт.ст.
  - б) кратковременно повышается с последующим прогрессивным его снижением
  - в) не изменяется
  - г) снижается систолическое до 90 мм рт. ст.
- 267 Пациент имеет право на:
- а) на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья;
  - б) соблюдение режима лечения, в том числе определенного на период временной нетрудоспособности;
  - в) выбор врача и выбор медицинской организации;
  - г) осуществление рекламы лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания.
- 268 К первичным элементам поражения относятся:
- а) пузырь
  - б) эрозия
  - в) афта
  - г) рубец
  - д) трещина
- 269 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие пульса на:
- а) локтевой артерии
  - б) лучевой артерии
  - в) сонной артерии
  - г) бедренной артерии
- 270 Местные факторы, оказывающие влияние на возникновение кариеса:
- а) климатические условия
  - б) изменение количества и качества ротовой жидкости
  - в) диета и питьевая вода
  - г) белковые пищевые остатки в полости рта
  - д) наследственные и соматические заболевания

- 271 При определении гигиенического состояния полости рта для окрашивания зубного налета используют раствор:
- а) метиленового синего 2%
  - б) спиртовой раствор йода 5%
  - в) Шиллера - Писарева
  - г) бриллиантового зеленого 1%
- 272 По рекомендациям ВОЗ суточное употребление сахара детьми дошкольного возраста должно составлять:
- а) 10 г
  - б) 20 г
  - в) 40 г
  - г) 50 г
- 273 Функция пародонта, которая направлена на удержание зуба в альвеоле, поддержании зубодеснево-го соединения, перераспределении жевательного давления на стенки альвеолы:
- а) барьерная
  - б) трофическая
  - в) пластическая
  - г) регулирующая, нейросенсорная
  - д) амортизирующая, опорно-удерживающая
- 274 Пациента в состоянии гипергликемической комы:
- а) необходимо госпитализировать
  - б) не госпитализируют
  - в) необходимо активно наблюдать на дому
  - г) госпитализировать только после выведения из комы
- 275 Первичный элемент поражения при остром герпетическом стоматите носит название:
- а) афта
  - б) корка
  - в) папула
  - г) эрозия
  - д) пузырек
- 276 Недостаточное насыщение ротовой жидкости гидроксиапатитом и фторапатитом характерно для:
- а) гипоплазии
  - б) эрозии эмали
  - в) кариеса
  - г) флюороза
  - д) гиперплазии
- 277 Системная гипоплазия эмали проявляется на зубах одного срока:
- а) закладки
  - б) минерализации
  - в) прорезывания
  - г) реминерализации

- 278 Клиническая картина эрозии зуба -это:
- а) дефект твердых тканей с признаками деминерализации, шероховатым дном и стенками
  - б) дефект в форме клина у шеек зубов на щечных и губных поверхностях
  - в) овальный или округлый дефект эмали на наиболее выпуклой части вестибулярной поверхности коронки
  - г) потеря блеска эмали, образование меловидных пятен с последующим образованием дефекта
  - д) пятна белого или желтоватого оттенка на всей поверхности эмали
- 279 Ценность человеческой жизни в биомедицинской этике определяется:
- а) возрастом (количество прожитых лет)
  - б) расовой и национальной принадлежностью
  - в) финансовой состоятельностью
  - г) уникальностью и неповторимостью личности
- 280 Стенокардические боли носят характер:
- а) колющих
  - б) сжимающих, давящих за грудиной
  - в) постоянных ноющих в левой половине грудной клетки
  - г) интенсивных болей за грудиной, более 20 минут, не купирующихся приемом нитроглицерина
- 281 В России трансплантация может проводиться без согласия донора, если донор:
- а) особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение
  - б) гражданин страны, находящейся в состоянии войны с Россией
  - в) психически неполноценный
  - г) донор — умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов
- 282 Воспаление межзубной, маргинальной, части или всей альвеолярной десны характерно для:
- а) пародонтита легкой степени
  - б) пародонтита средней степени
  - в) пародонтита тяжелой степени
  - г) пародонтоза средней степени
  - д) пародонтоза тяжелой степени
- 283 Индекс CP1TN у взрослых — это показатель:
- а) зубного налета
  - б) зубного камня
  - в) кровоточивости
  - г) пародонтальных карманов
  - д) нуждаемости в лечении заболеваний пародонта
- 284 Целью стоматологического просвещения является:
- а) изучение стоматологической заболеваемости населения
  - б) выявление факторов риска возникновения стоматологических заболеваний
  - в) определение уровня гигиены полости рта среди различных контингентов населения
  - г) мотивация населения к поддержанию стоматологического здоровья

- 285 Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться:
- а) на основании свободного, осознанного и информированного согласия больного
  - б) на основании медицинских показаний
  - в) на основании редкости картины заболевания и его познавательной ценности
  - г) на основании требования родственников
- 286 Региональные программы профилактики стоматологических заболеваний в России проводятся компаниями:
- а) «Кока-кола»
  - б) «Колгейт», «Ригли»
  - в) «Джонсон @ Джонсон»
  - г) СТАР
- 287 К первичной профилактике заболеваний пародонта относится:
- а) диагностика и устранение аномалий прикрепления уздечек верхней и нижней губы, языка, преддверия полости рта
  - б) предотвращение или устранение формирования кариесогенной ситуации в полости рта
  - в) профилактика и своевременное лечение аномалий прикуса
  - г) создание условий для нормального формирования и первичной минерализации твёрдых тканей зуба
- 288 Меловидно-крапчатая форма флюороза:
- а) наличием хорошо выраженных меловидных пятен без полосок
  - б) появлением небольших меловидных полосок-штрихов
  - в) хорошо очерченными пигментированными пятнами и крапинками на фоне матовой эмали
  - г) на фоне выраженной пигментации эмали участками с ее отсутствием
  - д) изменением формы коронки вследствие эрозивного разрушения и стирания
- Меловидно-крапчатая форма флюороза:
- а) наличием хорошо выраженных меловидных пятен без полосок
  - б) появлением небольших меловидных полосок-штрихов
  - в) хорошо очерченными пигментированными пятнами и крапинками на фоне матовой эмали
  - г) на фоне выраженной пигментации эмали участками с ее отсутствием
  - д) изменением формы коронки вследствие эрозивного разрушения и стирания
- 289 Внеротовое стоматологическое обследование включает осмотр:
- а) кожных покровов лица и шеи, регионарных лимфатических узлов, височно-нижнечелюстного сустава
  - б) преддверия полости рта, уздечек верхней и нижней губы, твердых тканей зубов
  - в) кожных покровов лица и шеи, преддверия полости рта, определение вида прикуса
  - г) тканей пародонта, слизистой оболочки полости рта, твердых тканей зубов
- 290 Последовательность проведения стоматологического обследования пациента:
- а) перкуссия зубов, пальпация мягких тканей полости рта, анамнез заболевания
  - б) анамнез жизни, внуритотовое обследование, жалобы
  - в) внуритотовое обследование, анамнез заболевания, перкуссия зубов
  - г) жалобы, сбор анамнеза, внуритотовое и внуритотовое обследование

- 291 Кандидоз развивается на фоне длительного приема:
- а) ферментов
  - б) антибиотиков
  - в) поливитаминов
  - г) кератопластиков
  - д) нейрорепарантов
- 292 Минерализация («созревание») эмали после прорезывания зуба наиболее активно протекает в течение:
- а) 2 лет
  - б) 5 лет
  - в) 10 лет
  - г) всей жизни
- 293 По «правилу циферблата» зона работы врача располагается между:
- а) 12.00 и 5.00
  - б) 2. 5.00 и 8.00
  - в) 12.00 и 2.00
  - г) 8.00 и 12.00
- 294 Какой ион способен изоморфно включаться в состав апатита?
- а) бора
  - а) брома
  - б) фтора
  - в) хлора
- 295 Характер дыхания пациента при альвеолярном отеке легких:
- а) клочущее
  - б) грубое сухое
  - в) слабое поверхностное
  - г) везикулярное
- 296 Пациентам с брекет-системами для наиболее эффективного очищения пространства между дугой и зубами рекомендуется использовать:
- а) зубочистки
  - б) суперфлоссы
  - в) электрическую зубную щетку
  - г) мануальную зубную щетку
- 297 К производным бигуанида относятся:
- 1) алексидин
  - 2) аспирин
  - 3) нистатин
  - 4) хлоргексидин
- 298 Срок хранения инструментов и материалов в комбинированных (ламинат + бумага) прозрачных пакетах, закрытых термосшивателями, составляет:
- а) 1 неделю
  - б) 3 недели
  - в) 1 год
  - г) 5 лет
- 299 Недостатками хлоргексидина является
- 1) антисептическое действие
  - 2) неприятный вкус
  - 3) окрашивание зубов в жёлтый цвет
  - 4) преципитация на эмали зуба

300 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:

- а) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
- б) лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей,
- в) в целях проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях;
- г) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения