

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ»**

**(для медицинских сестёр детских оториноларингологических отделений и кабинетов,
прошедших обучение по циклам "Сестринское дело в детской оториноларингологии",
профессиональной переподготовки по специальности
«Сестринское дело в педиатрии»)**

- 1 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:
 - а) две
 - б) три
 - в) четыре
 - г) пять
- 2 Методы исследования слуха:
 - а) вестибюлометрия
 - б) отоскопия
 - в) аудиометрия
 - г) вращательная проба
- 3 При гортанной ангине воспалительный процесс затрагивает:
 - а) ткани мягкого неба
 - б) слизистую надгортанника
 - в) слизистую подсвязочной области
 - г) трахею
- 4 Серная пробка удаляется из слухового прохода:
 - а) Промыванием слухового прохода стерильным физ. раствором.
 - б) Промыванием после предварительного закапывания раствора H_2O_2
 - в) Механическим удалением серной пробки крючком
 - г) Всё вышеперечисленное верно
- 5 После удаления небных миндалин на диспансерном учете дети находятся в течение:
 - а) 1 месяца
 - б) 6 месяцев
 - в) 1 года
 - г) 5 лет
- 6 При оперативном лечении доброкачественных опухолей гортани используется доступ:
 - а) через ларингофиссуру
 - б) эндоскопический подход
 - в) подход под местной анестезией
 - г) операция Крайля
- 7 Отёк тканей шеи и увеличение шейных лимфоузлов является симптомом:
 - а) Ангины Симановского-Венсана
 - б) Агранулоцитарной ангины
 - в) Дифтерии
 - г) Герпетической ангины
 - д) Всё вышеперечисленное верно

- 8 Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью, относятся к классу:
- а) А
 - б) Б
 - в) В
 - г) Г
- 9 Какие отделы носа наиболее часто вызывают носовые кровотечения:
- а) носовые раковины
 - б) дно полости носа
 - в) придаточные пазухи
 - г) зона Киссельбаха
- 10 Метод отоакустической эмиссии используется:
- а) для диагностики воспалительных заболеваний уха
 - б) для диагностики нарушений слуха
 - в) для экспресс-диагностики нарушений слуха
 - г) для диагностики вестибулярных нарушений
 - д) Всё вышеперечисленное верно
- 11 Цель санитарного просвещения:
- а) формирование высокой санитарной культуры, сознательного гигиенического поведения граждан
 - б) нетерпимое и критичное отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к условиям окружающей среды, наносящим ущерб здоровью
 - в) правильное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленное на выздоровление
 - г) овладение знаниями, необходимыми для соблюдения правил гигиенического поведения
- 12 Иннервация гортани осуществляется ветвями:
- а) Языкоглоточного нерва
 - б) Блуждающего нерва
 - в) Кохлеарного нерва
 - г) Варианты А, Б
- 13 Какой метод обследования наиболее информативен для диагностики заболеваний гортаноглотки:
- а) Диафаноскопия
 - б) Эндоскопия
 - в) Отоскопия
 - г) Импедансометрия
- 14 Сестринские рекомендации родителям ребёнка после перенесенной респираторной инфекции включают:
- а) щадящее закаливание
 - б) длительное применение интерферона
 - в) постоянное полоскание зева отваром шалфея
 - г) обработку зева раствором Люголя

- 15 Профилактика гриппа включает в себя:
- а) прием антибиотиков
 - б) регулярное полоскание зева
 - в) проведение ароматерапий
 - г) сезонную вакцинопрофилактику
- 16 Причиной истинных парезов и параличей гортани являются:
- а) травмы, ушибы
 - б) ятрогенные причины
 - в) функциональные причины
 - г) онкопатология
- 17 Глотка расположена:
- а) между основанием черепа и II шейным позвонком;
 - б) между основанием черепа и IV шейным позвонком;
 - в) между основанием черепа и входом в пищевод;
 - г) между II и IV шейным позвонком;
 - д) между I и II шейным позвонком
- 18 Первоочередной эвакуации подлежат пораженные сортировочной группы:
- а) первой
 - б) второй
 - в) третьей
 - г) четвертой
- 19 Этиология миопатических парезов гортани следующая:
- а) функциональные причины
 - б) травмы гортани
 - в) соматические заболевания
 - г) медицинские манипуляции
- 20 Перечислите ангины при заболеваниях крови:
- а) агранулоцитарная;
 - б) ангина при лейкозах;
 - в) ангина при ВИЧ-инфекции;
 - г) сифилитическая ангина;
 - д) моноцитарная ангина
- 21 Причиной проникновения инфекции из носоглотки в среднее ухо является:
- а) отсутствие нижнего носового хода
 - б) недостаточное развитие придаточных пазух носа
 - в) короткие и широкие евстахиевы трубы
 - г) узкие носовые ходы
- 22 Гортанная ангина является заболеванием, связанным с:
- а) С подслизистым отёком надгортанника
 - б) Отёком подскладочным отд. гортани
 - в) Отёком голосовой щели
 - г) Всё вышеперечисленное верно
- 23 Причиной парезов голосовых складок чаще всего являются:
- а) Оперативные вмешательства
 - б) Травмы, Ушибы
 - в) Нарушение кровообращения центрального характера
 - г) Голосовые перегрузки

- 24 Для временной остановки венозного наружного кровотечения применяют
- а) пальцевое прижатие артерии на протяжении
 - б) наложение жгута
 - в) максимальное сгибание конечности
 - г) наложение давящей повязки
- 25 В каких случаях гортаноглотку осматривают с использованием местной анестезии:
- а) при неадекватном поведении больного
 - б) при повышенном рвотном рефлекс
 - в) при повышенном болевом рефлекс
 - г) при отеке гортаноглотки
- 26 Хондропериондрит гортани развивается как:
- а) Самостоятельное заболевание
 - б) Результат травмы, ушиба
 - в) Функциональное
 - г) Порок развития
- 27 Сестринский процесс при ОРВИ предполагает:
- а) постельный режим, смену белья, теплое питье
 - б) измерение диуреза, артериального давления (АД)
 - в) прием противовирусных препаратов
 - г) повышение калорийности пищевого рациона
- 28 В классификации стенозов гортани выделяют:
- а) 5 стадий;
 - б) 2 стадии;
 - в) 3 стадии;
 - г) 4 стадии
- 29 Какая ларингоскопическая картина характерна для рака гортани?
- а) бугристая поверхность;
 - б) широкое основание;
 - в) гладкая поверхность опухоли;
 - г) основание - тонкая ножка;
 - д) изъязвления
- 30 При лечении синуситов антибиотики:
- а) не показаны
 - б) показаны во всех случаях
 - в) при синуситах средней тяжести и тяжелых
 - г) при безпункционном ведении
- 31 Причинами сезонного аллергического ринита является:
- а) Шерсть домашних животных
 - б) Пыльца растений и деревьев
 - в) Клещ домашней пыли
 - г) Плесень
- 32 Ингаляцию при вирусном крупе проводят раствором:
- а) с лекарственными травами
 - б) с муколитиками
 - в) с бронхолитиками
 - г) со спазмолитиками

- 33 Серная пробка — это:
- а) результат несоблюдения гигиены
 - б) заболевание
 - в) аномалия слухового прохода
 - г) результат манипуляций в слуховом проходе и ношения ушной гарнитуры
- 34 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие пульса на:
- а) локтевой артерии
 - б) лучевой артерии
 - в) сонной артерии
 - г) бедренной артерии
- 35 Остов гортани составляет:
- а) Кости
 - б) Хрящи
 - в) Мышцы
 - г) Связки
- 36 Абсцессы гортаноглотки могут распространяться:
- а) в мозг
 - б) в придаточные пазухи
 - в) в средостение
 - г) в пищевод
- 37 Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции предусматривают:
- а) вакцинацию населения
 - б) антибиотикотерапию
 - в) санитарно-просветительную работу среди населения
 - г) изоляцию больных и инфицированных
- 38 Выберите метод лечения больных с паратонзиллярным абсцессом при наличии у них хронического тонзиллита:
- а) антибиотикотерапия;
 - б) вскрытие абсцесса;
 - в) абсцесстонзиллэктомия и тонзиллэктомия на противоположной стороне;
 - г) только местная терапия
- 39 Для голосообразования голосовая щель должна быть:
- а) открыта
 - б) закрыта по всей длине
 - в) закрыта в переднем и среднем отделе
 - г) закрыта в задней трети
- 40 К развитию сенсоневральной тугоухости приводят:
- а) воспалительные заболевания уха
 - б) осложнения отитов
 - в) внутричерепные осложнения
 - г) гипертоническая болезнь
- 41 Отогематома — это:
- а) воспаление ушной раковины в результате заболевания
 - б) результат травмы уха
 - в) аномалия развития
 - г) осложнения наружного отита

- 42 Перечислите симптомы простой формы хронического тонзиллита:
- а) небные дужки спаяны с миндалинами;
 - б) в миндалинах жидкий гной;
 - в) субфебрильная температура тела;
 - г) головная боль;
 - д) боли в области сердца
- 43 Механизмом передачи ротавирусной инфекции является:
- а) трансмиссивный
 - б) парэнтеральный
 - в) трансплацентарный
 - г) фекально-оральный
- 44 У детей раннего возраста (до 1 года) наблюдается следующий тип дыхания:
- а) диафрагмальный
 - б) смешанный
 - в) грудной
 - г) брюшной
- 45 Ангиофиброма носоглотки развивается:
- а) в возрасте 20-40 лет
 - б) у девушек 15-20 лет
 - в) у мальчиков 9-15 лет
 - г) в пожилом возрасте
- 46 Укажите симптомы, характерные для II стадии острого стеноза гортани:
- а) затруднение дыхания в покое;
 - б) затруднение дыхания при физической нагрузке;
 - в) ринорея;
 - г) дисфагия;
 - д) стридорозное дыхание
- 47 Жидкие лекарственные средства (настои, отвары) рекомендуется хранить в:
- а) морозильном отделении холодильника
 - б) холодильнике при температуре ниже 0 градусов
 - в) холодильнике при температуре +2 +6 градусов
 - г) тёмном месте при комнатной температур
- 48 Радикальная операция на среднем ухе выполняется:
- а) для улучшения слуха
 - б) для улучшения вестибулярной функции
 - в) санации уха
 - г) для профилактики внутричерепных осложнений
- 49 Какие из указанных симптомов характерны для фарингита?
- а) резкая боль в горле;
 - б) першение и дискомфорт в горле;
 - в) затруднение проглатывания слюны;
 - г) субфебрильная температура
- 50 Развитие риносинусита вызывается:
- а) плохим носовым дыханием
 - б) неадекватным лечением
 - в) эмпиемой пазухи
 - г) травмой носа

- 51 Функциональные нарушения голоса вызываются:
- а) Воспалением голос, складок
 - б) Воспалением ложных голосовых складок
 - в) Ограничение подвижности голосовых складок
 - г) Отёком голосовых складок
- 52 С чем сообщаются придаточные пазухи носа:
- а) с глазницей
 - б) друг с другом
 - в) с полостью носа
 - г) ни с чем не сообщаются
- 53 Изъятие органов и тканей от мертвого донора осуществляется в Российской Федерации:
- а) беспрепятственно в интересах науки и общества
 - б) согласно принципу “презумпция несогласия”
 - в) согласно принципу “презумпция согласия”
 - г) в соответствии с морально-религиозными ценностями
- 54 Симптомом, характерным для гайморита является:
- а) головная боль
 - б) обострение обоняния
 - в) полидипсия
 - г) экзикоз
- 55 Диспансерное наблюдение ребёнка с хроническим отитом проводится в течение:
- а) 1 года
 - б) 3 лет
 - в) 5 лет
 - г) до передачи во взрослую поликлинику
- 56 Сенсоневральная тугоухость — это:
- а) патология звукопроводящего аппарата уха
 - б) нарушение цепи слуховых косточек
 - в) нарушение звуковоспринимающего аппарата уха
 - г) нарушение в системе овального и круглого окна
- 57 К нарушениям вестибулярного аппарата не относятся:
- а) Нистагм
 - б) Тугоухость
 - в) Головокружение
 - г) Тошнота
- 58 У грудного ребёнка при остром отите боль усиливается при:
- а) приёме пищи
 - б) проведении туалета носа
 - в) физической нагрузке
 - г) надавливании на козелок
- 59 Острый мастоидит является:
- а) осложнением острого отита.
 - б) самостоятельным заболеванием
 - в) осложнением евстахеита.
 - г) воспаление структур внутреннего уха

- 60 Лабиринтит - это воспаление:
- а) глотки
 - б) наружного уха
 - в) внутреннего уха
 - г) гортани
- 61 Осложнения острых отитов:
- а) сенсоневральная тугоухость
 - б) тубарная дисфункция
 - в) мастоидит
 - г) диффузный наружный отит
- 62 Одностороннее поражение слухового нерва возникает при:
- а) скарлатине
 - б) кори
 - в) эпидемическом паротите
 - г) ветряной оспе
- 63 В каких случаях показана экстренная госпитализация пациента:
- а) Абсцесс глотки в стадии инфильтрации
 - б) Абсцесс глотки в стадии абсцедирования
 - в) Абсцесс глотки в стадии разрешения
 - г) Во всех случаях
- 64 При взятии мазка из уха при гнойном отите необходимо:
- а) провести туалет наружного слухового прохода
 - б) взять как можно больше гноя
 - в) предварительно закапать капли в ухо
 - г) предварительно пролечить антибиотиками
- 65 Продувание слуховых труб для восстановления слуха производится при:
- а) воспалении среднего уха
 - б) воспалении внутреннего уха
 - в) аденоидите
 - г) назофарингите
- 66 Выберите анатомические элементы, формирующие средний этаж гортани:
- а) надгортанник;
 - б) голосовые складки;
 - в) валекулы;
 - г) язычная миндалина
- 67 Холестеатома — это:
- а) проявление острого экссудативного отита
 - б) проявление хронического эпитимпанита
 - в) проявление хронического мезотимпанита
 - г) проявление лабиринтита
- 68 Возбудителем наружного отита чаще всего является:
- а) Бактерии
 - б) Вирусы
 - в) Грибы
 - г) Протозои

- 69 Показанием к оперативному лечению является:
- а) Ангины до 2 раз в год
 - б) Рецидивирующие фарингиты
 - в) Ангины Симановского-Венсана
 - г) Постоянные боли в глотке
- 70 Пункция верхнечелюстной пазухи показано:
- а) В случае осложнения
 - б) Во всех случаях
 - в) При затяжном течении
 - г) При рецидиве заболевания
- 71 Выберите причины отека гортани:
- а) атрофический ларингит;
 - б) аллергический ларингит;
 - в) инородное тело;
 - г) травмы
- 72 Остов гортани образуется:
- а) костями
 - б) хрящами
 - в) соединительной тканью
 - г) мягкими тканями шеи
- 73 Для современной модели профессиональной морали - биоэтики, основным принципом является:
- а) принцип "соблюдения долга"
 - б) принцип "не навреди"
 - в) принцип приоритета науки
 - г) принцип приоритета прав и уважения достоинства пациента
- 74 Каким видом ткани является небные и глоточные миндалины:
- а) Соединительной тканью
 - б) Лимфоидной тканью
 - в) Мышечной тканью
 - г) Железистой тканью
- 75 Предпочтительным положением больного после трахеотомии является:
- а) лежа на спине
 - б) лежа на боку
 - в) сидячее
 - г) полусидячее
- 76 Абсцессы мозга и мозжечка чаще:
- а) самостоятельные заболевания
 - б) осложнения воспалительных заболеваний уха
 - в) последствия вирусных заболеваний уха
- 77 Боли в глотке при глотании слюны беспокоят при:
- а) Ангине
 - б) Инфекционном мононуклеозе
 - в) Остром фарингите
 - г) Дифтерии
 - д) Всё вышеперечисленное верно

- 78 В начале приступа бронхиальной астмы у больных отмечается кашель:
- а) с выделением пенистой розовой мокроты
 - б) с выделением «ржавой» мокроты
 - в) сухой
 - г) с выделением стекловидной мокроты
- 79 Основные причины, вызывающие стойкие хронические стенозы гортани:
- а) доброкачественные и злокачественные опухоли;
 - б) сифилис;
 - в) аллергический отек;
 - г) параличи мышц гортани;
 - д) склерома
- 80 Биомедицинская этика и медицинское право должны находиться в состоянии:
- а) независимости
 - б) медицинское право - приоритетно
 - в) должен быть выдержан приоритет биомедицинской этики
 - г) биомедицинская этика - критерий корректности медицинского права
- 81 При кровотечении из уха до осмотра врача необходимо:
- а) почистить ухо ватным тампоном
 - б) закапать капли в ухо
 - в) ввести стерильный тампон в слуховой проход
 - г) промыть ухо с раствором перманганата калия
- 82 Голосовая щель имеет размеры:
- а) 30 мм
 - б) 20 мм
 - в) меньше 19 мм
 - г) 10 мм
- 83 Функциональные заболевания гортани характеризуются:
- а) гиперемией тканей гортани
 - б) ограничением подвижности голосовых складок
 - в) отеком тканей гортани
 - г) сужением просвета гортани
- 84 К симптомам вирусного крупа относится:
- а) влажный кашель
 - б) сухой «лающий» кашель
 - в) экспираторная одышка
 - г) дыхание Куссмауля
- 85 Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием...
- а) личность;
 - б) индивид;
 - в) человек;
 - г) индивидуальность;
 - д) субъект
- 86 Чем характеризуется III степень гипертрофии небных миндалин?
- а) миндалины увеличены на 1/3;
 - б) миндалины увеличены на 2/3;
 - в) миндалины соприкасаются друг с другом;
 - г) миндалины расположены за небными дужками;
 - д) миндалины у края небных дужек

- 87 Папилломатоз гортани вызывается:
- а) онковирусом
 - б) ассоциацией грибов и вирусов
 - в) спирохетой полости рта
 - г) бактериями полости рта
- 88 Острый фарингит – это воспалительный процесс слизистой:
- а) носовой полости
 - б) оболочки гортани
 - в) оболочки глотки
 - г) оболочки конъюнктивы
- 89 Гортань иннервируется ветвями:
- а) тройничного нерва
 - б) кохлеарного нерва
 - в) возвратного нерва
 - г) языкоглоточного нерва
- 90 Для купирования приступа стенокардии на доврачебном этапе нитроглицерин можно применять повторно с интервалом:
- а) 20-30 минут
 - б) 10-15 минут
 - в) 5-10 минут
 - г) 5 минут
- 91 Фурункул носа опасен:
- а) Рецидивом
 - б) Изменениями тканей наружного носа
 - в) Распространением процесса на придаточные пазухи
 - г) Внутричерепными осложнениями
- 92 Задняя тампонада носа выполняется:
- а) При кровотечении передних отделов носа
 - б) Если другие виды остановок кровотечений не состоятельны
 - в) При кровотечении из зоны Киссельбаха
 - г) При кровотечении из ветвей общей сонной артерии
- 93 Наиболее часто возникающим осложнением при ОРВИ является:
- а) синусит
 - б) гломерулонефрит
 - в) тугоухость
 - г) сфеноидит
- 94 При эпилептическом припадке:
- а) развитию судорог предшествует аура
 - б) припадок начинается внезапно
 - в) каждый припадок начинается своеобразно
 - г) развитию судорог предшествует психотравмирующая ситуация
- 95 Паратонзиллярный абсцесс является осложнением:
- а) Гортанной ангины
 - б) Ангины язычной миндалины
 - в) Ангины носоглоточной миндалины
 - г) Банальной ангины нёбных миндалин

- 96 Наиболее частым осложнением ринита у грудных детей является:
- а) отит
 - б) ангина
 - в) гайморит
 - г) плеврит
- 97 Туалет носа грудному ребёнку проводят:
- а) ватными жгутиками
 - б) ватными палочками
 - в) марлевой турундой
 - г) ватными шариками и пинцетом
- 98 Болезнь Менъера — это:
- а) воспалительное заболевание уха
 - б) разновидность лабиринтопатии
 - в) осложнение отитов
 - г) внутричерепное осложнение
- 99 Искусственный активный иммунитет формируется в результате:
- а) перенесенной инфекционной болезни
 - б) введения вакцины
 - в) приема бактериофага
 - г) введения иммуноглобулина
- 100 Симптомом, абсолютно характерным при попадании инородного тела в дыхательные пути, является:
- а) кашель
 - б) выделения из носа
 - в) кратковременная асфиксия
 - г) рвота, слюнотечение
- 101 Вирус Эпштейна-Барра является возбудителем:
- а) Банальных ангин
 - б) Ангин Симановского-Венсана
 - в) Агранулоцитарной ангины
 - г) Инфекционного мононуклеоза
- 102 Постановка цели и планирование сестринских вмешательств по решению проблем пациента - это этап сестринского процесса:
- а) первый
 - б) второй
 - в) третий
 - г) четвертый
- 103 Какие препараты являются приоритетными в лечении аллергических вазомоторных ринитов:
- а) сосудосуживающие средства
 - б) средства ирригационной терапии
 - в) эндоназальные кортикостероиды
 - г) иммуномодуляторы
- 104 Придаточные пазухи носа - это:
- а) Бухтообразные полости в костях черепа
 - б) Полости носа
 - в) Носовые раковины

- 105 Обязательное медицинское страхование - это:
- а) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи;
 - б) страховой риск, связанный с возникновением страхового случая;
 - в) обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи;
 - г) обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, целевым назначением которых является обеспечение прав застрахованного обеспечения
- 106 Клинические проявления полипов носа зависит от:
- а) размеров поражения
 - б) от гистологического строения полипов
 - в) от сопутствующих заболеваний
 - г) ни от чего не зависит
- 107 Заболеваемость хроническим ларингитом чаще:
- а) у лиц голосо-речевых профессий
 - б) у лиц женского пола
 - в) у лиц мужского пола
 - г) не зависит от пола
- 108 Диагноз невриномы слух нерва ставится на основании:
- а) импедансометрии
 - б) аудиометрии
 - в) вестибулометрии
 - г) КТ, МРТ
- 109 Перечислите симптомы, характерные для дифтерии глотки:
- а) грязно-серые налеты на небных миндалинах, дужках;
 - б) налеты с миндалин удаляются легко;
 - в) удаленная пленка не тонет в сосуде с жидкостью;
 - г) налеты распространяются на заднюю стенку глотки, в гортань;
 - д) при удалении налетов образуется эрозивная поверхность
- 110 К особым формам мастоидитов относятся:
- а) зигоматит
 - б) затяжное течение среднего отита
 - в) некротизирующий наружный отит
 - г) гнойный лабиринтит
- 111 Укажите наиболее частую локализацию паратонзиллярного абсцесса:
- б) передневерхняя;
 - в) боковая;
 - г) нижняя;
 - д) интратонзиллярная
- 112 Рекомендуемое положение ребёнка в постели при одышке:
- а) строго горизонтальное
 - б) с приподнятым изголовьем
 - в) с приподнятыми ногами
 - г) лежа на боку

- 113 К исследованиям слуховой функции не относится:
- а) импедансометрия
 - б) аудиометрия
 - в) отоакустическая эмиссия
 - г) вестибулометрия
- 114 Укажите миндалины, расположенные в носоглотке:
- а) язычная
 - б) небные
 - в) глоточная
 - г) трубные
- 115 Инфекция в среднее ухо попадает:
- а) со стороны слухового прохода
 - б) воздушно- капельным путем
 - в) через слуховую трубу
- 116 В анатомии трахеи различают:
- а) шейный и грудной отделы
 - б) брюшной отдел
 - в) гортанный отдел
 - г) пищеводный отдел
- 117 Длительность применения сосудосуживающих капель в нос составляет:
- а) 3 дня
 - б) 1 неделю
 - в) 2 недели
 - г) 1 месяц
- 118 Показания к оперативному лечению по поводу искривления перегородки носа определяют:
- а) характер кривизны перегородки носа
 - б) сопутствующие заболевания носа
 - в) сопутствующие соматические заболевания
 - г) аллергические заболевания носа
- 119 К достоверным признакам внезапной остановки сердечной деятельности не относится:
- а) отсутствие пульса на сонных артериях
 - б) внезапная потеря сознания
 - в) отсутствие самостоятельного дыхания
 - г) отсутствие тонов сердца
- 120 Выберите метод радикального хирургического лечения больных хроническим тонзиллитом:
- а) двусторонняя тонзиллотомия;
 - б) двусторонняя тонзиллэктомия;
 - в) аденотомия;
 - г) вскрытие кисты миндалины;
 - д) удаление папилломы миндалины
- 121 Больные со стенозом гортани подлежат:
- а) плановой госпитализации в стационар
 - б) амбулаторному лечению
 - в) госпитализации в течение суток
 - г) экстренной госпитализации

- 122 Заглочный абсцесс чаще развивается в возрастном периоде:
- а) преддошкольном
 - б) младшем школьном
 - в) пубертатном
 - г) юношеском
- 123 Длительность заболевания острым синуситом у взрослых составляют:
- а) 2-3 Недели
 - б) 1 месяц
 - в) до 12 недель
 - г) свыше 12 недель
- 124 Ведущий фактор, приводящий к развитию хронических заболеваний гортани:
- а) Экологические факторы
 - б) Курение
 - в) Воспалительные заболевания пазух носа
 - г) Наследственность
- 125 Правильным определением этики как науки является:
- а) этика - наука об отношении живых существ между собой
 - б) этика - наука о природе и смысле моральных взаимоотношений и нравственных принципов
 - в) этика - наука о минимизировании зла в человеческих отношениях
 - г) этика - наука об умении правильно себя вести в обществе
- 126 С использованием какого прибора проводят тимпанометрию:
- а) аудиометр
 - б) импедансометр
 - в) набор камертонов
 - г) ушной манометр
- 127 Что способствует формированию абсцессов в глотке:
- а) Кариозные зубы
 - б) Инфекционные заболевания
 - в) Рецидивирующие ангины
 - г) Снижение резистентности организма
 - д) Всё вышеперечисленное верно
- 128 Возможно ли консервативное лечение полипов носа:
- а) невозможно
 - б) возможно при использовании иммуномодуляторов
 - в) возможно при использовании эндоназальных кортикостероидных препаратов
 - г) возможно при использовании препаратов местной противовоспалительной терапии
- 129 В каком возрасте чаще развивается ретрофарингеальный (заглочный) абсцесс?
- а) в детском;
 - б) во взрослом;
 - в) неонатальном;
 - г) пожилым

- 130 Слухопротезирование показано:
- а) при снижении слуха на 30 Дб
 - б) при односторонней стойкой глухоте
 - в) при снижении слуха на 40-60 Дб
 - г) при полной глухоте
- 131 При катаральном ларингите выявляется:
- а) дисфония;
 - б) дыхательная недостаточность;
 - в) нарушение глотания;
 - г) кашель
- 132 Подсчет частоты дыхательных движений у детей проводят за (время в секундах):
- а) 10
 - б) 15
 - в) 30
 - г) 60
- 133 Длительность течения острого риносинусита:
- а) 10-14 дней
 - б) до 1 мес
 - в) 5-6 нед.
 - г) до 12 нед
- 134 Дифтерия лечится:
- а) антибиотиками пенициллинового ряда
 - б) антибиотиками цефалоспоринового ряда
 - в) макролидами
 - г) не лечится антибиотиками
- 135 Перечислите функции гортани:
- а) дыхательная;
 - б) обонятельная;
 - в) голосообразующая;
 - г) защитная;
 - д) резонаторная
- 136 При каких видах параличей гортани больные страдают от затрудненного дыхания:
- а) при правосторонних парезах
 - б) при левосторонних парезах
 - в) двусторонних
 - г) импатических
- 137 Число пораженных при территориальных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах):
- а) 10-50 пораженных
 - б) 50-500 пораженных
 - в) свыше 500 пораженных
 - г) до 10 пораженных
- 138 Основным симптомом отомикоза является:
- а) скудное гнойное выделение
 - б) глухота
 - в) зуд слухового прохода
 - г) острая боль

- 139 При ложном крупе отек тканей развивается на уровне:
- а) голосовых складок
 - б) выше голосовых складок
 - в) в подсвязочной области
 - г) в трахее
- 140 К носовым кровотечениям может приводить:
- а) заболевания кроветворных органов
 - б) гипертоническая болезнь
 - в) заболевания печени
 - г) все вышеперечисленные заболевания
- 141 Путем передачи вирусного гепатита В является:
- а) воздушно-капельный
 - б) пищевой
 - в) водный
 - г) трансплацентарный
- 142 Возбудителем ангины Симановского-Венсана является:
- а) стафилококк
 - б) стрептококк
 - в) веретенообразная палочка в симбиозе со спирохетой полости рта
 - г) синегнойная палочка
- 143 Укажите, в каком возрасте развивается ложный круп:
- а) детский;
 - б) взрослый;
 - в) пожилой;
 - г) подростковый;
 - д) юношеский
- 144 Лейкоцитоз до 30 млн в крови характерен:
- а) Фолликулярная ангина
 - б) Агранулоцитарной ангины
 - в) Инфекционного мононуклеоза
 - г) Ангина Симановского-Венсана
- 145 Сестринское вмешательство при ОРВИ для уменьшения симптомов интоксикации предполагает:
- а) оксигенотерапию
 - б) обильное теплое питье
 - в) калорийную диету
 - г) горчичное обёртывание
- 146 Мастоидит – это воспаление:
- а) носовой перегородки
 - б) придаточных пазух носа
 - в) сосцевидного отростка височной кости
 - г) лобных пазух носа
- 147 Осложнением заглоточного абсцесса у детей раннего возраста является:
- а) сепсис, стеноз гортани
 - б) снижение слуха
 - в) отёк век
 - г) диспептический синдром

- 148 Мастоидит — это:
- а) разновидность острого отита:
 - б) распространение воспалительного процесса на ячейки сосцевидного отростка
 - в) хронизация процесса
 - г) исход процесса
- 149 Симптомом фурункула носа является:
- а) ограниченная инфильтрация, болезненность
 - б) отсутствие интоксикации, гипотермия
 - в) стридорозное дыхание
 - г) снижение слуха, шум в ухе
- 150 Стеноз гортани вызывается:
- а) Сужением просвета гортани
 - б) Сужением трахеи
 - в) Спазмом бронхов
 - г) Спазмом мышц глотки
- 151 К анатомо-физиологическим особенностям органов дыхания новорожденного относятся:
- а) бронхи, трахея узкие
 - б) голосовая щель широкая
 - в) легкие эластичны, воздушны
 - г) слизистая оболочка скудно васкуляризирована
- 152 Лимфоаденоидное кольцо Пирогова выполняет функции:
- а) Глотательную
 - б) Дыхательную
 - в) Защитную
 - г) Разделительную
- 153 Согласно приказу МЗ РФ от 04.03.2003 №73 длительность реанимационных мероприятий составляет:
- а) не менее 15 минут
 - б) не менее 25 минут
 - в) не менее 30 минут
 - г) не менее 1 часа
- 154 При лечении риносинуситов используются:
- а) Местная терапия
 - б) Антибиотики и деконгестанты
 - в) Системная антибактериальная терапия
 - г) Сосудосуживающие средства
 - д) Всё вышеперечисленное верно
- 155 Выберите метод лечения при остром стенозе гортани IV стадии:
- а) трахеостомия;
 - б) коникотомия;
 - в) медикаментозное дестенозирование;
 - г) резекция гортани;
 - д) коникотомия с последующей трахеостомией
- 156 Сурдология — раздел отоларингологии, который занимается:
- а) всеми заболеваниями, приводящими к нарушениям слуха
 - б) гнойными заболеваниями слухового аппарата
 - в) сенсоневральными нарушениями слухового аппарата
 - г) только слухопротезированием

- 157 Показанием к наложению окклюзионной повязки является:
- а) ранение груди
 - б) гемоторакс
 - в) закрытые переломы ребер
 - г) ушибы грудной клетки
- 158 Оперативное лечение на среднем ухе показано:
- а) при наличии выделения из уха
 - б) при снижении слуха
 - в) для профилактики внутричерепных осложнений
 - г) при частых обострениях
- 159 Предпочтительным положением грудного ребёнка в кроватке при наличии у него ринита является:
- а) на спине
 - б) на животе
 - в) на боку с возвышенным изголовьем
 - г) коленно-кистевое
- 160 При аллергическом стенозе гортани II стадии применяется:
- а) трахеостомия;
 - б) медикаментозное дестенозирование;
 - в) коникотомия;
 - г) резекция гортани
- 161 Истечение ликвора из уха или носа является характерным признаком
- а) сотрясения головного мозга
 - б) сдавления головного мозга
 - в) перелома свода черепа
 - г) перелома основания череп
- 162 Для исследования гортани применяют методы:
- а) непрямая ларингоскопия;
 - б) фарингоскопия;
 - в) прямая ларингоскопия;
 - г) томография гортани;
 - д) стробоскопия
- 163 Какая из ангин сопровождается затруднением носового дыхания:
- а) Ангина язычной миндалины
 - б) Гортанной ангина
 - в) Ангина носоглоточной миндалины
 - г) Фолликулярная ангина
- 164 Сестринское вмешательство осуществляется на этапе:
- а) сбора информации
 - б) планирования сестринского ухода
 - в) реализации плана
 - г) оценки эффективности ухода
- 165 Пункция верхнечелюстной пазухи показана в случае:
- а) затяжного течения заболевания
 - б) при наличии клинических и рентгенологических показаний
 - в) во всех случаях синусита
 - г) при хроническом синусите

- 166 В лечении опухолей гортани используется:
- а) оперативное лечение
 - б) химиотерапия
 - в) рентгенотерапия
 - г) комплексная терапия
- 167 Симптомом аденовирусной инфекции является:
- а) атрофический фарингит
 - б) гингивит
 - в) глоссит
 - г) конъюнктивит
- 168 Каким категориям больных показано обучение пищеводному голосу:
- а) больных с двусторонними параличами гортани
 - б) больным с функциональной афонией
 - в) больным, перенесшим операцию ларингэктомию
 - г) больным с рецидивирующим папилломатозом гортани
- 169 Какой метод исследования применяется для осмотра гортани на первичном приеме лор-врача:
- а) Непрямая ларингоскопия
 - б) Прямая ларингоскопия
 - в) Фарингоскопия
 - г) Флуометрия
- 170 Рекомендации ребёнку с ларингитом предусматривают:
- а) горячее питье
 - б) голосовой режим
 - в) постельный режим
 - г) ограничение питья
- 171 Негнойные заболевания уха это:
- а) Евстахеит
 - б) Лабиринтит
 - в) Лабиринтопатия
 - г) Мiringит
- 172 Температура капель при закапывании в ухо (в градусах по Цельсию):
- а) 20-22
 - б) 24-30
 - в) 37-38
 - г) 42-45
- 173 Укажите, на сколько этажей делится гортань:
- а) два;
 - б) три;
 - в) четыре;
 - г) пять;
 - д) один
- 174 Симптомы лабиринтита — это:
- а) заложенность в ухе
 - б) гнойное течение из уха
 - в) снижение слуха
 - г) головокружение

- 175 Введение лекарственных средств в барабанную полость грудного ребёнка предусматривает применение:
- а) шпателя
 - б) ушной воронки
 - в) шприца
 - г) резиновой груши
- 176 При злокачественных опухолях гортани позднее диагностируются опухоли следующих локализаций:
- а) надскладочное пространство
 - б) область голосовых складок
 - в) подсвязочное пространство
 - г) область надгортанника
- 177 Какая артерия перевязывается при обильном кровотечении из распадающейся опухоли гортани?
- а) наружная сонная;
 - б) внутренняя сонная;
 - в) щитовидная;
 - г) небная;
 - д) язычная
- 178 Юношеская ангиофиброма носоглотки относится к:
- а) Злокачественным опухолям
 - б) Доброкачественным опухолям
 - в) Условно доброкачественным опухолям
 - г) Опухолоподобным заболеваниям
- 179 Какие антибиотики используют при лечении гнойных заболеваний гортани чаще всего:
- а) защищенные полусинтетические пенициллины
 - б) препараты левофлоксацина
 - в) меропенемы
 - г) биопарокс
- 180 Что способствует развитию аллергического ринита:
- а) анатомические особенности строения перегородки носа
 - б) воспалительные заболевания полости носа
 - в) снижение резистентности организма
 - г) неправильное лечение
- 181 В этиологии болезни Рейнке первопричиной считается:
- а) фактор экологии
 - б) курение
 - в) профессиональные вредности
 - г) голосовые перегрузки
- 182 Выберите устные средства санитарного просвещения:
- а) беседа, лекция
 - б) фотография, плакат
 - в) брошюра, журнал
 - г) бюллетень, буклет

- 183 Мазки из зева и носа на ВЛ берут:
- а) до завтрака, не допуская обработки ротовой полости
 - б) до завтрака, обработав ротовую полость
 - в) после завтрака и чистки зубов
 - г) в любое время суток, независимо от приема пищи
- 184 Укажите наиболее неблагоприятную локализацию рака гортани:
- а) голосовые складки;
 - б) вестибулярные складки;
 - в) подголосовое пространство;
 - г) область основания надгортанника;
 - д) область морганьевых желудочков
- 185 Певческие узелки являются разновидностью:
- а) хронического субатрофического фарингита
 - б) хронического гипертрофического ларингита
 - в) острого ларингита
 - г) перихондрита гортани
- 186 Внутрочерепные осложнения синуситов вызываются:
- а) вирулентностью возбудителя
 - б) особенностью анатомии пазух
 - в) отсутствием лечения
 - г) аллергизацией слизистых
- 187 Оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке на фоне инъекции начинают с:
- а) прекращения введения аллергена
 - б) придания дренажного положения пострадавшему
 - в) введения адреналина
 - г) применения пузыря со льдом на место инъекции
- 188 Для проведения обратной ларингоскопии необходимо приготовить:
- а) гортанное зеркало
 - б) ларингоскоп
 - в) шпатель
 - г) носовое зеркало
- 189 Какую связку рассекают при коникотомии?
- а) шило-подъязычную;
 - б) перстне-щитовидную;
 - в) язычно-надгортанную;
 - г) черпало-надгортанную;
 - д) перстне-трахеальную
- 190 Сестринское вмешательство при сухом кашле на фоне ОРВИ предполагает:
- а) постуральный дренаж
 - б) прием мукалтина
 - в) горчичное обертывание
 - г) паровую ингаляц

- 191 Выберите симптомы, характерные для гипертрофии глоточной миндалины:
- а) постоянное затруднение носового дыхания;
 - б) ночью ребенок спит с открытым ртом;
 - в) частые носовые кровотечения;
 - г) головная боль;
 - д) диспепсия
- 192 Наружный диффузный отит лечится в основном:
- а) Местная терапия
 - б) Системная антибиотика терапия
 - в) Хирургическим путём
- 193 При остром среднем отите больного беспокоят:
- а) Заложенность уха, выделение из слухового прохода
 - б) Сильные стреляющие боли.
 - в) Шум в голове, звон.
 - г) Тупые ноющие боли в ухе
- 194 Профилактика тяжёлой реакции на госпитализацию у ребёнка 1 года жизни включает:
- а) раздельное пребывание матери и ребёнка
 - б) отвлечение игрушкой
 - в) госпитализацию матери с ребёнком
 - г) проведение терапевтической игры
- 195 Сестринские рекомендации при влажном кашле включают:
- а) постуральный дренаж
 - б) прием коделака
 - в) паровые ингаляции
 - г) оксигенотерапию
- 196 К каким осложнениям может приводить фурункул носа:
- а) дерматит кожи носа
 - б) общий фурункулез
 - в) внутричерепным осложнениям
- 197 Развитию отитов у детей способствует:
- а) особенности анатомии детского возраста
 - б) снижение резистентности организма
 - в) неадекватное лечение
- 198 Укажите объективные признаки гиперкератоза, лептотрихоза глотки:
- а)слизистая оболочка миндалин ярко гиперемирована;
 - б) на поверхности миндалин видны остроконечные белые шипы;
 - в) слизистая оболочка миндалин инфильтрирована;
 - г) стекловидный отек uvulae
- 199 Отосклероз — это:
- а) аномалия развития уха
 - б) исход воспалительного заболевания уха
 - в) самостоятельное заболевание
 - г) внутричерепное осложнение
- 200 Ложный круп развивается чаще всего:
- а) постепенно в течение дня
 - б) неожиданно ночью
 - в) независимо от времени суток

- 201 Наиболее информативными методами обследования гортаноглотки в настоящее время являются:
- а) непрямая ларингоскопия
 - б) прямая ларингоскопия
 - в) фиброларингоскопия
 - г) рентгенологическое обследование
- 202 Воспалительные заболевания наружного уха — это:
- а) острый средний отит
 - б) фурункул уха
 - в) мастоидит
 - г) лабиринтит
- 203 Для профилактики ангин рекомендуется:
- а) системное назначение антибиотиков
 - б) промывание лакун небных миндалин
 - в) тубус-кварц глотки
 - г) иммунопрофилактика
- 204 Для болезни Меньера характерно:
- а) длительное постепенное развитие
 - б) приступообразное течение
 - в) спонтанное выздоровление
- 205 Способность понимания психологических состояний других людей и сопереживание им, умение посмотреть на ситуацию глазами другого - это качество личности
- а) доброжелательность
 - б) открытость
 - в) конфронтация
 - г) эмпатия
 - д) аутентичность
- 206 Тактика сестринского вмешательства при носовом кровотечении включает:
- а) запрокидывание головы ребёнка назад
 - б) прикладывание тепла на область переносицы
 - в) наклон головы ребёнка вперед
 - г) проведение задней тампонады носа
- 207 В структуре ЛОР-заболеваний онкопатология чаще локализуется:
- а) в ухе
 - б) в носу и в придаточных пазухах
 - в) в глотке
 - г) в гортаноглотке
- 208 При каких заболеваниях образуются инфекционные гранулемы ЛОР-органов:
- а) сифилис;
 - б) гранулематоз Вегенера;
 - в) рак;
 - г) склерома
- 209 Выберите метод лечения при флегмонозном ларингите:
- а) консервативное;
 - б) хирургическое;
 - в) лучевая терапия;
 - г) химиотерапия

- 210 К негнойным заболеваниям уха относят:
- а) лабиринтит
 - б) лабиринтопатию
 - в) заболевания слуховой трубы
 - г) петрозит
- 211 После перенесённого инфекционного заболевания у ребёнка вырабатывается иммунитет:
- а) естественный, активный
 - б) искусственный, пассивный
 - в) естественный, пассивный
 - г) искусственный, активный
- 212 Фурункул слухового прохода обычно развивается:
- а) На нижней стенке
 - б) На верхней стенке
 - в) На передней стенке
 - г) На задней стенке
 - д) Все вышеперечисленные варианты
- 213 Клиническими симптомами паратонзиллита являются:
- а) асимметрия глотки, лихорадка
 - б) отсутствие интоксикации
 - в) снижение саливации
 - г) гипертензия
- 214 Кратковременная, бурно протекающая, чрезвычайно интенсивная эмоциональная реакция:
- а) фрустрация
 - б) аффект
 - в) настроение
 - г) депрессия
 - д) стресс
- 215 Перечислите миндалины, образующие лимфаденоидное глоточное кольцо Вальдеера-Пирогова:
- а) небные миндалины;
 - б) глоточная;
 - в) язычная;
 - г) трубные;
 - д) гортанные;
 - е) пейеровы бляшки
- 216 У больного с агранулоцитарной ангиной в крови:
- а) лейкоциты $30 \cdot 10^9$ г/л, мононуклеары
 - б) умеренный лейкоцитоз
 - в) лейкопения ниже 1 млн
 - г) эозинофилия
- 217 Для лечения наружных отитов используется:
- а) местная терапия
 - б) системная антибиотикотерапия
 - в) оперативная санация очага
 - г) дезинтоксикационная терапия

- 218 Трахеотомия выполняется обычно в положении больного:
- а) лежа на спине с валиком в грудном отделе
 - б) сидя
 - в) лежа на спине с валиком в поясничном отделе
 - г) лежа на спине с валиком под лопатками
- 219 При остром гнойном лабиринтите показана:
- а) санирующая операция на среднем ухе
 - б) санирующая операция на лабиринте
 - в) мастоидотомия
 - г) консервативное лечение
- 220 Основным симптомом ларингоспазма является:
- а) дыхание Биота
 - б) насморк
 - в) стридорозное дыхание
 - г) обильная мокрота
- 221 Какие причины вызывают развитие рецидивирующего папилломатоза гортани у детей:
- а) Хим. канцерогены
 - б) Экологические факторы
 - в) Вирусы
 - г) Рентгеновское излучение
- 222 Хондроперихондрит гортани развивается как:
- а) самостоятельное заболевание
 - б) результат травмы, ушиба
 - в) функциональное заболевание
 - г) воспалительное заболевание
- 223 Хронический средний отит — это:
- а) мастоидит
 - б) мезотимпанит
 - в) евстахеит
 - г) лабиринтит
- 224 Вскрытие фурункула слухового прохода производится на стадии:
- а) Инфильтрации
 - б) Абсцедирование
 - в) Инволюции
- 225 Репозиция костей носа после травмы показана до:
- а) 3 дней
 - б) 7 дней
 - в) 10 дней
 - г) 1 месяца
- 226 Выберите метод хирургического лечения при аденоидах III степени:
- а) аденотомия;
 - б) тонзиллотомия;
 - в) тонзиллэктомия;
 - г) удаление кисты миндалин
- 227 Какие заболевания гортани относят к предраковым заболеваниям:
- а) парез голосовых складок
 - б) фонастения
 - в) гортанная ангина
 - г) пахидермия гортани

- 228 Сипота голоса является симптомом:
- а) воспалительного заболевания глотки
 - б) заболевания гортани и трахеи
 - в) заболевания только гортани
 - г) заболевания органов грудной клетки
- 229 Для восстановления носового дыхания ребёнку через 3-4 недели после аденотомии необходимо порекомендовать:
- а) исключение физической нагрузки
 - б) дыхательную гимнастику
 - в) посещение бассейна
 - г) проведение ароматерапии
- 230 На доврачебном этапе (при отсутствии ЭКГ) можно думать о начавшемся инфаркте миокарда, если приступ стенокардии не купируется приемом нитроглицерина в течение:
- а) 20 - 30 минут
 - б) 30 минут - 1 часа
 - в) 1,5-2 часа
 - г) суток
- 231 Аллергический ринит проявляется:
- а) Гноетечение из носа
 - б) Боли в полости носа
 - в) Заложенность носа
 - г) Кашель
- 232 Диспансерное наблюдение у ЛОР-врача 4 раза в год показано при:
- а) хроническом эпитимпаните
 - б) хроническом мезотимпаните
 - в) рецидивирующим отите
 - г) кохлеарномневрите
- 233 Укажите возможные осложнения ангин:
- а) паратонзиллит;
 - б) отит;
 - в) этмоидит;
 - г) парафарингит;
 - д) бронхит;
 - е) сепсис
- 234 Сестринский процесс при аллергическом рините предусматривает:
- а) соблюдение гипоаллергической диеты
 - б) применение антигистаминных препаратов
 - в) проведение ароматерапии
 - г) прием противовирусных препаратов
- 235 Перечислите объективные признаки хронического тонзиллита:
- а) передние небные дужки застойно гиперемированы и спаяны с миндалинами;
 - б) лакуны зияют;
 - в) в лакунах гнойное содержимое;
 - г) на миндалинах некротические налеты;
 - д) регионарные лимфоузлы увеличены

- 236 Рецидивы при оперативном лечении полипов:
- а) часто
 - б) редко
 - в) не бывают
 - г) бывают при отсутствии противорецидивного лечения в послеоперационном периоде
- 237 Выберите симптомы, характерные для паратонзиллярного абсцесса:
- а) отек боковой поверхности шеи;
 - б) спазм жевательной мускулатуры;
 - в) асимметрия зева;
 - г) резкая односторонняя боль в горле;
 - д) гипоксия
- 238 Укажите причины острого стеноза гортани:
- а) опухоли;
 - б) травмы гортани;
 - в) острый ларингит;
 - г) аллергический отек;
 - д) инородное тело
- 239 Метод отоакустической эмиссии используется для диагностики:
- а) в любом возрасте
 - б) в пожилом возрасте
 - в) в раннем детском возрасте
 - г) в зрелом возрасте
- 240 Отсутствие речи у ребёнка в 3 года предполагает консультацию у:
- а) логопеда
 - б) эндокринолога
 - в) невролога и отоларинголога
 - г) стоматолога
- 241 Пищеводный голос -это:
- а) Симптом нарушения голоса
 - б) Навык человека, перенёсшего удаление гортани
 - в) Вредная привычка
 - г) Искусственная голосообразование
- 242 Выберите симптомы, характерные для IV стадии стеноза гортани:
- а) дыхание редкое, поверхностное;
 - б) дыхание частое, глубокое;
 - в) бледные покровы кожи;
 - г) больной без сознания;
 - д) снижение артериального давления
- 243 Отек какого отдела гортани возникает при ложном крупе:
- а) вестибулярного;
 - б) голосового;
 - в) подголосового;
 - г) в области валекул
- 244 При рецидивирующем папилломатозе гортани показано:
- а) консервативное лечение
 - б) оперативное лечение
 - в) противорецидивное лечение
 - г) физиотерапии

- 245 Субпериостальный абсцесс — это:
- а) абсолютный признак мастоидита
 - б) исход заболевания
 - в) самостоятельное заболевание мягких тканей
 - г) осложнение фурункула слух, прохода
- 246 Целью сестринского процесса является:
- а) оценка тяжести заболевания
 - б) установление причины заболевания
 - в) удовлетворение основных потребностей пациента
 - г) осуществление очередности лечебных мероприятий
- 247 Определение проблем пациента, возникающих в связи с заболеванием, это этап сестринского процесса:
- а) второй
 - б) первый
 - в) третий
 - г) четвертый
- 248 В России трансплантация может проводится без согласия донора, если донор:
- а) особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение
 - б) гражданин страны, находящейся в состоянии войны с Россией
 - в) психически неполноценный
 - г) донор — умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов
- 249 Показания к кохлеарной имплантации является:
- а) снижение слуха то 20 до 50 Дб
 - б) снижение слуха от 10 до 30 Дб
 - в) односторонняя глухота
 - г) двусторонняя выраженная тугоухость
- 250 Приступообразный спазматический кашель характерен для:
- а) вирусного крупа
 - б) дифтерийного крупа
 - в) коклюша
 - г) кори
- 251 Анатомические образования, с которыми латерально граничит глотка:
- а) сосудисто-нервный пучок;
 - б) шейные позвонки;
 - г) хрящи гортани;
 - д) околоушная слюнная железа
- 252 Возбудителем инфекционного мононуклеоза является:
- а) стафилококк
 - б) стрептококк
 - в) вирус Эпштейна-Барра
 - г) веретенообразная палочка

- 253 Медицинские работники имеют право на:
- а) оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
 - б) совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях;
 - в) соблюдение врачебной тайны;
 - г) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя
- 254 Кохлеарная имплантация — это:
- а) разновидность слухопротезирования
 - б) метод лечения тугоухости
 - в) система мероприятий, направленных на восстановление слуха
- 255 Контрастные ножные ванны проводятся с возраста:
- а) 1 года
 - б) 1,5-2 лет
 - в) 3 лет
 - г) 4 лет
- 256 Лимфоаденоидное кольцо глотки выполняет функцию:
- а) глотания
 - б) защитную
 - в) дыхательную
 - г) разделительную
- 257 Приоритетным в лечении аллергических ринитов являются:
- а) Антигистаминные препараты
 - б) Местные сосудосуживающие средства
 - в) Местная кортикостероидная терапия
 - г) Водно-солевые спреи
- 258 Для передней тампонады носа используют:
- а) резиновый жгут
 - б) марлевая турунда длиной 10 см
 - в) марлевая турунда 80-90 см
 - г) гемостатическая губка
- 259 Острые паратонзиллиты являются осложнениями:
- а) фарингита
 - б) ангины
 - в) туберкулеза глотки
 - г) перихондрита гортани
- 260 Что приводит к развитию сезонного аллергического ринита:
- а) использование эндоназальных сосудосуживающих средств
 - б) домашняя пыль
 - в) пыльца растений
 - г) шерсть, слюна домашних животных
- 261 Осложнением вирусного гепатита С является:
- а) дисбактериоз
 - б) цирроз печени
 - в) гломерулонефрит
 - г) сплениит

- 262 Основная функция трахеи:
- а) защитная
 - б) дренажная
 - в) дыхательная
 - г) резонансная
- 263 К каким осложнениям могут приводить абсцессы глотки при не своевременном лечении:
- а) к формированию капсулы абсцесса
 - б) К рецидиву
 - в) К медиастиниту
 - г) К самопроизвольному выздоровлению
- 264 Отосклероз проявляется в виде:
- а) склероз всех звукопроводящих структур уха
 - б) склероз барабанной перепонки
 - в) анкилоз стремени
 - г) склероз звуковоспринимающего аппарата
- 265 Второй этап сестринского процесса включает в себя:
- а) сбор информации
 - б) планирование сестринского процесса
 - в) определение сестринских проблем
 - г) оценку результатов
- 266 Какой нерв управляет двигательными волокнами мышц гортани?
- а) блуждающий нерв;
 - б) лицевой нерв;
 - в) тройничный нерв;
 - г) преддверно-улитковый нерв;
 - д) подъязычный
- 267 Онкопатология наиболее часто локализуется в следующих органах:
- а) Уха
 - б) Нос и его пазухи
 - в) Глотка
 - г) Гортань
- 268 Сфеноидит начинается с поражения пазухи:
- а) верхнечелюстной
 - б) клиновидной
 - в) решетчатого лабиринта
 - г) лобной
- 269 Сурдологический кабинет занимается лечением заболеваний:
- а) Лиц, перенёвших радикальную операцию.
 - б) Сенсонеуральных нарушений.
 - в) Глухоту детского возраста.
 - г) Все виды нарушения слуха
- 270 Причинами носовых кровотечений являются:
- а) Заболевания слизистой носа
 - б) Анатомические особенности носа
 - в) Соматические заболевания носа
 - г) Опухоли носа
 - д) Всё вышеперечисленное верно

- 271 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
- а) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
 - б) лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей,
 - в) в целях проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях;
 - г) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения
- 272 Неблагоприятным симптомом отека Квинке является:
- а) лихорадка
 - б) отёк гортани
 - в) головная боль
 - г) влажный кашель
- 273 При обмороке АД у больных:
- а) резко снижается
 - б) снижается постепенно в течении нескольких часов
 - в) не изменяется
 - г) резко повышается на несколько минут
- 274 Подсчет дыхательных движений у грудного ребёнка оптимально проводить:
- а) после сна
 - б) после кормления
 - в) при пеленании
 - г) во время сна
- 275 Фонопедическая коррекция-это:
- а) Метод лечения заболевания голоса
 - б) Физиотерапевтическая методика
 - в) ЛФК
 - г) Местная противовоспалительная терапия
- 276 Что определяет показания к аденотомии:
- а) размеры аденоидной вегетации
 - б) рецидивирующие отиты в анамнезе
 - в) частые простуды
 - г) другие причины
- 277 Развитию острого стенозирующего ларинготрахеита способствует:
- а) гиперсекреция бронхиального дерева
 - б) отёк подсвязочного пространства
 - в) спазм гладкой мускулатуры бронхов
 - г) слабый кашлевой толчок
- 278 Показанием к оперативному лечению хронического тонзиллита является:
- а) постоянные боли в глотке
 - б) ангины ежегодно 1 раз в год
 - в) ангины 2 раза в год
 - г) выделения из лакун гнойного отделяемого

- 279 Коникотомия показана:
- а) если участок асфиксии ниже трахеи
 - б) если участок асфиксии в грудном отделе трахеи
 - в) если нет времени на осуществлении типичной трахеотомии
- 280 Порог слышимости при лёгкой степени тугоухости составляет (в децибелах):
- а) не более 50
 - б) 60
 - в) 70-80
 - г) свыше 80
- 281 Диагноз хронического риносинусита ставится в случае:
- а) длительность заболевания до 12 нед.
 - б) заболевание повторяется 2-4 раза в году
 - в) длительность заболевания свыше 12 нед.
 - г) перерыв между обострениями меньше 12 нед.
- 282 При дифтерии налеты снимаются:
- а) с трудом, с образованием язвы
 - б) легко
 - в) с трудом, с образованием эрозии
 - г) налеты плотно фиксированы на поверхности
- 283 Основным в лечении парезов и параличей гортани является:
- а) медикаментозная терапия
 - б) физиотерапия
 - в) фonoпедическая коррекция
 - г) иглорефлексотерапия
- 284 Парацентез барабанной перепонки производится:
- а) Без анестезии
 - б) Под наркозом
 - в) Под инфильтрационной анестезией
 - г) Под местной анестезией смазыванием.
 - д) Всё вышеперечисленное верно
- 285 Исследование вестибулярной функции — это:
- а) импедансометрия
 - б) опыт Вальсальвы
 - в) тональная аудиометрия
 - г) калорическая проба
- 286 Здоровый образ жизни включает в себя:
- а) благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе поведенческой, гигиенические навыки
 - б) состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
 - в) принятие мер, направленных на снижение влияния вредных факторов на организм человека
 - г) привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом

- 287 Перечислите наиболее частые симптомы парафарингита:
- а) снижение слуха на стороне поражения;
 - б) тяжелое общее состояние, высокая температура;
 - в) вынужденное положение головы;
 - г) ригидность затылочных мышц;
 - д) односторонняя инфильтрация тканей шеи
- 288 Интенсивная терапия при стридорозном дыхании предусматривает:
- а) восстановление свободной проходимости дыхательных путей
 - б) введение сердечных гликозидов
 - в) введение диуретиков
 - г) бальнеотерапию
- 289 Хондроперихондриты гортани могут приводить:
- а) к обострению хронического ларингита
 - б) к рубцовой атрезии
 - в) к деформации шеи
 - г) к тиреоидиту
- 290 В возрасте 10 лет ребёнок I группы здоровья должен быть осмотрен:
- а) дерматологом
 - б) аллергологом
 - в) отоларингологом
 - г) гастроэнтерологом
- 291 Какой путь введения лекарственных препаратов предпочтителен при оказании помощи больным с анафилактическим шоком:
- а) внутривенный
 - б) внутримышечный
 - в) подкожный
 - г) ингаляционный
- 292 Перстневидный и щитовидный хрящ соединяются с помощью связки:
- а) эллиптической;
 - б) конической;
 - в) трапецевидной;
 - г) надгортанной
- 293 Аденоиды I-II степени могут считаться физиологической нормой до возраста:
- а) 3 лет
 - б) 7 лет
 - в) 12 лет
 - г) 16 лет
- 294 Первая медицинская помощь при вирусном крупе предусматривает:
- а) проведение паровых ингаляций
 - б) введение супрастина
 - в) горчичное обёртывание
 - г) проведение оксигенотерапии

- 295 Выберите метод остановки паренхиматозного кровотечения после двусторонней тонзиллэктомии:
- а) наложение лигатуры на кровоточащий сосуд;
 - б) введение гемостатического тампона в тонзиллярную нишу;
 - в) инфильтрация тканей тонзиллярной ниши раствором ново-каина с адреналином;
 - г) наложение зажима Микулича;
 - д) гемостатическая терапия
- 296 Выберите из указанных нозологических форм банальные ангины:
- а) катаральная;
 - б) моноцитарная;
 - в) лакунарная;
 - г) дифтеритическая;
 - д) коревая
- 297 Понятие “милосердие” включает в себя все, кроме:
- а) чувства и способности сострадания
 - б) готовность оказать помощь тому, кто в ней нуждается
 - в) снисходительность
 - г) готовность выполнить любую просьбу человека
- 298 Перечислите симптомы, характерные для фолликулярной ангины:
- а) гиперемия небных миндалин;
 - б) на поверхности миндалин видны желтовато-белые точки;
 - в) грязно-серые налеты на небных миндалинах;
 - г) болезненность регионарных лимфатических узлов;
 - д) выраженная интоксикация
- 299 Остеомы носа развиваются в:
- а) клиновидной пазухе
 - б) лобной пазухе
 - в) полости носа
 - г) в носоглотке
- 300 Профилактические прививки после обострения хронического отита проводятся через:
- а) 3 дня
 - б) 1 неделю
 - в) 1 месяц
 - г) 3 месяца