

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НАРКОЛОГИЯ»**

**(для фельдшеров по наркологии, прошедших обучение по циклам
"Наркология", профессиональной переподготовки по специальности
"Наркология")**

- 1 Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием...
 - а) личность;
 - б) индивид;
 - в) человек ;
 - г)индивидуальность;
 - д) субъект
- 2 Основные признаки коматозного состояния:
 - а) падение гемодинамики
 - б) угнетение дыхания
 - в) потеря мышечного тонуса
 - г) угнетение центральной нервной системы (ЦНС)
- 3 Медицинские работники имеют право на:
 - а)оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
 - б)совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях;
 - в)соблюдение врачебной тайны;
 - г)профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя
- 4 Мусситирующий делирий характеризуется:
 - 1.психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах постели;
 - 2.невнятным, бессвязным бормотанием;
 - 3.карфологическими нарушениями;
 - 4.возбуждением с совершением профессиональных действий;
 - 5.эпизодами кататонического возбуждения.
 - а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в)верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 5 Под изготовлением наркотических средств подразумевается действия, направленные на:
 - а) серийное получение наркотических средств
 - б) получение готовых к использованию и потреблению наркотических средств
 - в) культивирование растительного сырья для дальнейшего изготовления наркотических средств
 - г) изготовление психотропных препаратов

6 Острые интоксикационные психозы при злоупотреблении амфетаминами

чаще протекают по типу:

- 1.острого параноида;
 - 2.острого галлюциноза;
 - 3.делирия;
 - 4.онейроидногодобного состояния;
 - 5.аменции.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в)верно 2,4
г) верно все перечисленное

7 К гепатопротекторам относятся:

- а) галоперидол
- б) аминалон
- в) гептрапал
- г) но-шпа

8 Формирование состояния отмены свидетельствует о становлении:

- 1.начальной стадии наркомании;
 - 2.средней стадии наркомании;
 - 3.конечной стадии наркомании;
 - 4.синдрома физической зависимости;
 5. синдрома изменённой реактивности.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно 4

9 Основными задачами предрейсовых медицинских осмотров являются выявление у водителей:

- а) признаков употребления алкоголя
- б) признаков употребления наркотических средств и сильнодействующих веществ
- в) наличие у водителей симптомов острого заболевания или обострения хронического заболевания
- г) наличие у водителей хронических заболеваний

10 Характерными признаками интоксикации при употреблении кетамина являются:

- а) психомоторное возбуждение
- б) зрительные и слуховые галлюцинации
- в) нарушение речи
- г) потеря способности запоминать текущие события

11 Изменения личности у больных алкоголизмом обусловлены:

- 1.токсическим действием алкоголя и его метаболитов;
 - 2.длительностью заболевания;
 - 3.психореактивными факторами;
 - 4.преморбидными характерологическими особенностями;
 - 5.сопутствующей соматической патологией.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

12 Токсикомания – это заболевание, обусловленное употреблением:

- а) химических токсических веществ
- б) психотропных препаратов
- в) алкоголя
- г) наркотиков

13 Среди социальных факторов, влияющих на формирование алкоголизма, наиболее значимыми являются:

- 1.алкогольная политика государства;
 - 2.социальное положение индивидуума и его экономическая обеспеченность;
 - 3.устойчивые обычай ближайшего окружения;
 - 4.семейное положение
 - 5.расовая и этническая принадлежность.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

14 Результаты предрейсового медицинского осмотра заносятся в:

- а) журнал контроля трезвости
 - б) протокол осмотра водителя автотранспортного средства
 - в) путевой лист
- г) протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения

15 Для истинных запоев у больных алкоголизмом характерно:

- 1.отсутствие продрома запоя (изменение физического и психического состояния перед началом запоя);
 - 2.спонтанное появление интенсивного патологического влечения к алкоголю;
 - 3.отсутствие каких-либо расстройств в физической и психической сферах больного в динамике за поя;
 - 4.декомпенсация физического и психического состояния в процессе запоя и, особенно в конце запоя;
 - 5.появление на этапе 2ст. заболевания.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

16 Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Российской Федерации регламентируется:

- а) правилами внутреннего распорядка в ЛПУ
 - б) Указами Президента Российской Федерации
 - в) Федеральным законом Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах
- г) уголовным кодексом

17 К синдромам помрачения сознания могут быть отнесены следующие:

- а) оглушение
- б) делирий
- в) онейроид
- г) психоорганический синдром

- 18 Факторами риска развития зависимости от алкоголя у подростков являются:
- 1.тяжёлое материальное положение семьи;
 - 2.алкоголизм отца или матери;
 - 3.наличие соматической патологии;
 - 4.отсутствие эмоциональной привязанности и сплочённости между членами семьи, постоянная конфликтность взаимоотношений;
 - 5.определенная национальная принадлежность.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4
- 19 Для абстиненции при употреблении препаратов конопли характерно все перечисленное, кроме:
- а) неприятных ощущений в сердце
б) снижения настроения
в) артериальной гипертензии
г) тремора
- 20 Наркомания - это заболевание, вызванное употреблением:
- а) опиатов
б) препаратов конопли
в) препаратов стимулирующего действия
г) сильнодействующих препаратов
д) препаратов седативного действия
- 21 К обороту наркотических средств относятся:
- а) культивирование растений, содержащих наркотические вещества естественного происхождения
б) производство и изготовление наркотических средств
в) хранение, перевозка и пересылка наркотических средств
г) пропаганда употребления наркотиков
- 22 Для алкогольной энцефалопатии типа Корсаковского психоза характерно:
- 1.развитие после перенесённого состояния помрачения сознания ;
 - 2.появление невропатии нижних конечностей;
 - 3.наличие расстройств памяти с преобладанием фиксационной амнезии;
 - 4.полное отсутствие осознания болезни;
 - 5.острое начало болезни.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

- 23 К критериям синдрома зависимости по МКБ-10 относятся:
- 1.сильное желание или чувство насильтственной тяги к приёму вещества;
 - 2.физиологическое состояние отмены, при котором приём вещества прекращается или уменьшается , о чём свидетельствует характерный для вещества синдром отмены;
 - 3.нарушение способности контролировать приём вещества, т.е. начало употребления, окончание или дозировку употребляемых веществ;
 - 4.формирующаяся соматическая патология;
 - 5.социальная дезадаптация.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4
- 24 Выберите устные средства санитарного просвещения:
- а) беседа, лекция
б) фотография, плакат
в) брошюра, журнал
г) бюллетень, буклет
- 25 Для первой стадии алкоголизма наиболее характерна форма пьянства в виде:
- а) постоянного пьянства на фоне повышенной толерантности
б) коротких двух-трех дневных псевдозапоев
в) частых однодневных эксцессов
г) перемежающего пьянства
д) истинных запоев
- 26 Гарантированный объем помощи больным наркоманией включает:
- а) обследование
б) диагностику
в) стационарное лечение
г) санаторное лечение
- 27 ВИЧ-инфекция чаще возникает у наркоманов, употребляющих наркотики:
- а) внутривенно
б) перорально
в) не зависимо от способа введения
г) интраназально
- 28 Выраженные неврологические нарушения в виде симптомов орального автоматизма, спонтанного нистагма, гиперкинезов характерны для:
- а)Корсаковского психоза
б)энцефалопатии Гайе-Вернике
в)алкогольного параноида
г)алкогольного слухового галлюциноза
д)алкогольной паранойи
- 29 Клиническими признаками кокаиновой наркомании являются:
- а) повышение интеллектуальной деятельности
б) расширение зрачков, блеск глаз
в) тактильные галлюцинации
г) эпилептические припадки

30 В клинической структуре алкогольного абстинентного синдрома наиболее специфичным является:

- а)расстройство сна;
- б)аффективные проявления;
- в)вегетативные расстройства;
- г)вторичные формы влечения к алкоголю;

31 К дезинтоксикационным средствам относятся:

- 1.гипохлорит натрия;
 - 2.гемодез;
 - 3.сернокислая магнезия;
 - 4.апоморфин;
 - 5.кордиамин.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

32 Ранним называется алкоголизм, формирующийся в период:

- а) до 25 лет
- б) до 18 лет
- в) внутриутробного развития
- г) 6 – 7 лет

33 Здоровый образ жизни включает в себя:

- а)благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе поведенческой, гигиенические навыки
- б)состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
- в)принятие мер, направленных на снижение влияния вредных факторов на организм человека
- г)привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом

34 Больной О., 42 г. доставлен на консультацию к психиатру хирургом, который обнаружил, что больной спрятал большое количество кодеинсодержащего лекарства от кашля, когда поступил в больницу. Пять лет тому назад при операции на спине врачу пришлось прописать ему кодеин, чтобы облегчить боли. Однако, через пять лет он продолжал употреблять кодеинсодержащие таблетки и повысил дозу с 60 до 95 таблеток ежедневно. Пытался прекратить принимать кодеин, но не мог. Появилась раздражительность, тревога, бессонница. Что с больным?

- а)опийная наркомания
- б)гашишная наркомания
- в)алкоголизм
- г)кодеиновая зависимость
- д)первитиновая наркомания

35 Для абстиненции при употреблении антипаркинсонических препаратов характерно все вышеперечисленное, кроме:

- а) снижения настроения
- б) тремора
- в) тактильных галлюцинаций
- г) делириозных расстройств

- 36 При опьянении, вызванном употреблением наркотических или сильнодействующих веществ, выявляется все перечисленное, кроме:
- а) наличия следов инъекций
 - б) акроцианоза, гипергидроза
 - в) нистагма
 - г) запаха алкоголя изо рта
- 37 Сенестопатии- это:
- а)локализованные неприятные, тягостные ощущения;
 - б)необычные, часто алгические, ощущения с меняющейся локализацией;
 - в)тягостные болевые ощущения в утраченной конечности;
 - г)ягостные ощущения ползания насекомых, червей и т.п. под кожей, внутри тела
- 38 Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена:
- а)крепостью и качеством алкоголя;
 - б)культурально-этническими факторами;
 - в)поло-возрастным факторами;
 - г)активностью фермента алкогольдегидрогеназы,/АДГ/;
- 39 При терапии алкогольных делириев с особой осторожностью следует назначать:
- а) полионные растворы;
 - б)крово- и плазмозаменители;
 - в)транквилизаторы;
 - г)нейролептики;
- 40 Признаки употребления амфетаминов, кроме:
- а)излишняя двигательная активность
 - б)отсутствие чувство голода
 - в)нарушение режима сна
 - г)сенестопатии
 - д)сильное сексуальное раскрепощение
- 41 Для первой стадии делирия характерно:
- 1.наплывы ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях;
 - 2.развитие псевдогаллюцинаторных расстройств;
 - 3.расстройства сна, яркие сновидения;
 - 4.помрачение сознания;
 - 5.деперсонализация.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4
- 42 Для алкогольной комы характерно:
- 1.нарушение сознания;
 - 2.понижение температуры тела и появление цианоза;
 - 3.резкое снижение мышечного тонуса;
 - 4.повышение тонуса сердечно-сосудистой системы;
 - 5.двигательное возбуждение.
- 6.верно 1,2,3
 - 7.верно 1,3
 - 8.верно 2,4
 - 9.верно все перечисленное

43 Уголовная ответственность не предусматривается за:

- а) хищение наркотических лекарственных средств;
- б) незаконное изготовление, сбыт, хранение наркотических средств;
- в)потребление ПАВ без врачебного предписания;
- г)содержание притонов для потребления наркотиков, склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств

44 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений

и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:

- а)две
- б)три
- в)четыре
- г)пять

45 Чаще всего зависимость от ПАВ формируется у лиц:

- 1.с дефектами воспитания;
- 2.с личностными девиациями;
- 3.с нарушениями социальной адаптации;
- 4.с невысоким уровнем профессиональной ориентации;
- 5.с невысоким интеллектом.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в)верно 2,4
- г)верно все первое численное

46 Для алкогольной комы характерно:

- 1.нарушение сознания;
- 2.понижение температуры тела и появление цианоза;
- 3.резкое снижение мышечного тонуса;
- 4.повышение тонуса сердечно-сосудистой системы;
- 5.двигательное возбуждение.

- а)верно 1,2,3
- б)верно 1,3
- в)верно 2,4
- г)верно все перечисленное

47 При алкогольном слуховом галлюцинозе сознание:

- а)помрачено
- б)выключено
- в)ясное
- г)периодически-ясное, периодически-с периодами помрачнения
- д)с периодами помрачения

48 Синдром последствий при наркомании у подростков:

- 1.появляется быстро;
 - 2.опережает развитие собственно наркологической симптоматики;
 - 3.проявляется остановкой в психическом развитии уже на этапе систематического потребления наркотика;
 - 4.характеризуется нарушением закономерности психического и социального созревания;
 - 5.выражается формированием психоорганического синдрома с очень быстрым исходом в слабоумие.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

49 Параноидная форма патологического опьянения характеризуется :

- 1.наличием аффекта страха, доходящего до ужаса;
 - 2.иллюзорно-бредовым восприятием окружающего;
 - 3.внешне целенаправленной деятельностью;
 - 4.наличием фантастических сценоподобных галлюцинаций;
 - 5.делириозным расстройством сознания.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

50 Каким документом регламентированы стандарты оказания наркологической помощи:

- а) Приказ Министерства здравоохранения № 704 от 12.09.88г.
б) Приказы Министерства здравоохранения № 129, 131, 132, 133, 134, 135 от 04.09.2012г.
в) Постановление Правительства РФ № 234-ПП от 12.09.2014г.
г) Приказы Департамента здравоохранения № 346, 347, 348 от 04.09.2012г.

51 Полизависимость формируется при употреблении нескольких ПАВ, которые:

- 1.по типу действия на ЦНС обладают одинаковыми эффектами у больных;
 - 2.при комбинированном приёме способны усиливать действие друг друга;
 - 3.обладают разной продолжительностью действия;
 - 4.оказывают разнонаправленные эффекты;
 - 5.обладают одинаковой продолжительностью действия.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

52 О психопатоподобных изменениях личности наркомана свидетельствуют:

- а) колебания эмоционального фона и снижение интеллекта;
б)раздражительность, возбудимость, неспособность критически оценивать свои действия и сужения круга интересов;
в)неспособность критически оценивать свои действия и снижение интеллекта;
г) снижение интеллекта, сужение круга интересов

53 Перечислите виды патологического опьянения:

- а) сумеречное патологическое опьянение, параноидное патологическое
- б) опьянение
- в) дисфорическое опьянение
- г) депрессивное опьянение
- д) сомноленция
- е) абстинентный синдром

54 При терапии алкогольных делириев с особой осторожностью следует назначать:

- а) поливитаминные растворы;
- б) крово- и плазмозаменители;
- в) транквилизаторы;
- г) нейролептики;

55 Сужение зрачков характерно для:

- а) эфедроновой интоксикации
- б) опийного абстинентного синдрома
- в) гашишной интоксикации
- г) опийной интоксикации

56 Переход от эпизодического к систематическому злоупотреблению алкоголем проявляется в:

- а) учащении периодов опьянения
- б) изменении характера опьянения
- в) традиционно обусловленных эпизодах употребления алкоголя
- г) росте толерантности к алкоголю
- д) развитии выраженной интоксикации организма к алкоголю

57 К группе агонистов опиатных рецепторов не относятся:

- а) налоксон
- б) раствор из маковой соломки
- в) героин
- г) метадон

58 Способность понимания психологических состояний других людей и сопереживание им, умение посмотреть на ситуацию глазами другого - это качество личности

- а) доброжелательность
- б) открытость
- в) конфронтация
- г) эмпатия
- д) аутентичность

59 К транквилизаторам относятся:

- 1. производные бензамида;
 - 2. производные бензодиазепина;
 - 3. производные ГАМК;
 - 4. производные пропандиола;
 - 5. ингибиторы моноаминооксидазы.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4

- 60 Все листы журнала контроля трезвости должны быть:
- а) пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью организации и заверены подписью руководителя
 - б) заверены только подписью медицинского работника, проводящего предрейсовый медицинский осмотр
 - в) только пронумерованы
 - г) заверены только подписью руководителя организации
- 61 Клиника дисфорического варианта измененного простого алкогольного (острой алкогольной интоксикации) опьянения характеризуется:
- 1. состоянием напряженности, сопровождаемой недовольством, угрюмостью в сочетании с неприязнью и злобой;
 - 2. преобладанием подавленного настроения
 - 3. придиричивостью с агрессивностью;
 - 4. появлением суицидальных мыслей, сопровождаемых суицидальными действиями;
 - 5. моторной заторможенностью.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 62 При эпилептическом припадке:
- а) развитию судорог предшествует аура
 - б) припадок начинается внезапно
 - в) каждый припадок начинается своеобразно
 - г) развитию судорог предшествует психотравмирующая ситуация
- 63 Острые интоксикационные психозы при злоупотреблении амфетаминами чаще протекают по типу:
- 1. острого параноида;
 - 2. острого галлюциноза;
 - 3. делирия;
 - 4. онейроиднаподобного состояния;
 - 5. аменции.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 64 О распространенности пьянства и алкоголизма наиболее эффективно свидетельствует следующий показатель:
- а) рождаемость
 - б) смертность
 - в) количество абсолютного алкоголя, потребляемого на душу населения в год
 - г) количество состоящих на учете больных

65 Исходя из сложившихся классификаций, к острым металкогольным психозам относят:

- 1.алкогольный делирий;
- 2.алкогольный галлюциноз;
- 3.бредовые психозы;
- 4.алкогольную эпилепсию;
- 5.дипсоманию.

- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г)верно 4

66 Для острого алкогольного гепатита характерно:

- 1.состоиние общей интоксикации;
- 2.диспептические расстройства;
- 3.увеличение печени;
- 4.гиперхолестеринемия;
- 5.паренхиматозная желтуха.

- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

67 Для симптома снижения толерантности у больных алкоголизмом характерно:

- 1.появление признаков опьянения при употреблении привычных доз алкоголя;
- 2.переход на напитки с более низким содержанием алкоголя;
- 3.снижения разовой дозы алкоголя при сохранении суточной;
- 4.появление на этапе 2-3 ст. заболевания;
- 5.появление в картинах опьянения тотальных амнезий.

- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г)верно все перечисленное

68 Для алкогольной энцефалопатии типа Корсаковского психоза характерно :

- 1.развитие после перенесенного состояния помрачения сознания ;
 - 2.появление невропатии нижних конечностей;
 3. наличие расстройств памяти с преобладанием фиксационной амнезии;
 - 4.полное отсутствие осознания болезни;
 - 5.острое начало болезни.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г) верно 4

69 Алкогольная деградация личности проявляется:

- а) ослаблением памяти и утратой критики
б) разноплановостью мышления
в) морально-этическим снижением
г) эмоциональной амбивалентностью

70 К дезинтоксикационным средствам относятся:

- 1.гипохлорит натрия;
 - 2.гемодез;
 - 3.сернокислая магнезия;
 - 4.апоморфин;
 - 5.кордиамин.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

71 Для купирования состояния отмены (алкогольногоабстинентного синдрома)

обычно используются:

- 1.витаминные препараты;
 - 2.ноотропы;
 - 3.транквилизаторы;
 - 4.антибиотики;
 5. трихопол, фуразолидон.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

72 Состояние отмены при барбитуровой наркомании характеризуется:

1. дисфорическим аффектом;
 - 2.гиперрефлексией с мышечной гипертензией и мелким трепором;
 - 3.подъемом АД с последующей гипотензией вплоть до коллапсов;
 - 4.бессонницей;
 - 5.болями в желудке и крупных суставах.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

73 В «группу риска» входят водители:

- а) склонные к употреблению психоактивных веществ
б) длительно и часто болеющие
в) старше 40 лет
г) старше 55 лет

74 Для симптома снижения толерантности у больных алкоголизмом характерно:

- 1.появление признаков опьянения при употреблении привычных доз алкоголя;
 - 2.переход на напитки с более низким содержанием алкоголя;
 - 3.снижения разовой дозы алкоголя при сохранении суточной;
 - 4.появление на этапе 2-3 ст. заболевания;
 - 5.появление в картинах опьянения тотальных амнезий.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

75 Судорожные припадки в абстинентном синдроме характерны для:

- а) опийной наркомании
- б) гашишной наркомании
- в) эфедроновой наркомании
- г) барбитуровой наркомании

76 Больной С., 1952 г.р. в течение длительного времени употреблял алкоголь. После развода с женой употребление спиртного усилилось, имели место изменения личности. Эти нарушения привели к госпитализации. При осмотре: несколько раздражителен. Знает название больницы, в которой находится, но не знает дату, не может запомнить пять названий различных предметов. При неврологическом обследовании обнаружено небольшое снижение локтевых рефлексов, шаткость походки. Что с больным?

- а) алкогольный параноид
- б)энцефалопатия Гайе-Вернике
- в)корсаковский психоз
- г)атипичная картина опьянения
- д)алкогольный делирий

77 Для интоксикации опиоидными наркотиками характерно:

- а) бледность кожи
- б) покраснение кожи
- в) сужение зрачков
- г) расширение зрачков

78 Изменение картины опьянения у больных алкоголизмом обусловлено:

- 1.содержанием алкоголя в алкогольных напитках;
- 2.длительностью (тяжестью) заболевания;
- 3.технологией приготовления алкогольных напитков;
- 4.преморбидными характерологическими особенностями;
- 5.половыми различиями.

- а)верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в)верно 2,4
- г) верно все перечисленное

79 Объектом профилактики в наркологии являются:

- 1.больные люди, страдающие зависимостью от ПАВ;
- 2.подростки из неблагополучных семей;
- 3.подростки, замеченные в употреблении ПАВ;
- 4.все контингенты населения;
- 5.школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3,5
- в) верно 2,4
- г) верно 4

80 Амфетамины-это:

- а)наркотики, обладающие психостимулирующим действием
- б)вещества, обладающие депрессогенным эффектом
- в)вещества, вызывающие психоз по типу отравления ЛСД
- г)смесь смолы, пыльцы и измельченных верхушек конопли
- д)препараты, обладающие снотворным эффектом

- 81 Вербальные и пантомимические стигмы (ужимки, жаргон, уплощенный юмор) в статусе больных могут свидетельствовать:
- 1.о наличии токсической энцефалопатии;
 - 2.о признаках снижения уровня личности;
 - 3.о неблагоприятном микросоциальном окружении;
 - 4.об отравлении марганцово-кислым калием;
 - 5.об олигофрении.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г)верно все перечисленное
- 82 Ретроградная амнезия характеризуется:
- 1.фрагментарной утратой памяти;
 - 2.выпадением из памяти событий периода, следовавшего непосредственно после выхода из бессознательного состояния;
 - 3.отсутствием памяти на текущие события;
 - 4.выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию;
 - 5.потеря способности запоминать.
- а) верно 1,2, 3
б) верно 1,3
в)верно 2,4,5
г)верно 4
- 83 Для купирования состояния отмены (алкогольного абстинентного синдрома) обычно используются:
- 1.витаминные препараты;
 - 2.ноотропы;
 - 3.транквилизаторы;
 - 4.антибиотики;
 - 5.трихопол, фуразолидон.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно 4
- 84 Среди социальных факторов, влияющих на формирование алкоголизма, наиболее значимыми являются:
- 1.алкогольная политика государства;
 - 2.социальное положение индивидуума и его экономическая обеспеченность;
 - 3.устойчивые обычай ближайшего окружения;
 - 4.семейное положение
 - 5.расовая и этническая принадлежность.
- а) верно 1,2 ,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

85 Эпилептиформный синдром при алкоголизме наиболее часто проявляется в виде:

- а) больших судорожных припадков
- б) эпилептического слабоумия
- в) дисфорических состояний
- г) сумеречного помрачения сознания

86 Мотивами потребления наркотиков чаще всего являются:

- 1.удовлетворение любопытства, желание испытать новые ощущения;
 - 2.желание отвлечься от будничных трудностей;
 - 3.гедонистические установки;
 - 4.необходимость признания «своим» в группе;
 - 5.желание повысить настроение.
- а)верно 1,2,3
 - б)верно 1,3
 - в)верно 2,4
 - г)верно все перечисленное

87 Тяжелая степень острой алкогольной интоксикации определяется:

- 1.мозжечковой атаксией;
 - 2.мышечной атонией, амимией;
 - 3.вестибулярными расстройствами: головокружением, тошнотой, рвотой;
 - 4.бледностью кожных покровов;
 - 5.снижением тонуса сердечно-сосудистой системы.
- а)верно 1,2,3
 - б)верно 1,3
 - в)верно 2,4
 - г)верно все перечисленное

88 Клиническая картина развёрнутого делирия характеризуется:

- 1.наплывом парейдолов, сценоподобных зрительных галлюцинаций;
 - 2.двигательным беспокойством;
 - 3.помрачением сознания;
 - 4.кататоническими нарушениями;
 - 5.массивными псевдогаллюцинациями.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4

89 Медицинские работники автотранспортных предприятий осуществляют:

- а) контроль за состоянием здоровья водителей
- б) анализ причин отстранения водителей от работы
- в) участие в служебном расследовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
- г) проведение медицинских осмотров водителей

90 Наркологическая помощь наркологическим больным оказывается по:

- а) просьбе больного
- б) просьбе и с согласия родителей или других законных представителей больного
- в) требованию общественных организаций по месту жительства больного
- г) требованию правоохранительных органов

91 Реабилитация больных наркологического профиля осуществляется:

- 1.социальными работниками;
 - 2.психотерапевтами;
 - 3.психологами;
 - 4.врачами;
 - 5.специалистами по социальной работе.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

92 Кардиомиопатия у больных алкоголизмом проявляется:

- 1.нарушением сердечного ритма;
 - 2.сниженной сократительной функцией миокарда;
 - 3.разнообразными болевыми ощущениями;
 - 4.нарушением проводимости;
- а)верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г)верно все перечисленное

93 Для водителей «группы риска» проводятся медицинские осмотры:

- а) предрейсовые
б) текущие
в) послерейсовые
г) еженедельные

94 Патологическое опьянение - это:

- а)конфабуляции в сочетании с реминисценциями
б)повышение толерантности к алкоголю
в)транзиторный (кратковременный) психоз
г)атипичное опьянение
д)сомноленция

95 Предварительный этап лечения больных с зависимостью от ПАВ включает:

- 1.проведение дезинтоксикационной терапии;
 - 2.купирование состояния отмены;
 - 3.коррекцию поведения больного;
 - 4.восстановление нарушенных соматических и психических функций;
 - 5.выявление основного симптомокомплекса психической зависимости и определение причин предшествующих рецидивов.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г)верно все перечисленное

96 К дезинтоксикационным средствам относятся:

- 1.гипохлорит натрия;
 - 2.гемодез;
 - 3.сернокислая магнезия;
 - 4.апоморфин;
 - 5.кордиамин.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в) верно 2,4
г)верно все перечисленное

97 В группу риска входят:

- 1.подростки, замеченные в употреблении алкоголя или других ПАВ;
 - 2.подростки, ведущие асоциальный образ жизни;
 - 3.подростки из неблагополучных семей;
 - 4.подростки и взрослые, страдающие алкоголизмом;
 - 5.подростки с пограничной умственной отсталостью.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

98 Состояние отмены при героиновой наркомании характеризуется:

- 1.лавинообразны и нарастанием симптомов;
 - 2.алгическими и диспептическими расстройствами;
 - 3.профузным потом, «леденящим ознобом», слезотечением, светобоязнью;
 - 4.подавленным настроением с тревогой, неусидчивостью, приступами отчаяния ;
 - 5.быстрой, практически, критической редукцией симптомов.
- а)верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г)верно все перечисленное

99 Для абстиненции при употреблении опиатов характерны все перечисленные симптомы, кроме:

- а) зуда в носу, чихания
б) нарушения сна
в) боли в суставах и мышцах
г) сужения зрачков

100 О психопатоподобных изменениях личности наркомана свидетельствуют:

- а)колебания эмоционального фона и снижение интеллекта;
б)раздражительность, возбудимость, неспособность критически оценивать свои действия и сужения круга интересов;
в)неспособность критически оценивать свои действия и снижение интеллекта;
г)снижение интеллекта, сужение круга интересов

101 Токсикомании, формирующиеся вследствие злоупотребления лекарственными препаратами, чаще всего возникают из-за:

- а)нерационального, неправильного лечения;
б)частого приема бензодиазепинов при бессоннице или других расстройствах;
в)частого приема медикаментов при различных неблагоприятных жизненных ситуациях;
г)лечения барбитуратами;

102 Основными признаками алкогольного параноида являются:

- а) галлюцинаторные расстройства
- б) чувственный аффект страха
- в) бред преследования
- г) психические автоматизмы

103 Полизависимость формируется при употреблении нескольких ПАВ, которые:

- 1.по типу действия на ЦНС обладают одинаковыми эффектами у больных;
- 2.при комбинированном приеме способны усиливать действие друг друга;
- 3.обладают разной продолжительностью действия;
- 4.оказывают разнонаправленные эффекты;
- 5.обладают одинаковой продолжительностью действия.

- а)верно 1,2,3
- б)верно 1,3
- в)верно 2,4
- г)верно 4

104 Для эксплозивного варианта изменённого простого алкогольного опьянения (острой алкогольной интоксикации) характерно:

- 1.слабо выраженная и кратковременна я эйфория;
- 2.вспышки резкого недовольства, раздражения или злобы, неоднократно повторяющиеся в состоянии опьянения;
- 3.проявление конфликтности;
- 4.состояние тревожно-тоскливого аффекта;
- 5.проявление демонстративности.

- а)верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в)верно 2,4
- г)верно все перечисленное

105 Толерантность к алкоголю в большей степени зависит:

- 1.от технологии изготовления алкогольной продукции.
- 2.от частоты употребления алкоголя;
- 3. от функционального состояния организма;
- 4.от изначальной активности альдегидокисляющих ферментов;
- 5.от возраста и пола индивидуума.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно 4

106 Для временной остановки венозного наружного кровотечения применяют:

- а)пальцевое прижатие артерии на протяжении
- б)напложение жгута
- в)максимальное сгибание конечности
- г)наложение давящей повязки

- 107 Схема заместительной терапии состояния отмены при барбитуровой наркомании фенобарбиталом не предусматривает:
- а)подбор дозы фенобарбитала из расчета 1/3 от суточной дозы барбитурата, которую принимал больной;
 - б)назначения высчитанной дозы в 4 приема ежедневно в течение первых 2-х дней;
 - в)меньшение с 3-х суток лечения каждой следующей суточной дозы фенобарбитала на 10 %;
 - г)назначения высчитанной дозы фенобарбитала до момента купирования состояния отмены
- 108 К последствиям хронической интоксикации ПАВ при любой форме зависимости относятся:
- 1.прогрессирующее падение активности, энергетического потенциала;
 - 2.угасание влечений, утрата потребностей как в биологическом, так и в социальном смысле;
 - 3.снижение сопротивляемости организма, прогрессирующее истощение;
 - 4.развитие миокардиопатий;
 - 5.угасание интеллекта.
- а)верно 1,2,3
 - б)верно 1,3
 - в)верно 2,4
 - г)верно все перечисленное
- 109 Ретроградная амнезия характеризуется:
- 1.фрагментарной утратой памяти;
 - 2.выпадением из памяти событий периода, следовавшего непосредственно после выхода из бессознательного состояния;
 - 3.отсутствием памяти на текущие события;
 - 4.выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию;
 - 5.потеря способности запоминать.
- а)верно 1,2,3
 - б)верно 1,3
 - в)верно 2,4,5
 - г)верно 4
- 110 При передозировке кокаина смерть наступает от:
- 1.эпистатуса (серии судорожных припадков);
 - 2.остановки сердца вследствие аритмии;
 - 3.остановки дыхания;
 - 4.некронефроза;
 - 5.печеночной комы.
- а)верно 1,2,3
 - б)верно 1,3
 - в)верно 2,4
 - г)верно все перечисленное
- 111 Для наркомании характерно:
- а)развитие физической и психической зависимости от наркотиков
 - б)рост толерантности к наркотическим веществам
 - в)выраженные изменения личности
 - г)отсутствие абстинентного синдрома

112 Мусситирующий делирий характеризуется:

- 1.психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах постели;
 - 2.невнятным, бессвязным бормотанием;
 - 3.карфологическими нарушениями;
 - 4.возбуждением с совершением профессиональных действий;
 - 5.эпизодами кататонического возбуждения.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

113 Основными признаками мусситирующего делирия являются:

- а) глубокое помрачнение сознания
б) преобладание простых двигательных актов
в) бредовое поведение
г) вербальная продукция в виде бормотания
д) наличие вербальных галлюцинаций
е) наличие различных неприятных соматических ощущений в теле, на фоне пониженного настроения

114 Лёгкая степень острой алкогольной интоксикации характеризуется:

- 1.ощущением психического и физического комфорта;
 - 2.повышением речедвигательной активности;
 - 3.лёгким нарушением координации движений;
 - 4.замедлением ассоциативного процесса;
 - 5.появлением психосенсорных расстройств.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г)верно все перечисленное

115 Реабилитация больных наркологического профиля осуществляется:

- 1.социальными работниками;
 - 2.психотерапевтами;
 - 3.психологами;
 - 4.врачами;
 - 5.специалистами по социальной работе.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г)верно все перечисленное

116 Мусситирующий делирий характеризуется:

- 1.психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах постели;
 - 2.невнятным, бессвязным бормотанием;
 - 3.карфологическими нарушениями;
 - 4.возбуждением с совершением профессиональных действий;
 - 5.эпизодами кататонического возбуждения.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

117 Обязательное медицинское страхование - это:

- а) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской по мощи;
- б) страховой риск, связанный с возникновением страхового случая;
- в) обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи;
- г) обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, целевым назначением которых является обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения

118 К наиболее выраженным психопатологическим эффектам острой интоксикации галлюциногенами относятся:

- а) нарушения зрительного восприятия;
- б) парестезии;
- в) деперсонализационные и дереализационные расстройства;
- г) стойкие вербальные галлюцинации;

119 Осложненная наркомания – это сочетание зависимости от наркотиков и:

- а) антибиотиков
- б) алкоголя
- в) глюкокортикоидов
- г) витаминных препаратов

120 Для симптома «плато» толерантность у больных алкоголизмом характерно:

- 1.потребление стабильно установленной дозы алкоголя;
 - 2.появление состояний опьянения только при употреблении высоких доз алкоголя ;
 - 3.переносимость максимальных доз алкоголя на протяжении определённого отрезка времени ;
 - 4.появление на эта пе перехода начальной стадии заболевания в среднюю;
 - 5.переход на употребление алкогольных напитков с более низким содержанием алкоголя.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

121 Помещение для проведения предрейсовых медицинских осмотров должно иметь:

- а) мебель (кушетка медицинская, письменный стол, стол и т.д.)
- б) электрокардиограф
- в) приборы для определения алкоголя в биологических средах организма
- г) тест-полоски

122 Для алкогольной комы характерно:

- 1.нарушение сознания;
 - 2.понижение температуры тела и появление цианоза;
 - 3.резкое снижение мышечного тонуса;
 - 4.повышение тонуса сердечно-сосудистой системы;
 - 5.двигательное возбуждение.
- а)верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в)верно 2,4
 - г)верно все перечисленное

123 Атипичная картина опьянения не развивается:

- а) после перенесенных в прошлом черепно-мозговых травм
- б) после нейроинтоксикаций
- в) при вынужденной бессоннице, сильном эмоциональном стрессе
- г) при сильном эмоциональном стрессе
- д) после лечения антибиотиками

124 Наркотическая эйфория - это изменение в сторону максимально положительного для субъекта значения восприятий:

- 1. настроения;
 - 2. мышления;
 - 3. физического состояния;
 - 4. психического состояния;
 - 5. памяти.
- а) верно 1,3,4
 - б) верно 1,2,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

125 Для средней степени алкогольного опьянения характерно все перечисленное, кроме:

- а) нарушения речи
- б) нарушения походки
- в) неустойчивости в позе Ромберга
- г) слабого запаха алкоголя изо рта

126 Кратковременная, бурно протекающая, чрезвычайно интенсивная эмоциональная реакция:

- а) фрустрация
- б) аффект
- в) настроение
- г) депрессия
- д) стресс

127 Какие лабораторные исследования применяются для подтверждения ремиссии у больных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя:

- а) определение уровня прямого билирубина в крови
- б) анализ на карбогидрат-дефицитный трансферрин методом капиллярного электрофореза (CDT)
- в) определение уровня креатинина в крови
- г) определение уровня глюкозы в крови

128 На доврачебном этапе (при отсутствии ЭКГ) можно думать о начавшемся инфаркте миокарда, если приступ стенокардии не купируется приемом нитроглицерина в течение:

- а) 20 - 30 минут
- б) 30 минут - / часа
- в) 1,5-2 часа
- г) суток

129 Легкая степень острой алкогольной интоксикации характеризуется:

- 1.ощущением психического и физического комфорта;
 - 2.повышением речедвигательной активности;
 - 3.легким нарушением координации движений;
 - 4.замедлением ассоциативного процесса;
 - 5.появлением психосенсорных расстройств.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

130 При химико-токсикологических исследованиях для определения наркотических

или сильнодействующих веществ в биологических средах организма используют:

- а) тест-полоски
б) газожидкостную и тонкослойную хроматографию
в) иммуноферментный анализ
г) алкометры

131 Антидепрессанты обладают следующими эффектами действия:

- 1.антипсихотическим;
- 2.седативным;
- 3.миорелаксирующим;
- 4.противосудорожным;
- 5.транквилизирующим.

- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

132 Актуализация ситуационно обусловленного первичного патологического влечения к алкоголю в значительной степени проявляется:

- 1.стойкими навязчивыми мыслями об алкоголе;
- 2.повышенной двигательной активностью и суеверностью при появлении алкогольных раздражителей, или ситуаций связанных с алкоголем
- 3.беспринной раздражительностью;
- 4.чрезмерным стремлением к контактам с окружающими;
- 5.появлением сновидений с алкогольной тематикой.

- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

133 С юридической точки зрения «производство» и «изготовление» наркотических средств – это:

- а) синонимы
б) разные понятия
в) оборот наркотических средств
г) реализация наркотических средств

134 Характерными признаками при употреблении седативных препаратов являются

все перечисленное, кроме:

- а) бледности кожных покровов
б) зрительных галлюцинации
в) снижения тонуса мышц и рефлексов
г) смазанности речи

- 135 К основным факторам, участвующим в симптомообразовании алкоголизма относят: 1. фактор почвы; 2. фактор фона; 3. токсический фактор; 4. временной фактор; 5. этнический фактор.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4
д) верно все перечисленное
- 136 Остаточные явления предшествующего алкогольного опьянения коррелируют с концентрацией алкоголя в крови:
- а) 0,022 - 1%
б) 1 - 2%
в) 2 - 3%
г) 3 - 4%
- 137 Клиническая картина острого отравления опиатами характеризуется:
1. угнетением ЦНС от стадии засыпания до расстройства сознания в виде комы;
2. сужением зрачков (симптом «точки») со снижением или полным отсутствием реакции на свет;
3. угнетением дыхания до брадипноэ с частотой до 4-6 в минуту или полной его остановкой;
4. снижением сухожильных и периостальных рефлексов или арефлексией;
5. снижением или отсутствием реакции на болевое раздражение, корнеальных, кашлевых и глоточных рефлексов.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 138 Основные симптомы Корсаковского психоза:
- а) полиневриты
б) амнезия
в) конфабуляции
г) сохранность памяти
- 139 Для алкогольного бреда ревности характерно все выше перечисленное, кроме:
- а) бреда преследования
б) идеи отношения
в) тревоги
г) тактильных галлюцинации
- 140 Цель санитарного просвещения:
- а) формирование высокой санитарной культуры, сознательного гигиенического поведения граждан
б) нетерпимое и критичное отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к условиям окружающей среды, наносящим ущерб здоровью
в) правильное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленное на выздоровление
г) овладение знаниями, необходимыми для соблюдения правил гигиенического поведения

141 Повторное медицинское освидетельствование проводится по:

- а) личному заявлению водителя
- б) направлению руководителя автотранспортного предприятия
- в) направлению медицинского работника
- г) направлению сотрудников ГИБДД

142 Для средней степени острой алкогольной интоксикации характерно:

- 1.функциональные нарушение моторики;
- 2.замедление и затруднение ассоциативного процесса;
- 3.однообразность представлений и трудности в переключении внимания, дизартричность речи;
- 4.непроизвольное мочеиспускание;
- 5.выраженные соматические расстройства.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно все перечисленное

143 Сужение зрачков характерно для:

- а) эфедроновой интоксикации
- б) опийного абстинентного синдрома
- в) гашишной интоксикации
- г) опийной интоксикации

144 К транквилизаторам относятся:

- 1.производные бензамида;
- 2.производные бензодиазепина;
- 3.производные ГАМК;
- 4.производные пропандиола;
- 5.ингибиторыmonoаминооксидазы.

а) верно 1 ,2, 3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно 4

145 Для синдрома отмены при амфетаминовой наркомании наиболее характерно:

- а) развитие острой депрессии с суициdalными тенденциями;
- б) повышенная утомляемость, раздражительность;
- в) сонливость при отсутствии сна;
- г)стойкое отсутствие аппетита

146 К основным клиническим проявлениям алкогольного абстинентного синдрома относят:

- 1.влечение к алкоголю с целью опохмеления;
- 2.расстройства в сфере памяти
- 3.аффективно-вегетативные проявления;
- 4.судорожные состояния;
- 5.психосенсорные расстройства.

а) верно 1,2,3

б) верно 1,3

в) верно 2,4

г) верно 4

147 В неизмененном виде алкоголь выводится из организма:

- а) печенью
- б) легкими
- в) почками
- г) молочными железами

148 Метадон является:

- а) нейролептиком
- б) психостимулятором
- в) опийным производным
- г) сильнодействующим веществом

149 Летучие органические соединения (средства бытовой и промышленной химии)

имеют ряд общих качеств, к которым относятся:

- 1.хорошая растворимость в жирах;
 - 2.высокая токсичность;
 - 3.быстрая испаряемость;
 - 4.высокая наркогенность;
- 5.преимущественное поражение ЦНС, сердца, печени и почек при злоупотреблении ими.
- а)верно 1,2,3
 - б)верно 1,3
 - в)верно 2,4
 - г)верно все перечисленное

150 Основными признаками алкогольного галлюциноза являются:

- а) помрачение сознания
- б) полная амнезия психоза
- в) преобладание вербальных псевдогаллюцинаций
- г) преобладание истинных вербальных галлюцинаций

151 По медицинским показаниям наркотики назначают:

- а) онкологическим пациентам
- б) терапевтическим пациентам
- в) стоматологическим пациентам
- г) наркологическим пациентам

152 К основным принципам антиалкогольной терапии относятся:

- а) непрерывность и длительность
- б) комплексность
- в) максимальная индивидуальность
- г) принудительность

153 В группу риска входят:

- 1.подростки, замеченные в употреблении алкоголя или других ПАВ;
 - 2.подростки, ведущие асоциальный образ жизни;
 - 3.подростки из неблагополучных семей;
 - 4.подростки и взрослые, страдающие алкоголизмом;
 - 5.подростки с пограничной умственной отсталостью.
- а)верно 1,2,3
 - б)верно 1,3
 - в)верно 2,4
 - г)верно все перечисленное

- 154 В России трансплантация может проводится без согласия донора, если донор:
- а)особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение
 - б)гражданин страны, находящейся в состоянии войны с Россией
 - в)психически неполноценный
 - г)донор — умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов
- 155 Нерезко выраженные признаки абстинентного синдрома наблюдаются при употреблении:
- а) опиатов
 - б) препаратов конопли
 - в) стимуляторов
 - г) барбитуратов
- 156 Для патологического опьянения характерно: 1. внезапность, острота и транзиторность психотического эпизода; 2. импульсивность и целенаправленность характера разрушительных действий; 3. сумеречное расстройство сознания; 4. нетипичность развития повторных аналогичных состояний; 5. кризисное разрешение глубоким сном с последующей амнезией и астенией.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4
 - д) верно все перечисленное
- 157 Для алкогольного делирия характерно все, кроме:
- а)сенестезии
 - б)иллюзии
 - в)галлюцинации
 - г)бессонницы
 - д)чувства страха
- 158 Для средней степени алкогольного опьянения характерно все перечисленное, кроме:
- а)нарушения речи
 - б)нарушения походки
 - в)неустойчивости в позе Ромберга
 - г)слабого запаха алкоголя изо рта
- 159 Клиническими проявлениями наркомании при употреблении галлюциногенов являются:
- а) зрительные галлюцинации
 - б) страх, подозрительность
 - в) бредовые идеи преследования
 - г) параличи нижних конечностей
- 160 Патогенез алкогольного делирия заключается:
- а)в аутоинтоксикации вследствие алкогольного поражения печени
 - б)вследствие поражения почек
 - в)вследствие коллапса сосудов
 - г)вследствие нарушения сердечной деятельности
 - д)вследствие расширения сосудов

- 161 Состояние отмены при бензодиазепиновой токсикомании проявляется:
- 1.тревогой, неусидчивостью, подавленностью и злобой;
 - 2.фибриллярными подергиваниями лицевой мускулатуры и мышц конечностей;
 - 3.тахиардией и ортостатической гипотензией;
 - 4.горизонтальным нистагмом и мел кора змешистым трепором;
 - 5.бессонницей, головными болями, тошнотой, отсутствием аппетита.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное
- 162 Формирование состояния отмены свидетельствует о становлении:
- 1.начальной стадии наркомании;
 - 2.средней стадии наркомании;
 - 3.конечной стадии наркомании;
 - 4.синдрома физической зависимости;
 - 5.синдрома измененной реактивности.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г) верно 4
- 163 Последствия, не характерные для применения экстази:
- а)быстрое возникновение психической зависимости
б)физическое истощение
в)нервное истощение
г)отрицательное влияние на генетический код и будущее потомство
д)укрепление здоровья
- 164 К признакам острой интоксикации опиатами относят:
- 1.миоз с отсутствием или крайне вялой реакцией зрачков на свет;
 - 2.брадипное и тахипное;
 - 3.зуд кожи лица;
 - 4.«меловую» бледность и сухость кожи;
 - 5.отсутствие нарушений координации движений и артикуляции.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 165 Биомедицинская этика и медицинское право должны находиться в состоянии:
- а)независимости
б)медицинское право - приоритетно
в)должен быть выдержан приоритет биомедицинской этики
г)биомедицинская этика - критерий корректности медицинского права
- 166 Для синдрома отмены при амфетаминовой наркомании наиболее характерно:
- а)развитие острой депрессии с суицидальными тенденциями;
б)повышенная утомляемость, раздражительность;
в)сонливость при отсутствии сна;
г)стойкое отсутствие аппетита;

167 Уголовная ответственность за изготовление, хранение и сбыт наркотиков предусмотрена статья УК РФ:

- а) 119
- б) 167
- в) 228
- г) 235

168 Максимальное угнетение дыхательного центра после внутривенного введения морфина развивается через:

- а) 1 - 3 минуты
- б) 5 - 10 минут
- в) 15 - 20 минут
- г) 30 минут

169 Основные симптомы энцефалопатии Гайе-Вернике:

- а) нарушение сознания
- б) психотические расстройства
- в) гиперкинезы
- г) отсутствие неврологических расстройств

170 Для эфедренового и первитинового опьянения характерно:

- а) гипомания, ощущение невесомости, тяга к общению, чувство
- б) безграничной любви
- в) депрессии с суициdalными мыслями
- г) сенестопатии
- д) выраженные амнезии
- е) мании

171 Для проведения лабораторных исследований биологических сред на содержание алкоголя используются:

- а) алкотетры
- б) газовые хроматографы
- в) метод Раппопорта
- г) тест-полоски

172 Чаще всего острые токсические энцефалопатии развиваются при передозировке:

- 1. циклодола;
- 2. летучих органических соединений;
- 3. гашиша;
- 4. эфедрона;
- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно 4
- д) верно все перечисленное

173 Исчезновение рвотного рефлекса при алкоголизме характерно:

- а) для первой стадии алкоголизма
- б) для второй стадии алкоголизма
- в) для третьей стадии алкоголизма
- г) для алкогольного параноида
- д) все верно

174 Для симптома снижения толерантности у больных алкоголизмом характерно:

- 1.появление признаков опьянения при употреблении привычных доз алкоголя;
 - 2.переход на напитки с более низким содержанием алкоголя;
 - 3.снижения разовой дозы алкоголя при сохранении суточной;
 - 4.появление на этапе 2-3 ст. заболевания;
 - 5.появление в картинах опьянения тотальных амнезий.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

175 Чаще всего острые токсические энцефалопатии развиваются при передозировке:

- 1.циклогола;
 - 2.летучих органических соединений;
 - 3.гамиша;
 - 4.эфедрона;
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно 4
д)верно все перечисленное

176 Токсикомании, формирующиеся вследствие злоупотребления лекарственными препаратами , чаще всего возникают из-за:

- а)нерационального, неправильного лечения;
б)частого приема бензодиазепинов при бессоннице или других расстройствах;
в)частого приема медикаментов при различных неблагоприятных жизненных ситуациях; 2
г)лечения барбитуратам;

177 В кабинеты экспертизы опьянения после проведения предрейсового медицинского осмотра водители направляются в случаях:

- а) противоречивости данных клинического и лабораторного исследования
б) согласия водителя с заключением проведенного контроля трезвости
в) неясной или неполной клинической картины опьянения
г) сомнительных результатов лабораторного исследования

178 Основными клиническими признаками «профессионального» делирия являются:

- а) бред преследования
б) стереотипные автоматизированные действия
в) слуховые галлюцинации
г) ложные узнавания

179 Штамп в путевом листе водителей ставится при:

- а) допуске к работе
б) наличии признаков употребления алкоголя
в) наличии у водителей симптомов острого заболевания
г) наличии признаков употребления наркотиков

180 К метаболитам алкоголя относятся:

- а) ацетальдегид
б) молочная кислота
в) уксусная кислота
г) масляная кислота

181 К достоверным признакам внезапной остановки сердечной деятельности не относится:

- а)отсутствие пульса на сонных артериях
- б)внезапная потеря сознания
- в)отсутствие самостоятельного дыхания
- г)отсутствие тонов сердца

182 Для клиники токсикомании транквилизаторами бензодиазепинового ряда характерно:

- 1.сходство с клиникой барбитуровой наркомании;
- 2.более медленное формирование основных симптомокомплексов;
- 3.менее брутальное интеллектуально-мнестическое снижение;
- 4.значительная выраженность аффективных нарушений;
- 5.отсутствие судорожных припадков.

- а)верно 1,2,3
- б)верно 1,3
- в)верно 2,4
- г)верно все перечисленное

183 Чаще всего зависимость от ПАВ формируется у лиц:

- 1.с дефектами воспитания;
- 2.с личностными девиациями;
- 3.с нарушениями социальной адаптации;
- 4.с невысоким уровнем профессиональной ориентации;
- 5.с невысоким интеллектом.

- а)верно 1,2,3
- б)верно 1,3
- в)верно 2,4
- г)верно все перечисленное

184 Истечение ликвора из уха или носа является характерным признаком:

- а) сотрясения головного мозга
- б) сдавления головного мозга
- в) перелома свода черепа
- г) перелома основания черепа

185 Для легкой степени алкогольного опьянения характерно:

- а) нарушение поведения
- б) нарушение сознания и ориентировки
- в) нарушение походки
- г) трепет

186 Срок диспансерного наблюдения больных, с синдромом зависимости от наркотиков :

- а) пять лет
- б) три года
- в) два года
- г) один год

187 Наркогенность ПАВ определяется:

- 1.скоростью формирования зависимости;
 - 2.высотой толерантности;
 - 3.степенью психической и социальной инвалидизации;
 - 4.значением субъективного эффекта удовольствия от вещества;
 - 5.видом вещества.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

188 Объектом профилактики в наркологии являются:

- 1.больные люди, страдающие зависимостью от ПАВ;
 - 2.подростки из неблагополучных семей;
 - 3.подростки, замеченные в употреблении ПАВ;
 - 4.все контингенты населения;
 - 5.школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3,5
в)верно 2,4
г)верно 4

189 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие пульса на:

- а) локтевой артерии
б) лучевой артерии
в) сонной артерии
г) бедренной артерии

190 Первичная профилактика наркомании - это:

- а)лечение уже начавшего заболевания
б)недопущение развития болезни
в)предупреждение осложнений болезни
г)лечение последствий заболевания
д)этой проблемы не существует

191 Аверсионная терапия по В.С.Битенскому при гашишной наркомании включает:

- а)внутривенное введение диазепама.
б)внутривенное введение коразола
в)внутримышечное введение дисульфирама
г)внутримышечное введение налтрексона.
д)внутривенное введение диазепама

192 К конечной стадии течения наркомании относится все перечисленное, кроме:

- а) кахексии
б) полной деградации личности
в) абстиненции
г) повышения толерантности

- 193 К основным критериям, определяющим состояние острой алкогольной интоксикации (простое алкогольное опьянение), относят:
- 1.изменения в эмоциональной сфере;
 - 2.функциональные изменения моторики;
 3. изменение ассоциативного процесса и восприятия окружающего;
 - 4.наличие неврологических и вегетативных нарушений или изменений;
 - 5.характерный запах алкоголя изо рта.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г)верно все перечисленное

- 194 Изменение картины опьянения у больных алкоголизмом обусловлено:
- 1.содержанием алкоголя в алкогольных напитках;
 - 2.длительностью (тяжестью) заболевания;
 - 3.технологией приготовления алкогольных напитков;
 - 4.преморбидными характерологическими особенностями;
 - 5.половыми различиями .
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

- 195 В спектр психотропного действия нейролептиков входят эффекты:
- 1.седативный;
 - 2.снотворный;
 - 3.подавляющий влечеение;
 - 4.противосудорожный;
 - 5.тимонормализующий.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

- 196 Для второй стадии алкоголизма наиболее характерны следующие признаки:
- а) физическая и психическая зависимость от алкоголя
 - б) алкогольный абстинентный синдром
 - в) высокая толерантность к алкоголю
 - г) алкогольная деградация личности

- 197 К основным клиническим проявлениям алкоголизма относятся:
- 1.патологическое влечеение к алкоголю;
 - 2.синдром отмены (AAC);
 - 3.синдром измененной реактивности;
 - 4.аффективный синдром;
 - 5.психоорганический синдром.
- а) верно, 1 2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

198 Поражение периферической нервной системы при алкоголизме проявляется:

- а) полинейропатией
- б) рассеянным склерозом
- в) параличами
- г) парезами

199 У больных алкоголизмом поведенческая компонента при актуализации

патологического влечения к алкоголю проявляется:

- 1. затруднениями в профессиональной деятельности;
- 2. дисфориями;
- 3. неуступчивость и потребность во всем противоречит окружающим;
- 4. размыщлениями о неизбежности употребления алкоголя;
- 5. раздражительностью.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно все перечисленное

200 Наименьшим угнетающим действием на дыхательный центр обладает:

- а) морфин
- б) омнопон
- в) промедол
- г) фентанил

201 Исходя из сложившихся классификаций, к острым металкогольным психозам

относят:

- 1. алкогольный делирий;
 - 2. алкогольный галлюциноз;
 - 3. бредовые психозы;
 - 4. алкогольную эпилепсию;
 - 5. дипсоманию.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4

202 Максимальная толерантность к алкоголю развивается при алкоголизме:

- а) в первой стадии заболевания
- б) во второй стадии заболевания
- в) в третьей стадии заболевания
- г) в состоянии алкогольной абstinенции

203 О психопатоподобных изменениях личности наркомана свидетельствуют:

- а) колебания эмоционального фона и снижение интеллекта;
- б) раздражительность, возбудимость, неспособность критически оценивать свои действия и сужения круга интересов;
- в) неспособность критически оценивать свои действия и снижение интеллекта;
- г) снижение интеллекта, сужение круга интересов;

- 204 Больной М, 1946г. р. поступил в стационар с жалобами на то, что слышит мужские "голоса" на улице под окном. Они говорят о нем, пугают его, угрожая расправой. В анамнезе - почти ежедневное употребление алкоголя в течение 20 лет. При осмотре - больной в сознании, правильно ориентирован. Что с больным?
- а) алкогольный делирий
 - б) алкогольный галлюциноз
 - в) энцефалопатия Гайе-Вернике
 - г) алкогольная паранойя
 - д) алкогольный параноид
- 205 Полинаркомания – это:
- а) одновременное злоупотребление несколькими наркотическими веществами
 - б) повышение дозы наркотического вещества
 - в) алкоголизм в сочетании с наркоманией
 - г) употребление сильнодействующих препаратов
- 206 Для алкоголизма в подростковом возрасте свойственно:
- 1. недостаточна я выраженность и незавершенность специфических симптомов, а иногда и отсутствие некоторых из них;
 - 2. высокая прогредиентность;
 - 3. трудность разграничения стадий алкоголизма и нечеткость стереотипа их развития;
 - 4. формирование алкогольной деградации с эйфорической установкой;
 - 5. высокий риск развития психотических форм алкоголизма.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 207 Для купирования приступа стенокардии на доврачебном этапе нитроглицерин можно применять повторно с интервалом:
- а) 20-30 минут
 - б) 10-15 минут
 - в) 5-10 минут
 - г) 5 минут
- 208 Для клиники алкоголизма у лиц пожилого возраста характерно:
- 1. относительная невысокая интенсивность влечения к алкоголю;
 - 2. непродолжительные запои;
 - 3. преобладание соматических и неврологических расстройств в структуре AAC;
 - 4. усиление в опьянении эмоциональной лабильности;
 - 5. относительно невысокая толерантность.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 209 Для первой стадии алкоголизма характерны все перечисленные симптомы, кроме:
- а) утраты количественного
 - б) роста толерантности
 - в) амнезии отдельных периодов опьянения
 - г) абстинентного синдрома

210 Ретроградная амнезия характеризуется:

- 1.фрагментарной утратой памяти;
 - 2.выпадением из памяти событий периода, следовавшего непосредственно после выхода из бессознательного состояния;
 - 3.отсутствием памяти на текущие события;
 - 4.выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию;
 - 5.потеря способности запоминать.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4,5
г)верно 4

211 Антероградная амнезия характеризуется:

- 1.утратой воспоминаний на период бессознательного состояния и период предшествовавший ему;
 - 2.правильное поведение в запамятованном периоде;
 - 3.распространение забвения на различные периоды жизни;
 - 4.утратой воспоминаний на период, непосредственно следовавший за выходом из бессознательного состояния;
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно 4

212 Характерными особенностями псевдозапоев у больных алкоголизмом являются;

- 1.видимая связь алкогольного эксцесса с внешними факторами (начало и окончание псевдозапоя)
 - 2.длительность периода ежедневного злоупотребления алкоголя от 3-4 дней до двух недель;
 - 3.сохранение высокой толерантности в течение всего периода злоупотребления;
 - 4.отчетливое изменение у больных как психического, так и физического состояния за несколько дней до начала эксцесса;
 - 5.спонтанность начала алкогольного эксцесса.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4

213 Эфедрон чаще всего употребляется:

- а) внутривенно
б) внутримышечно
в) путем курения
г) путем ингаляции

214 Острая интоксикация амфетаминами проявляется:

- 1.ощущением прилива энергии и усилением активности, переоценкой собственных возможностей;
 - 2.склонностью к стереотипным однообразным действиям и раздражительностью, тревогой;
 - 3.нарушениями сердечного ритма и дыхания, повышением АД;
 - 4.резким снижением аппетита;
 - 5.повышенной потливостью, гиперрефлексией, tremором, расширением зрачков.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

215 К клиническим проявлениям наркомании при употреблении препаратов конопли относят:

- а) ощущение легкости движений
б) психомоторное возбуждение
в) расстройство сознания, бред, галлюцинации
г) благодушие, расслабленность

216 Для алкоголизма в подростковом возрасте свойственно:

- 1.недостаточная выраженность и незавершенность специфических симптомов, а иногда и отсутствие некоторых из них;
- 2.высокая прогредиентность;
- 3.трудность разграничения стадий алкоголизма и нечеткость стереотипа их развития;
- 4.формирование алкогольной деградации с эйфорической установкой;
- 5.высокий риск развития психотических форм алкоголизма.

- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

217 Летучие органические соединения (средства бытовой и промышленной химии) имеют ряд общих качеств, к которым относятся:

- 1.хорошая растворимость в жирах;
 - 2.высокая токсичность;
 - 3.быстрая испаряемость;
 - 4.высокая наркогенность;
 - 5.преимущественное поражение ЦИС, сердца, печени и почек при злоупотреблении ими.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

218 Острая интоксикация амфетаминами проявляется:

- 1.ощущением прилива энергии и усилением активности, переоценкой собственных возможностей;
 - 2.склонностью к стереотипным однообразным действиям и раздражительностью, тревогой;
 - 3.нарушениями сердечного ритма и дыхания, повышением АД;
 - 4.резким снижением аппетита;
 5. повышенной потливостью, гиперрефлексией, трепетом, расширением зрачков.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

219 К последствиям хронической интоксикации ПАВ при любой форме зависимости относятся:

- 1.прогрессирующее падение активности, энергетического потенциала;
 - 2.угасание влечений, утрата потребностей как в биологическом, так и в социальном смысле;
 - 3.снижение сопротивляемости организма, прогрессирующее истощение;
 - 4.развитие миокардиопатий;
 5. угасание интеллекта.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

220 Для тяжелой степени алкогольного опьянения характерно все перечисленное, кроме:

- а) нарушения сознания, ориентировки
б) нарушения походки
в) неточности выполнения точных движений
г) дрожания век, языка, пальцев рук

221 Число пораженных при территориальных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах):

- а)10-50 пораженных
б)50-500 пораженных
в)свыше 500 пораженных
г)до 10 пораженных

222 При обмороке АД у больных:

- а)резко снижается
б)снижается постепенно в течении нескольких часов
в)не изменяется
г)резко повышается на несколько минут

223 Объектом профилактики в наркологии являются:

- 1.больные люди, страдающие зависимостью от ПАВ;
 - 2.подростки из неблагополучных семей;
 - 3.подростки, замеченные в употреблении ПАВ;
 - 4.все контингенты населения;
 - 5.школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3,5
в)верно 2,4
г)верно 4

224 При купировании возбуждения в случаях отравления димедролом назначают:

- а) прозерин и реланиум
- б) прозерин и дроперидол
- в) прозерин и аминазин
- г) тромал

225 Для абстиненции при употреблении наркотиков стимулирующего ряда характерно все выше перечисленное, кроме:

- а) ощущения разбитости
- б) сонливости днем, бессонницы ночью
- в) психотических эпизодов
- г) ломающих болей в суставах и мышцах

226 Кустарно изготовленный первитин относится к:

- а) опиатам
- б) психостимуляторам
- в) галлюциногенам
- г) транквилизаторам

227 Понятие "милосердие" включает в себя все, кроме:

- а) чувства и способности сострадания
- б) готовность оказать помощь тому, кто в ней нуждается
- в) снисходительность
- г) готовность выполнить л юбую просьбу человека

228 Клиническими проявлениями наркомании при употреблении препаратов стимулирующего ряда являются:

- а) приподнятое настроение
- б) повышение работоспособности
- в) болтливость
- г) острые бредовые состояния

229 Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующееся:

- а) прогредиентным течением
- б) отсутствием патологического влечения к алкоголю
- в) формированием абстинентного синдрома
- г) развитием стойких соматических, неврологических расстройств и деградацией личности

230 Согласно Постановлению Правительства РФ № 950 от 20.09.2012

- реанимационные мероприятия прекращаются при признании их абсолютно бесперспективными, в частности, при неэффективности таковых:
- а) в течение 15 минут
 - б) в течение 25 минут
 - в) в течение 30 минут
 - г) в течение 1 часа

231 Наркогенность ПАВ определяется:

- 1.скоростью формирования зависимости;
 - 2.высотой толерантности;
 - 3.степенью психической и социальной инвалидизации;
 - 4.значением субъективного эффекта удовольствия от вещества;
 - 5.видом вещества.
- а)верно 1,2,3
 - б)верно 1,3
 - в)верно 2,4
 - г)верно все перечисленное

232 Для клиники алкоголизма у лиц пожилого возраста характерно:

- 1.относительная невысокая интенсивность влечения к алкоголю;
 - 2.непродолжительные запои;
 - 3.преобладание соматических и неврологических расстройств в структуре ААС;
 - 4.усиление в опьянении эмоциональной лабильности;
 - 5.относительно невысокая толерантность.
- а)верно 1,2,3
 - б)верно 1,3
 - в)верно 2,4
 - г)верно все перечисленное

233 Расширение зрачков характерно для:

- а) эфедроновой интоксикации
- б) барбитуровой интоксикации
- в) опийного абстинентного синдрома
- г) опийной интоксикации

234 Вегетативные проявления при кокаиновой наркомании характеризуется:

- а)серцебиение, повышение АД
- б)снижение АД, сужение зрачков
- в)тремор, повышение АД
- г)сухость во рту
- д)расширение зрачков

235 Алкогольная деградация включает в себя:

- 1.аффективные расстройства;
 - 2.психопатоподобные симптомы;
 - 3.этическое снижение;
 - 4.стойкое снижение памяти и интеллекта;
 - 5.утрату критического отношения к злоупотреблению алкоголем и самому к себе.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

236 Изменение картины опьянения у больных алкоголизмом обусловлено:

- 1.содержанием алкоголя в алкогольных напитках;
 - 2.длительностью (тяжестью) заболевания;
 - 3.технологией приготовления алкогольных напитков;
 - 4.преморбидными характерологическими особенностями;
 - 5.половыми различиями.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

237 Для синдрома отмены при амфетаминовой наркомании наиболее характерно:

- а)развитие острой депрессии с суициальными тенденциями;
б)повышенная утомляемость, раздражительность;
в)сонливость при отсутствии сна;
г)стойкое отсутствие аппетита;

238 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия

гражданина или его законного представителя допускается:

- а)в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
б)лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей,
в)в целях проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях;
г)организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения

239 Следы внутривенных инъекций обнаруживаются при употреблении:

- а) барбитуратов
б) галлюциногенов
в) стимуляторов
г) антипаркинсонических препаратов

240 Наркогенность ПАВ определяется:

- 1.скоростью формирования зависимости;
- 2.высотой толерантности;
- 3.степенью психической и социальной инвалидизации;
- 4.значением субъективного эффекта удовольствия от вещества;
- 5.видом вещества.

- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

241 Кокаин относится к:

- а)седативным средствам
б)психостимуляторам
в)галлюциногенам
г)препаратам конопли

242 Больной 43года, злоупотребляет алкоголем 5 лет. Доставлен в стационар с жалобами на бессонницу, страх, тревогу. Уверяет, что его собираются убить, следят за ним на улице. Не выходит из дома, просит спрятать его где-нибудь - "чтобы не убили". Выберите правильный ответ:

- а) алкогольная паранойя
- б) алкогольный делирий
- в) опийная наркомания
- г) гашишная наркомания
- д) энцефалопатия Гайе-Вернике

243 Синдром физической зависимости от наркотика включает:

- 1. компульсивное влечение;
 - 2. состояние отмены;
 - 3. способность достижения физического комфорта в интоксикации;
 - 4. общую депривированность;
 - 5. несобранность больного.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

244 Соматические изменения в III стадии алкоголизма:

- а) отсутствуют
- б) носят характер функциональных нарушений
- в) носят необратимый характер
- г) носят характер вегетативных расстройств

245 Прогредиентность алкоголизма оценивается по:

- а) скорости нарастания изменений личности
- б) длительности запоев
- в) длительности ремиссий
- г) длительности периода от начала систематического пьянства до формирования алкогольного абстинентного синдрома

246 Условно-рефлекторная терапия алкоголизма направлена на:

- а) выработку стойкого рефлекса отвращения к вкусу и запаху алкоголя
- б) повышение толерантности к алкоголю
- в) прерывание алкогольного эксцесса
- г) лечение абстенции

247 В отличие от взрослых, для подростков при становлении зависимости от ПАВ, характерно:

- 1. преобладание группового мотива употребления ПАВ;
 - 2. направленность влечения не на определённые ощущения, а на недифференцированное состояние оглушения («балдение»);
 - 3. предпочтение преимущественно веществ с галлюцинаторным эффектом;
 - 4. выбор дешёвых (а отсюда - тяжелодействующих) ПАВ;
 - 5. замедленное формирование влечения вследствие незрелости чувственной сферы.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

248 Клинические проявления алкогольного абстинентного синдрома:

- а) трепет, потливость
- б) психическая напряжённость
- в) упорное отсутствие сна
- г) повышение аппетита
- д) сухость кожи
- е) влечеие к опохмелению

249 Для патологического опьянения характерно:

- 1.внезапность, острота и транзиторность психотического эпизода;
- 2.импульсивность и целенаправленность характера разрушительных действий;
- 3.сумеречное расстройство сознания;
- 4.нетипичность развития повторных аналогичных состояний;
- кризисное разрешение глубоким сном с последующей амнезией и астенией.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно все перечисленное

250 Неврологические расстройства у больных алкоголизмом проявляются;

- 1.патологическими рефлексами;
- 2.полиневропатиями;
- 3.нарушением вибрационной чувствительности;
- 4.синдромом рассеянного энцефаломиелита;
- 5.расширением желудочков мозга.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно все перечисленное

251 Первоочередной эвакуации подлежат пораженные сортировочной группы:

- а)первой
- б)второй
- в)третьей
- г)четвертой

252 Какой путь введения лекарственных препаратов предпочтителен при оказании помощи больным с анафилактическим шоком:

- а)внутривенный
- б)внутримышечный
- в)подкожный
- г)ингаляционный

253 Для купирования состояния отмены (алкогольного абстинентного синдрома) обычно используются:

- 1.витаминные препараты;
- 2.ноотропы;
- 3.транквилизаторы;
- 4.антибиотики;
- 5.трихопол, фуразолидон.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно 4

254 В начале приступа бронхиальной астмы у больных отмечается кашель:

- а) с выделением пенистой розовой мокроты
- б) с выделением «ржавой» мокроты
- в) сухой
- г) с выделением стекловидной мокроты

255 В отличие от взрослых, для подростков при становлении зависимости от ПАВ, характерно:

- 1. преобладание группового мотива употребления ПАВ;
 - 2. направленность влечения не на определенные ощущения, а на недифференцированное состояние оглушения («балдение»);
 - 3. предпочтение преимущественно веществ с галлюцинаторным эффектом;
 - 4. выбор дешевых (а отсюда - тяжелодействующих) ПАВ;
 - 5. замедленное формирование влечения вследствие незрелости чувственной сферы.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

256 К основным клиническим проявлениям алкогольного абстинентного синдрома относят:

- 1. влечение к алкоголю с целью опохмеления;
 - 2. расстройства в сфере памяти
 - 3. аффективно-вегетативные проявления;
 - 4. судорожные состояния;
 - 5. психосенсорные расстройства.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4

257 Больной В., 1946 г., злоупотребляет алкоголем в течение 15 лет. В стационар поступил с жалобами на то, что слышит незнакомые мужские "голоса" с 2-х сторон. Одни "голоса" ругают его, другие защищают. Тревожен, напряжен, что-то шепчет. Выберите правильный ответ:

- а) алкогольный галлюциноз императивного характера
- б) алкогольный галлюциноз антагонистического характера (+)
- в) алкогольный параноид
- г) алкогольный делирий
- д) атипичная картина опьянения

258 Для современной модели профессиональной морали - биоэтики, основным принципом является:

- а) принцип "соблюдения долга"
- б) принцип "не навреди"
- в) принцип приоритета науки
- г) принцип приоритета прав и уважения достоинства пациента

259 Показанием к наложению окклюзионной повязки является:

- а) ранение груди
- б) пневмоторакс
- в) закрытые переломы ребер
- г) ушибы грудной клетки

260 К основным клиническим проявлениям алкоголизма относятся:

- 1.патологическое влечение к алкоголю;
 - 2.синдром отмены (AAC);
 - 3.синдром изменённой реактивности;
 - 4.аффективный синдром;
 - 5.психоорганический синдром.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

261 Состояние глоточного рефлекса при коме 2 степени:

- а) сохранен
б) снижен
в) отсутствует
г) усилен

262 Наиболее отличительной особенностью алкоголизма у женщин является:

- а)злокачественность течения;
б)раннее появление психотических форм;
в)низкая курабельность;
г)аффективная окрашенность клинической симптоматики;

263 Метадон-это:

- а)синтетический препарат сходный с ЛСД
б)синтетический препарат сходный с морфином
в)синтетический преапарат сходный с кофеином
г)синтетический препарат сходный с кодеином
д)галлюциноген

264 Социальные последствия наркологических заболеваний проявляются в:

- а) способности выполнять в полном объеме семейные и производственные обязанности
б) выраженному профессиональном снижении с утратой прежней квалификации
в) иждивенческих тенденциях
г) деградации личности

265 Для начальных проявлений алкоголизма (1ст. заболевания) характерно;

- 1.2-3 кратный рост толерантности в сравнении с изначальной;
 - 2.нарушение сна;
 - 3.актуализация влечения к алкоголю в основном в «питейных» ситуациях;
 - 4.выраженные изменения состояний опьянения;
 - 5.появление так называемого «симптома критической дозы».
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

266 Состояние отмены при героиновой наркомании характеризуется:

- 1.лавинообразным нарастанием симптомов;
 - 2.алгическими и диспептическими расстройствами;
 - 3.профузным потом, «леденящим ознобом», слезотечением, светобоязнью;
 - 4.подавленным настроением с тревогой, неусидчивостью, приступами отчаяния;
 - 5.быстрой, практически, критической редукцией симптомов.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

267 К транквилизаторам относятся:

- 1.производные бензамида;
 - 2.производные бензодиазепина;
 - 3.производные ГАМК;
 - 4.производные пропандиола;
 - 5.ингибиторы моноаминооксидазы.
- а)верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

268 Легкая степень острой алкогольной интоксикации характеризуется:

- 1.ощущением психического и физического комфорта;
 - 2.повышением речедвигательной активности;
 - 3.легким нарушением координации движений;
 - 4.замедлением ассоциативного процесса;
 - 5.появлением психосенсорных расстройств.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

269 Изъятие органов и тканей от мертвого донора осуществляется в Российской Федерации:

- а) беспрепятственно в интересах науки и общества
б) согласно принципу "презумпция несогласия"
в) согласно принципу "презумпция согласия"
г) в соответствии с морально-религиозными ценностями

270 Правильным определением этики как науки является:

- а) этика - наука об отношении, живых существ между собой
б) этика - наука о природе и смысле моральных взаимоотношений и нравственных принципов
в) этика - наука о минимизации зла в человеческих отношениях
г) этика - наука об умении правильно себя вести в обществе

271 В группу риска входят: ·

- 1.подростки, замеченные в употреблении алкоголя или других ПАВ;
 - 2.подростки, ведущие асоциальный образ жизни;
 - 3.подростки из неблагополучных семей;
 - 4.подростки и взрослые, страдающие алкоголизмом;
 - 5.подростки с пограничной умственной отсталостью.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

272 При терапии алкогольных делириев с особой осторожностью следует назначать:

- а)полионные растворы;
б)крово- и плазмозаменители;
в)транквилизаторы;
г)нейролептики;

273 ЛСД относится к:

- а) психостимуляторам
б) производным конопли
в) галлюциногенам
г) опиатам

274 Предрейсовые медицинские осмотры проводятся:

- а) врачами
б) фельдшерами
в) медицинскими сестрами
г) работниками автотранспортных предприятий

275 К специфическим наркоманическим синдромам относятся синдромы:

- 1.изменённой реактивности;
 - 2.психической зависимости;
 - 3.физической зависимости;
 - 4.последствий злоупотребления ПАВ;
 - 5.неустойчивого равновесия .
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

276 Токсикомании, формирующиеся вследствие злоупотребления лекарственными препаратами, чаще всего возникают из-за:

- а) нерационального, неправильного лечения;
б)частого приёма бензодиазепинов при бессоннице или других расстройствах;
в)частого приёма медикаментов при различных неблагоприятных жизненных ситуациях;
г)лечения барбитуратами;

277 Больной С., 1963г.р., в течение 15 лет злоупотреблял дешевым вином. В течение 5 лет живет один, разведен. Со дня развода выпивает больше 5 литров водки в день. Последние три дня не пьет. Через 3 дня после воздержания от алкоголя почувствовал сильную дрожь в теле, панику, появилась бессонница. При осмотре возбужден, отмечается тремор всего тела, пытается ловить "клопов", которых видит. Дезориентирован во времени, считает, что находится в супермаркете, а не в больнице. Все время к чему-то прислушивается, озирается по сторонам. Что с больным?

- а)алкогольный делирий
- б)отравление опиатами
- в)алкогольный галлюциноз
- г)цикодоловый делирий
- д)патологическое опьянение

278 Изменения личности у больных алкоголизмом проявляются:

- 1.заострением преморбидных характерологических особенностей;
- 2.снижением «энергетического потенциала»;
- 3.нивелировкой преморбидных характерологических особенностей
- 4.грубыми расстройствами памяти;
- 5.патологическим развитием личности.

- а)верно 1,2,3
- б)верно 1,3
- в)верно 2,4
- г) верно все перечисленное

279 Для диагностики состояния острой интоксикации каннабиноидами значимыми являются следующие признаки:

- 1.расширение зрачков и инъецированность сосудов склер;
- 2.хриплый, «лающий» голос,
- 3.выраженная сухость видимых слизистых;
- 4.резкие колебания эмоционального фона;
- 5.готовность к индукции поведения.

- а)верно 1,2,3
- б)верно 1,3
- в)верно 2,4
- г)верно все перечисленное

280 Кардиомиопатия у больных алкоголизмом проявляется:

- 1.нарушением сердечного ритма;
 - 2.сниженной сократительной функцией миокарда;
 - 3.разнообразными болевыми ощущениями;
 - 4.нарушением проводимости;
- а)верно 1,2,3
 - б)верно 1,3
 - в)верно 2,4
 - г)верно все перечисленное

281 Изменения личности у больных алкоголизмом проявляются:

- 1.заострением преморбидных характерологических особенностей;
 - 2.снижением «энергетического потенциала»;
 - 3.нивелировкой преморбидных характерологических особенностей
 - 4.грубыми расстройствами памяти;
 - 5.патологическим развитием личности.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

282 49.Реабилитация больных наркологического профиля осуществляется:

- 1.социальными работниками;
 - 2.психотерапевтами;
 - 3.психологами;
 - 4.врачами;
 - 5.специалистами по социальной работе.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

283 Симптомы интоксикации при употреблении препаратов антипаркинсонического действия:

- а) эйфория
б) утрата реальности существования
в) сценоподобные галлюцинации
г) нарушение речи

284 Для эксплозивного варианта изменённого простого алкогольного опьянения (острой алкогольной интоксикации) характерно:

- 1.слабо выраженная и кратковременная эйфория;
 - 2.вспышки резкого недовольства, раздражения или злобы, неоднократно повторяющиеся в состоянии опьянения;
 - 3.проявление конфликтности;
 - 4.состояние тревожно-тоскливого аффекта;
 - 5.проявление демонстративности.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно все перечисленное

285 Кокаин относится к:

- а) седативным средствам
б) психостимуляторам
в) галлюциногенам
г) препаратам конопли

286 Для первой стадии делирия характерно:

- 1.наплывы ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях;
 - 2.развитие псевдогаллюцинаторных расстройств;
 - 3.расстройства сна, яркие сновидения;
 - 4.помрачение сознания;
 - 5.деперсонализация.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно 4

287 Для первой стадии делирия характерно:

- 1.наплывы ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях;
 - 2.развитие псевдогаллюцинаторных расстройств;
 - 3.расстройства сна, яркие сновидения;
 - 4.помрачение сознания;
 - 5.деперсонализация.
- а)верно 1,2,3
б)верно 1,3
в)верно 2,4
г)верно 4

288 Наркоманы, отказывающиеся от лечения:

- а) привлекаются к уголовной ответственности
б) привлекаются к принудительному лечению
в) к ответственности не привлекаются
г) направляются на лечение в психиатрические больницы

289 Соматоневрологическая патология у больных алкоголизмом обусловлена:

- 1.преморбидными морфофункциональными особенностями органов и систем индивидуума;
 - 2.токсическим действием этанола;
 - 3.токсическим действием ацетальдегида;
 - 4.длительностью заболевания;
 5. злоупотреблением суррогатами алкоголя.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

290 Для вынесения заключения о факте употребления наркотического вещества обязательным является:

- а) заявление испытуемого об употреблении наркотического вещества
б) обнаружение наркотического вещества в биологических средах организма
в) представление врачу сведений об употреблении испытуемым наркотического вещества
г) выявление клиники опьянения (одурманивания), вызванного употреблением наркотических веществ

291 Больной К., 34 г., в течение 7 лет злоупотребляет алкоголем. Алкоголь для него - необходимое средство, чтобы поднять настроение, чувствовать себя уверенно, свободно. Начав пить, уже не может остановиться, не учитывает ситуацию, окружающую обстановку. Периодически из памяти выпадают отдельные периоды опьянения. Выберите правильный ответ:

- а)имеет место 1 стадия алкоголизма
- б)имеет место 2 стадия алкоголизма
- в)имеет место алкогольный делирий
- г)имеет место Корсаковский психоз
- д)речь идет об энцефалопатии Гайе-Вернике

292 Алкоголь в организме в основном всасывается в:

- а) желудке
- б) двенадцатиперстной кишке
- в) толстом кишечнике
- г) тощей кишке

293 Карбамазепин в наркологической практике применяют для:

- 1.коррекции аффективных нарушений;
- 2.снижения интенсивности патологического влечения;
- 3.лечение судорожных расстройств;
- 4.профилактики судорожных расстройств;
- 5.коррекции психопатоподобных нарушений.

- а)верно 1,2,3
- б)верно 1,3
- в)верно 2,4
- г)верно все перечисленное

294 При проведении предрейсового медицинского осмотра медицинские работники заполняют:

- а) протокол контроля трезвости
- б) акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения
- в) протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления
- алкоголя и состояния опьянения
- г) справка о состоянии освидетельствования

295 К признакам острой интоксикации опиатами относят:

- 1.миоз с отсутствием или крайне вялой реакцией зрачков на свет;
- 2.брадипно и тахипно;
- 3.зуд кожи лица;
- 4.«меловую» бледность и сухость кожи;
- 5.отсутствие нарушений координации движений и артикуляции.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в)верно 2,4
- г)верно все перечисленное

296 Начальный этап лечения алкоголизма предусматривает:

- а) выработку условного рефлекса отвращения к алкоголю
- б) прерывание злоупотребления алкоголем
- в) устранение абстинентного синдрома
- г) снижение признаков возбудимости

297 К вегетативным признакам опьянения ЛСД относятся все, кроме:

- а) конфабуляции
- б) повышение АД
- в) сужение зрачков
- г) расширение зрачков
- д) дрожание рук

298 Основными клиническими проявлениями алкогольной депрессии являются все

перечисленное, кроме:

- а) снижения настроения
- б) чувства тоски и тревоги
- в) идей самообвинения и самоуничтожения
- г) бреда ревности

299 Симптомы, характерные для употребления летучих органических соединений

(бензин, толуол, бензол, ацетон и т.д.):

- а) сужение зрачков
- б) тахикардия
- в) нарушение координации движений
- г) дезориентировка

300 В третьей стадии алкоголизма наиболее часто встречаются следующие формы

злоупотребления алкоголем:

- а) постоянное пьянство с высокой толерантностью
- б) истинные запои
- в) псевдозапои
- г) постоянное пьянство с низкой толерантностью