

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

**(для медицинских сестёр дерматовенерологических отделений и кабинетов,
прошедших обучение по циклам «Сестринская помощь больным с кожными и
венерическими заболеваниями», профессиональной переподготовки по специальности
«Сестринское дело»)**

- 1 Врожденное новообразование кожи называется:
 - а) герпес
 - б) фавус
 - в) невус
 - г) сикоз
- 2 Артропатия встречается при:
 - а) разноцветном лишае
 - б) витилиго
 - в) экземе
 - г) псориазе
- 3 К какой группе топических стероидов относится клобетазон (дермовейт):
 - а) слабые
 - б) сильные
 - в) очень сильные
- 4 Экземой называется:
 - а) заболевание кожи, обусловленное нарушением функции сальных желез
 - б) любое воспаление кожи, вызываемое воздействием внешних раздражителей
 - в) поражение кожи нервно-аллергического характера
 - г) гнойное поражение кожи, возникающее в результате внедрения в нее гноеродных кокков
- 5 Для подтверждения диагноза отрубевидного лишая проводят пробу:
 - а) с 5%-ой спиртовой настойкой йода
 - б) марганцовокислую
 - в) фурациллиновую
 - г) пробу Кебнера
- 6 Клетки зернистого слоя эпидермиса:
 - а) Содержат ядра
 - б) Не содержат ядра
- 7 Понятие «медицинская этика» включает в себя:
 - а) форму общественного сознания и систему социальной регуляции деятельности медицинских работников
 - б) форму правовой регуляции деятельности медицинских работников
 - в) учение о долге (должном) в деятельности медицинских работников
 - г) представления об условиях оптимальной деятельности медицинских работников
- 8 Какое эпидемиологическое мероприятие является лишним для больного сифилисом:
 - а) Обследование половых контактов больного
 - б) Обследование тесных бытовых контактов больного
 - в) Обследование коллег по работе
 - г) Обследование реципиентов крови

- 9 Диета больных дерматитом Дюринга предусматривает:
- а) ограничение углеводов
 - б) исключение из рациона продуктов, приготовленных из злаков
 - в) ограничение белков
 - г) снижение калорийности пищевого рациона
- 10 Препаратами выбора для лечения хламидиоза являются:
- а) Антибиотики макролиды
 - б) Антибиотики аминогликозиды
 - в) Сульфаниламиды
 - г) Антибиотики цефалоспорины
- 11 Фурункул – это воспаление:
- а) сальных желез
 - б) апокринных потовых желез
 - в) слюнных желез
- 12 К инфекционным дерматозам относится:
- а) контагиозный моллюск
 - б) чешуйчатый лишай
 - в) атопический дерматит
 - г) витилиго
- 13 Укажите характерные признаки шелушения при псориазе:
- а) Мелкопластинчатое, чешуйки серебристо-белого цвета
 - б) Крупнопластинчатое, чешуйки желтоватого цвета
 - в) Муковидные чешуйки коричневатого цвета
 - г) Крупнопластинчатое, корко-чешуйки
- 14 Очаг поражения на волосистой части головы при микроспории характеризуется наличием:
- а) множественных эктим
 - б) «черных точек» в очаге
 - в) зоной « расшатанных» волос
 - г) обломанных волос длиной на 5-8 мм
- 15 Первичный период сифилиса начинается с появления:
- а) твердого шанкра
 - б) высыпаний на слизистых оболочках в виде энантем
 - в) сифилитического бубона
 - г) гуммы
- 16 Микроспорию и трихофитию вызывают:
- а) антропофильные и зоофильные патогенные грибы
 - б) членистоногие и животные паразиты
 - в) пиогенные кокки
 - г) хламидии и уреаплазмы
- 17 Характерное свечение в лучах лампы Вуда при микроспории:
- а) желтое
 - б) коралловое
 - в) изумрудно-зеленое
 - г) нет свечения
- 18 Дактилоскопия позволяет идентифицировать личность по:
- а) форме ногтевых пластинок
 - б) отпечаткам пальцев
 - в) мазкам-отпечаткам слизистых оболочек
 - г) по структуре и цвету волос

- 19 При зудящих дерматозах применяются:
- а) взбалтываемые смеси
 - б) пасты
 - в) примочки
 - г) присыпки
- 20 Препараты группы пенициллина действуют:
- а) только на спиралевидную форму бледной трепонемы
 - б) только на цист - формы бледной трепонемы
 - в) на обе формы бледной трепонемы
 - г) не действуют на бледную трепонему
- 21 Стрептококк вызывает:
- а) гидроаденит
 - б) фурункулёз
 - в) вульгарное импетиго
 - г) чесотку
- 22 Проба Яддасона это:
- а) проба с йодидом калия
 - б) проба с никотиновой кислотой
 - в) перманганатом калия
 - г) проба с растительным маслом
- 23 Достоверный признак врожденного позднего сифилиса:
- а) триада Гетчинсона
 - б) твердый шанкр
 - в) лейкодерма
 - г) бугорковый сифилид
- 24 Характерный клинический симптом пузырчатки:
- а) симптом Никольского
 - б) симптом Аусница
 - в) симптом Стивена-Джонсона
 - г) феномен Кебнера
- 25 К первичным морфологическим элементам кожной сыпи относятся:
- а) везикулы, корки, рубцы, лихенизация
 - б) везикулы, папулы, уртикарии, пигментация
 - в) везикулы, шелушение, эрозии, пустулы
 - г) везикулы, пустулы, уртикарии, папулы
- 26 Эрозия формируется в пределах:
- а) эпидермиса
 - б) дермы
 - в) подкожной жировой клетчатки
- 27 Для бактериального вагиноза характерно:
- а) Гнойные выделения
 - б) Смешанные выделения
 - в) Слизистые прозрачные выделения
 - г) Мутные выделения с запахом рыбы
- 28 Синдром Рейтера осложнение:
- а) гонореи
 - б) сифилиса
 - в) трихомониаза
 - г) экземы

- 29 Антибиотики назначают при локализации фурункула:
- а) в области лица
 - б) в области груди
 - в) в области голени
- 30 При герпесе рекомендуется:
- а) мазь флуцинар
 - б) мазь оксолиновая
 - в) мазь левомецетиновая
 - г) мазь тетрациклиновая
- 31 Сифилитическая пузырьчатка очень характерна для:
- а) вторичного сифилиса
 - б) раннего врожденного сифилиса
 - в) первичного сифилиса
 - г) всех периодов сифилиса
- 32 Заражение гонококковой инфекцией может происходить:
- а) при половом контакте
 - б) парентерально
 - в) орально-генитальным путем
 - г) вертикальным путем
 - д) при бытовом контакте
- 33 Влагалищная трихомонада – это:
- а) спирохета паллидум
 - б) внутриклеточный вирус
 - в) простейший одноклеточный паразит
 - г) патогенный грибок
- 34 К специфическим препаратам при лечении сифилиса относятся:
- а) антибиотики пенициллинового ряда
 - б) препарат йода
 - в) препарат висмута
 - г) пирогенные препараты
- 35 К инфекционным дерматозам относится:
- а) нейродерматозы
 - б) зудящие дерматозы
 - в) отрубевидный лишай
 - г) розовый лишай
- 36 К вирусным дерматозам относится:
- а) сикоз
 - б) контагиозный моллюск
 - в) витилиго
 - г) псориаз
- 37 Современное средство лечения чесотки – это:
- а) 30% тиосульфат натрия
 - б) мифокс
 - в) флуцинар мазь
 - г) 5% эритромициновая мазь
- 38 Папилломавирусная инфекция может приводить к:
- а) уретриту
 - б) раку шейки матки
 - в) орхиту
 - г) риниту

- 39 Самый поверхностный слой эпидермиса:
- а) роговой
 - б) пигментный
 - в) зернистый
 - г) зародышевый
- 40 Третичный сифилис проявляется в виде:
- а) гумм
 - б) розеол
 - в) папул
- 41 Заражение бледной трепонемой происходит:
- а) через неповреждённые слизистые
 - б) через повреждённую кожу
 - в) при поцелуе
 - г) при докуривании сигарет
- 42 К доброкачественным новообразованиям кожи относится:
- а) саркома
 - б) липома
 - в) базилома
 - г) меланома
- 43 Биодоступность лекарственного препарата – это:
- а) время, за которое концентрация лекарства в крови снижается на 50%
 - б) процесс превращения вещества в организме
 - в) содержание свободного вещества в плазме крови относительно введённой дозы
 - г) совокупность процессов биотрансформации и выведения
- 44 При гонококковой инфекции нижних отделов мочеполовых путей поражаются органы:
- а) трубы
 - б) яичники
 - в) мочеиспускательный канал
 - г) тело матки
- 45 Доброкачественные опухоли кожи – это:
- а) базалиомы
 - б) ксантомы
 - в) саркомы
 - г) меланомы
- 46 Туберкулез кожи, как правило, развивается:
- а) первично, контактным путем, через поврежденную кожу
 - б) вторично у больных туберкулезом внутренних органов, лимфоузлов
 - в) первично, аэрогенным путем
 - г) вторично, искусственным путем
- 47 Бельё больного при микроскопии гладкой кожи обрабатывается:
- а) автоклавированием
 - б) кипячением, обработка горячим утюгом
 - в) встряхиванием, обработкой горячим утюгом
 - г) просто стиркой
- 48 Наличие «дежурных» бляшек характерно для:
- а) сифилитической лейкодермии
 - б) разноцветного лишая
 - в) микроспории гладкой кожи
 - г) псориаза

- 49 Твёрдый шанкр – это:
- а) эрозия или язва, резко болезненная и всегда сопровождающаяся лимфаденитом
 - б) эрозия или язва с гладким дном, ровными краями, округлых или овальных очертаний, с твердым инфильтратом в основании, безболезненная
 - в) эрозия или язва размерами не менее 1,5-2,0 см, резко болезненная, с гнойным отделяемым
 - г) эрозия или язва, резко болезненная, с плотным инфильтратом в основании
- 50 Тактика в отношении половых контактов к больному сифилисом, здоровых на данный момент, если от момента последней половой связи прошло менее 2 месяцев:
- а) Клинико-серологическое наблюдение в течение 6 месяцев.
 - б) Повторное обследование через месяц
 - в) Превентивное лечение с последующим клинико-серологическим наблюдением
 - г) Лечение и наблюдения не требуется
- 51 До обследования эрозивно-язвенные высыпания на гениталиях обрабатываются:
- а) мазью Вишневского
 - б) физраствором
 - в) линиментом стрептоцида
 - г) примочкой с 2% раствором соды
- 52 Бледная трепонема лучше сохраняется:
- а) в тепле
 - б) при повышении температуры до 60 градусов
 - в) во влажной среде
 - г) при высыхании
- 53 Разглашение врачебной тайны без согласия пациента не является законным:
- а) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю
 - б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений
 - в) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда
 - г) по желанию ближайших родственников
- 54 Белый дермографизм характерен для:
- а) идиопатической экземы
 - б) пруригинозной экземы
 - в) атопического дерматита
 - г) микробной экземы
- 55 В норме химическая реакция влагалищного содержимого:
- а) кислая
 - б) щелочная
 - в) нейтральная
- 56 Основной принцип асептики:
- а) всё, что попадает в рану, должно быть уничтожено
 - б) всё, что соприкасается с раной, должно быть стерильным
- 57 Какое исследование не проводится при микозе стоп:
- а) осмотр в лучах лампы Вуда
 - б) микроскопия на патогенные грибы
 - в) посев на патогенные грибы

- 58 К дерматомикозам относится:
- а) отрубевидный лишай
 - б) чешуйчатый лишай
 - в) микроспория, трихофития
 - г) розовый лишай
- 59 Гонококк – это:
- а) диплококк
 - б) вирус
 - в) простейшее
 - г) риккетсия
- 60 Основные препараты для лечения гонококковой инфекции:
- а) кортикостероидные гормоны
 - б) антибиотики
 - в) витамины
 - г) нитрофураны
- 61 Рубромикоз и эпидермомикоз относятся к группе:
- а) дерматомикозов
 - б) кератомикозов
 - в) глубоких микозов
 - г) не установленного генеза
- 62 Что из перечисленного не характерно для псориаза:
- а) Отягощенная наследственность
 - б) Сезонные обострения
 - в) Отягощенный аллергоанамнез
 - г) Типичная, характерная локализация высыпаний
- 63 Достоверный признак врожденного позднего сифилиса:
- а) периоститы
 - б) триада Гетчинсона
 - в) бугорковые высыпания
 - г) положительная реакция RW
- 64 Фенистил в каплях назначают детям:
- а) с рождения
 - б) с 1 месяца
 - в) с 6 месяцев
 - г) с 1 года
- 65 Псориаз (чешуйчатый лишай) – заболевание:
- а) грибковой природы
 - б) вирусной природы
 - в) бактериальной природы
 - г) многофакторной этиологии
- 66 Причины простого дерматита:
- а) механические, химические, биологические, физические агенты
 - б) аллергические и аутоиммунные воздействия
 - в) вторичные иммунодефициты и обменные нарушения
 - г) эндокринные и урологические инфекционные заболевания
- 67 При сердечно-лёгочной реанимации в тройной приём Сафара не входит:
- а) запрокидывание головы
 - б) положение на боку
 - в) выдвижение нижней челюсти вверх
 - г) открывание рта

- 68 Фармакодинамика - это:
- а) раздел фармакологии, изучающий влияние лекарственного средства на организм больного или здорового человека
 - б) раздел фармакологии, изучающий процессы, происходящие с лекарственным средством от момента его поступления в организм до его выведения
 - в) раздел фармакологии, рассматривающий основы генетической чувствительности организма к лекарственному средству
 - г) раздел фармакологии, рассматривающий особенности взаимодействия лекарственных веществ между собой
- 69 Кутикула состоит из:
- а) коллагеновых волокон
 - б) эластических волокон
 - в) элейдина
- 70 Препаратами выбора для лечения микоплазменных инфекций урогенитального тракта являются:
- а) Антибиотики тетрациклинового ряда
 - б) Цефалоспорины
 - в) Аминогликозиды
 - г) Пенициллины
- 71 Удлинение инкубационного периода сифилиса наблюдается при:
- а) сопутствующих инфекционных заболеваниях
 - б) биполярном расположении твердых шанкров
 - в) приеме малых доз антибиотиков по поводу других заболеваний
 - г) продолжении половой жизни с источником заражения
- 72 Поражения внутренних органов при вторичном сифилисе могут проявляться:
- а) менингитами, энцефалитами
 - б) открытоугольными глаукомами
 - в) нефритами, периоститами
 - г) гепатитами, гастритами
 - д) атопическими дерматитами
- 73 Розовое пятно с легким шелушением, размером до 0,8-1,0 см с четкими границами на коже спины или плеч, темнеющее при смазывании 2% настойкой йода – подтверждает диагноз:
- а) сифилитической лейкодермии
 - б) разноцветного лишая
 - в) микроскопии гладкой кожи
 - г) витилиго
- 74 Самый глубокий слой эпидермиса – это:
- а) роговой
 - б) базальный
 - в) блестящий
 - г) сетчатый
- 75 Опоясывающий лишай – это заболевание кожи:
- а) неинфекционное
 - б) вирусной этиологии
 - в) грибковой природы
 - г) паразитарное

- 76 Какой из перечисленных микроорганизмов является облигатным возбудителем ИППП:
- а) Микоплазма *hominis*
 - б) Микоплазма *genitalium*
 - в) Уреаплазма *urealyticum*
 - г) Гарднерелла *vaginalis*
- 77 ИППП вирусной этиологии у взрослых - это:
- а) контагиозный моллюск
 - б) гонококковая инфекция
 - в) шанкроид
 - г) трихомониаз
- 78 Какие профилактические меры можно использовать для профилактики негативного воздействия полярной ночи:
- а) высыпаться
 - б) правильно питаться
 - в) умеренные физические нагрузки
 - г) все перечисленное
- 79 Специфические серологические реакции для диагностики сифилиса включают:
- а) ПЦР – полимеразную цепную реакцию
 - б) реакцию Колмера и реакцию Аргайла-Робертсона
 - в) ИФА, РПГА, РМП, реакцию иммобилизации бледных трепонем (РИБТ)
 - г) клинический анализ крови
- 80 Для лечения зудящих дерматозов применяют:
- а) аскорбиновую кислоту
 - б) антигистаминный препарат
 - в) пенициллин
- 81 Какой из перечисленных препаратов рекомендуется использовать для лечения атопического дерматита у ребенка 5 месяцев:
- а) дермовейт
 - б) Адвантан
 - в) Акридерм
 - г) Целестодерм
- 82 Реакция для массового обследования на сифилис:
- а) РПГА
 - б) РМП
 - в) РИФ
 - г) Все перечисленное
- 83 Синонимом названия «герпес симплекс»:
- а) простой пузырьковый лишай
 - б) грибковое поражение кожи
 - в) герпес зостер
 - г) опоясывающий лишай
- 84 Для опоясывающего герпеса характерно поражение:
- а) сосудистых образований
 - б) нервных стволов
 - в) придатков кожи

- 85 Пищевые продукты, не рекомендуемые больному с обострением экземы:
- а) творог
 - б) шоколад
 - в) яблоки
 - г) отварное мясо
- 86 Набор инструментов для инстилляции в уретру у мужчин:
- а) резиновый катетер, шприц, вазелиновое масло, пинцет, салфетки, перчатки
 - б) шприц, салфетки, ложка Фолькмана, пинцет, перчатки
 - в) прямой буж, ложка Фолькмана, резиновый катетер, салфетки, перчатки
- 87 Инфекционный дерматоз – это:
- а) онихомикоз
 - б) розовый лишай
 - в) лишай Диверджи
 - г) склеродермия
- 88 По методу Демьяновича последовательность в применении:
- а) 60% тиосульфат натрия, 6% раствор соляной кислоты
 - б) 3% раствор соляной кислоты, 10% раствор тиосульфата натрия
 - в) 6% раствор соляной кислоты, 10% раствор тиосульфата натрия
- 89 Классическая венерическая болезнь – это:
- а) гонококковая инфекция
 - б) гiardiaz
 - в) гидраденит
 - г) трихомониаз
- 90 Для хламидиоза характерны:
- а) Обильные гнойные выделения
 - б) Обильные слизистые выделения
 - в) Слизисто-гнойные выделения
 - г) Отсутствие выделений
- 91 Инфекционный дерматоз – это:
- а) крапивница
 - б) нейродермит
 - в) микроспория
 - г) себорея
- 92 Фармакодинамика - это:
- а) раздел фармакологии, изучающий влияние лекарственного средства на организм больного или здорового человека
 - б) раздел фармакологии, изучающий процессы, происходящие с лекарственным средством от момента его поступления в организм до его выведения
 - в) раздел фармакологии, рассматривающий основы генетической чувствительности организма к лекарственному средству
 - г) раздел фармакологии, рассматривающий особенности взаимодействия лекарственных веществ между собой
- 93 Особенности пота определяются составом:
- а) сложных эфиров в секрете апокринной потовой железы
 - б) сложных эфиров в секрете эккринной потовой железы
 - в) сложных эфиров в секрете сальной железы
 - г) ненасыщенными жирными кислотами кожного сала

- 94 Наиболее эффективное средство при лечении педикулёза:
- а) 20% бензил-бензоат
 - б) керосин 50% - подсолнечное масло
 - в) 33% серная мазь
 - г) сбрить волосы
- 95 Для предупреждения рецидивов атопического дерматита применяют следующие мероприятия:
- а) борьба с вредными привычками, профилактические курсы антибактериальных препаратов, белковая диета
 - б) вакцинация и ревакцинация, курс ЛФК, комплекс оздоровительных мероприятий
 - в) режим труда и отдыха, гипоаллергенная диета, борьба с вторичной пиококковой инфекцией, санация очагов инфекции, общее УФО, профилактическая антигистаминная терапия
 - г) своевременное применение лекарственных препаратов, исключение физического перенапряжения, строгое соблюдение диеты и времени приема пищи
- 96 Местное лечение герпетических кожных проявлений чаще всего включает применение:
- а) 5% спиртового раствора йода:
 - б) спиртовых растворов анилиновых красителей
 - в) аэрозоля «ламизил-спрей»
 - г) кортикостероидных мазей
- 97 При выявлении пациента с чесоткой заключительная дезинфекция проводится:
- а) раствором гипохлорида кальция
 - б) раствором аламинола
 - в) 0,2%-ой водной эмульсией медифокса
 - г) раствором хлорамина
- 98 Разглашение врачебной тайны без согласия пациента не является законным:
- а) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю
 - б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений
 - в) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда
 - г) по желанию ближайших родственников
- 99 Апокринные потовые железы – это железы:
- а) ладоней и стоп
 - б) лба и грудной клетки
 - в) паховых складок и подмышечных впадин
 - г) все потовые железы
- 100 Бородавки вирусной этиологии, передающиеся половым путем - это:
- а) обыкновенные (вульгарные)
 - б) плоские (юношеские)
 - в) подошвенные бородавки
 - г) остроконечные кондиломы
- 101 Острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и окружающих тканей – это:
- а) фолликулит
 - б) фурункул
 - в) фликтена
 - г) фавус

- 102 Образования, относящиеся к придаткам кожи – это:
- а) коллагеновые и элединовые волокна
 - б) межтучное вещество соединительной ткани
 - в) волосы, ногти, железы
 - г) артериальные, венозные и лимфатические сосуды
- 103 Костная система при третичном сифилисе:
- а) поражена
 - б) не поражена
- 104 Появление зуда, отека, гиперемии, везикулярных высыпаний на коже рук после контакта с новым стиральным порошком – это симптомы:
- а) контактного дерматита
 - б) экземы
 - в) атопического дерматита
 - г) токсикодермии
- 105 Срок повторного осмотра пациента после обнаружения педикулеза и обработки волосистой части головы (в днях):
- а) 14
 - б) 7
 - в) 5
 - г) 3
- 106 Хвойные ванны противопоказаны при:
- а) себорее
 - б) чесотке
 - в) экземе
 - г) герпесе
- 107 Факторами риска развития бактериального вагиноза являются:
- а) Гормональные нарушения
 - б) Отягощенный гинекологический анамнез
 - в) Частая смена половых партнеров
 - г) Все перечисленное
- 108 Характерный клинический симптом пузырчатки:
- а) симптом Никольского
 - б) симптом Аусница
 - в) симптом Стивена-Джонсона
 - г) феномен Кебнера
- 109 Кератолитическое средство:
- а) йод
 - б) дёготь
 - в) сера
 - г) салициловая кислота
- 110 Апокринные потовые железы располагаются в области:
- а) паховых складок
 - б) красной каймы губ
 - в) подмышечных впадин
 - г) волосистой части головы
- 111 Кутикула состоит из:
- а) коллагеновых волокон
 - б) роговых чешуек
 - в) элейдина

- 112 Вторичный морфологический элемент:
- а) волдырь
 - б) эрозия
 - в) петехии
 - г) пурпура
- 113 Отличительные признаки опоясывающего лишая:
- а) множественные расчесы
 - б) боль, парестезии по ходу нервов
 - в) фолликулиты на лице
 - г) шелушение на коже
- 114 Первичным морфологическим элементом пиодермий является:
- а) нодус
 - б) эктима
 - в) пустула
 - г) везикула
- 115 Постановка кожных проб целесообразна при экземе:
- а) истинной
 - б) профессиональной
 - в) микробной
 - г) себорейной
- 116 Для руброфитии характерно поражение:
- а) кожи пахово-бедренных складок
 - б) кожи стоп
 - в) слизистых оболочек
 - г) ногтей стоп и кистей
- 117 Эпителиома подлежит лечению методами:
- а) гипнотического воздействия, склеротерапии
 - б) диатермокоагуляции, хирургического удаления
 - в) народного лечения, психологического воздействия
 - г) фармакотерапии, лапароскопии
- 118 Пути передачи внутрибольничной инфекции:
- а) воздушно-капельный
 - б) парентеральный
 - в) контактный
 - г) все перечисленные
- 119 Какое из перечисленных заболеваний является грибковым поражением кожи:
- а) Красный плоский лишай
 - б) Разноцветный лишай
 - в) Чешуйчатый лишай
- 120 Местное лечение и уход за больным пиодермией предполагает:
- а) исключение водных процедур
 - б) направление на плавание в бассейн
 - в) рекомендации курса массажа
 - г) применение кортикостероидной мази
- 121 Белый дермографизм встречается при:
- а) крапивнице
 - б) истинной экземе
 - в) нейродермите
 - г) токсикодермите

- 122 Тактика медработника при выявлении эрозивно-язвенных высыпаний на гениталиях:
- а) назначить наружную терапию
 - б) взять соскоб с высыпаний на микроскопическое исследование
 - в) отправить больного к дерматовенерологу
 - г) отправить больного к дерматовенерологу с сопровождающим
- 123 К инфекционным дерматозам относится:
- а) микроспория
 - б) псориаз
 - в) чешуйчатый лишай
 - г) красный плоский лишай
- 124 Средний инкубационный период при зоонозной микроспории:
- а) 2 недели
 - б) 5-7 дней
 - в) 1,5 месяца
 - г) 1 месяц
- 125 При микроскопии в/ч головы волосы сбивают:
- а) 1 раз в неделю
 - б) 1 раз в 10 дней
 - в) 1 раз в 15 дней
- 126 Чесотка - заболевание по этиологии:
- а) вирусное
 - б) грибковой природы
 - в) паразитарное
 - г) аллергическое
- 127 Микозом является:
- а) сикоз, фавус, невус
 - б) трихофития, микроспория, руброфития
 - в) вульгарная волчанка, красный плоский лишай
 - г) склеродермия, псориаз
- 128 Деление клеток эпидермиса происходит в следующем слое:
- а) зернистом
 - б) роговом
 - в) базальном
 - г) шиповидном
- 129 Пиодермии – это:
- а) гнойничковые заболевания кожи
 - б) грибковые заболевания кожи
 - в) экзематиды
 - г) вирусные дерматозы
- 130 Поверхностный дефект кожи, в пределах эпидермиса – это:
- а) чешуйка
 - б) корка
 - в) эрозия
 - г) язва

- 131 Фальсифицированное лекарственное средство – это:
- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства
 - б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе
 - в) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа
 - г) лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства
- 132 Генитальный герпес вызывается вирусом простого герпеса:
- а) 1 типа
 - б) 2 типа
 - в) 1 и/или 2 типа.
- 133 ИППП вирусной этиологии – это:
- а) остроконечные бородавки
 - б) микоплазмоз
 - в) трихомоноз
 - г) шигеллез гомосексуалистов
- 134 В очагах поражения волосистой части головы волосы обломаны на уровне 5-8 мм от кожи, отмечается гиперемия, мукоидное шелушение. Указанные симптомы характерны для:
- а) себорейного облысения
 - б) вторичного рецидивного сифилиса
 - в) микроспории волосистой части головы
 - г) дискоидной красной волчанки
- 135 Что отличает высыпания при дерматите Дюринга:
- а) мономорфность
 - б) эволюционный полиморфизм
 - в) истинный полиморфизм
 - г) все перечисленное
- 136 Какая локализация высыпаний не характерна для псориаза:
- а) Разгибательные поверхности голеней и предплечий
 - б) Сгибательные поверхности конечностей
 - в) Волосистая часть головы
 - г) Кожа туловища
- 137 К индифферентным средствам местного лечения относятся:
- а) свинцовая вода
 - б) нитрат серебра
 - в) фукорцин
 - г) ланолин
- 138 В норме химическая реакция влагалищного содержимого:
- а) кислая
 - б) щелочная
 - в) нейтральная

- 139 На первом этапе терапии микоза стоп с острыми воспалительными явлениями (мокнутие, наличие пузырей) применяют:
- а) влажно-высыхающие повязки и примочки
 - б) лак «Батрафен»
 - в) фунгицидные мази
 - г) цинковые мази
- 140 После образования твердого шанкра КСР становится положительной:
- а) через 1 неделю
 - б) через 2-4 недели
 - в) через 40 дней
 - г) через 6-7 недель
- 141 Биодоступность лекарственного препарата – это:
- а) время, за которое концентрация лекарства в крови снижается на 50%
 - б) процесс превращения вещества в организме
 - в) содержание свободного вещества в плазме крови относительно введенной дозы
 - г) совокупность процессов биотрансформации и выведения
- 142 Клинические проявления при сикозе:
- а) фолликулиты в области голени
 - б) высыпания красных розеол на коже
 - в) фолликулиты в области усов и бороды
 - г) очаги облысения на голове
- 143 Что можно назначить женщине, страдающей бактериальным вагинозом:
- а) Спринцевание содовым раствором
 - б) Антибиотики
 - в) Свечи с метронидазолом
 - г) Все перечисленное
- 144 К современным средствам лечения отрубевидного лишая относится:
- а) ламизил-спрей
 - б) скин-кап
 - в) спрегаль
 - г) фторокорт
- 145 Меланоциты находятся в:
- а) эпидермисе
 - б) собственно коже
 - в) подкожной клетчатке
- 146 Заражение сифилисом может произойти:
- а) при половом и бытовом контакте
 - б) внутриутробно
 - в) парентерально
 - г) воздушно-капельным путем
- 147 Генеральная уборка в кабинетах риска кожно-венерологического диспансера проводится:
- а) один раз в месяц
 - б) один раз в неделю
 - в) ежедневно
 - г) один раз в десять дней

- 148 Мягкий шанкр после выздоровления сохраняет иммунитет:
- а) 1 год
 - б) 2-3 года
 - в) на всю жизнь
 - г) не оставляет иммунитета
- 149 ВИЧ относится к семейству:
- а) рабдовирусов
 - б) гепадновирусов
 - в) ретровирусов
 - г) аденовирусов
- 150 Ваши действия при выявлении чесотки в коллективе:
- а) сообщить в СЭС
 - б) провести профосмотр в коллективе
 - в) направить больного к дерматологу
 - г) обработать кожу спиртом
- 151 Злокачественные опухоли кожи – это:
- а) папилломы
 - б) меланомы
 - в) гидроцистаденомы
 - г) ангиомы
- 152 Степень злокачественности наибольшая у:
- а) плоскоклеточного рака кожи
 - б) саркомы кожи
 - в) меланомы
 - г) одинаковая у всех опухолей кожи
- 153 К дерматофитиям не относится:
- а) отрубевидный лишай
 - б) микроспория
 - в) кандидоз
 - г) трихофития
- 154 Заражение плода сифилисом чаще происходит на:
- а) 1-2 неделе беременности
 - б) 5-ом месяце беременности
 - в) в первом периоде родов
 - г) на 2-ом месяце беременности
- 155 Отрубевидный лишай – это:
- а) вирусное поражение кожи
 - б) грибковое поражение кожи
 - в) аллергическое заболевание кожи
 - г) заболевание кожи невыясненной этиологии
- 156 Какие высыпания не являются клиническим проявлением вторичного сифилиса:
- а) Розеола
 - б) Папула
 - в) Пустула
 - г) Вегетирующая папула
- 157 Наиболее частое проявление СПИДа:
- а) простой герпес
 - б) микоз стоп
 - в) отёк Квинке
 - г) крапивница

- 158 Твёрдый шанкр:
- а) эпителизируется через 1-2 года, после упорного лечения
 - б) эпителизируется без лечения через 3-6 недель
 - в) остаётся до конца жизни человека
 - г) эпителизируется через сутки
- 159 Между эпидермисом и собственно кожей располагается:
- а) сосочковый слой
 - б) основная мембрана
 - в) удерживатели кожи
 - г) гребешки кожи
- 160 Для приготовления моющего раствора взять: 5 г порошка до 1 л воды и:
- а) 33% пергидроль – 20 мл
 - б) 33% пергидроль – 14,5 мл
 - в) 33% пергидроль – 17 мл
- 161 В дерме различают следующие потовые железы:
- а) эккринные и апокринные
 - б) железистые и соединительно-тканые
 - в) эпителиальные и дермальные
 - г) железистые и дермальные
- 162 Осложнениями гонорейного заболевания являются:
- а) уретрит
 - б) сальпингоофорит
 - в) бесплодие
 - г) гепатит
- 163 Для неотложной помощи при отёке Квинке применяют:
- а) мочегонное
 - б) гипотензивное
 - в) десенсибилизирующее
 - г) витамины
- 164 Для простого герпеса характерны:
- а) гнойнички – гнойные корки – язвы
 - б) узелки – чешуйки – гиперпигментация
 - в) пузырь – эрозии – серозные корки
 - г) бугорки – язвы – геморрагические корки
- 165 Метод определения личности человека по отпечаткам пальцев называется:
- а) дерматоглификой
 - б) дермабразией
 - в) дактилоскопией
 - г) дарвинизмом

- 166 Фальсифицированное лекарственное средство – это:
- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.
 - б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе.
 - в) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.
 - г) лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства.
- 167 К классическим венерическим болезням относится:
- а) хламидиоз
 - б) сифилис
 - в) гарднереллез
 - г) уреаплазмоз
- 168 Достоверный признак врожденного сифилиса:
- а) ягодицеобразный череп
 - б) триада Гетчинсона
 - в) рубцы Робинсона-Фурнье
 - г) все перечисленное
- 169 К новообразованиям кожи относятся:
- а) Папиллома
 - б) Невус
 - в) Липома
 - г) Все перечисленное
- 170 Разглашение врачебной тайны без согласия пациента не является законным:
- а) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю
 - б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений
 - в) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда
 - г) по желанию ближайших родственников
- 171 Наружный слой кожи называется:
- а) эпидермис
 - б) базальный слой
 - в) дерма
 - г) подкожная жировая клетчатка
- 172 ИППП вирусной этиологии – это:
- а) остроконечные бородавки
 - б) микоплазмоз
 - в) шигеллез
 - г) хламидиоз
- 173 Венерическая болезнь бактериальной этиологии:
- а) сифилис
 - б) СПИД
 - в) трихомониаз
 - г) кандидоз

- 174 К методам контроля излеченности урогенитального трихомониаза относятся:
- а) культуральный метод
 - б) микроскопия фиксированного мазка
 - в) микроскопия фиксированного мазка
 - г) ПЦР – диагностика
 - д) визуальный осмотр
- 175 Фальсифицированное лекарственное средство – это:
- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.
 - б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе.
 - в) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.
 - г) лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства.
- 176 Функция кожи:
- а) эндокринная
 - б) гормональная
 - в) защитная
 - г) гуморальная
- 177 Пути передачи гепатита Б:
- а) алиментарный
 - б) бытовой
 - в) воздушно-капельный
 - г) вертикальный
- 178 Микозы гладкой кожи проявляются чаще всего как:
- а) красные шелушащиеся пятна с четкими границами
 - б) гипертрофированные инфильтраты
 - в) множественные гранулёмы красного цвета
 - г) язвы и эрозии с серозно-гнойным отделяемым
- 179 Серологические реакции для диагностики сифилиса включают:
- а) реакцию иммобилизации бледных трепонем (РИБТ)
 - б) реакцию пассивной гемагглютинации (РПГА)
 - в) полимеразную цепную реакцию (ПЦР)
 - г) реакцию Герксгеймера
- 180 Критерии диагностики бактериального вагиноза:
- а) Гомогенные выделения серо-белого цвета
 - б) Значение РН влагалищного секрета $\geq 4,5$
 - в) Положительный результат аминотеста
 - г) Все перечисленные критерии
- 181 Пигмент, от которого зависит, цвет кожи называется:
- а) эленидин
 - б) гистидин
 - в) меланин
 - г) соматотропин

- 182 Инкубационный период при сифилисе чаще всего составляет:
- а) 21-31 день
 - б) 1-2 дня
 - в) 12 дней
 - г) 1-2 месяца
- 183 Какой симптом не характерен для псориаза:
- а) Феномен скрытого шелушения
 - б) Феномен кровавой росы;
 - в) Феномен облатки
- 184 Пути передачи внутрибольничной инфекции:
- а) воздушно-капельный
 - б) парентеральный
 - в) контактный
 - г) всё перечисленное
- 185 Полная регенерация ногтевой пластинки происходит за:
- а) 50 дней
 - б) 90 дней
 - в) 120 дней
 - г) 170 дней
- 186 Какие физиологические функции не выполняет кожа:
- а) Защитная
 - б) терморегулирующая
 - в) Рецепторная
 - г) Опорно-двигательная
- 187 Тактика в отношении половых контактов к больному сифилисом, здоровых на данный момент, если от момента последней половой связи прошло от 2 до 4 месяцев:
- а) Клинико-серологическое наблюдение в течение 6 месяцев.
 - б) Повторное обследование через месяц
 - в) Превентивное лечение с последующим клинико-серологическим наблюдением
 - г) Повторное клинико-серологическое обследование через 2 месяца
- 188 Какой дермографизм характерен для больных атопическим дерматитом:
- а) Розовый
 - б) Смешанный
 - в) Белый
 - г) Никакой
- 189 Что не характерно для розового pityriasis Жибера:
- а) высыпания в виде пятен
 - б) зуд кожи
 - в) отсутствие высыпаний
 - г) положительный феномен Кебнера
- 190 К стафилококковым пиодермиям относится:
- а) эритродермия
 - б) микропория
 - в) гидраденит
 - г) эктима
- 191 Витамины D образуются в:
- а) эпидермисе
 - б) дерме
 - в) гиподерме
 - г) подкожно жировом слое

- 192 Карбункул – это:
- а) поверхностная стрептококковая пиодермия
 - б) поверхностная стафилококковая пиодермия
 - в) глубокая стрептококковая пиодермия
 - г) глубокая стафилококковая пиодермия
- 193 Сальные железы:
- а) альвеолярные
 - б) трубчатые
- 194 Кто является возбудителем чесотки:
- а) *Demodex folliculorum*
 - б) *Sarcoptes scabies*
 - в) *Candida albicans*
 - г) *Pediculus pubis*
- 195 Фармакодинамика - это:
- а) раздел фармакологии, изучающий влияние лекарственного средства на организм больного или здорового человека
 - б) раздел фармакологии, изучающий процессы, происходящие с лекарственным средством от момента его поступления в организм до его выведения
 - в) раздел фармакологии, рассматривающий основы генетической чувствительности организма к лекарственному средству
 - г) раздел фармакологии, рассматривающий особенности взаимодействия лекарственных веществ между собой
- 196 Основными элементами кожных высыпаний при контактном дерматите являются:
- а) розеолы
 - б) бугорки
 - в) эритемы
 - г) эрозии
- 197 Эпидермофития – это заболевание:
- а) вирусной этиологии
 - б) грибковой этиологии
 - в) бактериальной этиологии
 - г) аллергической этиологии
- 198 В норме химическая реакция влагалищного содержимого:
- а) Кислая
 - б) Щелочная
 - в) Нейтральная
- 199 К основным симптомам СПИДА относятся:
- а) гепатоспленомегалия, слабость, головная боль
 - б) лимфаденопатия, диарея более месяца, лихорадка более месяца
 - в) потеря массы тела, желтушность кожных покровов
 - г) ночные поты, слабость
- 200 Для лечения чесотки можно использовать препараты:
- а) 33% серная мазь
 - б) 5% диметроловая мазь
 - в) 20% эмульсия бензилбензоата
 - г) 1% раствор карболовой кислоты

- 201 Микоплазмоз – заболевание, при котором поражаются:
- а) кожа, ногти, волосяные фолликулы, потовые железы
 - б) ногти, потовые и сальные железы, коллагеновые волокна
 - в) влагалище, шейка матки, эндометрий, мочеиспускательный канал
 - г) роговой, элеидиновый, шиповидный и базальный слои эпидермиса
- 202 Диспансеризация больного чесоткой проводится:
- а) 1 месяц
 - б) 3 месяца
 - в) 6 месяцев
 - г) 12 месяцев
- 203 Причина старческого зуда:
- а) инфекции
 - б) микозы
 - в) паразитарные инфекции
 - г) обезвоживание, сухость кожи
- 204 Вторым симптомом первичного сифилиса – регионарный лимфаденит, возникает:
- а) через 1-2 месяца после твердого шанкра
 - б) на 5-7 дней после появления твердого шанкра
 - в) одновременно с твердым шанкром
 - г) через 16 недель после появления твердого шанкра
- 205 Гнойное отделяемое из пустул рекомендуют удалять стерильными ватными тампонами с раствором:
- а) облепихового масла
 - б) перекиси водорода 3%
 - в) перекиси водорода 30%
 - г) стерильного вазелинового масла
- 206 К венерическим заболеваниям относится:
- а) чесотка
 - б) микоплазмоз
 - в) трихофития
 - г) гонококковая инфекция
- 207 Площадь кожного покрова человека составляет:
- а) 5-6 м²
 - б) 1,5-2,5 м²
 - в) 0,5-0,7 м²
 - г) 3-4 м²
- 208 Антисептическим действием при наружном применении обладают:
- а) глицерин
 - б) анилиновые красители
 - в) тальк
 - г) анестезин
- 209 Типичная локализация отрубевидного лишая:
- а) лицо
 - б) в/ч головы
 - в) спина
 - г) внутренняя поверхность бедер

- 210 К вторичным морфологическим элементам кожной сыпи относятся:
- а) папулы, уртикарии, пигментация
 - б) корки, рубцы, лихенизация
 - в) шелушение, эрозии, пустулы
 - г) везикулы, шелушение, эрозии
- 211 При микроспории поражаются:
- а) внутренние органы
 - б) большие и малые суставы
 - в) гладкая кожа, волосы
 - г) слизистые оболочки
- 212 Характерный признак псориаза:
- а) зуд
 - б) «серозная роса»
 - в) жжение
 - г) гиперемия
- 213 Стрептобацилла Дюкрея вызывает:
- а) сифилис
 - б) мягкий шанкр
 - в) венерическую язву
 - г) твердый шанкр
- 214 Поражение ногтей грибковой этиологии – это:
- а) онихогрифоз
 - б) онихомезис
 - в) онихомикоз
 - г) ониходистрофия
- 215 К стафилококковым пиодермиям относится:
- а) карбункул
 - б) импетиго
 - в) герпес
 - г) экзема
- 216 При массовых профилактических осмотрах для выявления микроспории используют:
- а) микроспорию волос и чешуек
 - б) люминисцентный метод
 - в) бактериологический метод
 - г) пробное лечение
- 217 Кровь на микрореакцию берут:
- а) из пальца
 - б) только из локтевой вены
 - в) только из подключичной вены
 - г) из любой вены
- 218 Эпидермофития - грибковое заболевание с локализацией в области:
- а) паховых складок
 - б) волосистой части головы
 - в) стоп, ногтевых пластинок
 - г) слизистых оболочек
- 219 Термин «стригущий лишай» объединяет:
- а) эпидермофитию и руброфитию
 - б) микроспорию и трихофитию волосистой части головы
 - в) импетиго и сикоз
 - г) розовый и разноцветный лишай

- 220 Особенность течения чесотки у детей:
- а) бессимптомность течения дерматоза
 - б) высыпания на коже лица
 - в) шелушение кожи
 - г) сильный зуд днем
- 221 Какова характеристика зуда при чесотке:
- а) усиливающийся вечером
 - б) не зависящий от времени суток
 - в) усиливающийся днем
 - г) усиливающийся после физической нагрузки
- 222 Дети в детские коллективы при микроспории допускаются:
- а) после 3-кратного отрицательного обследования на грибы
 - б) через месяц от момента заболевания
 - в) после снятия с учёта
- 223 Сероводородные ванны показаны при:
- а) экземе
 - б) нейродермите
 - в) микроспории
 - г) гидроадените
- 224 Температура серо-водородной лечебной ванны должна быть:
- а) 18-24 градуса
 - б) 36-37 градусов
 - в) 38-40 градусов
 - г) 42-45 градуса
- 225 При проведении санитарно-просветительной лекции-беседы для населения по профилактике инфекционных дерматозов медицинский работник должен обязательно учитывать:
- а) размер денежного вознаграждения лектору
 - б) особенности состава слушателей в аудитории
 - в) численность аудитории слушателей
 - г) удаленность местонахождения здания, аудитории
- 226 Скрофулодерма – это:
- а) туберкулёз кожи
 - б) сифилитическое поражение кожи
 - в) осложнение псориаза
 - г) осложнение нейродермита
- 227 К современным средствам лечения педикулеза относят:
- а) фулорцин
 - б) мазь дипрогент
 - в) ламизил
 - г) мифокс
- 228 Укажите методы лабораторной диагностики Микоплазма genitalis:
- а) Прямая бактериоскопия
 - б) Бактериологическое исследование
 - в) ИФА исследование
 - г) Исследование методом ПЦР
- 229 Реакция (Ph) пота:
- а) нейтральная
 - б) щелочная
 - в) кислая

- 230 Меланома развивается из:
- а) пигментных клеток эпидермиса
 - б) гистиобластов
 - в) тучных клеток
 - г) жировых клеток
- 231 Методы стерилизации:
- а) паровой
 - б) воздушный
 - в) химический
 - г) всё перечисленное
- 232 Первым признаком появления пролежней является:
- а) участок бледной кожи в местах риска развития пролежней
 - б) участок стойкой не исчезающей гиперемии
 - в) участок гиперемии кожи, исчезающий при осмотре за 1-2 минуты
 - г) участок некроза кожи
- 233 Кожный покров содержит рецепторы:
- а) обонятельные
 - б) болевые
 - в) вкусовые
 - г) пигментные
- 234 Заболевание кожи и слизистых оболочек, вызываемое дрожжевыми грибами – это:
- а) микроспория
 - б) трихофития
 - в) кандидоз
 - г) кондиломы остроконечные
- 235 Соотношение порошка и жироподобного вещества в пастах:
- а) 50% порошка и 50% жира
 - б) 25% порошка и 75% жира
 - в) 75% порошка и 25% жира
 - г) 45 % порошка и 55% жира
- 236 Для этиотропного лечения сифилиса чаще применяют препараты:
- а) витамины
 - б) группы пенициллина
 - в) кортикостероиды
 - г) иммуномодуляторы
- 237 Для лечения гонореи применяют:
- а) антибиотики
 - б) витамины
 - в) десенсибилизирующие
- 238 Контагиозный моллюск вызывается:
- а) патогенными грибами
 - б) вирусами
 - в) пиогенными кокками
 - г) хламидиями
- 239 Потовых желез в кожном покрове человека имеется в количестве равном:
- а) 30 миллиардам
 - б) 3-3,5 миллионам
 - в) 100 тысячам
 - г) 55 тысячам

- 240 Общественная профилактика ИППП включает:
- а) серологическое обследование больных соматических стационаров
 - б) профилактические осмотры декретированных контингентов
 - в) принудительное обследование с помощью РМП всех студентов
 - г) санитарно-просветительную работу
- 241 Лихеноидный туберкулёз кожи чаще встречается у:
- а) взрослых
 - б) пожилых
 - в) детей до 1 года
 - г) детском и юношеском возрасте
- 242 Из каких компонентов состоит крем:
- а) воды и жира
 - б) жира и порошка
 - в) жира, порошка и воды
- 243 Симптомы, характерные для синдрома Рейтера включают:
- а) уретрит, артрит, конъюнктивит, цервицит
 - б) уретрит, эндометрит, сальпингит, оофорит
 - в) уретрит, сальпингит, эндометрит,
 - г) уретрит, оофорит, аднексит, эпидидимит
- 244 К вторичным элементам кожной сыпи относится:
- а) Узелок
 - б) Пузырек
 - в) Эрозия
 - г) Корочка
- 245 Цитомегаловирус может обнаруживаться в:
- а) слюне, крови
 - б) эпидермисе
 - в) моче
 - г) сперме
 - д) грудном молоке
- 246 Лейкоцитоз в мазках для бактериального вагиноза характерен:
- а) Да
 - б) Нет
 - в) Не всегда
- 247 Для диагностики гонококковой инфекции, прежде всего, используют:
- а) бактериологический посев
 - б) микроскопическое исследование
 - в) биохимическое исследование
 - г) реакцию Кана
- 248 Воспаление мочеполовых органов грибковой этиологии:
- а) хламидиоз
 - б) кандидоз
 - в) трихомониаз
 - г) сифилис
- 249 Воспаление мочеполовых органов грибковой этиологии – это:
- а) микоплазмоз
 - б) контагиозный моллюск
 - в) кандидоз
 - г) уреаплазмоз

- 250 Источником заражения дерматозоонозами для человека являются:
- а) домашние животные
 - б) больные люди
 - в) книги
 - г) посуда
- 251 Какие заболевания из перечисленных не относятся к ИППП:
- а) хламидиоз
 - б) генитальный герпес
 - в) урогенитальный кандидоз
 - г) аногенитальные бородавки
- 252 Наиболее частые места локализации при чесотке у взрослых:
- а) ладони и подошвы
 - б) слизистые оболочки
 - в) межпальцевые складки кистей
 - г) лицо
- 253 Клиническими проявлениями микозов гладкой кожи чаще являются:
- а) красные шелушащиеся пятна с четкими границами
 - б) гипертрофированные инфильтраты
 - в) множественные уртикарии
 - г) кольцевидной формы скопления бугорков
- 254 Инфекционный дерматоз – это:
- а) чешуйчатый лишай
 - б) разноцветный или отрубевидный лишай
 - в) красный плоский лишай
 - г) розовый лишай
- 255 Комплекс мер, направленных на предупреждение попадания микробов в рану по время операционных, лечебных и диагностических мероприятий, это:
- а) асептика
 - б) антисептика
 - в) дезинфекция
 - г) стерилизация
- 256 Избыточный рост волос, не соответствующий данной области кожи и возрасту пациента – это:
- а) алопеция
 - б) плешивость
 - в) гипертрихоз
 - г) трихофития
- 257 Заболевание соединительной ткани кожи – это:
- а) псориаз
 - б) вульгарная волчанка
 - в) склеродермия
 - г) красный плоский лишай
- 258 Биодоступность лекарственного препарата – это:
- а) время, за которое концентрация лекарства в крови снижается на 50%
 - б) процесс превращения вещества в организме
 - в) содержание свободного вещества в плазме крови относительно введенной дозы
 - г) совокупность процессов биотрансформации и выведения

- 259 Клетки «Лангерганса» находятся в:
- а) блестящем слое
 - б) шиповатом слое
 - в) базальном слое
 - г) роговом слое
- 260 Методы лечения, применяемые при псориазе:
- а) ПУВА-терапия
 - б) рентгенотерапия
 - в) гемосорбция
 - г) гамматерапия
- 261 Микроскопию в тёмном поле проводят для диагностики:
- а) сифилиса
 - б) чесотки
 - в) туберкулёза
 - г) гонореи
- 262 Дерматофитии или дерматомикозы характеризуются поражением:
- а) кожи, ногтей и волос
 - б) только ногтевых пластинок
 - в) только волос
 - г) кожи, ногтей, волос, слизистых оболочек
- 263 Для сифилитической ангины характерно:
- а) одностороннее поражение миндалин
 - б) отсутствие температуры
 - в) резкая боль в горле
 - г) высокая лихорадка с ознобом
- 264 Заражение эпидермофитией стоп происходит:
- а) в банях, в бассейнах, через обувь, носки
 - б) при поездках в общественном транспорте
 - в) воздушно-капельным путем
 - г) только при пользовании общими столовыми приборами
- 265 Дермой называется:
- а) поверхностный слой кожи
 - б) собственно кожа
 - в) подкожная жировая клетчатка
 - г) базальный слой
- 266 Герпетиформный дерматит это:
- а) Вирусное заболевание кожи
 - б) Бактериальная инфекция кожи
 - в) Грибковое заболевание кожи
 - г) Не является инфекцией кожи
- 267 Больной пузырчаткой должен принимать постоянно:
- а) антибиотики
 - б) кортикостероиды
 - в) биостимуляторы
 - г) витамины
- 268 К придаткам кожи относится:
- а) родимое пятно
 - б) сальная железа
 - в) эпидермис
 - г) тельца фатера – Паччини

- 269 Где отсутствуют сальные железы:
- а) на груди
 - б) на ладонях
 - в) в подмышечных впадинах
 - г) в области гениталий
- 270 Кожа состоит из:
- а) двух слоев
 - б) пяти слоев
 - в) трех слоев
 - г) четырех слоев
- 271 Какие факторы могут быть причиной кожных болезней:
- а) Эндогенные
 - б) Экзогенные
 - в) Химические и инфекционные
 - г) Все перечисленные
- 272 Трихомониаз вызывается:
- а) вирусами
 - б) бактериями
 - в) грибами
 - г) простейшими
- 273 Кератолическое средство:
- а) салициловая кислота
 - б) нафталин
 - в) дёготь
 - г) ментол
- 274 Небольшое скопление жидкости между эпидермисом и дермой - это:
- а) пятно
 - б) пузырек
 - в) узелок
 - г) волдырь
- 275 К доброкачественным новообразованиям кожи относятся:
- а) липомы, папилломы
 - б) меланомы, саркомы
 - в) эпителиомы
 - г) дерматосаркомы
- 276 Назвать средство, применяемое при лечении пузырчатки:
- а) примочки с марганцовокислым калием
 - б) с 70% спиртом
 - в) мазь синтомициновая
 - г) туширование анилиновыми красками
- 277 К эндогенным предрасполагающим причинам стрепто-стафилодермий кожи относятся:
- а) нарушения обмена веществ, эндокринопатии
 - б) авитаминозы, анемии, нарушения кровообращения
 - в) воздействия экстрасенсов
 - г) сахарный диабет, иммунодефициты

278 Гонококковая инфекция вызывается:

- а) вирусами
- б) гонококками
- в) спирохетами
- г) хламидиями

279 Для диагностики хламидиоза исследуют материал, полученный из:

- а) лимфоузла
- б) зева
- в) мочеполовых органов
- г) прямой кишки

280 Муфтообразные чехлики имеются при:

- а) псориазе
- б) фавусе
- в) микроспории
- г) отрубевидном лишае

281 Понятие «медицинская этика» включает в себя:

- а) форму общественного сознания и систему социальной регуляции деятельности медицинских работников
- б) форму правовой регуляции деятельности медицинских работников
- в) учение о долге (должном) в деятельности медицинских работников
- г) представления об условиях оптимальной деятельности медицинских работников

282 Для экспресс-диагностики сифилиса кровь берут из:

- а) вены
- б) пальца
- в) артерии

283 К эпидермису относятся слои:

- а) сосочковый
- б) сетчатый
- в) зернистый
- г) шиповидный

284 Трихомониаз - заболевание, которое вызывают:

- а) грибы
- б) бактерии
- в) простейшие
- г) вирусы

285 Микозы ногтевых пластинок называются:

- а) глубокие микозы
- б) онихомикозы
- в) трихомикозы
- г) ониходистрофии

286 Препарат выбора для лечения хламидиоза у беременных:

- а) джозамицин
- б) азитровицин
- в) доксициклин

287 Потовые железы имеют:

- а) трубчатое строение
- б) альвеолярное строение

288 Осложнение остроконечных кондилом:

- а) бесплодие
- б) выкидыши
- в) рак шейки матки
- г) рак легкого

289 В каком слое кожи не находятся болевые нервные окончания:

- а) в дерме
- б) подкожной жировой клетчатке
- в) эпидермисе
- г) Всё перечисленное

290 Сикоз локализуется, как правило, на коже:

- а) лица (в области бороды и усов)
- б) ладоней и подошв
- в) живота
- г) спины

291 Гидраденит - это:

- а) избыточная потливость ладоней и стоп
- б) гнойное воспаление апокринных потовых желез
- в) снижение суточного количества выделения пота
- г) аномальное расположение потовых желез

292 Первичный морфологический элемент:

- а) рубец
- б) трещина
- в) гнойничок
- г) ссадина

293 Понятие «медицинская этика» включает в себя:

- а) форму общественного сознания и систему социальной регуляции деятельности медицинских работников
- б) форму правовой регуляции деятельности медицинских работников
- в) учение о долге (должном) в деятельности медицинских работников
- г) представления об условиях оптимальной деятельности медицинских работников

294 К аллергическим дерматозам относится:

- а) токсикодермия
- б) пиодермия
- в) сухая себорея
- г) жирная себорея

295 К инфекционным дерматозам относится:

- а) чешуйчатый лишай
- б) красный плоский лишай
- в) разноцветный лишай
- г) крапивница

296 При оформлении помещений КВД нельзя вывешивать таблички:

- а) микологическое отделение
- б) для венерических больных
- в) юрист-консультант
- г) диагностическая лаборатория

297 Резорбтивная функция кожи обеспечивает:

- а) терморегуляцию
- б) секрецию
- в) обратное всасывание
- г) иммунный ответ

298 К гнойничковым болезням кожи относится:

- а) Фурункул
- б) Эпидермофития
- в) Трихофития
- г) Favus

299 После образования твёрдого шанкра КСР становится положительной через:

- а) 1 неделю
- б) 2-4 недели
- в) 40 дней
- г) 6-7 недель

300 Предметом изучения этики является:

- а) этикет
- б) мораль и нравственность
- в) общественные отношения
- г) развитие обрядов, традиций социума