

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

(для медицинских сестёр гинекологического отделения, прошедших обучение по
циклам "Сестринская помощь гинекологическим больным",
профессиональной переподготовки по специальности
«Сестринское дело»)

- 1 Осложнения при неполном аборте:
 - а) повышение температуры тела
 - б) продолжающееся кровотечение
 - в) схваткообразные боли в нижнем отделе живота
 - г) анемия, инфекция
- 2 Подготовка операционного поля перед плановой операцией проводится:
 - а) утром в день операции
 - б) накануне вечером
 - в) за 30 минут до операции
 - г) дома накануне госпитализации
- 3 Наиболее точный метод диагностики патологии при маточном кровотечении:
 - а) кольпоскопия;
 - б) лапароскопия;
 - в) УЗИ;
 - г) гистероскопия
- 4 Истинным предраковым заболеванием шейки матки является:
 - а) эктропион шейки
 - б) дисплазия шейки
 - в) эндометриоз шейки
 - г) истинная эрозия
- 5 Мазки на гонорею при беременности берутся из:
 - а) уретры
 - б) цервикального канала
 - в) переднего свода влагалища
 - г) вульвы
- 6 Имплантация плодного яйца происходит за счет:
 - а) эмбриобласта
 - б) эндометрия
 - в) миометрия
 - г) трофобласта
- 7 ВИЧ-инфекция передаётся через:
 - а) грудное молоко
 - б) кровь
 - в) кухонную посуду
 - г) сперму
- 8 Для экзофитной формы рака шейки матки характерно:
 - а) разрастание ткани на шейке в виде «цветной капусты»
 - б) бочкообразная форма шейки
 - в) при осмотре шейка маленькая, атрофичная
 - г) десквамация эпителия вокруг наружного зева

- 9 Осложнением медицинского аборта не является:
- а) бесплодие;
 - б) нарушение функции яичников;
 - в) эндометрит;
 - г) перфорация матки;
 - д) цистит
- 10 Основные показания к кольпоскопии:
- а) бесплодие;
 - б) подозрение на порок развития гениталий;
 - в) подозрение на фоновые, предраковые заболевания и рак шейки матки;
 - г) невынашивание беременности;
 - д) маточное кровотечение
- 11 Перед ультразвуковым исследованием (УЗИ) органов малого таза вагинальным датчиком необходимо:
- а) выпить жидкости и не опорожнять мочевой пузырь
 - б) опорожнить мочевой пузырь
 - в) ввести в мочевой пузырь контрастное вещество
- 12 Использование комбинированных оральных контрацептивов (КОК) противопоказано женщинам при:
- а) сахарном диабете с сосудистыми осложнениями
 - б) эндометриозе
 - в) тромбозе глубоких вен
 - г) остром вирусном гепатите
 - д) миоме матки
- 13 К группе риска по развитию воспалительных послеродовых заболеваний относятся женщины:
- а) с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом
 - б) с хроническим воспалительным процессом гениталий
 - в) с экстрагенитальными воспалительными заболеваниями (тонзиллит, пиелонефрит)
 - г) со всем перечисленным
 - д) ни с чем из перечисленного
- 14 Беременность при туберкулезе:
- а) протекает без особенностей
 - б) всегда прерывается
 - в) ухудшает течение туберкулеза
 - г) нежелательна
- 15 Наиболее точный метод диагностики рака шейки матки – это:
- а) расширенная кольпоскопия
 - б) цитологическое исследование
 - в) биопсия шейки с выскабливанием цервикального канала
 - г) гистеросальпингография
- 16 ВИЧ относится к семейству:
- а) рабдовирусов
 - б) гепадновирусов
 - в) ретровирусов
 - г) аденовирусов

- 17 Круглые связки матки отклоняют матку:
- а)кзади, книзу
 - б)кверху, кпереди
 - в)кзади
 - г)в сторону
- 18 Функция матки:
- а)менструальная
 - б)секреторная
 - в)выделительная
 - г)защитная
- 19 Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища:
- а)белые, творожные
 - б)серые, с аминным запахом
 - в)прозрачные, слизистые
 - г)желто-зеленые, пенистые
 - д)серозные с прожилками крови
- 20 Рвота тяжёлой степени бывает:
- а)2-3 раза в сутки
 - б)10-12 раз в сутки
 - в)до 20 раз в сутки
 - г)5-6 раз в сутки
- 21 Предметом изучения этики является:
- а)этикет
 - б)мораль и нравственность
 - в)общественные отношения
 - г)развитие обрядов, традиций социума
- 22 Снижение систолического давления до 80-60 мм рт.ст. и ниже характерно для:
- а)септицемии
 - б)септического шока
 - в)асцитного перитонита
 - г)параметрита
 - д)сальпингоофорита
- 23 Вероятные признаки беременности:
- а)тошнота
 - б)изменение артериального давления
 - в)синюшность слизистой влагалища и шейки матки
 - г)сонливость
- 24 На локтевой и коленный суставы накладывается повязка:
- а) Циркулярная.
 - б)Спиральная.
 - в)8-образная.
 - г) «Черепашья».
- 25 В набор инструментов для диагностического выскабливания полости матки входят:
- а) конхотом
 - б) пулевые шипцы
 - в) кюретки
 - г) скальпель
 - д) расширители Гегара

- 26 Первая менструация у девочек (менархе) в норме начинается в возрасте:
- а) 11-13 лет
 - б) 16-17 лет
 - в) 8-9 лет
 - г) 20-22 года
- 27 При беременности у больных сахарным диабетом:
- а) повышается потребность в инсулине
 - б) снижается потребность в инсулине
 - в) ухудшается течение болезни
 - г) повышается уровень сахара в крови
- 28 Слизистая оболочка влагалища покрыта эпителием:
- а) цилиндрическим
 - б) многослойным плоским
 - в) железистым
 - г) однослойным плоским
- 29 Клиническими проявлениями гиперпластических процессов в репродуктивном периоде являются:
- а) ациклические кровотечения
 - б) наличие предменструальной «мазни»
 - в) меноррагии
 - г) правильные ответы 1 и 2
 - д) все ответы правильные
- 30 Симптомы нарастающего отека и гипоксии мозга (головная боль, тошнота, рвота) характерны для:
- а) водянки
 - б) нефропатии II степени
 - в) нефропатии III степени
 - г) преэклампсии
- 31 Болезненная язвочка на малой половой губе - это скорее всего:
- а) генитальный герпес
 - б) карбункул
 - в) первичный сифилис
 - г) псориаз
- 32 При тяжелом состоянии больной с прервавшейся трубной беременностью показано:
- а) немедленное переливание крови
 - б) безотлагательное удаление источника кровотечения (беременной трубы)
 - в) надежный гемостаз
 - г) все перечисленное
 - д) ничто из перечисленного
- 33 Наружные половые органы:
- а) влагалище
 - б) маточные трубы
 - в) клитор
 - г) молочные железы
- 34 Особенности нормального менструального цикла являются:
- а) овуляция
 - б) образование желтого тела в яичнике
 - в) преобладание гестагенов во второй фазе цикла
 - г) все перечисленное
 - д) ничто из перечисленного

- 35 Не является фактором риска развития рака яичников:
- а) отсутствие родов в анамнезе;
 - б) выкидыши или значительное количество беременностей в анамнезе;
 - в) рак яичников у близких родственников;
 - г) хронический пиелонефрит;
 - д) эндокринные заболевания в анамнезе.
- 36 Величина матки при 12-ти недельной беременности с:
- а) женский кулак
 - б) куриное яйцо
 - в) гусиное яйцо
 - г) головку новорожденного
- 37 Злокачественные поражения половых органов и беременность:
- а)осложняют течение друг друга
 - б)сопровождаются кровотечением
 - в)вызывают уродства плода
- 38 Для перекрута «ножки» кисты характерна клиника:
- а) резкое снижение артериального давления (АД)
 - б) тошнота, рвота
 - в) жидкий стул
 - г) живот умеренно вздут, чаще асимметрично
- 39 Метод исследования, позволяющий установить проходимость маточных труб:
- а) диагностическое выскабливание полости матки
 - б) кольпоскопия
 - в) гистеросальпингография
 - г) гистероскопия
- 40 Гормональнозависимый слой эндометрия матки:
- а) базальный
 - б) функциональный
 - в) компактный
 - г) строма
- 41 Антенатальная охрана плода – это:
- а) медицинская помощь во время родов
 - б) комплекс лечебно-профилактических мероприятий для женщин до беременности
 - в) дородовая профилактическая помощь
 - г) комплекс лечебно-профилактических мероприятий для беременных женщин
- 42 Во время беременности вирус простого герпеса (ВПГ-2) может вызвать:
- а) многоводие
 - б) привычное невынашивание
 - в) фетоплацентарную недостаточность
 - г) уродство плода
- 43 Цель санитарного просвещения:
- а)формирование высокой санитарной культуры, сознательного гигиенического поведения граждан
 - б)нетерпимое и критичное отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к условиям окружающей среды, наносящим ущерб здоровью
 - в)правильное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленное на выздоровление
 - г)овладение знаниями, необходимыми для соблюдения правил гигиенического поведения

- 44 Эндометриоз – это:
- а) заболевание воспалительного характера
 - б) разрастание эндометриальноподобной ткани за пределами слизистой оболочки матки
 - в) разновидность опухолей гениталий
 - г) эндометриальные кисты
- 45 Эндометриоз - это:
- а) дисгормональная гиперплазия эктопированного эндометрия;
 - б) доброкачественное разрастание ткани, подобной эндометрию;
 - в) опухолевидный процесс
 - г) все вышеперечисленное
- 46 К дополнительным методам обследования в гинекологии относятся:
- а) биопсия шейки матки
 - б) бимануальное влагалищное исследование
 - в) тесты функциональной диагностики
 - г) пункция заднего свода влагалища
- 47 Атрезия влагалища – это:
- а) первичное отсутствие части влагалища;
 - б) полное или частичное заращение влагалища, связанное с воспалительным процессом в ante- и постнатальном периоде;
 - в) первичное полное отсутствие влагалища;
 - г) полная перегородка во влагалище
- 48 Наступление менструации не зависит от:
- а) стероидных гормонов яичника;
 - б) чувствительности эндометрия к половым стероидам;
 - в) количества гонадотропинов;
 - г) проходимости фаллопиевых труб.
- 49 Фармакодинамика - это:
- а) раздел фармакологии, изучающий влияние лекарственного средства на организм больного или здорового человека
 - б) раздел фармакологии, изучающий процессы, происходящие с лекарственным средством от момента его поступления в организм до его выведения
 - в) раздел фармакологии, рассматривающий основы генетической чувствительности организма к лекарственному средству
 - г) раздел фармакологии, рассматривающий особенности взаимодействия лекарственных веществ между собой
- 50 Скрининг-методом для выявления патологий шейки матки является:
- а) визуальный осмотр
 - б) кольпоскопия
 - в) радионуклидный метод
 - г) цитологическое исследование мазков
- 51 Способность понимания психологических состояний других людей и сопереживание им, умение по-смотреть на ситуацию глазами другого - это качество личности:
- а) доброжелательность
 - б) открытость
 - в) конфронтация
 - г) эмпатия
 - д) аутентичность

- 52 Среднее количество крови, которое теряет женщина во время менструации:
- а) 150-200 мл
 - б) 25- 60 мл
 - в) 60-100 мл
 - г) 100- 150 мл
 - д) более 200 мл
- 53 Нарушение внематочной беременности по типу разрыва маточной трубы: сопровождают
- а) внезапный приступ боли в одной из подвздошных областей
 - б) иррадиация боли в плечо
 - в) тошнота (или рвота)
 - г) правильные ответы 1 и 2
 - д) все ответы правильные
- 54 Средняя продолжительность менструального цикла:
- а) 72 дня;
 - б) 75 дней;
 - в) 28 дней;
 - г) 35 дней;
 - д) 38 дней.
- 55 Канцелярские отходы, упаковка, инвентарь, потерявший потребительские свойства, образующиеся в медицинском учреждении, относятся к медицинским отходам:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 56 Кисты яичников относятся к:
- а) истинным опухолям
 - б) опухолевидным образованиям
 - в) воспалительным заболеваниям
 - г) обменным заболеваниям
- 57 Аменорея – это отсутствие менструации в течение:
- а) 2 - х месяцев
 - б) 6 - ти месяцев
 - в) 1 - го года
 - г) 2 - х лет
- 58 У больной с клиническим диагнозом апоплексии яичника показанием к операции является:
- а) наличие воспаления придатков в анамнезе;
 - б) дисфункция яичников в анамнезе;
 - в) болевой синдром;
 - г) внутрибрюшное кровотечение.
- 59 После овуляции яйцеклетка сохраняет способность к оплодотворению в течение:
- а) 6 часов
 - б) 12-24 часов
 - в) 3-5 суток
 - г) 10 суток

- 60 Наличие судорог в икроножных мышцах у беременных говорит о нарушении функции:
- а)желудочно-кишечного тракта
 - б)сердечно-сосудистой системы
 - в)паращитовидных желез
 - г)гипоталамо-гипофизарной системы
- 61 При эндометриозе шейки матки на ней будут видны:
- а) белые полосы различной длины
 - б) «глазки» синеватого цвета
 - в) крошковидные включения белого цвета
 - г) мелкие кисточки с серозным содержимым
- 62 В диагностике причин маточного кровотечения не используется:
- а) кольпоскопия;
 - б) гистеросальпингография;
 - в) УЗИ;
 - г)раздельное выскабливание слизистой матки;
 - д)гистероскопия
- 63 В матке различают следующие основные отделы:
- а) тело
 - б) шейку
 - в) дно
 - г) перешеек
- 64 Апоплексия яичника чаще наступает:
- а) в период овуляции;
 - б) в стадию васкуляризации желтого тела;
 - в) в период созревания граафова фолликула;
 - г) в период атрезии фолликулов.
- 65 В полость матки инфекция чаще всего проникает через цервикальный канал:
- а)с помощью трихомонад
 - б)с помощью сперматозоидов
 - в)благодаря пассивному транспорту
 - г)в результате отрицательного внутрибрюшного давления, возникающего при движении диа-фрагмы
 - д)всеми перечисленными способами
 - е)ни одним из перечисленных способов
- 66 Факторы, способствующие возникновению рака шейки матки кроме:
- а)гормональная контрацепция
 - б)рубцовая деформация шейки матки после родов
 - в)эктопион
 - г)длительно существующие эрозии шейки матки
 - д)лейкоплакия шейки матки
- 67 Уточнить характер патологии шейки матки позволяет:
- а) лапароскопия
 - б) кольпоскопия
 - в) осмотр шейки в зеркалах
 - г) гистеросальпингография

- 68 Какие профилактические меры можно использовать для профилактики негативного воздействия полярной ночи:
- а)высыпаться
 - б)правильно питаться
 - в)умеренные физические нагрузки
 - г)все перечисленное
- 69 Госпитальная инфекция чаще всего обусловлена:
- а) золотистым стафилококком
 - б) грамотрицательной флорой
 - в) анаэробами
 - г) ассоциацией микроорганизмов
- 70 Указать парентеральный способ внедрения лекарств в организм:
- а) Ингаляционный
 - б) Пероральный
 - в)Сублингвальный
 - г)Ректальный
- 71 Прогрессирующий атрофический процесс, трещины, изъязвления, зуд характерны для:
- а) крауроза
 - б) рака матки
 - в) остроконечных кондилом
 - г) лейкоплакии
- 72 К группе риска по развитию воспалительных послеродовых заболеваний относятся женщины:
- а)с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом
 - б)с хроническим воспалительным процессом гениталий
 - в)с экстрагенитальными воспалительными заболеваниями (тонзиллит, пиелонефрит)
 - г)со всем перечисленным
 - д)ни с чем из перечисленного
- 73 Иммуитет после перенесённого трихомоноза:
- а) создается
 - б) не создается
 - в) создается при постоянном половом партнере
- 74 Симптомы трубного аборта:
- а)внутреннее кровотечение
 - б)схваткообразные боли внизу живота
 - в)метеоризм
 - г)обильное, длительное кровотечение из половых путей
- 75 Показание к наложению жгута:
- а) Венозное кровотечение.
 - б) Артериальное кровотечение.
 - в)Внутреннее кровотечение.
 - г) Кровотечение в просвет полого органа
- 76 Кольпоскопия показана при заболеваниях:
- а) миома матки
 - б) эрозия шейки матки
 - в) лейкоплакия шейки
 - г) эктопия шейки матки

- 77 Апоплексия яичника - это
- а) остро возникшее кровотечение из яичника
 - б) разрыв яичника
 - в) остро возникшее нарушение кровоснабжения яичника
 - г) правильные ответы 1 и 2
 - д) все ответы правильные
- 78 Соотношение компрессий на грудину и искусственных вдохов при проведении реанимации:
- а) 2:15
 - б) 3:6
 - в) 30:2
 - г) 1:5
- 79 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» «радиоактивными» отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 80 Основной метод диагностики рака тела матки:
- а) гистологическое исследование соскоба эндометрия;
 - б) цитологическое исследование;
 - в) трансвагинальная эхография;
 - г) гистерография;
 - д) рентгенотелевизионная гистеросальпингография.
- 81 Инкубационный период гепатита «А»:
- а) до 35-45 дней
 - б) до 6 месяцев
 - в) до 1 года
- 82 В матке фаза секреции идет под действием гормона яичника:
- а) фолликулина
 - б) синестрола
 - в) прогестерона
 - г) тестостерона
- 83 Диагностические критерии подострого эндометрита после родов:
- а) температура тела роженицы 38 °С и выше
 - б) тахикардия до 100 ударов в минуту
 - в) лохии с примесью крови на 5-е сутки после родов
 - г) все перечисленное
 - д) ничего из перечисленного
- 84 Трофобластическая болезнь – это:
- а) саркома матки;
 - б) миома матки;
 - в) киста яичника;
 - г) хорионэпителиома;
 - д) рак тела матки.

- 85 При сердечно-лёгочной реанимации в тройной приём Сафара не входит:
- а) запрокидывание головы
 - б) положение на боку
 - в) выдвижение нижней челюсти вверх
 - г) открывание рта
- 86 Факторами, способствующими возникновению гнойно-воспалительных осложнений в период наркоза и проведения операции, являются:
- а) невосполненная кровопотеря
 - б) травматичность операции
 - в) длительность операции более 2 часов
 - г) нарушение микроциркуляции тканей
 - д) все перечисленное
- 87 При опущении стенок влагалища III степени с нарушением функции тазовых органов рекомендуется:
- а) ношение влагалищного кольца
 - б) оперативное лечение
 - в) лечебная физкультура для укрепления мышц тазового дна
 - г) физиотерапия
- 88 Биологическая провокация гонореи – это:
- а) употребление острой пищи
 - б) обработка наружного зева цервикального канала раствором Люголя
 - в) введение гоновакцины
 - г) индуктотермия с влагалищным электродом
- 89 Появление симптомов нарушения мозгового кровообращения характерно для:
- а) раннего гестоза
 - б) нефропатии
 - в) эклампсии
 - г) преэклампсии
- 90 Для лечения женского бесплодия применяются:
- а) физиотерапия
 - б) санаторно-курортные методы
 - в) противовоспалительные средства
 - г) диатермокоагуляция
- 91 При прерывании внематочной беременности по типу трубного аборта развиваются клинические симптомы:
- а) характерные признаки беременности
 - б) скудные кровянистые выделения из половых путей
 - в) признаки внутреннего кровотечения
 - г) схваткообразные боли внизу живота, чувство «дурноты»
- 92 Самопроизвольный аборт – это прерывание беременности в сроке до (в неделях):
- а) 12
 - б) 14
 - в) 22
 - г) 32
- 93 Нормальная флора влагалища:
- а) эпителиальные клетки
 - б) палочки Дедерлейна
 - в) кишечные палочки
 - г) гормоны

- 94 Гормон желтого тела прогестерон способствует:
- а) сохранению беременности, росту молочных желез
 - б) прерыванию беременности
 - в) развитию яйцеклетки
 - г) созреванию фолликула
- 95 Хламидийная инфекция может:
- а) привести к бесплодию
 - б) часто рецидивировать
 - в) вызвать нарушение менструальной функции
 - г) осложниться маточным кровотечением
- 96 Срок наступления овуляции при 28-дневном менструальном цикле:
- а) 20-22 день
 - б) 8-10 день
 - в) 12-14 день
 - г) 3-5 день
- 97 Выделяют следующие формы сальпингоофорита:
- а) специфическую
 - б) неспецифическую
 - в) атипичную
 - г) аллергическую
- 98 Аменорея называется патологической:
- а) во время беременности
 - б) при наличии опухоли гипофиза
 - в) в периоде постменопаузы
 - г) во время лактации
- 99 Гипоталамус вырабатывает:
- а) гонадотропины;
 - б) эстрогены;
 - в) гестагены;
 - г) рилизинг – гормоны.
- 100 Возбудители воспалительных заболеваний гениталий специфической этиологии:
- а) хламидии
 - б) стрептококк
 - в) вирусы
 - г) дрожжеподобные грибы
 - д) кишечная палочка
- 101 Акушерский перитонит возникает после:
- а) родов
 - б) раннего самопроизвольного выкидыша
 - в) кесарева сечения
 - г) искусственного аборта
- 102 Трихомоноз относится к:
- а) инфекциям, передающимся половым путём (ИППП)
 - б) неспецифическим воспалительным заболеваниям женской половой сферы
 - в) невоспалительное заболевание женской половой сферы
- 103 Функция яичников:
- а) выделительная
 - б) эндокринно-гормональная
 - в) защитная
 - г) менструальная

- 104 При каком заболевании гениталий используется даназол чаще всего:
- а)миома матки
 - б)гиперплазия эндометрия
 - в)эндометриоз гениталий
 - г)синдром поликистозных яичников
 - д)дисфункциональные маточные кровотечения
- 105 Для апоплексии яичника характерно все, кроме:
- а) болей внизу живота;
 - б) внутреннего кровотечения;
 - в) отрицательных биологических реакций на беременность;
 - г) выраженного лейкоцитоза;
 - д) симптомов раздражения брюшины.
- 106 Лечение гонореи при беременности:
- а) не проводится
 - б) проводится с применением больших доз антибиотиков
 - в)проводится с использованием физиотерапевтических методов
 - г) не имеет каких-либо особенностей
- 107 Основным клиническим симптомом пузырного заноса является:
- а) кровотечение различной интенсивности
 - б) боль разлитого характера внизу живота
 - в) гнойные выделения из половых путей
 - г) высокая температура
- 108 Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников у молодых женщин:
- а) удаление придатков;
 - б) резекция яичника с возможно большим сохранением здоровой ткани органа;
 - в) надвлагалищная ампутация матки с придатками на стороне поражения;
 - г) удаление яичника на стороне поражения
- 109 Выворот слизистой цервикального канала называется:
- а) эктропион
 - б) лейкоплакия шейки
 - в) эктопия
 - г) истинная эрозия шейки
- 110 Позиция плода – это:
- а) отношение спинки плода к плоскостям таза
 - б) отношение спинки плода к боковым сторонам матки
 - в) положение спинки плода по отношению к передней и задней стенкам матки
 - г) отношение крупной части плода ко входу в малый таз
- 111 К отходам класса В относят:
- а) материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекционными болезнями
 - б) пищевые отходы неинфекционных отделений
 - в) органические операционные отходы
 - г) пищевые отходы инфекционных отделений
- 112 Аплазия влагалища – это:
- а) отсутствие части влагалища;
 - б) полное или частичное заращение влагалища, связанное с воспалительным в) процессом в ante- и постнатальном периоде;
 - г) первичное полное отсутствие влагалища;
 - д) полная перегородка во влагалище.

- 113 К тестам функциональной диагностики – относятся:
- а) базальная температура
 - б) R-снимок турецкого седла
 - в) симптом «зрачка»
 - г) симптом «папоротника»
- 114 Для предменструального синдрома характерно
- а) появление отеков
 - б) галакторея
 - в) понижение зрения
 - г) монофазная базальная температура
 - д) все перечисленное
- 115 Эндометрит – это:
- а) воспаление маточной трубы;
 - б) воспаление мышцы матки;
 - в) воспаление брюшины;
 - г) воспаление околоматочной клетчатки;
 - д) воспаление слизистой оболочки матки.
- 116 Действующим агентом при паровом методе стерилизации является:
- а) водяной пар,
 - б) насыщенный водяной пар,
 - в) насыщенный водяной пар под давлением,
 - г) газ
- 117 Осложнением, чаще всего возникающим при введении внутриматочной спирали (ВМС), считается:
- а) истмико - цервикальная недостаточность
 - б) внематочная беременность
 - в) привычный выкидыш
 - г) острая инфекция
 - д) тромбоз вен таза
- 118 Наиболее точный метод диагностики прогрессирующей трубной беременности:
- а) бимануальное исследование
 - б) ультразвуковое исследование (УЗИ)
 - в) лапароскопия
 - г) гистероскопия
- 119 Для миомы матки характерно:
- а) доброкачественность
 - б) склонность к малигнизации;
 - в) склонность к метастазам
- 120 Пациент имеет право на:
- а) на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья;
 - б) соблюдение режима лечения, в том числе определенного на период временной нетрудоспособности;
 - в) выбор врача и выбор медицинской организации;
 - г) осуществление рекламы лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания.

- 121 Самое частое осложнение кисты яичника:
- а) кровоизлияние в полость кисты
 - б) разрыв капсулы кисты
 - в) перекрут «ножки» кисты
 - г) бесплодие
- 122 Преждевременными называют роды при сроке беременности:
- а) до 36 недель
 - б) с 22 до 36 недель
 - в) с 26 до 30 недель
 - г) после 30 недель
 - д) с 28 до 36 недель
- 123 Число пораженных при территориальных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах):
- а) 10-50 пораженных
 - б) 50-500 пораженных
 - в) свыше 500 пораженных
 - г) до 10 пораженных
- 124 Наружные половые органы:
- а) влагалище
 - б) маточные трубы
 - в) клитор
 - г) молочные железы
- 125 Минимальный объём подготовки к экстренной операции – это:
- а) промывание желудка
 - б) очистительная клизма
 - в) подготовка операционного поля
 - г) полная санобработка
- 126 Частыми клиническими признаками трихомоноза при беременности являются:
- а) кольпит
 - б) цистит
 - в) уретрит
 - г) явления общей интоксикации
- 127 При синдроме «острого живота» нельзя:
- а) вводить анальгетики и спазмолитики
 - б) применять лед на живот
 - в) кормить и поить больную
 - г) ставить очистительную клизму
- 128 При появлении мажущих кровянистых выделений из половых путей в постменопаузе прежде всего необходимо произвести:
- а) ультразвуковое исследование (УЗИ)
 - б) кольпоскопию
 - в) раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки
 - г) гистероскопию
- 129 Пельвиоперитонит – это:
- а) воспаление брюшины малого таза;
 - б) воспаление клетчатки малого таза;
 - в) воспаление серозного покрова матки;

- 130 Привычный аборт - это
- а) прерывание беременности более 5 раз
 - б) прерывание беременности 1 раз
 - в) самопроизвольное прерывание беременности более 2 раз
- 131 Прерывание внематочной беременности чаще происходит на сроке:
- а) 10-12 недель
 - б) 2-3 недели
 - в) 5-6 недель
 - г) 8-9 недель
- 132 Базальную температуру измеряют ежедневно:
- а) после спринцевания влагалища
 - б) утром в одно и то же время, не вставая с постели
 - в) после очистительной клизмы
 - г) вечером в одно и то же время перед сном
- 133 Мазки на гонококк Нейсера берут:
- а) ложечкой Фолькмана из цервикального канала
 - б) из заднего свода влагалища
 - в) деревянным шпателем с боковой стенки влагалища
 - г) из уретры
- 134 Тактика при сочетании беременности и рака шейки матки:
- а) беременность может быть продолжена
 - б) искусственный аборт
 - в) госпитализация на роды в 37-88 недель
 - г) расширенная экстирпация беременной матки
- 135 Основным клиническим симптомом рака тела матки:
- а) хроническая тазовая боль;
 - б) контактные кровотечения;
 - в) ациклические кровотечения;
 - г) нарушение функции соседних органов;
 - д) бесплодие
- 136 При разрыве маточной трубы кровь скапливается:
- а) во влагалище
 - б) в переднем своде влагалища
 - в) в дугласовом пространстве
 - г) в пузырно-маточном пространстве
- 137 Трофобластическая болезнь – это:
- а) саркома матки;
 - б) миома матки;
 - в) киста яичника;
 - г) хорионэпителиома;
 - д) рак тела матки
- 138 Основная причина воспалительных заболеваний органов малого таза:
- а) механический фактор
 - б) термический фактор
 - в) инфекционный агент
 - г) химический фактор

- 139 Возможным источником кровотечения из яичника может быть:
- а) желтое тело
 - б) фолликулярная киста яичника
 - в) киста желтого тела
 - г) склеротически измененный яичник
- 140 Менструальный цикл – это:
- а) сама менструация
 - б) гормональные изменения, происходящие в яичниках
 - в) фазы маточного цикла
 - г) сложные биологические изменения в течение месяца во всех системах и органах женского организма
- 141 Среднее количество крови, которое теряет женщина во время менструации:
- а) 150 – 200 мл;
 - б) 25 – 60 мл;
 - в) 60 – 100 мл;
 - г) 100 – 150 мл;
 - д) более 200 мл.
- 142 Основная причина развития трубной беременности:
- а) воспалительные процессы маточных труб
 - б) кольпит
 - в) эндоцервицит
 - г) эндометриоз
- 143 Биодоступность лекарственного препарата – это:
- а) время, за которое концентрация лекарства в крови снижается на 50%
 - б) процесс превращения вещества в организме
 - в) содержание свободного вещества в плазме крови относительно введенной дозы
 - г) совокупность процессов биотрансформации и выведения
- 144 Для мазка второй степени чистоты влагалища характерно:
- а) влагалищные бациллы, клетки эпителия, единичные лейкоциты, слабкокислая среда
 - б) влагалищных бацилл мало, много лейкоцитов, кокков и другой патогенной флоры, слабощелочная среда
 - в) влагалищных бацилл много, клетки эпителия, кислая среда
 - г) влагалищные бациллы, клетки эпителия, слабощелочная среда
- 145 Величина матки, являющаяся показанием к оперативному лечению миомы (в неделях):
- а) 4 - 6
 - б) 5 - 7
 - в) 8 - 9
 - г) 12 и более
- 146 Парный трубчатый орган яйцевод — это:
- а) семявыносящие протоки
 - б) слуховые трубы
 - в) мочеточники
 - г) маточные трубы

- 147 Фальсифицированное лекарственное средство – это:
- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.
 - б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе.
 - в) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.
 - г) лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства
- 148 Для молочницы влагалища характерны выделения:
- а) гнойные пенные
 - б) обильные слизистые
 - в) творожистые
 - г) необильные водянисто - слизистые
- 149 Гипофиз вырабатывает:
- а) гонадотропины;
 - б) эстрогены;
 - в) гестагены;
 - г) рилизинг – гормоны.
- 150 Увлажнение входа во влагалище при половом возбуждении происходит за счет:
- а) пропотевания кровеносных сосудов
 - б) бартолиновых желез
 - в) маточного секрета
 - г) парауретральных желез
- 151 Профилактика развития рака эндометрия состоит:
- а) в устранении нарушений овуляции;
 - б) в своевременном лечении диабета, ожирения и гипертонической болезни;
 - в) в использовании оральных контрацептивов
 - г) все вышеперечисленное
- 152 К гиперменструальному синдрому относятся:
- а) редкие менструации
 - б) аменорея
 - в) короткие менструации
 - г) дисфункциональные маточные кровотечения
- 153 Внутриматочные спирали (ВМС) противопоказаны при:
- а) субмукозной форме миомы матки
 - б) одном аборте без осложнений в анамнезе
 - в) двурогой матке
 - г) остром воспалении матки и /или придатков
- 154 Внутренние половые органы:
- а) лобок
 - б) мочевого пузыря
 - в) влагалище
 - г) тазовая клетчатка

- 155 Осложнение оральной контрацепции, требующее отмены применяемых препаратов:
- а) прибавка в весе
 - б) нагрубание молочных желез
 - в) тромбоз вен нижних конечностей
 - г) тошнота
 - д) нерегулярные маточные кровотечения
- 156 Субмукозные миомы могут сопровождаться перечисленными симптомами и признаками:
- а) патологические кровотечения;
 - б) бесплодие;
 - в) анемия;
 - г) перекрут ножки узла.
- 157 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» эпидемиологически безопасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 158 Боль за грудиной, иррадиирующая в левую руку и левую лопатку, – признак:
- а) Приступа стенокардии.
 - б) Желчной колики.
 - в) Почечной колики.
 - г) Приступа бронхиальной астмы.
- 159 Во время профилактического осмотра чаще других из доброкачественных заболеваний шейки матки диагностируют:
- а) эктопию
 - б) лейкоплакию
 - в) полип цервикального канала
 - г) эритроплакию
- 160 Наружная оболочка матки:
- а) параметрий
 - б) периметрий
 - в) миометрий
 - г) эндометрий
- 161 При сортировке на основании оценки общего состояния , характера повреждений и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:
- а) две
 - б) три
 - в) четыре
 - г) пять
- 162 Квалифицированная медицинская помощь – это:
- а) оказание помощи по жизненным показаниям
 - б) оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным
 - в) само- и взаимопомощь, помощь спасателей
 - г) полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами

- 163 Стремительно развивающийся шок:
- а) Травматический
 - б) Геморрагический
 - в) Анафилактический
 - г) Гемотрансфузионный
- 164 Положение плода – это:
- а) отношение продольной оси плода к продольной оси матки
 - б) отношение спинки плода к стенке матки
 - в) отношение головки к плоскостям таза
 - г) отношение крупной части плода ко входу в малый таз
- 165 После экстренной операции для борьбы с парезом кишечника очистительную клизму ставят:
- а) через 6 - 8 часов
 - б) в конце первых суток
 - в) на третьи сутки
 - г) на пятые сутки
- 166 Клиническим проявлением папилломавирусной инфекции (ПВИ) является наличие:
- а) эрозии на шейке матки
 - б) генитальных бородавок (кондилом)
 - в) «глазков» на шейке матки
 - г) полипов на шейке матки
- 167 Провокация гонореи – это:
- а) искусственная активизация возбудителя
 - б) естественная активизация гонококка
 - в) введение специальных химических препаратов
 - г) применение гоновакцины
- 168 Слизистая оболочка матки:
- а) эндотелий
 - б) миометрий
 - в) эндометрий
 - г) параметрий
- 169 Важную роль в регуляции менструального цикла играют:
- а) гипоталамо-гипофизарная система
 - б) поджелудочная железа
 - в) щитовидная железа
 - г) паращитовидные железы
- 170 Шок - это:
- а) острая сосудистая недостаточность
 - б) острая сердечная недостаточность
 - в) острая дыхательная недостаточность
- 171 Для миомы матки характерно:
- а) доброкачественность
 - б) склонность к малигнизации;
 - в) склонность к метастазам

- 172 Раздельно (цервикальный канал и матка) диагностическое выскабливание при дисфункциональном маточном кровотечении проводится
- а) в ювенильном возрасте
 - б) в репродуктивном возрасте
 - в) в климактерическом возрасте
 - г) правильные ответы 2 и 3
 - д) все ответы правильные
- 173 У больной с клиническим диагнозом апоплексии яичника показанием к операции является:
- а) наличие воспаления придатков в анамнезе;
 - б) дисфункция яичников в анамнезе;
 - в) болевой синдром;
 - г) внутрибрюшное кровотечение
- 174 Реабилитация больных, оперированных по поводу внематочной беременности, включает:
- а) электрофорез лекарственных средств;
 - б) ультразвуковую терапию;
 - в) гормональную терапию
 - г) все вышеперечисленное
- 175 В полость матки инфекция чаще всего проникает через цервикальный канал
- а) с помощью трихомонад
 - б) с помощью сперматозоидов
 - в) благодаря пассивному транспорту
 - г) в результате отрицательного внутрибрюшного давления, возникающего при движении диафрагмы
 - д) всеми перечисленными способами
 - е) ни одним из перечисленных способов
- 176 Симптом «папоротника» у здоровой женщины при 28-дневном менструальном цикле четко выражен на (день цикла):
- а) 5 - 6
 - б) 10 - 12
 - в) 14 - 15
 - г) 20 - 22
- 177 Атрезия влагалища – это:
- а) первичное отсутствие части влагалища;
 - б) полное или частичное заращение влагалища, связанное с воспалительным
 - в) процессом в ante- и постнатальном периоде;
 - г) первичное полное отсутствие влагалища;
 - д) полная перегородка во влагалище
- 178 Фармакодинамика - это:
- а) раздел фармакологии, изучающий влияние лекарственного средства на организм больного или здорового человека
 - б) раздел фармакологии, изучающий процессы, происходящие с лекарственным средством от момента его поступления в организм до его выведения
 - в) раздел фармакологии, рассматривающий основы генетической чувствительности организма к лекарственному средству
 - г) раздел фармакологии, рассматривающий особенности взаимодействия лекарственных веществ между собой

- 179 Для прервавшейся внематочной беременности по типу разрыва трубы характерны симптомы:
- а) периодические приступы болей внизу живота
 - б) низкое АД, частый слабый пульс
 - в) мажущие кровянистые выделения из половых путей
 - г) «кинжальные» боли внизу живота
- 180 Дискератозы относятся к группе заболеваний:
- а) предраковых
 - б) раковых
 - в) фоновых
 - г) воспалительных
- 181 К внутреннему эндометриозу относится:
- а) эндометриоз тела матки (аденомиоз)
 - б) ретроцервикальный эндометриоз
 - в) «шоколадные» кисты яичников
 - г) эндометриоз маточных труб
- 182 Для определения чистоты влагалища берутся мазки из:
- а) уретры
 - б) цервикального канала
 - в) заднего свода влагалища
 - г) нижней трети влагалища
- 183 Понятие «медицинская этика» включает в себя:
- а) форму общественного сознания и систему социальной регуляции деятельности медицинских работников
 - б) форму правовой регуляции деятельности медицинских работников
 - в) учение о долге (должном) в деятельности медицинских работников
 - г) представления об условиях оптимальной деятельности медицинских работников
- 184 Имплантация — это:
- а) выход яйцеклетки из фолликула
 - б) слияние сперматозоида с яйцеклеткой
 - в) прикрепление яйцеклетки к стенке матки
 - г) отторжение функционального слоя
- 185 При пиелонефрите беременных госпитализируют для:
- а) прерывания беременности
 - б) лечения при обострении процесса
 - в) профилактики гестоза
 - г) нефрологического обследования перед родами
- 186 Указать правильную последовательность стадий самопроизвольного аборта:
- а) угрожающий аборт, аборт в «ходу», неполный выкидыш, начавшийся выкидыш, полный выкидыш
 - б) угрожающий аборт, начавшийся выкидыш, аборт в «ходу», неполный выкидыш, полный выкидыш
 - в) полный выкидыш, угрожающий аборт, аборт в «ходу», начавшийся выкидыш, неполный выкидыш
- 187 Понятие «медицинская этика» включает в себя:
- а) форму общественного сознания и систему социальной регуляции деятельности медицинских работников
 - б) форму правовой регуляции деятельности медицинских работников
 - в) учение о долге (должном) в деятельности медицинских работников
 - г) представления об условиях оптимальной деятельности медицинских работников

- 188 Для диагностики острого метроэндометрита необходимо применить:
- а) осмотр наружных половых органов
 - б) бимануальное исследование
 - в) осмотр шейки матки и влагалища зеркалами
 - г) кольпоскопия
- 189 Пространство между малыми половыми губами называется:
- а) мочеполовая диафрагма
 - б) промежность
 - в) девственная плева
 - г) половая щель
- 190 Какое исследование позволяет установить диагноз инвазивной карциномы шейки матки:
- а) мазок по папаниколу
 - б) аспирация цервикальной слизи
 - в) прицельная биопсия шейки с гистологическим исследованием
 - г) смыв с влагалища
 - д) кольпоскопия
- 191 Апоплексия яичника чаще наступает:
- а) в период овуляции;
 - б) в стадию васкуляризации желтого тела;
 - в) в период созревания граафова фолликула;
 - г) в период атрезии фолликулов
- 192 Признаками, характерными для «госпитальных штаммов» возбудителей гнойно-септических инфекций являются все указанные, кроме:
- а) полирезистентность к антибиотикам,
 - б) чувствительность к антибиотикам,
 - в) устойчивость к дезинфектантам и антисептикам,
 - г) способность вызывать связанные заболевания.
- 193 Биодоступность лекарственного препарата – это:
- а) время, за которое концентрация лекарства в крови снижается на 50%
 - б) процесс превращения вещества в организме
 - в) содержание свободного вещества в плазме крови относительно введенной дозы
 - г) совокупность процессов биотрансформации и выведения
- 194 Положение плода – это:
- а) отношение продольной оси плода к продольной оси матки
 - б) отношение спинки плода к стенке матки
 - в) отношение головки к плоскостям таза
 - г) отношение крупной части плода ко входу в малый таз
- 195 Каждая женщина должна проходить профилактический осмотр у гинеколога 1 раз в:
- а) 3 месяца
 - б) 6 месяцев
 - в) 1 год
 - г) 3 года
- 196 Критерии излеченности больных гонореей устанавливаются после лечения в течение:
- а) одного месяца;
 - б) двух месяцев;
 - в) трех месяцев;
 - г) четырех месяцев;
 - д) пяти месяцев

- 197 Появление мелких фибиллярных подергиваний мышц, тонические и клонические судороги наблюдаются при:
- а) преэклампсии
 - б) водянке
 - в) эклампсии
 - г) нефропатии
- 198 Во время профосмотра обязательно берут мазки на:
- а) онкоцитологическое исследование
 - б) посев
 - в) гормональное исследование
- 199 В яичниках образуются:
- а) ферменты
 - б) сперматозоиды
 - в) яйцеклетка и женские половые гормоны
 - г) форменные элементы крови
- 200 Какая аменорея не является физиологической
- а) перед менархе
 - б) после менопаузы
 - в) во время беременности
 - г) в репродуктивном возрасте
 - д) во время лактации
- 201 Все отходы ЛПУ по степени опасности делят на:
- а) 2 класса
 - б) 3 класса
 - в) 4 класса
 - г) 5 классов
- 202 Кратность обследования персонала на носительство ВИЧ:
- а) 1 раз в год
 - б) 1 раз в 2 года
 - в) 1 раз в 3 месяца
- 203 Эктопией шейки матки называется:
- а) разрастание ткани на шейке матки (плюс ткань)
 - б) замещение многослойного плоского эпителия влагиалищной части шейки матки цилиндрическим
 - в) дефект эпителия
 - г) выворот слизистой цервикального канала
- 204 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» эпидемиологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 205 К основным симптомам СПИДА относятся:
- а) гепатоспленомегалия, слабость, головная боль
 - б) лимфаденопатия, диарея более месяца, лихорадка более месяца
 - в) потеря массы тела, желтушность кожных покровов
 - г) ночные поты, слабость

- 206 Синдром «острого живота» в гинекологии может развиваться вследствие:
- а) острого бартолинита
 - б) острого сальпингоофорита
 - в) разрыва трубы при внематочной беременности
 - г) перекрута «ножки» кисты яичника
- 207 При сифилисе в период беременности:
- а) развиваются уродства плода
 - б) происходит внутриутробное поражение плода
 - в) ухудшается состояние матери
 - г) возможны выкидыши
- 208 Аменорея – это:
- а) нарушение менструального цикла
 - б) отсутствие месячных более 6 месяцев
 - в) обильные месячные
 - г) скудные месячные
- 209 Наиболее частый признак субмукозной миомы матки:
- а) гиперполименорея;
 - б) бесплодие;
 - в) нарушение функции мочевого пузыря и прямой кишки;
 - г) боль в нижних отделах живота;
- 210 Тестами функциональной диагностики выявляют:
- а) микрофлору влагалища
 - б) функциональное состояние яичников
 - в) количество половых гормонов в крови
 - г) атипичность клеток
- 211 Основная триада жалоб гинекологических пациентов:
- а) боли, тошнота, кровотечения;
 - б) боли, бесплодие, бели;
 - в) боли, бели, кровотечения;
 - г) бели, кровотечения, бесплодие
- 212 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» токсикологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д
- 213 Для диагностики пузырного заноса подтверждением является:
- а) большой размер матки
 - б) кровотечение
 - в) высокий уровень хорионического гонадотропина
 - г) шевеление плода
- 214 Для проведения пробы Шиллера необходимо обработать шейку матки:
- а) этиловым спиртом
 - б) вазелиновым маслом
 - в) раствором Люголя
 - г) раствором фукорцина

- 215 Трихомонады – это:
- а) вирусы
 - б) грамм-положительные кокки
 - в) простейшие жгутиковые
 - г) кандиды
- 216 Началом родов следует считать:
- а) излитие околоплодных вод
 - б) появление схваток каждые 20 минут
 - в) прижатие головки ко входу в малый таз
 - г) появление регулярных схваток и сглаживание шейки
- 217 В регуляции менструального цикла особо важную роль играет:
- а) кора головного мозга
 - б) гипофиз
 - в) гипоталамус
 - г) щитовидная железа
- 218 Клиническими проявлениями гиперпластических процессов в репродуктивном периоде являются:
- а) ациклические кровотечения
 - б) наличие предменструальной «мазни»
 - в) меноррагии
 - г) вышперечисленное
- 219 Для предменструального синдрома характерно:
- а) появление отеков
 - б) галакторея
 - в) понижение зрения
 - г) монофазная базальная температура
 - д) все перечисленное
- 220 Гипоталамус вырабатывает следующие гормоны:
- а) гонадотропины
 - б) эстрогены
 - в) гестогены
 - г) рилизинг-факторы
- 221 Здоровый образ жизни включает в себя:
- а) благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе поведенческой, гигиенические навыки
 - б) состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
 - в) принятие мер, направленных на снижение влияния вредных факторов на организм человека
 - г) привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом
- 222 Для апоплексии яичника характерным является:
- а) задержка менструации
 - б) приступ болей в середине менструального цикла
 - в) повышение температуры до 38,0 С
 - г) наличие признаков беременности

- 223 Все ниже перечисленные факторы способствуют развитию аденомиоза тела матки, кроме:
- а) аборт
 - б) операция кесарево сечение
 - в) консервативная миомэктомия
 - г) высокая ампутация матки
 - д) резекция яичников
- 224 Принцип действия комбинированных оральных контрацептивов (КОК):
- а) нарушают имплантацию оплодотворённой яйцеклетки
 - б) уменьшают количество менструальной крови
 - в) подавляют овуляцию
 - г) обладают сперматотоксическим эффектом
- 225 При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение:
- а) Полусидячее
 - б) Ровное горизонтальное
 - в) Горизонтальное с приподнятой головой
 - г) Горизонтальное с приподнятыми ногами
- 226 Факторы передачи гепатита «В»:
- а) кровь
 - б) сперма
 - в) медицинский инструментарий
 - г) продукты питания
 - д) воздух
- 227 Эндометриоидная киста яичника заполнена:
- а) густой тёмно-коричневой жидкостью
 - б) гноем
 - в) серозным содержимым
 - г) эмбриональными зачатками
- 228 При субмукозной форме миомы матки узел расположен в:
- а) полости матки
 - б) мышечном слое
 - в) периметрии
- 229 Гистероскопия – это:
- а) осмотр полости матки оптическим прибором
 - б) метод исследования полости матки с контрастом
 - в) осмотр шейки матки оптическим прибором
 - г) ультразвуковое исследование матки
- 230 Фибромиома матки – это:
- а) доброкачественная опухоль из гладкомышечных и соединительных тканей матки
 - б) доброкачественная опухоль из соединительных тканей
 - в) злокачественная опухоль
 - г) предраковое состояние
- 231 Принципы лечения послеродовых воспалительных заболеваний заключаются:
- а) в выборе антибиотика с учетом формы и локализации заболевания
 - б) в локальном воздействии на очаг инфекции
 - в) в повышении неспецифической активности организма
 - г) во всем перечисленном
 - д) ни в чем из перечисленного

- 232 Реабилитация больных, оперированных по поводу внематочной беременности, включает:
- а) электрофорез лекарственных средств;
 - б) ультразвуковую терапию;
 - в) гормональную терапию;
 - г) все вышеперечисленное
- 233 Основным методом исследования в гинекологии с целью выявления патологии шейки матки:
- а) бимануальное влагалищное исследование
 - б) осмотр шейки матки в зеркалах
 - в) осмотр наружных половых органов
 - г) микроскопический
- 234 Мужские половые гормоны:
- а) тестостерон
 - б) тиреоидин
 - в) прогестерон
 - г) инсулин
- 235 Фоновые заболевания шейки матки - это:
- а) доброкачественные изменения на шейке матки, которые обязательно перерождаются в рак шейки
 - б) предраковые заболевания
 - в) доброкачественные заболевания, на фоне которых возможно развитие рака шейки
 - г) воспалительные заболевания
- 236 Операция, сохраняющая детородную функцию при миоме матки:
- а) надвлагалищная ампутация матки
 - б) консервативная миомэктомия
 - в) экстирпация матки
 - г) высокая ампутация матки
- 237 Какая аменорея не является физиологической:
- а) перед менархе
 - б) после менопаузы
 - в) во время беременности
 - г) в репродуктивном возрасте
 - д) во время лактации
- 238 Сомнительные признаки беременности:
- а) повышение артериального давления
 - б) извращение вкуса и обоняния
 - в) частые мочеиспускания
 - г) потливость
- 239 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» чрезвычайно эпидемиологически опасными отходами являются медицинские отходы:
- а) класса А,
 - б) класса Б,
 - в) класса В,
 - г) класса Г,
 - д) класса Д

- 240 Перед расширенной кольпоскопией для «набухания» эпителия и визуализации сосудов шейки обрабатывают:
- а) 5% йодом
 - б) 1% раствором уксусной кислоты
 - в) 5% раствором перманганата калия
 - г) раствором фуорцина
- 241 Лучшее запоминание предметов, изображений, звука, цвета и т.п. свидетельствует о преобладании у человека:
- а)наглядно-образной памяти
 - б)словесно-абстрактной памяти
 - в)кратковременной памяти
 - г)промежуточной памяти
 - д)долговременной памяти
- 242 В лечении вирусных заболеваний гениталий необходимо применять:
- а) противовирусные средства
 - б) антибиотики
 - в) эубиотики
 - г) витамины
- 243 Гонококк поражает слизистые, выстланные эпителием:
- а) цилиндрическим
 - б) многослойным плоским
 - в) железистым
 - г) однослойным плоским
- 244 Фаза секреции в эндометрии может быть полноценной только в случае, если:
- а)полноценная фаза пролиферации;
 - б)произошла овуляция;
 - в)функционирует полноценное желтое тело;
- 245 При туберкулёзе гениталий чаще поражаются:
- а) яичники
 - б) маточные трубы
 - в) влагалище
 - г) эндометрий матки
- 246 Показания к оперативному лечению миомы матки:
- а) быстрый рост опухоли
 - б) пременопаузальный период
 - в) большие размеры опухоли (свыше 12 недель)
 - г) подслизистое расположение узла
- 247 Для лечения острой формы гонореи применяют:
- а) гормоны
 - б) физиотерапевтические процедуры
 - в) антибиотики
 - г) спринцевание с антисептиками
- 248 Дермоидная киста яичника развивается из:
- а) клеток фолликула
 - б) зародышевой ткани
 - в) белочной оболочки яичника
 - г) надъяичниковых придатков

- 249 Кровотечение – это осложнение миомы:
- а) субсерозной
 - б) интрамуральной
 - в) субмукозной
- 250 Основным требованиям удовлетворяют контрацептивы:
- а)оральные
 - б)ВМС
 - в)механические
 - г)химические
 - д)правильно 1 и 2
- 251 Какие из кист чаще подвергаются обратному развитию без оперативного вмешательства:
- а)серозная
 - б)доброкачественная тератома
 - в)киста желтого тела
 - г)муцинозная
 - д)эндометриоидная
- 252 Для проведения искусственной вентиляции легких необходимо в первую очередь:
- а) Голову пострадавшего запрокинуть с выдвиганием вперед нижней челюсти.
 - б)Закрыть нос пострадавшему.
 - в)Сделать пробное вдувание воздуха.
 - г) Нажать на грудину
- 253 Метод лечения кистомы яичника:
- а) лучевая терапия
 - б) противовоспалительное лечение
 - в) оперативное вмешательство
 - г) химиотерапия
- 254 Основной клинический симптом предлежания плаценты:
- а) болевые ощущения в нижнем отделе живота
 - б) нарушение гемодинамики
 - в)асфиксия плода
 - г)повторные кровотечения
- 255 Первая помощь при потере сознания:
- а) Абсолютный покой.
 - б) Абсолютный покой, голову поворачивают набок.
 - в) Абсолютный покой, голову поворачивают набок, дальнейшие действия
 - г) зависят от причины, вызвавшей потерю сознания
 - д) холод на голову
- 256 Ранний симптом рака шейки матки:
- а) боли внизу живота «грызущего» характера
 - б) контактные кровотечения
 - в) обильное кровотечение из половых путей
 - г) аменорея
- 257 Для установления предполагаемого срока родов по последней менструации необходимо:
- а)прибавить к первому дню последней менструации восемь месяцев
 - б)отнять три месяца и прибавить семь дней
 - в)отнять четыре месяца
 - г)прибавить девять месяцев

- 258 Злокачественная опухоль, в которую может переродиться пузырьный занос:
- а) саркома матки
 - б) хорионэпителиома (хорионкарцинома)
 - в) рак матки
 - г) опухоль Крукенберга
- 259 Факторами, способствующими возникновению гнойно-воспалительных осложнений в период наркоза и проведения операции, являются:
- а) невосполненная кровопотеря
 - б) травматичность операции
 - в) длительность операции более 2 часов
 - г) нарушение микроциркуляции тканей
 - д) все перечисленное
- 260 Генитальный инфантилизм – это:
- а) симптом нейроэндокринной патологии
 - б) причина бесплодия
 - в) причина невынашивания
 - г) отсутствие матки
- 261 Сперматозоиды после проникновения в матку и маточные трубы сохраняют способность к оплодотворения в течение:
- а) 6-12 часов;
 - б) 24-48 часов;
 - в) 3-5 суток;
 - г) 10 суток.
- 262 Для химической провокации у больных с хроническим сальпингоофоритом применяют:
- а) раствор азотно-кислого серебра 0,5% и 2-3%;
 - б) раствор Люголя, разведенный дистиллированной водой;
 - в) 10% раствор хлористого натрия.
- 263 Современными методами контрацепции являются:
- а) барьерные
 - б) гормональные
 - в) химические
 - г) ритмические
- 264 Основной метод диагностики рака тела матки:
- а) гистологическое исследование соскоба эндометрия;
 - б) цитологическое исследование;
 - в) трансвагинальная эхография;
 - г) гистерография;
 - д) рентгенотелевизионная гистеросальпингография.
- 265 При трубной беременности менструации:
- а) отсутствуют
 - б) циклические
 - в) ациклические
 - г) нерегулярные
- 266 Киста яичника – это:
- а) воспалительное заболевание
 - б) ретенционное образование
 - в) истинное образование
 - г) доброкачественная опухоль

- 267 При истинном абсцессе бартолиновой железы показано следующее лечение:
- а) мазовые повязки, промывание раны 3% перекисью водорода
 - б) вскрытие абсцесса хирургическим путем, промывание раны 3% перекисью водорода
 - в) промывание раны 3% перекисью водорода, дренирование раны
- 268 Осложнением медицинского аборта не является:
- а) бесплодие;
 - б) нарушение функции яичников;
 - в) эндометрит;
 - г) перфорация матки;
 - д) цистит
- 269 Ановуляторные маточные кровотечения характеризуются:
- а) двухфазным менструальным циклом
 - б) отсутствием овуляции и фазы секреции в эндометрии
 - в) наличием овуляции
 - г) повышением базальной температуры после овуляции
- 270 Диагноз плоских и инвертированных кондилом ставится на основании проведения:
- а) цитологического исследования
 - б) расширенной кольпоскопии
 - в) биопсии шейки матки с гистологией биоптата
 - г) выскабливания цервикального канала
- 271 Несомненный признак биологической смерти:
- а) Отсутствие дыхания
 - б) Отсутствие сердцебиения
 - в) Расширение зрачков
 - г) Помутнение роговицы
- 272 При возникновении укола необеззараженным инструментом во время проведения парентеральных процедур для оказания первой помощи из «Укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций» используются:
- а) 70% этиловый спирт,
 - б) ножницы;
 - в) стерильная марлевая салфетка;
 - г) 70% этиловый спирт, 5% спиртовой раствор йода, лейкопластырь
- 273 Фактор риска эктопической беременности:
- а) гипоплазия матки;
 - б) оральная контрацепция;
 - в) пиелонефрит;
 - г) кесарево сечение в анамнезе;
 - д) эндометриоз.
- 274 Используются методы диагностики патологии шейки матки кроме
- а) мазок по Папаниколау
 - б) кольпоскопия
 - в) цервикогистеросальпингография
 - г) измерение ректальной температуры
 - д) кюретаж цервикального канала

- 275 Бактериоскопический метод исследования – это взятие мазков на:
- а) атипию клеток
 - б) чувствительность к антибиотикам
 - в) микрофлору
 - г) кандиды
- 276 Гормонотерапия миомы матки показана при:
- а) небольшой величине опухоли
 - б) субмукозной форме миомы
 - в) отсутствии клинических проявлений
 - г) увеличенной до 12 недель матке
- 277 Разглашение врачебной тайны без согласия пациента не является законным:
- а) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю
 - б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений
 - в) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда
 - г) по желанию ближайших родственников
- 278 Каковы действия медицинской сестры при условии, что пациент болен СПИД?
- а) работа в защитном костюме
 - б) работа в обычных условиях, соблюдая меры предосторожности (избегать повреждения перчаток и кожных покровов)
 - в) не предпринимать никаких мер
 - г) не оказывать помощь
- 279 При неполном аборте в первую очередь проводят:
- а) гемостатическую терапию
 - б) терапию, направленную на сокращение матки
 - в) удаление остатков плодного яйца
 - г) выскабливание стенок полости матки
- 280 Псевдоэрозия шейки матки является:
- а) онкозаболеванием
 - б) факультативным (фоновым) процессом
 - в) предраковым заболеванием
 - г) хроническим процессом
- 281 Максимально допустимы сроки начала постконтактной профилактики антиретровирусными препаратами при риске инфицирования ВИЧ:
- а) не позднее 24 часов
 - б) не позднее 36 часов
 - в) не позднее 72 часов
 - г) не позднее 12 часов
- 282 К современным методам контрацепции относятся:
- а) внутриматочная контрацепция
 - б) химические методы
 - в) гормональные препараты (КОК)
 - г) барьерные (механические) методы
 - д) хирургическая стерилизация
- 283 Препараты с метронидазолом при беременности можно применять
- а) только в раннем сроке
 - б) во 2 половине беременности
 - в) в комплексном лечении
 - г) не менее 3 курсов

- 284 Медицинские работники имеют право на:
- а) оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
 - б) совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях;
 - в) соблюдение врачебной тайны;
 - г) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя.
- 285 Для постменопаузы характерны проявления в костях:
- а) остеопороза
 - б) остеомиелита
 - в) остеомалации
- 286 Наиболее точный метод диагностики патологии при маточном кровотечении:
- а) кольпоскопия;
 - б) лапароскопия;
 - в) УЗИ;
 - г) гистероскопия;
 - д) цистоскопия
- 287 К группе риска по развитию воспалительных послеродовых заболеваний относятся женщины:
- а) с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом
 - б) с хроническим воспалительным процессом гениталий
 - в) с экстрагенитальными воспалительными заболеваниями (тонзиллит, пиелонефрит)
 - г) со всем перечисленным
 - д) ни с чем из перечисленного
- 288 Основные симптомы предлежания плаценты:
- а) повторные маточные кровотечения
 - б) боли внизу живота
 - в) внутриутробная гипоксия плода
- 289 Критерии излеченности больных гонореей устанавливаются после лечения в течение:
- а) одного месяца;
 - б) двух месяцев;
 - в) трех месяцев;
 - г) четырех месяцев;
 - д) пяти месяцев.
- 290 Созревание и развитие желтого тела идет под действием гормона гипофиза:
- а) фолликулостимулирующего
 - б) тиреотропного
 - в) адено-кортикотропного
 - г) пролактина
- 291 Разглашение врачебной тайны без согласия пациента не является законным:
- а) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю
 - б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений
 - в) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда
 - г) по желанию ближайших родственников

- 292 Иммунологические тесты основаны на выявлении:
- а) гормонов желтого тела
 - б) гормонов гипофиза
 - в) эстрогенов
 - г) хорионического гонадотропина
- 293 Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью, относятся к классу:
- а) А
 - б) Б
 - в) В
 - г) Г
- 294 Прибавка массы тела за неделю во время беременности составляет:
- а) 300 г
 - б) 500 г
 - в) 600 г
 - г) 1000 г
- 295 Внутрибрюшное кровотечение возникает вследствие:
- а) неполного выкидыша
 - б) апоплексии яичника
 - в) рака шейки матки (распад опухоли)
 - г) разрыва трубы при внематочной беременности
- 296 Нормальная флора влагалища:
- а) эпителиальные клетки
 - б) палочки Додерлейна
 - в) кишечные палочки
 - г) гормоны
- 297 Выбор объема минимальной подготовки к экстренной операции будет зависеть от:
- а) наличия или отсутствия кровотечения
 - б) времени, прошедшего с начала заболевания
 - в) состояния тяжести больной
- 298 Во влагалище в норме среда:
- а) нейтральная
 - б) кислая
 - в) слабощелочная
- 299 Биопсия шейки матки проводится:
- а) в гинекологическом отделении больницы
 - б) амбулаторно после кольпоскопии
 - в) в женской консультации при наличии дневного стационара
- 300 Для диагностики пузырного заноса подтверждением является:
- а) большой размер матки
 - б) кровотечение
 - в) высокий уровень хорионического гонадотропина
 - г) шевеление плода
 - д) правильные ответы 2 и 3