

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

**(для медицинских сестёр онкологических отделений и кабинетов, прошедших обучение по
циклам "Сестринская помощь онкологическим больным", профессиональной
переподготовки по специальности
«Сестринское дело»)**

- 1 От чего в основном зависит клиническое проявление забрюшинных опухолей:
 - а) Локализации и морфологического строения опухоли.
 - б) Морфологического строения опухоли.
 - в) Локализации и размеров опухоли.
 - г) Вообще не от чего не зависит
- 2 Миома матки это:
 - а) доброкачественное новообразование из гладкомышечных и соединительных тканей матки
 - б) доброкачественное новообразование из соединительной ткани
 - в) доброкачественное новообразование из мышечной ткани
 - г) злокачественное новообразование из мышечной ткани
- 3 Антибластика это комплекс мероприятий, направленных на:
 - а) предотвращение диссеминации раковых клеток во время операции
 - б) уничтожение раковых клеток в ране
 - в) изоляцию больного от окружающих
 - г) профилактику заболеваний среди медперсонала
- 4 Факторы, оказывающие влияние на возникновение рака нижней губы:
 - а) Курение.
 - б) Контакт с мышьяковистыми соединениями.
 - в) Климатические условия.
 - г) Верно все перечисленное
- 5 Под II стадией злокачественного заболевания следует понимать:
 - а) локализованный процесс
 - б) поражение регионарных лимфоузлов
 - в) поражение близлежащих (органных) лимфоузлов
 - г) наличие отдаленных метастазов
- 6 Хронический болевой синдром у онкологических больных наиболее часто развивается при:
 - а) метастазах в кости
 - б) метастазах в мозг
 - в) раке желудка
 - г) лимфогранулематозе
- 7 Символ «N» применим для обозначения состояния:
 - а) метастазирования
 - б) опухоли мягких тканей
 - в) отдаленных групп лимфатических узлов
 - г) только регионарных лимфатических узлов

- 8 Основные методы диагностики опухолей костей:
- а) Осмотр, опрос, пальпация.
 - б) Пункция, биопсия.
 - в) Рентгенография, компьютерная томография .
 - г) Верно все перечисленное
- 9 Рак молочной железы метастазирует в яичники:
- а) лимфогенным путем
 - б) ретроградно-лимфогенным путем
 - в) гематогенным путем
 - г) имплантационным путем
- 10 Основным структурным звеном онкологической службы является:
- а) ВОНЦ Российской АМН
 - б) НИИ онкологии
 - в) онкологический диспансер
 - г) онкологическое отделение
 - д) онкологический кабинет
- 11 К обязательным методам диагностики рака легкого относится:
- а) Рентгенография.
 - б) Радиоизотопное исследование.
 - в) Реовазография.
 - г) Флюорография
- 12 Показания к хирургическому лечению миомы матки:
- а) Гиперменореи с анемией.
 - б) Увеличение матки до 18-ти недельного срока беременности.
 - в) Быстрый рост миомы.
 - г) Верно все перечисленное
- 13 Злокачественная опухоль из эпителиальной ткани:
- а) Саркома.
 - б) Рак.
 - в) Гемангиома.
 - г) Нейросаркома
- 14 Саркома Юинга может метастазировать:
- гематогенным путем
 - а) лимфогенным путем
 - б) смешанным (лимфогенным + гематогенным) путем
- 15 К рентгенологическим исследованиям в онкологии относятся:
- а) ирригоскопия
 - б) фиброгастроскопия
 - в) колоноскопия
 - г) холангиография
 - д) цистоскопия
- 16 При запущенных злокачественных опухолях показана операция:
- а) Радикальная.
 - б) Паллиативная.
 - в) Электрокоагуляция.
 - г) Экстренная

- 17 У женщины при первичном осмотре гинекологом в мазке из шейки матки – цитограмма дисплазии. Дальнейшая тактика для исключения рака шейки матки:
- а) Биопсия шейки матки, соскоб из цервикального канала, УЗИ.
 - б) УЗИ, операция.
 - в) Лапароскопия.
 - г) Противовоспалительная терапия
- 18 Самой частой злокачественной опухолью у мужчин в нашей стране является:
- а) рак легких
 - б) рак желудка
 - в) рак предстательной железы
 - г) рак прямой кишки
- 19 Основные проявления рака молочной железы:
- а) Пальпируемая опухоль и фиксация соска молочной железы.
 - б) Втяжение кожи над опухолью молочной железы.
 - в) Увеличение подмышечных лимфоузлов на стороне опухоли.
 - г) Верно все перечисленное
- 20 Каковы задачи и функции онкологического диспансера:
- а) Диспансерное наблюдение пациентов..
 - б) Доврачебный осмотр пациента.
 - в) Проведение санпросвет работы среди граждан.
 - г) Анализ причин поздней диагностики злокачественных новообразований
- 21 Акт на уничтожение использованных ампул из-под наркотических средств хранится:
- а) В течение 1 года.
 - б) В течение 2 лет.
 - в) В течение 3 лет.
 - г) Бессрочно
- 22 К предраковым заболеваниям шейки матки относятся:
- а) Дисплазии II-III степени.
 - б) Аденоматозные полипы.
 - в) Атипичная лейкоплакия.
 - г) Верно все перечисленное
- 23 Адьювантная химиотерапия:
- а) Профилактическая химиотерапия.
 - б) Комбинированная химиотерапия.
 - в) Индивидуальная химиотерапия.
 - г) Индукционная химиотерапия
- 24 Онкологическая статистика в большей мере соответствует:
- а) описательному (дискриптивному) направлению в
 - б) эпидемиологии злокачественных новообразований
 - в) аналитическому направлению в эпидемиологии
- 25 Лимфогрануломатоз, лечение:
- а) Гормотерапия.
 - б) Химио-лучевое лечение.
 - в) Вакциноterapia.
 - г) Иммуноterapia

- 26 Основным первичным учетным документом онкологического диспансера является:
- а) извещение о больном с впервые в жизни установленным б)диагнозом рака
 - в)протокол запущенности
 - г)выписка из медицинской карты
 - д)контрольная карта диспансерного наблюдения
 - е)история болезни
- 27 Основные методы диагностики патологии шейки матки:
- а) Цитологический скрининг, кольпоскопия с прицельной биопсией.
 - б) Осмотр.
 - в) Пальпация.
 - г) Соскоб из полости матки
- 28 Место рака легкого в структуре онкологической заболеваемости:
- а) Первое.
 - б) Второе.
 - в) Пятое.
 - г) Третье
- 29 Анализ запущенных форм злокачественных образований проводится на основании:
- а) Карты стационарного пациента.
 - б) Амбулаторной карты.
 - в) Экстренного извещения.
 - г) Протокола на случай выявления запущенной формы злокачественного новообразования
- 30 Первичная диагностика рака на уровне общей лечебной сети предусматривает:
- а) установление наличия злокачественного новообразования
 - б) морфологическую верификацию
 - в) оценку стадии заболевания
 - г) оценку распространенности процесса по системе TNM
- 31 Хоспис – это:
- а) Медико-социальное учреждение, в котором осуществляется уход за неизлечимо больными людьми, оказывают медицинскую, психологическую, духовную и юридическую поддержку .
 - б) Лечебно-профилактическое учреждение, осуществляющее лечение и уход.
 - в) Диспансерное учреждение.
 - г) Поликлиническое учреждение
- 32 Последствия и осложнение после трахеостомии:
- а) Развитие подкожной эмфиземы.
 - б) Кровотечение, воздушная эмболия.
 - в) Инфицирование раны, пневмония.
 - г) Все перечисленное верно
- 33 Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников у женщин:
- а) Удаление придатков.
 - б) Резекция яичника с возможно большим сохранением здоровой ткани органа.
 - в) Надвлагалищная ампутация матки с придатками на стороне поражения.
 - г) Удаление яичника на стороне поражения
- 34 К опухолевидным процессам в яичнике относятся:
- а) Фолликулярная киста.
 - б) Киста желтого тела.
 - в) Эндометриоз.
 - г) Верно все перечисленное

- 35 В понятие «сочетанная терапия новообразований» входит:
- а) радикальное хирургическое + лучевое по плану лечебного учреждения
 - б) лучевое + хирургическое + лучевое в разных лечебных учреждениях
 - в) дистанционная + аппликационная лучевая терапия
 - г) лучевое + паллиативное хирургическое
- 36 Справку об умерших в стационаре оформляет:
- а) Патологоанатом.
 - б) Медстатист.
 - в) Медицинская сестра.
 - г) Лечащий врач
- 37 Температура в прямой кишке по отношению к температуре, измеренной в подмышечной впадине:
- а) идентична
 - б) ниже на 10
 - в) выше на 10
 - г) выше на 20
- 38 Медицинский работник смотрового кабинета пальпирует щитовидную железу:
- а) У всех пациентов.
 - б) Только при наличии клинических проявлений заболевания щитовидной железы.
 - в) Не пальпирует.
 - г) Только при подозрении на рак щитовидной железы
- 39 Длительная и интенсивная инсоляция может привести к возникновению новообразования:
- а) кожи
 - б) легкого
 - в) желудка
 - г) крови
- 40 Злокачественное новообразование из соединительной ткани называется:
- а) фиброма
 - б) киста
 - в) саркома
 - г) папиллома
- 41 Паллиативная помощь это:
- а) радикальное оперативное лечение
 - б) реабилитация
 - в) повышение качества жизни пациента с неизлечимой болезнью и членов его семьи
 - г) комплексная терапия
- 42 Перед взятием кала для исследования на скрытую кровь пациентам рекомендуют за 3 дня до анализа исключить из диеты:
- а) свеклу
 - б) препараты железа
 - в) зелень
 - г) кисло-молочные продукты
 - д) гречневую кашу
 - е) рисовую кашу

- 43 Контактные методы лучевой терапии:
- а) Аппликационная, внутрисполостная и интратканевая.
 - б) Внутрисполостная и дистанционная.
 - в) Дистанционная и аппликационная.
 - г) Интратканевая и дистанционная
- 44 Для рака желудка характерна:
- а) Повышенная кислотность желудочного сока.
 - б) Сниженная кислотность желудочного сока.
 - в) Повышение ранее сниженной кислотности желудочного сока.
 - г) Нормальная кислотность желудочного сока
- 45 Злокачественные новообразования среди причин смерти населения занимают:
- а) 1-е место
 - б) 2-е место
 - в) 7-8-е место
 - г) 10-е место
- 46 Предраковыми заболеваниями шейки матки являются:
- а) Дисплазия эпителия.
 - б) Кисты.
 - в) Полипы.
 - г) Кальлезная язва
- 47 Укажите предраковые заболевания:
- а) Хронический гастрит, дискинезия желчных путей.
 - б) Полипоз толстого кишечника, мастопатия, лейко- и эритроплакии.
 - в) Язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, хронический панкреатит.
 - г) Абсцесс ягодицы, рожистое воспаление
- 48 При раке пищевода применяются методы лечения:
- а) Хирургический, лучевой и химиотерапевтический.
 - б) Хирургический и лучевой.
 - в) Лучевой и химиотерапевтический.
 - г) Близкофокусная рентгенотерапия
- 49 Заболеваемость раком слизистой полости рта в РФ:
- а) Снижается.
 - б) Стабильная.
 - в) Повышается.
 - г) Никак не обозначена
- 50 Основные симптомы рака мочевого пузыря:
- а) Частое и болезненное мочеиспускание.
 - б) Кровь в моче.
 - в) Односторонние боли в пояснице.
 - г) Верно все перечисленное
- 51 Наиболее частые регионы метастазирования злокачественного новообразования молочной железы:
- а) печень
 - б) матка
 - в) кости, лимфоузлы регионарные
 - г) легкие, средостение

- 52 Что такое радикальная операция:
- а) Удаление пораженного органа в пределах здоровых тканей вместе с зонами регионарного ме-тастазирования.
 - б) Удаление первоначальной опухоли.
 - в) Удаление регионарных л/узлов.
 - г) Выполнение обходных анастомозов
- 53 В индустриальных странах главной причиной увеличения смертности от злокачественных новообразований является:
- а) старение населения
 - б) резкое ухудшение экологической обстановки
 - в) увеличение влияния профессиональных вредностей
 - г) нет правильного ответа
- 54 Газоотводную трубку ставят максимально на:
- а) 24 часа
 - б) 12 часов
 - в) 1 час
 - г) 30 минут
- 55 Наиболее частая локализация рака слизистой полости рта:
- а) На подвижной части языка.
 - б) Дно полости рта.
 - в) Слизистая щек.
 - г) Слизистая мягкого неба
- 56 Клинические симптомы ранней стадии злокачественного новообразования молочной железы:
- а) ограниченный узел в молочной железе
 - б) узел в молочной железе
 - в) выделение из соска
 - г) втяжение кожи над очагом
 - д) боли в молочной железе
- 57 Мелена симптом кровотечения:
- а) геморроидального
 - б) при язвенном колите
 - в) желудочного
 - г) из язвы 12-ти перстной кишки
 - д) из варикозно расширенных вен пищевода
- 58 Наиболее частые регионы метастазирования рака молочной железы:
- а) Кости, параортальные лимфоузлы.
 - б) Легкие, средостение.
 - в) Подмышечные лимфоузлы.
 - г) Паховые лимфоузлы
- 59 Методом морфологической верификации злокачественного новообразования считается:
- а) рентгеноскопия
 - б) биопсия
 - в) компьютерное исследование
 - г) УЗИ
 - д) термография

- 60 Обязательное исследование для диагностики рака пищевода:
- а) Ультразвуковое.
 - б) Эндоскопическое с биопсией.
 - в) Радиоизотопное.
 - г) В зеркалах
- 61 Количественному учету в отделении подлежат:
- а) Все наркотические средства.
 - б) Наркотические средства для парентерального применения.
 - в) Наркотические средства для парентерального и наружного применения.
 - г) Наркотические средства для наружного применения
- 62 Основные задачи онкологического диспансера:
- а) Оказание квалифицированной стационарной, поликлинической, консультативной помощи онко-логическим больным.
 - б) Организационно-методическое руководство, а также координирование деятельности всех он-кологических и лечебно-профилактических учреждений по вопросам онкологии.
 - в) Анализ причин поздней диагностики злокачественных новообразований.
 - г) Верно все перечисленное
- 63 Клинические признаки пузырного заноса:
- а) Быстрый рост матки.
 - б) Кровянистые выделения.
 - в) Уменьшение роста матки.
 - г) Повышение уровня гонадотропинов
- 64 Наиболее частой локализацией рака слизистой полости рта является:
- а) Язык.
 - б) Дно полости рта.
 - в) Слизистая щеки.
 - г) Слизистая мягкого неба
- 65 Виды экспериментального лечения в онкологии:
- а) химиотерапия
 - б) радиотерапия
 - в) радиохирurgia
 - г) нанотерапия
 - д) криоабляция
- 66 Факторы риска возникновения опухолей яичников:
- а) Гормональный.
 - б) Вирусный.
 - в) Генетический.
 - г) Верно все перечисленное
- 67 Сроки проведения профилактических осмотров населения:
- а) 1 раз в год.
 - б) 1 раз в 2 года.
 - в) 2 раза в год.
 - г) 1 раз полгода

- 68 Большинство внутрипросветных доброкачественных опухолей пищевода локализуется:
- а) В верхней половине пищевода.
 - б) В нижней половине пищевода.
 - в) В абдоминальном сегменте пищевода.
 - г) Нигде
- 69 Наиболее объективные сведения о местной распространенности опухолевого процесса (стадии заболевания) могут быть получены:
- а) При клиническом осмотре больного.
 - б) При рентгенологическом исследовании.
 - в) При использовании эндоскопических методов.
 - г) При патоморфологическом исследовании резецированного (удаленного) органа с региональными лимфатическими узлами
- 70 Наиболее частым психологическим синдромом у пациентов с неизлечимой болезнью считается:
- а) нарушение личности
 - б) нарушение психики
 - в) тревога и депрессия
 - г) эмоциональный ступор
- 71 Доброкачественное новообразование из соединительной ткани называется:
- а) фиброма
 - б) киста
 - в) саркома
 - г) папиллома
- 72 Температура тела от 37,0 до 37,9 градусов С называется:
- а) гиперпиретической
 - б) пиретической
 - в) субфебриальной
 - г) фебриальной
- 73 Эвтаназия это:
- а) оказание клиничко-хирургической помощи пациенту с неизлечимой болезнью
 - б) помощь в прекращении жизни пациента
 - в) комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни и смерти пациента
 - г) метод паллиативной помощи
- 74 Для достижения критической массы, несовместимой с жизнью, опухолевая клетка должна пройти:
- а) 10 удвоений
 - б) 20 удвоений
 - в) 30 удвоений
 - г) 40 удвоений
- 75 Где наиболее часто возникает рак поджелудочной железы:
- а) В теле железы.
 - б) В головке железы.
 - в) В хвосте железы.
 - г) Нигде

- 76 Доброкачественная опухоль:
- а) Метастазирует в регионарные узлы.
 - б) Метастазирует в отдаленные органы.
 - в) Метастазирует в регионарные лимфоузлы и отдаленные органы.
 - г) Не метастазирует
- 77 Использованные ампулы и шприц-тюбики из-под наркотических средств и психотропных веществ хранятся в сейфе процедурного кабинета в течение:
- а) недели
 - б) пяти дней
 - в) трех дней
 - г) суток
- 78 Виды (пути) метастазирования:
- а) гематогенный
 - б) иммуногематогенный
 - в) имплантационный
 - г) лимфогенный
 - д) смешанный
- 79 Рак молочной железы метастазирует в яичники:
- а) Лимфогенным путем.
 - б) Ретроградно-лимфогенным путем.
 - в) Гематогенным путем.
 - г) Имплантационным путем
- 80 Основные признаки злокачественных новообразований костей:
- а) гематома, боль, нарушение функции
 - б) припухлость, кожный зуд, местное повышение температуры
 - в) припухлость, боль, нарушение функции
 - г) плотное образование, боль, усиливающаяся ночью, нарушение функции
- 81 В понятие «комбинированный метод лечения новообразований» входит:
- а) радикальное хирургическое + лучевое по плану лечебного учреждения
 - б) лучевое + хирургическое + лучевое в разных лечебных учреждениях
 - в) дистанционная + аппликационная лучевая терапия
 - г) лучевое + паллиативное хирургическое
- 82 Основными методами диагностики доброкачественных опухолей пищевода являются:
- а) Рентгенологический и эндоскопический.
 - б) Радиоизотопный.
 - в) Трахеобронхоскопия.
 - г) Оперативный
- 83 Злокачественные новообразования хрящевой ткани:
- а) хондрома
 - б) хондробластома
 - в) хондросаркома
 - г) хорионэпителиома
 - д) тератома

- 84 К профилактике пролежней относится:
- а) протирание кожи камфорным спиртом
 - б) рациональный водный режим
 - в) рациональное питание
 - г) своевременный прием лекарственных препаратов
 - д) смена положения тела
- 85 На частоту местных лучевых реакций не влияет:
- а) Пожилой возраст.
 - б) Аллергические заболевания.
 - в) Сахарный диабет.
 - г) Тиреотоксикоз
- 86 К лучевым реакциям относится:
- а) Фиброз.
 - б) Лучевая язва.
 - в) Эритема кожи.
 - г) Лучевой рак.
- 87 Злокачественная опухоль из нервной ткани:
- а) Аденома.
 - б) Саркома.
 - в) Нейросаркома.
 - г) Миосаркома
- 88 Колоноскопом накладывают при раке:
- а) желудка
 - б) мочевого пузыря
 - в) прямой кишки
 - г) пищевода
- 89 Методом морфологической верификации злокачественного новообразования является:
- а) Рентгеноскопия.
 - б) Биопсия опухоли.
 - в) УЗИ.
 - г) Компьютерное обследование
- 90 Наиболее частый симптом злокачественного новообразования простаты:
- а) боль в промежности, крестце
 - б) дизурия
 - в) микрогематурия
 - г) нарушение акта дефекации
- 91 Интермиттирующий характер гематурии более характерен для рака:
- а) Мочеточника.
 - б) Почки.
 - в) Развитие второй опухоли.
 - г) Надпочечника
- 92 Метастазировать в кости могут:
- а) Рак молочной железы.
 - б) Рак яичников.
 - в) Рак шейки матки.
 - г) Верно все перечисленное

- 93 Базалиома:
- а) Предраковое заболевание.
 - б) Злокачественная опухоль.
 - в) Доброкачественная опухоль.
 - г) Инфильтрат
- 94 Подготовка пациента к колоноскопии включает в себя:
- а) низкокалорийную диету, слабительные средства, вечером накануне и за 2 часа до исследования
 - б) диету с механическим и химическим щажением, вечером накануне и за 2 часа до исследования очистительную клизму
 - в) низкокалорийную диету, слабительные средства, за 2 часа до исследования очистительную клизму
 - г) сифонную клизму за час до исследования
- 95 Причины заболевания раком гортани:
- а) Употребление чрезмерно горячей пищи.
 - б) Курение.
 - в) Переохлаждение.
 - г) Воздействие ультрафиолетовых лучей
- 96 Основной метод диагностики рака тела матки:
- а) Гистологическое исследование соскоба эндометрия.
 - б) Цитологическое исследование.
 - в) Трансвагинальная эхография.
 - г) Гистерография
- 97 Пероральный прием наркотических средств производится:
- а) В присутствии медицинской сестры.
 - б) В присутствии заведующего отделением.
 - в) В присутствии лечащего врача.
 - г) Всё перечисленное верно
- 98 К доброкачественным опухолям молочных желез относятся:
- а) Диффузная фиброзно-кистозная мастопатия.
 - б) Узловая фиброзно-кистозная мастопатия.
 - в) Фиброаденома.
 - г) Атерома
- 99 «Атипичные» клетки характерны для:
- а) миомы
 - б) фибромы
 - в) саркомы
 - г) ангиомы
- 100 Фибромиома матки - это:
- а) Доброкачественная опухоль из гладкомышечных и соединительных тканей матки.
 - б) Доброкачественная опухоль из соединительных тканей.
 - в) Злокачественная опухоль.
 - г) Предраковое состояние
- 101 Самый простой (не требующий специальной подготовки) метод диагностики рака прямой кишки:
- а) Пальцевое исследование прямой кишки.
 - б) Ирригоскопия.
 - в) Колоноскопия.
 - г) Дуоденография

- 102 Время подготовки кожи пациента перед плановой операцией (бритье):
- а) накануне вечером
 - б) накануне утром
 - в) за 2 часа до операции
 - г) за 1 час до операции
- 103 Нарушение гормонального баланса не оказывает влияние на возникновение:
- а) Рака яичников.
 - б) Рака матки.
 - в) Рака молочных желез.
 - г) Рака печени
- 104 Учет онкологических больных осуществляется на основании:
- а) Формы 070/у.
 - б) Карты стационарного больного (ф. 003/у).
 - в) Карты амбулаторного больного (ф. 025/у).
 - г) Выписки из онкологического диспансера
- 105 Ятрогения это термин применим к:
- а) психическому заболеванию
 - б) заболеванию с неблагоприятным прогнозом
 - в) заболеванию, вызванному действиями медицинского работника
 - г) разглашению врачебной тайны
 - д) заболеванию, вызванному словами медицинского работника
- 106 К доброкачественным опухолям относятся:
- а) Гемангиома, остеома, остеобластокластома, опухоль Юнга.
 - б) Скирр, болезнь Педжетта, нейрофиброма.
 - в) Липома, фиброма, миома.
 - г) Меланома, атерома, фибромиома, невринома
- 107 Самой частой злокачественной опухолью у мужчин в нашей стране является:
- а) Рак легких.
 - б) Рак желудка.
 - в) Рак предстательной железы.
 - г) Рак прямой кишки
- 108 Клинические проявления рака тела матки:
- а) Серозные и кровянистые выделения.
 - б) Зуд наружных половых органов.
 - в) Учащенное мочеиспускание.
 - г) Увеличение живота, боли
- 109 Положение пациента, которое он не в состоянии поменять называется:
- а) активное
 - б) вынужденное
 - в) дренажное
 - г) пассивное

- 110 Искусственное питание можно осуществлять через:
- а) гастростому
 - б) зонд
 - в) парентерально
 - г) клизму
 - д) рот
 - е) илеостому
 - ж) цистостому
- 111 Первыми проявлениями лимфогранулематоза считаются увеличенными лимфоузлы:
- а) паховые
 - б) медиастинальные
 - в) забрюшинные
 - г) шейные, надключичные
- 112 Плоскоклеточный рак преимущественно встречается:
- а) В пищеводе и анальном канале прямой кишки.
 - б) В желудке и тонкой кишке.
 - в) В тонкой и ободочной кишке.
 - г) В желудке и ободочной кишке
- 113 Документ разрешающий медицинскому учреждению осуществлять указанный в нем вид деятельности:
- а) Лицензия.
 - б) Приказ.
 - в) Сертификат.
 - г) Диплом
- 114 Для рака носоглотки характерно:
- а) Стойкая головная боль.
 - б) Снижение слуха.
 - в) Длительный насморк.
 - г) Длительный кашель
- 115 Виды роста опухоли в зависимости от числа очагов:
- а) экзофитный
 - б) уницентрический
 - в) мультицентрический
 - г) инфильтрирующий
 - д) аппозиционный
- 116 Символ «N» применим для обозначения состояния:
- а) Только регионарных лимфатических узлов.
 - б) Всех групп лимфатических узлов выше или ниже диафрагмы.
 - в) Любых групп лимфатических узлов.
 - г) Недостаточно данных для определения лимфатических узлов
- 117 Чаще малигнизируются язвы расположенные:
- а) На большой кривизне желудка.
 - б) В пилорическом отделе желудка.
 - в) На малой кривизне желудка.
 - г) В пищеводе

- 118 К контактным методам лучевой терапии относятся:
- а) рентгенотерапия
 - б) гамма-терапия
 - в) аппликационный
 - г) нейронная терапия
- 119 Страх смерти является проблемой:
- а) духовной
 - б) психологической
 - в) социальной
 - г) физической
- 120 При диспансерном наблюдении за онкологическим больным основным документом является:
- а) Амбулаторная карта (ф.025/у).
 - б) Контрольная карта диспансерного наблюдения (ф. 030/у).
 - в) Выписка из истории болезни.
 - г) Карта стационарного пациента
- 121 Рак почки наиболее часто метастазирует:
- а) в плевру и печень
 - б) в кости и легкие
 - в) в печень и головной мозг
 - г) в мягкие ткани и забрюшинные лимфоузлы
 - д) в забрюшинные лимфоузлы и яичники
- 122 Аденокарциномы злокачественные новообразования, происходящие из:
- а) соединительной ткани
 - б) костной ткани
 - в) хрящевой ткани
 - г) эпителия
 - д) эпителия с железистым компонентом
- 123 Во избежание патологических переломов при метастатических поражениях позвоночника под матрац пациента подкладывают:
- а) резиновый круг
 - б) матерчатый валик
 - в) металлические пластины
 - г) деревянный щит
- 124 Лучевая терапия регионарных метастазов рака нижней губы используется:
- а) Как самостоятельный радикальный метод.
 - б) Как этап комбинированного лечения.
 - в) Не используется.
 - г) Иногда
- 125 При жалобах больного на «охриплость» следует проявлять онкологическую настороженность относительно:
- а) Рака гортани.
 - б) Хемодектомы блуждающего нерва.
 - в) Рака щитовидной железы
 - г) Рака легкого

- 126 С воздействием вируса не связывают возникновение:
- а) Рака шейки матки.
 - б) Рака печени.
 - в) Рака желудка.
 - г) Рака носоглотки
- 127 Стадия заболевания во многом определяет:
- а) выбор метода лечения
 - б) прогноз
 - в) объем операции
 - г) эффективность лечения
- 128 Уничтожение использованных ампул из-под наркотических средств оформляется:
- а) Актом.
 - б) Докладной запиской.
 - в) Заявлением.
 - г) Служебной запиской
- 129 Методы диагностики рака щитовидной железы:
- а) Осмотр, пальпация, УЗИ с биопсией.
 - б) УЗИ.
 - в) Рентгенография.
 - г) Компьютерная томография
- 130 Смотровой кабинет относится к структурным подразделениям:
- а) врачебной амбулатории
 - б) многопрофильной больницы
 - в) онкологического диспансера
 - г) территориальной поликлиники
 - д) фельдшерско-акушерского пункта
- 131 Химиопрепараты, тормозящие деление раковых клеток называются:
- а) антиметаболиты
 - б) цитостатики
 - в) противоопухолевые антибиотики
 - г) гормоны
- 132 К первой категории лечебных учреждений относится онкологический диспансер при наличии в нем:
- а) 25 врачебных должностей
 - б) 15 врачебных должностей
 - в) 10 врачебных должностей
 - г) 7 врачебных должностей
 - д) 5 врачебных должностей
- 133 Дифференцировка клеток в злокачественных опухолях:
- а) Не нарушается
 - б) Нарушена частично.
 - в) Нарушена редко.
 - г) Нарушена всегда
- 134 Основной принцип обезболивания – это приема лекарств:
- а) по часам
 - б) по требованию
 - в) с повышением дозы
 - г) с понижением дозы
 - д) без учета индивидуальности

- 135 Меры профилактики рака кожи:
- а) Регулярный самоосмотр кожи.
 - б) Исключение длительного воздействия УФО.
 - в) Защита рубцов и родинок от механических травм.
 - г) Все перечисленное верно
- 136 Биопсия, при которой для исследования иссекают часть опухоли, называется:
- а) аспирационной
 - б) пункционной
 - в) инцизионной
 - г) тотальной
 - д) трепанобиопсия
- 137 Паллиативная помощь – это:
- а) Всеобъемлющая помощь неизлечимо больным гражданам, страдающим заболеваниями которые не поддаются излечению.
 - б) Психологическая поддержка пациентов и семьи.
 - в) Правовое консультирование пациентов и обеспечение им правовой защиты.
 - г) Всё перечисленное верно
- 138 Рак почки наиболее часто метастазирует:
- а) В плевру и печень.
 - б) В кости и легкие.
 - в) В печень и головной мозг.
 - г) В забрюшинные лимфоузлы
- 139 Основные признаки злокачественных образований костей:
- а) Объемное образование в кости.
 - б) Боль в костях, особенно при физической нагрузке.
 - в) Нарушение функции конечностей.
 - г) Верно все перечисленное
- 140 Признак, не характерный для злокачественной опухоли:
- а) Прорастание в окружающие ткани и регионарные лимфоузлы.
 - б) Четкие границы опухоли, метастазы не дает.
 - в) Развитие кисты.
 - г) Микроскопически-«атипичные» клетки
- 141 Пациенты считаются излеченными от злокачественного новообразования если:
- а) опухоль удалена полностью
 - б) при операции видимых метастазов не обнаружено
 - в) прошло 5 лет после комплексного лечения
 - г) прошло 10 лет после комплексного лечения
 - д) жалоб не предъявляют
- 142 Больной с удаленным ворсинчатым полипом прямой кишки должен наблюдаться:
- а) у хирурга
 - б) у проктолога
 - в) у онколога
 - г) у терапевта
- 143 Возможные осложнения фибромиомы матки:
- а) Перекрут ножки узла.
 - б) Бесплодие.
 - в) Анемия.
 - г) Верно все перечисленное

- 144 Сколько стадий проходит опухоль в своем развитии:
- а) Пять.
 - б) Две.
 - в) Четыре.
 - г) Одну
- 145 Психическая стадия онкологического пациента в начальной стадии болезни:
- а) депрессия
 - б) принятие
 - в) протест
 - г) отрицание
- 146 Сроки диспансерного наблюдения за онкологическим больным после проведенного лечения:
- а) В течение всей жизни.
 - б) В течение 3 лет.
 - в) В течение 5 лет.
 - г) В течение 10 лет
- 147 К группе повышенного онкологического риска не относятся люди:
- а) Имеющие контакт с онкобольными.
 - б) С предраковыми заболеваниями.
 - в) С нарушением углеводно-жирового обмена.
 - г) Здоровые с наличием рака у ближайших родственников
- 148 Осмотр и пальпацию молочной железы следует проводить в положении пациентки:
- а) стоя с опущенными руками
 - б) сидя
 - в) лежа
 - г) стоя, положив руки на пояс или за голову
- 149 К истинным опухолям яичников относится:
- а) фолликулярная киста
 - б) киста желтого тела
 - в) параовариальная киста
 - г) пилюозноэпителиальная киста
- 150 «Онкологическая настороженность» - это:
- а) Подозрение на наличие рака.
 - б) Тщательное собирание анамнеза.
 - в) Исполнение стандартов обследования.
 - г) Верно все перечисленное
- 151 Сочетанная лучевая терапия означает:
- а) Применение двух способов облучения или двух видов излучения.
 - б) Расщепление курса лучевой терапии.
 - в) Облучение с радиомодификаторами.
 - г) Облучение в сочетании с химиотерапией

- 152 Метод исследования, позволяющий доказать морфологически (цитологически, гистологически) диагноз злокачественного новообразования желудка:
- а) рентгеноскопия желудка
 - б) УЗИ
 - в) радиоизотопное исследование
 - г) фиброгастродуоденоскопия
 - д) тепловидение
- 153 Температура пищи, вводимой через стому (в градусах по цельсию):
- а) 60-65
 - б) 35-45
 - в) 25-30
 - г) 18-22
- 154 Внутриэпителиальный неинвазивный рак обозначается символом:
- а) To
 - б) Tx
 - в) Tis
 - г) T1
 - л) T4
- 155 Основным первичным учетным документом онкологического диспансера считается:
- а) выписка из медицинской карты
 - б) извещение о пациенте с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования
 - в) контрольная карта диспансерного наблюдения
 - г) протокол запущенности
 - д) заключение районного онколога
- 156 Основные признаки малигнизации пигментного невуса:
- а) изменение окраски, появление зернистости, медленный рост
 - б) изменение окраски, периферический рост, зуд
 - в) нагноение
 - г) усиленный рост волос
- 157 Метастазирование злокачественного новообразования молочной железы в первую очередь происходит в лимфоузлы:
- а) паховые
 - б) подключичные
 - в) подмышечные
 - г) шейные
- 158 Для установления диагноза злокачественной опухоли слюнных желез необходимо выполнить:
- а) Пункцию опухоли с последующим цитологическим исследованием.
 - б) Компьютерную томографию.
 - в) Ангиографию.
 - г) Рентгенографию
- 159 Основным структурным звеном онкологической службы признано:
- а) НИИ онкологии
 - б) онкологический диспансер
 - в) смотровой кабинет территориальной поликлиники
 - г) хоспис

- 160 Доброкачественное образование:
- а) метастазирует в регионарные узлы
 - б) метастазирует в отдаленные органы
 - в) метастазирует в соседние органы
 - г) не метастазирует
- 161 Наиболее устойчива к онкогенному действию ультрафиолетового излучения кожа:
- а) Не содержащая пигмента.
 - б) Содержащая незначительное количество пигмента.
 - в) Сильно пигментированная.
 - г) Белая
- 162 Исследование молочных желез при подозрении на новообразование начинают с:
- а) пункционной биопсии
 - б) дуктографии
 - в) маммографии
 - г) пальпации
- 163 Для ранней диагностики рака молочной железы применяется:
- а) Маммография.
 - б) Флюорография.
 - в) Радиоизотопное исследование.
 - г) Секторальная резекция молочной железы
- 164 Предраковые состояния желудка:
- а) Каллезная язва желудка.
 - б) Хронический гастрит.
 - в) Полипоз желудка.
 - г) Стеноз привратника желудка
- 165 Наиболее часто встречающаяся морфологическая форма рака шейки матки:
- а) плоскоклеточный рак
 - б) аденокарцинома
 - в) саркома
 - г) светлоклеточный рак
- 166 Укажите злокачественную опухоль:
- а) Липома.
 - б) Фиброма.
 - в) Миома.
 - г) Меланома
- 167 Запасы наркотических средств в отделениях не должны превышать:
- а) 7-дневной потребности.
 - б) 3-дневной потребности.
 - в) 1-дневной потребности.
 - г) 5-дневной потребност
- 168 Наличие множественных метастазов в регионарных лимфатических узлах характеризует, как:
- а) II стадию.
 - б) I стадию.
 - в) III стадию.
 - г) IV стадию

- 169 Наиболее часто встречающаяся морфологическая форма рака эндометрия:
- а) плоскоклеточный рак
 - б) аденокарцинома
 - в) железисто-плоскоклеточный рак
 - г) недифференцированный рак
 - д) светлоклеточная аденокарцинома
- 170 Какие методы диагностики опухолей являются достоверными:
- а) Биопсия с гистологическим исследованием.
 - б) Пункционная биопсия.
 - в) Цитологическое исследование.
 - г) Верно все перечисленное
- 171 В доброкачественных опухолях дифференцировка клеток:
- а) Не нарушена.
 - б) Нарушена умеренно.
 - в) Нарушена выраженно.
 - г) Нарушена сильно
- 172 Постлучевые осложнения слизистой полости рта (радиомукозит) обрабатывают:
- а) 0,1% раствором йода
 - б) содовым раствором
 - в) раствором антисептика
 - г) 6% раствором перекиси водорода
- 173 При злокачественном новообразовании кровь в кале появляется:
- а) перед дефекацией
 - б) во время дефекации
 - в) после дефекации
 - г) без связи с дефекацией
- 174 К 1а клинической группе больных относятся:
- а) Больные с заболеваниями, подозрительными на злокачественные новообразования.
 - б) Больные с предопухолевыми заболеваниями.
 - в) Больные с установленным диагнозом злокачественного новообразования и подлежащие радикальному лечению.
 - г) Лица, излеченные от злокачественных новообразований
- 175 Ко II клинической группе больных относится:
- а) Больные с заболеваниями, подозрительными на злокачественные новообразования.
 - б) Больные с предопухолевыми заболеваниями.
 - в) Больные с установленным диагнозом злокачественного новообразования и подлежащие радикальному лечению.
 - г) Лица, излеченные от злокачественных новообразований
- 176 Обязательные условия при постановке лекарственной клизмы:
- а) температура 38-40 градусов
 - б) температура 35-37 градусов
 - в) объем 50-100 мл
 - г) объем 1-1,5 л
 - д) без предварительной очистительной клизмы
 - е) после очистительной клизмы через 30-40 минут

- 177 Доброкачественным считается новообразование:
- а) меланома
 - б) фиброаденома
 - в) аденокардиома
 - г) лимфосаркома
 - д) фибросаркома
- 178 Ранние симптомы рака поджелудочной железы:
- а) Тяжесть или дискомфорт в верхних отделах живота.
 - б) Появление признаков сахарного диабета (жажда, повышение уровня сахара в крови и т.д).
 - в) Частый жидкий стул.
 - г) Все перечисленное верно
- 179 Мокроту для цитологического исследования необходимо доставить в лабораторию после сбора:
- а) сразу же
 - б) не позднее 1-1,5 часа
 - в) через 2 часа
 - г) в течении суток
- 180 Основной клинический симптом рака тела матки:
- а) Хроническая тазовая боль.
 - б) Контактные кровотечения.
 - в) Ациклические кровотечения.
 - г) Бесплодие
- 181 В индустриальных странах главной причиной увеличения смертности от злокачественных новообразований считается:
- а) качество продуктов питания
 - б) повышение профессиональных вредностей
 - в) ухудшение экологической обстановки
 - г) старение населения
- 182 Наука, изучающая вопросы нравственного поведения медицинских работников:
- а) медицинская деонтология
 - б) медицинская этика
 - в) медицинская педагогика
 - г) медицинская психология
- 183 Трофобластическая болезнь - это:
- а) Саркома матки.
 - б) Миома матки.
 - в) Киста яичника.
 - г) Хорионэпителиома
- 184 Уничтожение использованных ампул из-под наркотических средств производят:
- а) 1 раз в 10 дней.
 - б) Ежемесячно.
 - в) Ежедневно.
 - г) Ежеквартально
- 185 Злокачественные новообразования среди причин смертности населения занимают:
- а) 1-е место.
 - б) 2-е место.
 - в) 7-8-е место.
 - г) 10-е место

- 186 Наиболее частая локализация лимфангиом:
- а) Голова.
 - б) Конечности.
 - в) Область шеи.
 - г) Живот
- 187 Злокачественная опухоль:
- а) Не влияет на общее состояние.
 - б) Растет медленно, имеет капсулу.
 - в) Растет быстро, разрушая окружающие ткани.
 - г) Не рецидивировует
- 188 При предрасположенности к раку характерно:
- а) изменение гормонального фона
 - б) изменение иммунитета
 - в) наличие предраковых заболеваний
 - г) атипизм клеток органа
 - д) изменение на генетическом уровне
- 189 К методам биопсии относятся:
- а) пункция толстой иглой с забором тканей
 - б) исследование выделений
 - в) эндоскопическое взятие кусочка тканей щипком
 - г) исследование отпечатков
 - д) иссечение кусочка тканей
- 190 Основным методом лечения злокачественных новообразований:
- а) химиотерапия
 - б) оперативный
 - в) гормонотерапия
 - г) физиотерапия
- 191 Цитологический метод наиболее часто применяется при диагностике:
- а) Рака шейки матки.
 - б) Опухолей почек.
 - в) Опухолей костей.
 - г) Рака легкого
- 192 На основании каких исследований можно сделать вывод о дисплазии эпителиальной ткани:
- а) Клинических признаков.
 - б) Данных рентгенологического исследования.
 - в) Данных КТ.
 - г) Цитологического или гистологического исследования
- 193 Ионизирующие излучения обладают канцерогенным действием:
- а) При воздействии в малых дозах.
 - б) При воздействии в больших дозах.
 - в) При воздействии средних дозах.
 - г) Не обладают канцерогенным действием
- 194 Основные причины запущенности злокачественных опухолей:
- а) Позднее обращение и трудности в диагностике.
 - б) Невыполнение стандартов обследования и отсутствие онкологической настороженности.
 - в) Ошибки в диагностике.
 - г) Верно все перечисленное

- 195 Мокроту для цитологического исследования лучше собирать:
- а) Утром натощак.
 - б) Вечером.
 - в) Днем.
 - г) Не имеет значения
- 196 Миома матки сопровождается:
- а) Анемиями.
 - б) Учащением мочеиспускания
 - в) Нарушением дефекации.
 - г) Верно все перечисленное
- 197 Для преинвазивного рака (carcinoma in situ) характерно:
- а) атипизм эпителия
 - б) сохранность базальной мембраны
 - в) инвазия в подслизистый слой
 - г) неизменная структура эпителия
 - д) отсутствие метастазов
- 198 Анурия это понятие, означающее:
- а) отсутствие мочевыделения при полном мочевом пузыре
 - б) острую задержку мочеиспускания
 - в) прекращение поступления мочи в мочевой пузырь
 - г) расстройство мочеиспускания
- 199 Наиболее часто встречающаяся морфологическая форма рака эндометрия:
- а) Плоскоклеточный рак.
 - б) Аденокарцинома.
 - в) Железисто-плоскоклеточный рак.
 - г) Недифференцированный рак
- 200 Базальноклеточный рак наиболее часто локализуется на коже:
- а) Волосистой части головы.
 - б) Лица.
 - в) Верхних конечностей.
 - г) Нижних конечностей
- 201 Основные задачи онкологического диспансера:
- а) проведение профилактических осмотров
 - б) оказание квалифицированной стационарной, поликлинической, консультативной помощи
 - в) координирование деятельности всех учреждений онкологической службы
 - г) анализ причин поздней диагностики злокачественных новообразований
- 202 Абластика это система мероприятий, направленная на:
- а) предотвращение диссеминации раковых клеток во время операции
 - б) уничтожение раковых клеток в ране
 - в) изоляцию больного от окружающих
 - г) профилактику заболеваний среди медперсонала
- 203 Для выявления «холодных» и «горячих» узлов в щитовидной железе применяют:
- а) сцинтиграфию
 - б) рентгенографию
 - в) пальпацию
 - г) термографию

- 204 Для ранней диагностики злокачественного новообразования молочной железы применяются:
- а) флюорография
 - б) акторальная резекция молочной железы
 - в) маммография
 - г) пункционная биопсия
 - д) пальпация молочной железы
- 205 Архивный срок хранения контрольной карты составляет не менее:
- а) 1 года
 - б) 3 лет
 - в) 5 лет
 - г) 10 лет
 - д) 15 лет
- 206 Первичная диагностика рака при уровне общей лечебной сети предусматривает:
- а) Установление наличия злокачественной опухоли.
 - б) Морфологическую верификацию.
 - в) Оценку стадии заболевания.
 - г) Оценку распространенности процесса по системе TNM.
- 207 Приказ МЗ РФ, регламентирующий специальные требования к условиям хранения НС и ПВ, предназначенных для медицинского применения:
- а) № 1103н.
 - б) № 1030.
 - в) № 720
 - г) № 541
- 208 При запущенных злокачественных новообразованиях показана операция:
- а) радикальная
 - б) паллиативная
 - в) зональная
 - г) экстренная
- 209 Эндометриоз - это:
- а) Доброкачественный процесс.
 - б) Разрастание эндометрия.
 - в) Гормональная опухоль.
 - г) Инфильтрат
- 210 Оптимальная мощность специализированного онкологического отделения стационара составляет:
- от 20 до 40 коек
 - т 40 до 60 коек
 - от 60 до 90 коек
 - от 90 до 120 коек
- 211 Скрининговые исследования на выявление рака наиболее рационально следует начинать с возрастной группы:
- а) 15-24 лет.
 - б) 25-34 лет.
 - в) 35-44 лет
 - г) 45-54 лет

- 212 Принципам онкологической настороженности противоречит:
- а) Тщательное обследование каждого больного.
 - б) Назначение лекарств в первый день обращения больного.
 - в) Привычка думать о раке со скрытым течением.
 - г) Знание симптомов злокачественной опухоли
- 213 При раке легкого применяются методы лечения:
- а) Хирургический, лучевой и химиотерапевтический.
 - б) Хирургический и лучевой.
 - в) Лучевой и химиотерапевтический.
 - г) Близкофокусная рентгенотерапия
- 214 Для предупреждения пролежней положение пациента в постели необходимо менять каждые:
- а) 30 минут
 - б) 2 часа
 - в) 4 часа
 - г) сутки
- 215 Основная цель радикальной лучевой терапии:
- а) Подведение максимально возможной дозы излучения.
 - б) Снижение биологической активности опухолевых клеток.
 - в) Достижение частичной регрессии опухоли.
 - г) Достижение полной регрессии опухоли
- 216 Сколько групп диспансерного учета существует:
- а) Одна.
 - б) Пять.
 - в) Три.
 - г) Четыре
- 217 Морфологические признаки раннего инвазивного рака:
- а) атипизм эпителия
 - б) целостность клеточной мембраны
 - в) неизменность структуры эпителия
 - г) наличие отдаленных метастазов
 - д) инвазия в подслизистый слой
- 218 Кардиотоксическое действие оказывают химиопрепараты:
- а) адриамицин
 - б) винбластин
 - в) карминомицин
 - г) метатрексат
 - д) рубомицин
- 219 Методы рентгенологической диагностики опухолей:
- а) Рентгеноскопия и рентгенография.
 - б) Флюорография.
 - в) Компьютерная томография.
 - г) Все перечисленное верно
- 220 Ранние реакции после лучевого лечения:
- а) Снижение показателей крови (лейкопения).
 - б) Снижение аппетита.
 - в) Тошнота, рвота.
 - г) Верно все перечисленное

- 221 Основным методом лечения доброкачественных опухолей является:
- а) Лучевой.
 - б) Хирургический.
 - в) Гормональный.
 - г) Паллиативный
- 222 Основные методы диагностики опухоли яичника:
- а) Пункция заднего свода, гистеросальпингография.
 - б) УЗИ органов малого таза.
 - в) Определение опухолевых маркеров в крови.
 - г) Верно все перечисленное
- 223 По определению ВОЗ здоровье - это:
- а) Состояние оптимального функционирования организма, позволяющее ему ну и лучшим образом выполнять свои видоспецифические социальные функции.
 - б) Состояние полного физического, психического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
 - в) Состояние организма, при котором он функционирует оптимально без признаков заболевания или какого-либо нарушения
 - г) Информация о состоянии здоровья пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении
- 224 Абсолютным противопоказанием к лучевому лечению является:
- а) Пожилой возраст.
 - б) Молодой возраст.
 - в) Активный туберкулез.
 - г) Грипп и ОРВИ
- 225 Методы рентгенологической диагностики опухолей:
- а) Рентгеноскопия и рентгенография.
 - б) Флюорография.
 - в) Компьютерная томография.
 - г) Верно все перечисленное
- 226 Под термином «адъювантная химиотерапия» понимают:
- а) послеоперационную химиотерапию
 - б) предоперационную химиотерапию
 - в) профилактическую химиотерапию
 - г) оценку эффективности послеоперационной химиотерапии по степени лекарственного патоморфоза
- 227 Профилактика развития рака эндометрия состоит:
- а) В устранении нарушений овуляции.
 - б) В своевременном лечении диабета, ожирения, гипертонической болезни.
 - в) Правильная диета.
 - г) Отказ от половой жизни
- 228 Методы лечения доброкачественных опухолей костей:
- а) Хирургический.
 - б) Лучевой.
 - в) Лекарственный.
 - г) Химиотерапевтический

- 229 Карцинома in situ в классификации TNM соответствует стадии:
- а) IV
 - б) III
 - в) II
 - г) I
 - д) 0
- 230 Радикальные методы лечения злокачественных новообразований включают:
- а) полное излечение больного от злокачественного новообразования
 - б) ликвидацию метастаз
 - в) устранение симптомов злокачественного новообразования
 - г) комплекс мероприятий, улучшающих качество жизни онкологического больного
- 231 Пустые ампулы из-под наркотических средств медицинская сестра должна:
- а) Сдавать заведующему отделением.
 - б) Выбрасывать.
 - в) Сдавать главной медицинской сестре.
 - г) Списывать
- 232 Символ «М» в клинической классификации обозначает:
- а) Недостаточно данных для определения отдаленных метастазов.
 - б) Нет признаков отдаленных метастазов.
 - в) Имеются отдаленные метастазы.
 - г) Преинвазивная карцинома
- 233 К факторам, связывающим влияние на возникновение рака нижней губы, относятся:
- а) Курение, контакт с мышьяковистыми соединениями, лучистая энергия.
 - б) Травма.
 - в) Климатические условия.
 - г) Холодная пища
- 234 Рак кожи имеет вид:
- а) Язвы с плотным вывороченным краем.
 - б) Разрастание типа цветной капусты с мягкой влажной поверхностью.
 - в) Разрастание типа цветной капусты с гиперкератотическими наслоениями.
 - г) Верно все перечисленное
- 235 Наиболее частые клинические симптомы злокачественных опухолей яичка:
- а) Болевые ощущения, тяжесть и дискомфорт в яичке.
 - б) Затрудненное и учащенное мочеиспускание.
 - в) Клинические проявления метастазов.
 - г) Нарушение акта дефекации
- 236 Международная классификация новообразований по системе TNM применяется для характеристики:
- а) Предопухолевых состояний.
 - б) Доброкачественных опухолей.
 - в) Злокачественных опухолей.
 - г) Оценки количественного показателя заболеваемости
- 237 Под термином «неоадьювантная химиотерапия» понимают:
- а) послеоперационную химиотерапию
 - б) предоперационную химиотерапию
 - в) профилактическую химиотерапию
 - г) оценку эффективности послеоперационной химиотерапии по степени лекарственного патоморфоза

- 238 Ранний симптом центрального рака легкого:
- а) Кашель с гнойной мокротой.
 - б) Мокрый длительный кашель.
 - в) Кашель, кровохарканье, одышка.
 - г) Легочное кровотечение
- 239 Достоверная диагностика в онкологии обеспечивается исследованиями:
- а) Ультразвуковым.
 - б) Радиоизотопным.
 - в) Гистологическим.
 - г) Рентгенологическим
- 240 Диагноз злокачественного новообразования считается установленным при:
- а) гистологическом исследовании
 - б) клиническом осмотре
 - в) радиоизотопном исследовании
 - г) цитологическом исследовании
- 241 Температура воды для постановки простой очистительной клизмы (в градусах по цельсию):
- а) 38-40
 - б) 25-30
 - в) 18-22
 - г) 15-17
- 242 Наиболее опасна ультрафиолетовая инсоляция для малигнизации заболевания:
- а) Фотодермит.
 - б) Витилиго.
 - в) Пигментная ксеродерма.
 - г) Меланома
- 243 Основные методы диагностики при раке полости рта:
- а) Пальпация.
 - б) Сбор анамнеза.
 - в) Мазок-отпечаток с цитологическим исследованием и краевая биопсия с гистологическим исследованием
 - г) Рентгенография
- 244 Наиболее частой морфологической формой злокачественных опухолей слизистой полости рта является:
- а) Плоскоклеточный рак.
 - б) Саркома.
 - в) Мукоэпидермоидная опухоль.
 - г) Недифференцированный рак
- 245 В структуре онкологической заболеваемости среди женщин 1-е место в РФ занимает рак:
- а) Шейки матки.
 - б) Тела матки.
 - в) Яичников.
 - г) Молочной железы

- 246 Профилактический осмотр мужчин в смотровой кабинете включает в себя мероприятия, за исключением:
- а) Осмотр кожных покровов и видимых слизистых.
 - б) Осмотр и пальпация наружных половых органов.
 - в) Пальпация периферических лимфоузлов и пальцевой исследование прямой кишки.
 - г) Пальпация прекардиальной области
- 247 Заболеваемость раком желудка в России:
- а) имеет тенденцию к снижению
 - б) имеет тенденции к повышению
 - в) стабильна
 - г) в различных регионах имеет разную тенденцию
- 248 Основные методы диагностики рака легкого:
- а) Рентгенологический.
 - б) Эндоскопический.
 - в) Торакоскопия.
 - г) Верно все перечисленное
- 249 Злокачественное новообразование:
- а) не влияет на общее состояние
 - б) растет медленно, имеет капсулу
 - в) растет быстро, разрушая окружающие ткани
 - г) не рецидивирует
- 250 «Онкологическая настороженность» это:
- а) подозрение на наличие рака, тщательное собирание анализа и обследование с целью выявления возможного онкологического заболевания
 - б) санитарно-просветительская работа, первичная профилактика, формирование групп повышенного риска
 - в) тщательный учет онкологических больных, вторичная профилактика
 - г) привычка в трудных случаях диагностики думать о возможности злокачественного новообразования
 - д) проведение всеобщей диспансеризации
- 251 При диагностике злокачественного новообразования прямой кишки прежде всего применяют:
- а) колоноскопию
 - б) пальцевое исследование
 - в) ирригоскопию
 - г) ультразвуковое исследование
- 252 Путь распространения опухоли считается практически не возможным:
- а) лимфатический
 - б) по кровеносным сосудам
 - в) контактный
 - г) имплантационный от одного больного другому
- 253 Нормальное содержание гемоглобина у женщин (в г/дл):
- а) 11-12
 - б) 11,7-13,8
 - в) 12-16
 - г) 13-16

- 254 Сроки наблюдения за онкологическим больным в первый год после лечения:
- а) 1 раз в 3 месяца.
 - б) 1 раз в месяц.
 - в) 1 раз в год.
 - г) 1 раз в 2 года
- 255 Что характерно для доброкачественной опухоли:
- а) Способность метастазировать.
 - б) Неконтролируемым инфильтративным ростом.
 - в) Высокий дифференцировкой клеток.
 - г) Наличие капсулы
- 256 К 1а клинической группе больных относятся:
- а) Больные с заболеваниями, подозрительными на злокачественные новообразования.
 - б) Больные с предопухолевыми заболеваниями.
 - в) Больные с установленным диагнозом злокачественного новообразования и подлежащие ради-кальному лечению.
 - г) Лица, излеченные от злокачественных новообразований
- 257 Задачей короткого интенсивного курса предоперационной лучевой терапии является:
- а) Повышение операбельности.
 - б) Повышение резектабельности.
 - в) Достижение значительного уменьшения опухоли.
 - г) Понижение жизнеспособности опухолевых клеток
- 258 При эндометриозе отмечают:
- а) Болезненные менструации.
 - б) Нарушение менструального цикла.
 - в) Ухудшение общего состояния перед месячными.
 - г) Верно все перечисленное
- 259 При передозировке опиатов в качестве антагониста применяют:
- а) гидрокортизон
 - б) кордиамин
 - в) мексидол
 - г) налоксон
- 260 К опухолевым процессам яичников относится:
- а) фолликулярная киста
 - б) фиброма яичников
 - в) киста яичника
 - г) дермоидная киста
- 261 Предраковые заболевания эндометрия:
- а) Атипическая гиперплазия эндометрия.
 - б) Железисто-кистозная гиперплазия эндометрия.
 - в) Аденоматоз и аденоматозные полипы.
 - г) Верно все перечисленное
- 262 К фоновым заболеваниям шейки матки относятся:
- а) Простая лейкоплакия.
 - б) Эритроплакия.
 - в) Рецидивирующий полип канала шейки матки.
 - г) Верно все перечисленное

- 263 Меланома это новообразование из:
- а) эпителия
 - б) слизистой
 - в) паренхимы
 - г) невоидных клеток
- 264 Массивное врастание опухоли в жизненно важный орган (органы) считается исключительно признаком стадии:
- а) III а
 - б) III б
 - в) IV а
 - г) IVб
- 265 Периодичность смены холодного компресса (в минутах):
- а) 20-30
 - б) 10-15
 - в) 7-9
 - г) 2-3
- 266 Характерный признак рака молочной железы:
- а) Боль при пальпации.
 - б) Крепитация.
 - в) Повышение температуры кожи.
 - г) Втянутый сосок
- 267 Исползованные ампулы из-под наркотических средств сдаются:
- а) В этот же день.
 - б) Еженедельно.
 - в) 1 раз в 10 дней.
 - г) Ежемесячно
- 268 При лечении злокачественных опухолей мягких тканей применение лучевой терапии наиболее целесообразно:
- а) В предоперационном и послеоперационном периодах.
 - б) Как самостоятельный метод.
 - в) Нецелесообразно.
 - г) Иногда
- 269 К побочным реакциям химиотерапии относятся:
- а) тошнота, рвота
 - б) гипертермия
 - в) агранулоцитоз
 - г) нефротоксичность
 - д) стоматит
- 270 К доброкачественным опухолям молочных желез относятся:
- а) диффузная фиброзно-кистозная мастопатия
 - б)узловая фиброзно-кистозная мастопатия
 - в) фиброаденома
- 271 К дистанционным методам лучевой терапии относятся:
- а) внутриполостной
 - б) внутритканевой
 - в) аппликационный
 - г) гамма-терапия

- 272 Наркотические средства хранятся:
- а) В сейфе.
 - б) В шкафу.
 - в) На полках в закрытом помещении.
 - г) В столе у постовой медсестры
- 273 Высокая эффективность химиотерапии наблюдается при следующих неоплазиях:
- а) Рак яичников.
 - б) Рак поджелудочной.
 - в) Рак щитовидной железы.
 - г) Рак почки
- 274 Наиболее часто встречающаяся морфологическая форма рака шейки матки:
- а) Плоскоклеточный рак.
 - б) Аденокарцинома.
 - в) Саркома.
 - г) Светлоклеточный рак
- 275 Что характерно злокачественной опухоли:
- а) Наличие капсулы.
 - б) Инфильтративный рост в окружающие органы и ткани.
 - в) Снижение силы сцепления клеток.
 - г) Оттеснение окружающих тканей
- 276 При передозировке опиатов в качестве антагониста применяют:
- а) унитиол
 - б) мепробамат
 - в) налоксон
 - г) гидрокортизон
- 277 Работа онкологической службы регламентируется следующим приказом:
- а) МЗ РФ № 116н.
 - б) МЗ РФ № 330.
 - в) МЗ РФ № 720.
 - г) МЗ РФ № 480
- 278 Диагностика опухолей включает следующие мероприятия:
- а) Осмотр, пальпация, рентгеноскопия, наложение свищей, анастомозов, биопсия, клинические исследования.
 - б) Анализ, пальпация, клинические и лабораторные исследования, рентгенодиагностика, эндоскопические методы, цитодиагностика, биопсия, радиоизотопная диагностика, сканирование, компьютерная томография.
 - в) Анамнез, осмотр, перкуссия, спирография, зондирование, промывание желудка, биопсия, рентгенодиагностика.
 - г) Анамнез, осмотр, аускультация, рентгенодиагностика, остановка кровотечения, лапаротомия
- 279 В группу риска, относительно возникновения меланомы кожи, следует относить пациента:
- а) Белой расы, проживающего в регионах с повышенной солнечной инсоляцией.
 - б) Белокурого, голубоглазого.
 - в) Получавшего в анамнезе гормонотерапию.
 - г) Черной расы

- 280 К истинным опухолям яичников относится:
- а) Фолликулярная киста.
 - б) Киста желтого тела.
 - в) Параовариальная киста.
 - г) Пилиэпителиальная киста
- 281 Наиболее частыми отдаленными последствиями химиотерапии у детей являются:
- а) Эндокринные расстройства.
 - б) Задержка роста.
 - в) Развитие второй опухоли.
 - г) Простудные заболевания
- 282 Мокроту для цитологического исследования необходимо доставить в лабораторию после сбора:
- а) Сразу же.
 - б) Не позже одного часа.
 - в) Через 2 часа после сбора.
 - г) В течение суток
- 283 Характерные признаки злокачественных опухолей:
- а) Инфильтративный рост.
 - б) Способность давать метастазы.
 - в) Потеря специфической функции ткани, из которой состоит опухоль.
 - г) Верно все перечисленное
- 284 Наиболее частый клинический симптом рака простаты:
- а) Затрудненное и учащенное мочеиспускание.
 - б) Боль в промежности.
 - в) Зуд в промежности.
 - г) Нарушение акта дефекации
- 285 Основные методы лечения злокачественных опухолей:
- а) Хирургический.
 - б) Лучевой.
 - в) Лекарственный.
 - г) Все перечисленное верно
- 286 Для определения соотношения между дневным и ночным диурезом назначают анализ мочи по:
- а) Аддис-Каковскому
 - б) Зимницкому
 - в) Нечипоренко
 - г) Ребергу
- 287 Канцерогенами являются:
- а) Нитраты, нитриты, витамины, соль, сахар, хром.
 - б) Асбест, анилиновые красители, нафталин, инсектициды.
 - в) Ароматические углеводы, этиловый спирт, табак, молоко.
 - г) Шоколад, растительное масло, рентгеновские лучи, 4-бензпирен
- 288 Ультразвуковой метод сканирования органов применяется:
- а) Для диагностики опухолей, толстого и тонкого кишечника, пищевода.
 - б) Для выявления опухолей мочевого пузыря, мочеточника, уретры.
 - в) Для выявления опухолей печени, почек, поджелудочной железы, щитовидной железы, молочных желез.
 - г) Для выявления меланомы, атеромы, фибромиомы, невриномы

- 289 «Символ «Т» позволяет:
- а) Оценить размеры и местное распространение опухоли.
 - б) Первичная опухоль отсутствует.
 - в) Преинвазивная карцинома.
 - г) Недостаточно данных для определения опухоли
- 290 Характерные признаки рака пищевода:
- а) Дискомфорт при глотании.
 - б) Нарушение прохождения пищи.
 - в) Першение в горле.
 - г) Все перечисленное верно
- 291 Сроки наблюдения за онкологическим больным на втором году после лечения:
- а) 1 раз в 6 месяцев.
 - б) 1 раз в год.
 - в) 3 раза в год.
 - г) 2 раза в год
- 292 Иерархия ценностей в паллиативной медицине начинается с интересов:
- а) Пациентов.
 - б) Учреждения.
 - в) Родственников больного.
 - г) Медицинского работника
- 293 Длительная и интенсивная инсоляция может привести к возникновению:
- а) Рака кожи.
 - б) Рака легкого.
 - в) Рака желудка.
 - г) Рака пищевода
- 294 Курение оказывает влияние на частоту возникновения:
- а) Рака легкого, яичников, мочевого пузыря.
 - б) Рака легкого, гортани, мочевого пузыря.
 - в) Рака легкого, почки, щитовидной железы.
 - г) Рака легкого, желудка, толстой кишки
- 295 Осложнения внутримышечных инъекций:
- а) воздушная эмболия
 - б) гематома
 - в) жировая эмболия
 - г) инфильтрат
 - д) тромбофлебит
 - е) флебит
 - ж) флегмона
- 296 Врожденная опухоль, состоящая из отдельных органов или их частей называется:
- а) хондрома
 - б) тератома
 - в) фиброма
 - г) саркома
 - д) ангиома

297 Синдром малых признаков:

- а) Слабость, утомляемость, повышение температуры тела, похудание, плохой аппетит, анемия, повышенное СОЭ.
- б) Плохой аппетит, повышение температуры тела, сыпь на коже.
- в) Плохой сон, боли в области живота, увеличение массы тела.
- г) Зуд кожи, пожелтение склер, повышение билирубина

298 Наиболее часто связывают возникновение рака шейки матки с вирусом группы:

- а) Герпеса и вируса папилломы.
- б) Аденовируса.
- в) Вируса гепатита.
- г) Вирус гриппа

299 Показания для срочной операции при доброкачественных новообразованиях:

- а) быстрый рост
- б) большие размеры
- в) локализация в местах, подверженных частому механическому воздействию
- г) локализация на лице
- д) появление осложнений

300 Возникновению опухолей способствует:

- а) Снижение показателей клеточного иммунитета.
- б) Состояние иммунитета не влияет на возникновение опухолей.
- в) Влияние иммунитета на возникновение опухолей спорно.
- г) Снижение аппетита