

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

**(для медицинских сестёр наркологических отделений и кабинетов, прошедших
обучение по циклам "Сестринское дело в наркологии",
профессиональной переподготовки по специальности
«Сестринское дело»)**

- 1 О психопатоподобных изменениях личности наркомана свидетельствуют:
 - а) колебания эмоционального фона и снижение интеллекта;
 - б) раздражительность, возбудимость, неспособность критически оценивать свои действия и сужения круга интересов;
 - в) неспособность критически оценивать свои действия и снижение интеллекта;
 - г) снижение интеллекта, сужение круга интересов;
- 2 Летучие органические соединения (средства бытовой и промышленной химии) имеют ряд общих качеств, к которым относятся:
 1. хорошая растворяемость в жирах;
 2. высокая токсичность;
 3. быстрая испаряемость;
 4. высокая наркогенность;
 5. преимущественное поражение ЦНС, сердца, печени и почек при злоупотреблении ими.
 - а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 3 Объектом профилактики в наркологии являются:
 1. больные люди, страдающие зависимостью от ПАВ;
 2. подростки из неблагополучных семей;
 3. подростки, замеченные в употреблении ПАВ;
 4. все контингенты населения;
 5. школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ.
 - а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3,5
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4
- 4 Антидепрессанты обладают следующими эффектами действия:
 1. антипсихотическим;
 2. седативным;
 3. миорелаксирующим;
 4. противосудорожным;
 5. транквилизирующим.
 - а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

5 Оглушение относится к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия
- в) интеллекта
- г) сознания

6 К критериям синдрома зависимости по МКБ-10 относятся:

- 1. сильное желание или чувство насильственной тяги к приёму вещества;
 - 2. физиологическое состояние отмены, при котором приём вещества прекращается или уменьшается, о чём свидетельствует характерный для вещества синдром отмены;
 - 3. нарушение способности контролировать приём вещества, т.е. начало употребления, окончание или дозировку употребляемых веществ;
 - 4. формирующаяся соматическая патология;
 - 5. социальная дезадаптация.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4

7 Токсикомании, формирующиеся вследствие злоупотребления лекарственными

препаратами, чаще всего возникают из-за:

- а) нерационального, неправильного лечения;
- б) частого приема бензодиазепинов при бессоннице или других расстройствах;
- в) частого приема медикаментов при различных неблагоприятных жизненных ситуациях;
- г) лечения барбитуратами

8 Клиника дисфорического варианта измененного простого алкогольного (острой

алкогольной интоксикации) опьянения характеризуется:

- 1. состоянием напряженности, сопровождаемой недовольством, угрюмостью в сочетании с неприязнью и злобой;
 - 2. преобладанием подавленного настроения
 - 3. придиличностью с агрессивностью;
 - 4. появлением суицидальных мыслей, сопровождаемых суицидальными действиями;
 - 5. моторной заторможенностью.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

9 Наркотики – это препараты:

- а) вызывающие психическую зависимость при длительном употреблении
- б) обладающие снотворным действием
- в) обладающие седативным действием
- г) обладающие жаропонижающим действием

10 Полизависимость формируется при употреблении нескольких ПАВ, которые:

1. по типу действия на ЦНС обладают одинаковыми эффектами у больных;
 2. при комбинированном приеме способны усиливать действие друг друга;
 3. обладают разной продолжительностью действия;
 4. оказывают разнонаправленные эффекты;
 5. обладают одинаковой продолжительностью действия.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

11 Объектом профилактики в наркологии являются:

1. больные люди, страдающие зависимостью от ПАВ;
 2. подростки из неблагополучных семей;
 3. подростки, замеченные в употреблении ПАВ;
 4. все контингенты населения;
 5. школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3,5
в) верно 2,4
г) верно 4

12 По отношению к алкоголю население делится на:

- а) устойчивых к алкоголизму
б) злоупотребляющих и больных алкоголизмом
в) «любителей» спиртных напитков
г) выздоровевших от алкоголизма

13 О распространности пьянства и алкоголизма наиболее объективно

свидетельствует следующий показатель:

- а) рождаемость
б) смертность
в) количество абсолютного алкоголя, потребляемого на душу населения в год
г) количество состоящих на учете больных алкоголизмом

14 Синдром физической зависимости от наркотика включает:

1. компульсивное влечение;
 2. состояние отмены;
 3. способность достижения физического комфорта в интоксикации;
 4. общую депрессированность;
 5. несобранность больного.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

- 15 Состояние отмены при бензодиазепиновой токсикомании проявляется:
1. тревогой, неусидчивостью, подавленностью и злобой;
 2. фибриллярными подергиваниями лицевой мускулатуры и мышц конечностей;
 3. тахикардией и ортостатической гипотензией;
 4. горизонтальным нистагмом и мелкоразмашистым трепором;
 5. бессонницей, головными болями, тошнотой, отсутствием аппетита.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 16 Амбулаторные автоматизмы относятся к расстройствам:
- а) мышления
б) восприятия
в) сознания
г) интеллекта
- 17 Карbamазепин в наркологической практике применяют для:
1. коррекции аффективных нарушений;
 2. снижения интенсивности патологического влечения;
 3. лечение судорожных расстройств;
 4. профилактики судорожных расстройств;
 5. коррекции психопатоподобных нарушений.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 18 Характерными особенностями псевдозапоев у больных алкоголизмом являются;
1. видимая связь алкогольного эксцесса с внешними факторами (начало и окончание псевдозапоя)
 2. длительность периода ежедневного злоупотребления алкоголя от 3-4 дней до двух недель;
 3. сохранение высокой толерантности в течение всего периода злоупотребления;
 4. отчетливое изменение у больных как психического, так и физического состояния за несколько дней до начала эксцесса;
 5. спонтанность начала алкогольного эксцесса.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 19 К нарушениям памяти относятся:
- а) ментизм, шперрунг, обстоятельность
б) кратковременная и долговременная память
в) резонерство, разорванность мышления
г) амнезия, конфабуляции, псевдореминисценции

20 Изменения личности у больных алкоголизмом обусловлены:

1. токсическим действием алкоголя и его метаболитов;
 2. длительностью заболевания;
 3. психореактивными факторами;
 4. преморбидными характерологическими особенностями;
 5. сопутствующей соматической патологией.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

21 Чаще всего зависимость от ПАВ формируется у лиц:

1. с дефектами воспитания;
 2. с личностными девиациями;
 3. с нарушениями социальной адаптации;
 4. с невысоким уровнем профессиональной ориентации;
 5. с невысоким интеллектом.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

22 При прекращении приема наркотиков у больных развивается:

- а) синдром «рикошета»
б) абстинентный синдром
в) психоз
г) судорожный припадок

23 Объем однократно вводимой жидкости при зондовом промывании желудка

взрослому пациенту составляет:

- а) 300 мл
б) 500 мл
в) 900 мл
г) 1000 мл

24 Среди социальных факторов, влияющих на формирование алкоголизма, наиболее значимыми являются:

1. алкогольная политика государства;
 2. социальное положение индивидуума и его экономическая обеспеченность;
 3. устойчивые обычай ближайшего окружения;
 4. семейное положение
 5. расовая и этническая принадлежность.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

- 25 Актуализация ситуационно обусловленного первичного патологического влечения к алкоголю в значительной степени проявляется:
1. стойкими навязчивыми мыслями об алкоголе;
 2. повышенной двигательной активностью и суетливостью при появлении алкогольных раздражителей, или ситуаций связанных с алкоголем
 3. беспричинной раздражительностью;
 4. чрезмерным стремлением к контактам с окружающими;
 5. появлением сновидений с алкогольной тематикой.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 26 Деградация личности при наркомании развивается:
- а) при приеме наркотиков
 - б) в развернутой стадии
 - в) в стадии истощения
 - г) при абstinенции
- 27 Нарушения мышления по форме:
- а) депрессия
 - б) резонерство
 - в) деменция
 - г) дурашлисть
- 28 Сенестопатии это:
- а) локализованные неприятные, тягостные ощущения;
 - б) необычные, часто алгические, ощущения с меняющейся локализацией;
 - в) тягостные болевые ощущения в утраченной конечности;
 - г) тягостные ощущения ползания насекомых, червей и т.п. под кожей, внутри тела.
- 29 Объектом профилактики в наркологии являются:
1. больные люди, страдающие зависимостью от ПАВ;
 2. подростки из неблагополучных семей;
 3. подростки, замеченные в употреблении ПАВ;
 4. все контингенты населения;
 5. школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3,5
в) верно 2,4
г) верно 4
- 30 Иллюзии относятся к расстройствам:
- а) мышления
 - б) восприятия
 - в) интеллекта
 - г) влечений
- 31 Принудительное лечение – это:
- а) насилиственное лечение и кормление пациента
 - б) лечение пациента, совершившего общественно опасное деяние, признанного судом невменяемым, назначившего ему принудительные меры медицинского характера
 - в) фиксация пациента, чтобы он не причинил вреда себе и окружающим
 - г) изменение лечения пациенту, нарушившему режим в отделении

32 При передозировке кокаина смерть наступает от:

1. эпистатуса (серии судорожных припадков);
2. остановки сердца вследствие аритмии;
3. остановки дыхания;
4. некронефроза;
5. печеночной комы.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно все перечисленное

33 К специфическим наркоманическим синдромам относятся синдромы:

1. изменённой реактивности;
2. психической зависимости;
3. физической зависимости;
4. последствий злоупотребления ПАВ;
5. неустойчивого равновесия.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно 4

34 Для вынесения заключения о факте употребления наркотического вещества при проведении экспертизы обязательным является:

- а) заявление испытуемого об употреблении наркотика
- б) обнаружение наркотического вещества в биологических средах организма
- в) обнаружение в вещах (одежде) наркотического вещества
- г) выявление клиники опьянения (одурманивания) в сочетании с отрицательной химической реакцией на алкоголь

35 Укажите средства, относящиеся к наркотическим:

- а) гашиш
- б) акинетон
- в) фенозепам
- г) циклодол

36 Изменение картины опьянения у больных алкоголизмом обусловлено:

1. содержанием алкоголя в алкогольных напитках;
2. длительностью (тяжестью) заболевания;
3. технологией приготовления алкогольных напитков;
4. преморбидными характерологическими особенностями;
5. половыми различиями.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно все перечисленное

37 Объективными признаками наличия галлюцинаций являются:

- а) поведение больного, его внешний вид, высказывания
- б) склонность пациента к конфликтам
- в) дрожь в теле
- г) помрачение сознания

38 К наиболее выраженным психопатологическим эффектам острой интоксикации галлюциногенами относятся:

- а) нарушения зрительного восприятия;
- б) парестезии;
- в) деперсонализационные и дереализационные расстройства;
- г) стойкие вербальные галлюцинации;

39 Антидотом при отравлении наркотиками является:

- а) атропин
- б) налоксон
- в) прозерин
- г) унитиол

40 Метадон является:

- а) нейролепиком
- б) психостимулятором
- в) галлюциногеном
- г) опийным производным

41 Клоническая фаза развернутого эпилептического припадка продолжается:

- а) 10 – 15 секунд
- б) 1 – 3 минуты
- в) 3 – 5 минут
- г) 5 – 10 минут

42 Для симптома снижения толерантности у больных алкоголизмом характерно:

1. появление признаков опьянения при употреблении привычных доз алкоголя;
 2. переход на напитки с более низким содержанием алкоголя;
 3. снижения разовой дозы алкоголя при сохранении суточной;
 4. появление на этапе 2-3 ст. заболевания;
 5. появление в картинах опьянения тотальных амнезий.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

43 В предмет наркологии входит:

- а) изучение проявлений, этиологии и патогенеза наркологических заболеваний, исследование медицинских, психологических, социальных и правовых аспектов этих заболеваний
- б) изучение технологии получения наркотиков
- в) изучение этиологии и патогенеза гепатитов В и С
- г) исследование распространения ВИЧ-инфекции

44 Основные правила по применению методов физического стеснения пациента в наркологическом стационаре:

- а) фиксировать с помощью медперсонала
- б) фиксировать на время не более 6 часов
- в) получить письменное разрешение врача на фиксацию с указанием времени фиксации
- г) сообщить дежурному врачу о необходимости фиксации в течение часа

45 В группу риска входят:

1. подростки, замеченные в употреблении алкоголя или других ПАВ;
 2. подростки, ведущие асоциальный образ жизни;
 3. подростки из неблагополучных семей;
 4. подростки и взрослые, страдающие алкоголизмом;
 5. подростки с пограничной умственной отсталостью.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

46 Наркоманию вызывает злоупотребление:

- а) препаратами опия, конопли
б) элениумом
в) налоксоном
г) феназепамом

47 Сенестопатии это:

- а) локализованные неприятные, тягостные ощущения;
б) необычные, часто алгические, ощущения с меняющейся локализацией;
в) тягостные болевые ощущения в утраченной конечности;
г) ягостные ощущения ползания насекомых, червей и т.п. под кожей, внутри тела

48 Недобровольная госпитализация в наркологический стационар – это:

- а) возражение пациента против госпитализации
б) госпитализация пациента без его согласия
в) госпитализация пациента старше 15 лет без согласия его родственников
г) госпитализация пациента бригадой скорой помощи

49 Тоническая фаза развернутого эпилептического припадка продолжается:

- а) 5 – 15 секунд
б) 1 – 3 минуты
в) 3 – 5 минут
г) 5 – 10 минут

50 Клиническая картина острого отравления опиатами характеризуется:

1. угнетением ЦНС от стадии засыпания до расстройства сознания в виде комы;
2. сужением зрачков (симптом «точки») со снижением или полным отсутствием реакции на свет;
3. угнетением дыхания до брадипноэ с частотой до 4-6 в минуту или полной его остановкой;
4. снижением сухожильных и периостальных рефлексов или арефлексией;
5. снижением или отсутствием реакции на болевое раздражение, корнеальных, кашлевых и глоточных рефлексов.

- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

51 Кардиомиопатия у больных алкоголизмом проявляется:

1. нарушением сердечного ритма;
 2. сниженной сократительной функцией миокарда;
 3. разнообразными болевыми ощущениями;
 4. нарушением проводимости;
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

52 При терапии алкогольных делириев с особой осторожностью следует назначать:

- а) поливитаминные растворы;
б) крово- и плазмозаменители;
в) транквилизаторы;
г) нейролептики;

53 Токсикомании, формирующиеся вследствие злоупотребления лекарственными препаратами, чаще всего возникают из-за:

- а) нерационального, неправильного лечения;
б) частого приема бензодиазепинов при бессоннице или других расстройствах;
в) частого приема медикаментов при различных неблагоприятных жизненных ситуациях;
г) лечения барбитуратами;

54 Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома I степени

тяжести:

- а) до суток
б) 2 – 5 суток
в) 6 – 7 суток
г) до 10 суток

55 Схема заместительной терапии состояния отмены при барбитуратовой наркомании фенобарбиталом не предусматривает:

- а) подбор дозы фенобарбитала из расчета 1/3 от суточной дозы барбитурата, которую принимал больной;
б) назначения высчитанной дозы в 4 приема ежедневно в течение первых 2-х дней;
в) уменьшение с 3-х суток лечения каждой следующей суточной дозы фенобарбитала на 10 %;
г) назначения высчитанной дозы фенобарбитала до момента купирования состояния отмены;

56 Путем биотрансформации из организма удаляется:

- а) 50% введенного алкоголя
б) 75% введенного алкоголя
в) 80 – 95% введенного алкоголя
г) 100% введенного алкоголя

57 Наркотики – это препараты:

- а) вызывающее абstinенцию при однократном приеме
б) входящие в список наркотических средств
в) обладающие снотворным действием
г) обладающие седативным действием

- 58 Наркомания - это хроническое заболевание:
- а) вызванное потреблением препаратов или средств, официально отнесенных к списку наркотических
 - б) характеризующееся развитием психофизической зависимости и медико-социальных последствий
 - в) вызывающее психические и соматические нарушения
 - г) вызывающее привыкание и требующее наблюдения и лечения у врача-нарколога
- 59 Сужение зрачков характерно для:
- а) опийной интоксикации
 - б) гашишной интоксикации
 - в) эфедроновой интоксикации
 - г) опийного абстинентного синдрома
- 60 Злоупотребление сильнодействующими препаратами называется:
- а) токсикоманией
 - б) вредной привычкой
 - в) наркотической зависимостью
 - г) алкоголизмом
- 61 Для эксплозивного варианта измененного простого алкогольного опьянения (острой алкогольной интоксикации) характерно:
1. слабо выраженная и кратковременная эйфория;
 2. вспышки резкого недовольства, раздражения или злобы, неоднократно повторяющиеся в состоянии опьянения;
 3. проявление конфликтности;
 4. состояние тревожно-тоскливого аффекта;
 5. проявление, демонстративности.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 62 Биотрансформация алкоголя происходит в:
- а) печени
 - б) почках
 - в) центральной нервной системе
 - г) желудке
- 63 Изменение картины опьянения у больных алкоголизмом обусловлено:
1. содержанием алкоголя в алкогольных напитках;
 2. длительностью (тяжестью) заболевания;
 3. технологией приготовления алкогольных напитков;
 4. преморбидными характерологическими особенностями;
 5. половыми различиями.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 64 Бредовые идеи относятся к расстройствам:
- а) мышления
 - б) восприятия
 - в) интеллекта
 - г) влечений

65 Сверхценные идеи относятся к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия
- в) интеллекта
- г) влечений

66 Для клиники токсикомании транквилизаторами бензодиазепинового ряда характерно:

- 1. сходство с клиникой барбитуровой наркомании;
- 2. более медленное формирование основных симптомокомплексов;
- 3. менее брутальное интеллектуально-мнестическое снижение;
- 4. значительная выраженность аффективных нарушений;
- 5. отсутствие судорожных припадков.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно все перечисленное

67 Для симптома «плато» толерантности у больных алкоголизмом характерно:

- 1. потребление стабильно установленной дозы алкоголя;
 - 2. появление состояний опьянения только при употреблении высоких доз алкоголя;
 - 3. переносимость максимальных доз алкоголя на протяжении определённого отрезка времени;
 - 4. появление на этапе перехода начальной стадии заболевания в среднюю;
 - 5. переход на употребление алкогольных напитков с более низким содержанием алкоголя.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

68 К последствиям хронической интоксикации ПАВ при любой форме зависимости относятся:

- 1. прогрессирующее падение активности, энергетического потенциала;
 - 2. угасание влечений, утрата потребностей как в биологическом, так и в социальном смысле;
 - 3. снижение сопротивляемости организма, прогрессирующее истощение;
 - 4. развитие миокардиопатий;
 - 5. угасание интеллекта.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

69 Медицинский работник к пациенту должен обращаться:

- а) по имени
- б) по имени и отчеству
- в) по фамилии
- г) «больной»

70 К признакам острой интоксикации опиатами относят:

1. миоз с отсутствием или крайне вялой реакцией зрачков на свет;
 2. брадипное и тахипное;
 3. зуд кожи лица;
 4. «меловую» бледность и сухость кожи;
 5. отсутствие нарушений координации движений и артикуляции.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

71 Гашизм – это:

- а) наркомания
б) табакокурение
в) психическое заболевание, возникающее у любого наркомана
г) курение кальяна

72 Судорожные припадки в абстинентном синдроме характерны для наркомании:

- а) барбитуровой
б) гашишной
в) эфедроновой
г) опийной

73 Сопор относится к расстройствам:

- а) сознания
б) восприятия
в) интеллекта
г) мышления

74 Трансы относятся к расстройствам:

- а) мышления
б) сознания
в) восприятия
г) интеллекта

75 Антероградная амнезия характеризуется:

1. утратой воспоминаний на период бессознательного состояния и период предшествовавший ему;
 2. правильное поведение в запамятованном периоде;
 3. распространение забвения на различные периоды жизни;
 4. утратой воспоминаний на период, непосредственно следовавший за выходом из бессознательного состояния;
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

76 Параноидная форма патологического опьянения характеризуется:

1. наличием аффекта страха, доходящего до ужаса;
 2. иллюзорно-бредовым восприятием окружающего;
 3. внешне целенаправленной деятельностью;
 4. наличием фантастических сценоподобных галлюцинаций;
 5. делириозным расстройством сознания.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

77 Комплайанс - это:

- а) метод психотерапии, позволяющий настроить пациента на активное сотрудничество с персоналом
б) осознанная готовность пациента к сотрудничеству с врачом, настрой следовать его рекомендациям
в) пассивное следование больничному режиму, отсутствие замечаний по приему лекарств
г) осознанная активность пациента, готовность к сотрудничеству с медицинским персоналом в отделении

78 Доврачебные мероприятия при ортостатическом коллапсе у пациента, получающего нейролептики:

- а) внутримышечное введение аминазина
б) уложить пациента с приподнятым ножным концом
в) отменить нейролептики
г) наложить жгут на нижние конечности

79 Нарушения мышления по содержанию:

- а) навязчивости
б) гипестезии
в) амнезия
г) эйфория

80 Сведения о больных, находящихся в наркологическом отделении, сообщаются по телефону:

- а) всем обращающимся
б) только родственникам
в) только сотрудникам правоохранительных органов
г) никому не сообщаются

81 Первая фаза абstinентного синдрома при опиоидной наркомании развивается после последнего приема наркотика через:

- а) сутки
б) 8 – 12 часов
в) 48 – 72 часа
г) 5 суток

82 Дипсомания – это:

- а) запой
б) депрессивно – тревожный фон настроения
в) расстройства функции желудочно-кишечного тракта
г) агрессивность

83 Население по отношению и употреблению наркотических средств делится на:

- а) не употребляющих
- б) «любителей» наркотических средств
- в) выздоровевших от наркомании
- г) резистентных к наркологическим средствам

84 О психопатоподобных изменениях личности наркомана свидетельствуют:

- а) колебания эмоционального фона и снижение интеллекта;
- б) раздражительность, возбудимость, неспособность критически оценивать свои действия и сужения круга интересов;
- в) неспособность критически оценивать свои действия и снижение интеллекта;
- г) снижение интеллекта, сужение круга интересов

85 Назовите стадии алкоголизма:

- а) пивная, винная, водочная
- б) зависимость психическая, физическая, алкогольная деградация
- в) галлюциноз, делирий и параноид
- г) похмелье, пропивание вещей, продажа квартиры

86 В отличие от взрослых, для подростков при становлении зависимости от ПАВ, характерно:

1. преобладание группового мотива употребления ПАВ;
 2. направленность влечения не на определённые ощущения, а на недифференцированное состояние оглушения («балдение»);
 3. предпочтение преимущественно веществ с галлюцинаторным эффектом;
 4. выбор дешёвых (а отсюда - тяжелодействующих) ПАВ;
 5. замедленное формирование влечения вследствие незрелости чувственной сферы.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

87 К профилактическим формам борьбы с пьянством и алкоголизмом относят:

- а) организацию системы вытрезвителей
- б) пропаганду контролируемого употребления алкоголя
- в) разъяснение вреда, наносимого человеку употреблением алкоголя
- г) запрещение продажи алкогольных напитков

88 Кардиомиопатия у больных алкоголизмом проявляется:

1. нарушением сердечного ритма;
 2. сниженной сократительной функцией миокарда;
 3. разнообразными болевыми ощущениями;
 4. нарушением проводимости;
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

89 Конфликтогены – это:

- а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту
- б) проявления конфликта
- в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности
- г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта

90 Клинические проявления алкогольного абstinентного синдрома:

- а) гипергидроз, трепор
- б) отвращение к алкоголю
- в) сонливость
- г) влечеие к опохмелению

91 К факторам, влияющим на развитие алкоголизма, относятся:

- а) социально – средовые и личностные
- б) экологические
- в) географические
- г) климатические

92 Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена:

- а) крепостью и качеством алкоголя;
- б) культурально-этническими факторами;
- в) поло-возрастным фактором;
- г) активностью фермента алкогольдегидрогеназы /АДГ/

93 Полизависимость формируется при употреблении нескольких ПАВ, которые:

- 1. по типу действия на ЦНС обладают одинаковыми эффектами у больных;
 - 2. при комбинированном приёме способны усиливать действие друг друга;
 - 3. обладают разной продолжительностью действия;
 - 4. оказывают разнонаправленные эффекты;
 - 5. обладают одинаковой продолжительностью действия.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4

94 По данным ВОЗ, наибольшее влияние на возникновение заболеваний населения оказывают:

- а) организация и качество медицинской помощи
- б) экологическая обстановка
- в) социально-экономические условия и образ жизни населения
- г) наследственность

95 При III степени тяжести алкогольного абstinентного синдрома преобладают расстройства:

- а) психические
- б) вегетативно – соматические
- в) неврологические
- г) сердечно – сосудистые

96 Проявление паранойяльного синдрома:

- а) амнезия
- б) ступор
- в) сутяжничество
- г) деменция

97 В группу риска входят:

1. подростки, замеченные в употреблении алкоголя или других ПАВ;
 2. подростки, ведущие асоциальный образ жизни;
 3. подростки из неблагополучных семей;
 4. подростки и взрослые, страдающие алкоголизмом;
 5. подростки с пограничной умственной отсталостью.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

98 Делирий относится к расстройствам:

- а) мышления
б) восприятия
в) интеллекта
г) сознания

99 Наиболее отличительной особенностью алкоголизма у женщин является:

- а) злокачественность течения;
б) раннее появление психотических форм;
в) низкая курабельность;
г) аффективная окрашенность клинической симптоматики;

100 К основным критериям, определяющим состояние острой алкогольной интоксикации (простое алкогольное опьянение), относят:

1. изменения в эмоциональной сфере;
 2. функциональные изменения моторики;
 3. изменение ассоциативного процесса и восприятия окружающего;
 4. наличие неврологических и вегетативных нарушений или изменений;
 5. характерный запах алкоголя изо рта.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

101 Уголовная ответственность не предусматривается за:

- а) хищение наркотических лекарственных средств;
б) незаконное изготовление, сбыт, хранение наркотических средств;
в) потребление ПАВ без врачебного предписания;
г) содержание притонов для потребления наркотиков, склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств.

102 Показателями оценки уровня сформированности компетенций являются:

- а) знания
б) умения
в) способы деятельности
г) знания, умения, способы деятельности

103 Стигма в области наркологии - это:

- а) один из симптомов психического расстройства
б) предубеждение по отношению к пациентам
в) состояние, связанное с полным отсутствием интереса к жизни
г) состояние, связанное с недовольством собственной внешностью

104 Согласно классификации Портнова, для начальной стадии алкоголизма характерно:

- а) навязчивое влечение к алкоголю
- б) снижение толерантности к алкоголю
- в) повышение толерантности к алкоголю
- г) абstinентный синдром

105 Фальсифицированное лекарственное средство – это:

- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.
- б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе.
- в) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.
- г) лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства.

106 Невменяемость – это:

- а) неспособность пациента по психическому состоянию контролировать свои действия и отвечать за них
- б) неспособность говорить и отвечать на вопросы
- в) высокая степень алкогольного опьянения
- г) выраженное слабоумие

107 Мусситирующий делирий характеризуется:

- 1. психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах постели;
 - 2. невнятным, бессвязным бормотанием;
 - 3. карфологическими нарушениями;
 - 4. возбуждением с совершением профессиональных действий;
 - 5. эпизодами кататонического возбуждения.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

108 Чаще всего зависимость от ПАВ формируется у лиц:

- 1. с дефектами воспитания;
 - 2. с личностными девиациями;
 - 3. с нарушениями социальной адаптации;
 - 4. с невысоким уровнем профессиональной ориентации;
 - 5. с невысоким интеллектом.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

109 К дезинтоксикационным средствам относятся:

1. гипохлорит натрия;
 2. гемодез;
 3. сернокислая магнезия;
 4. апоморфин;
 5. кордиамин.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

110 Для абстиненции при употреблении галлюциногенов характерны:

- а) зрительные галлюцинации
б) бредовые проявления
в) слабость, сонливость
г) подергивание мышц лица

111 К основным клиническими проявлениями алкогольного абстинентного синдрома относят:

1. влечеие к алкоголю с целью опохмеления;
 2. расстройства в сфере памяти
 3. аффективно-вегетативные проявления;
 4. судорожные состояния;
 5. психосенсорные расстройства.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

112 Основные признаки астенического синдрома:

- а) абулия, афазия, амнезия
б) бессонница, беспокойство, бродяжничество
в) утомляемость, раздражительность, бессонница
г) анорексия, негативизм, сонливость

113 Острая интоксикация амфетаминалами проявляется:

1. ощущением прилива анергии и усилением активности, переоценкой собственных возможностей;
 2. склонностью к стереотипным однообразным действиям и раздражительностью, тревогой;
 3. нарушениями сердечного ритма и дыхания, повышением АД;
 4. резким снижением аппетита;
 5. повышенной потливостью, гиперрефлексией, тремором, расширением зрачков.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

114 Кома относится к расстройствам:

- а) мышления
б) восприятия
в) интеллекта
г) сознания

115 В спектр психотропного действия нейролептиков входят эффекты:

1. седативный;
 2. снотворный;
 3. подавляющий влечение;
 4. противосудорожный;
 5. тимонормализующий.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

116 Сенестопатии это:

- а) локализованные неприятные, тягостные ощущения;
б) необычные, часто алгические, ощущения с меняющейся локализацией;
в) тягостные болевые ощущения в утраченной конечности;
г) ягостные ощущения ползания насекомых, червей и т.п. под кожей, внутри тела

117 Изменения личности у больных алкоголизмом проявляются:

1. заострением преморбидных характерологических особенностей;
 2. снижением «энергетического потенциала»;
 3. нивелировкой преморбидных характерологических особенностей
 4. грубыми расстройствами памяти;
 5. патологическим развитием личности.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

118 Алкогольная деградация включает в себя:

1. аффективные расстройства;
 2. психопатоподобные симптомы;
 3. этическое снижение;
 4. стойкое снижение памяти и интеллекта;
 5. утрату критического отношения к злоупотреблению алкоголем и самому к себе.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

119 Для синдрома отмены при амфетаминовой наркомании наиболее характерно:

- а) развитие острой депрессии с суицидальными тенденциями;
б) повышенная утомляемость, раздражительность;
в) сонливость при отсутствии сна;
г) стойкое отсутствие аппетита;

120 Проявление расстройства интеллекта:

- а) оглушение
б) амбигентентность
в) слабоумие
г) дисфория

- 121 Для средней степени острой алкогольной интоксикации характерно:
1. функциональные нарушение моторики;
 2. замедление и затруднение ассоциативного процесса;
 3. однообразность представлений и трудности в переключении внимания, дизартричность речи;
 4. непроизвольное мочеиспускание;
 5. выраженные соматические расстройства.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 122 Для патологического опьянения характерно:
1. внезапность, острота и транзиторность психотического эпизода;
 2. импульсивность и целенаправленность характера разрушительных действий;
 3. сумеречное расстройство сознания;
 4. нетипичность развития повторных аналогичных состояний;
 5. кризисное разрешение глубоким сном с последующей амнезией и астенией.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 123 Определение реабилитационного потенциала необходимо для:
- а) реализации способностей пациента
б) борьбы с осложнениями
в) составления плана лечения
г) составления плана сестринского ухода
- 124 При отказе пациента от процедуры медицинская сестра давать разъяснения пациенту:
- а) обязана в пределах своей компетенции
б) не имеет права ни при каких условиях
в) имеет право с разрешения врача
г) не обязана
- 125 К основным клиническим признакам алкогольного параноида относятся:
- а) повышенное настроение
б) страх, тревога, бред преследования
в) галлюцинации
г) судорожные припадки
- 126 Предварительный этап лечения больных с зависимостью от ПАВ включает:
1. проведение дезинтоксикационной терапии;
 2. купирование состояния отмены;
 3. коррекцию поведения больного;
 4. восстановление нарушенных соматических и психических функций;
 5. выявление основного симптомокомплекса психической зависимости и определение причин предшествующих рецидивов.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

- 127 Уголовная ответственность не предусматривается за:
- а) хищение наркотических лекарственных средств;
 - б) незаконное изготовление, сбыт, хранение наркотических средств;
 - в) потребление ПАВ без врачебного предписания;
 - г) содержание притонов для потребления наркотиков, склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств.
- 128 К основным признакам алкогольного галлюциноза относится:
- а) помрачение сознания
 - б) полная амнезия
 - в) преобладание вербальных псевдогаллюцинаций
 - г) преобладание истинных вербальных галлюцинаций
- 129 Изменение картины опьянения у больных алкоголизмом обусловлено:
- 1. содержанием алкоголя в алкогольных напитках;
 - 2. длительностью (тяжестью) заболевания;
 - 3. технологией приготовления алкогольных напитков;
 - 4. преморбидными характерологическими особенностями;
 - 5. половыми различиями.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 130 Для подросткового возраста наиболее характерны:
- а) тяга к знаниям
 - б) реакция эманципации
 - в) реакция группирования со сверстниками
 - г) стремление к одиночеству
- 131 Пациенты с суицидальными намерениями и мыслями нуждаются в:
- а) строгом наблюдении
 - б) общем наблюдении
 - в) амбулаторном лечении
 - г) диспансерном наблюдении
- 132 Психосоциальная реабилитация пациентов подразумевает восстановление или формирование недостаточных или утраченных в результате болезни:
- а) когнитивных функций
 - б) постоянства внутренней среды организма
 - в) психического здоровья
 - г) физического здоровья
- 133 Фальсифицированное лекарственное средство – это:
- а) лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.
 - б) лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе.
 - в) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.
 - г) лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства.

134 Этические нормы медицинского работника определяются:

- а) умениями и навыками
- б) законами и приказами
- в) этническими особенностями региона
- г) моральной ответственностью

135 Галлюцинации – это:

- а) яркие фантастические сновидения
- б) крайне неприятные ощущения жжения, стягивания
- в) ложное восприятие несуществующего объекта
- г) световые вспышки при проведении электроэнцефалографии

136 Медицинский компонент наркомании означает:

- а) воздействие на центральную нервную систему
- б) использование наркотиков в немедицинских целях
- в) рост заболеваемости
- г) использование наркотиков в медицинских целях

137 К основным клиническим проявлениям алкоголизма относятся:

1. патологическое влечение к алкоголю;
 2. синдром отмены (AAC);
 3. синдром измененной реактивности;
 4. аффективный синдром;
 5. психоорганический синдром.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4

138 Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена:

- а) крепостью и качеством алкоголя
- б) активностью фермента алкогольдегидрогеназы
- в) культурально – этическими особенностями
- г) поло-возрастными особенностями

139 Для алкогольной комы характерно:

1. нарушение сознания;
 2. понижение температуры тела и появление цианоза;
 3. резкое снижение мышечного тонуса;
 4. повышение тонуса сердечно-сосудистой системы;
 5. двигательное возбуждение.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

- 140 Ретроградная амнезия характеризуется:
1. фрагментарной утратой памяти;
 2. выпадением из памяти событий периода, следовавшего непосредственно после выхода из бессознательного состояния;
 3. отсутствием памяти на текущие события;
 4. выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию;
 5. потеря способности запоминать.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4,5
г) верно 4
- 141 Первая степень тяжести алкогольного абстинентного синдрома характеризуется преобладанием расстройств:
- а) вегетативно – астенических
 - б) психических
 - в) неврологических
 - г) сердечно – сосудистых
- 142 К группе риска по развитию наркомании относятся:
- а) дети из семей пьющих родителей, сироты
 - б) мигранты
 - в) лица БОМЖ
 - г) любые дети
- 143 Токсикомания – это:
- а) вредная привычка
 - б) зависимость от наркотических препаратов
 - в) прием различных ядовитых веществ
 - г) злоупотребление средствами, не относящимися к наркотикам
- 144 Все отходы ЛПУ по степени опасности делят на:
- а) 2 класса
 - б) 3 класса
 - в) 4 класса
 - г) 5 классов
- 145 Для алкоголизма в подростковом возрасте свойственно:
1. недостаточная выраженность и незавершенность специфических симптомов, а иногда и отсутствие некоторых из них;
 2. высокая прогредиентность;
 3. трудность разграничения стадий алкоголизма и нечеткость стереотипа их развития;
 4. формирование алкогольной деградации с эйфорической установкой;
 5. высокий риск развития психотических форм алкоголизма.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

- 146 Токсикоманию вызывает злоупотребление:
- а) снотворными и транквилизаторами
 - б) алкоголем
 - в) слабоалкогольными напитками
 - г) «лёгкими» наркотиками
- 147 Верbalные и пантомимические стигмы (ужимки, жаргон, уплощенный юмор) в статусе больных могут свидетельствовать:
1. о наличии токсической энцефалопатии;
 2. о признаках снижения уровня личности;
 3. о неблагоприятном микросоциальном окружении;
 4. об отравлении марганцово-кислым калием;
 5. об олигофрении.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 148 Факторы риска развития наркомании:
- а) социальные
 - б) психологические
 - в) биологические
 - г) географические
- 149 К признакам острой интоксикации опиатами относят:
1. миоз с отсутствием или крайне вялой реакцией зрачков на свет;
 2. брадипно и тахипно;
 3. зуд кожи лица;
 4. «меловую» бледность и сухость кожи;
 5. отсутствие нарушений координации движений и артикуляции.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 150 Онейроид относится к расстройствам:
- а) мышления
 - б) восприятия
 - в) интеллекта
 - г) сознания
- 151 Предварительный этап лечения больных с зависимостью от ПАВ включает:
1. проведение дезинтоксикационной терапии;
 2. купирование состояния отмены;
 3. коррекцию поведения больного;
 4. восстановление нарушенных соматических и психических функций;
 5. выявление основного симптомокомплекса психической зависимости и определение причин предшествующих рецидивов.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

- 152 К группе риска по развитию наркомании относятся:
- а) дети, подростки из неполных семей
 - б) сироты
 - в) дети семей курящих родителей
 - г) подростки с нарушением психики, внимания, памяти
- 153 К основным симптомам Корсаковского психоза относятся:
- а) полиневриты, амнезия, конфабуляции
 - б) зрительные галлюцинации
 - в) депрессия
 - г) анорексия
- 154 Интеллектуально – мнестические расстройства при алкоголизме обычно возникают:
- а) в первой стадии заболевания
 - б) в переходной от первого ко второй стадии
 - в) во второй стадии
 - г) в третьей стадии
- 155 Для диагностики состояния острой интоксикации каннабиноидами значимыми являются следующие признаки:
1. расширение зрачков и инъецированность сосудов склер;
 2. хриплый, «лающий» голос,
 3. выраженная сухость видимых слизистых;
 4. резкие колебания эмоционального фона;
 5. готовность к индукции поведения.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 156 Уголовная ответственность не предусматривается за:
- а) хищение наркотических лекарственных средств;
 - б) незаконное изготовление, сбыт, хранение наркотических средств;
 - в) потребление ПАВ без врачебного предписания;
 - г) содержание притонов для потребления наркотиков, склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств.
- 157 Деменция относятся к расстройствам:
- а) мышления
 - б) восприятия
 - в) интеллекта
 - г) влечений
- 158 Состояние отмены при бензодиазепиновой токсикомании проявляется:
1. тревогой, неусидчивостью, подавленностью и злобой;
 2. фибриллярными подергиваниями лицевой мускулатуры и мышц конечностей;
 3. тахикардией и ортостатической гипотензией;
 4. горизонтальным нистагмом и мелкоразмашистым трепором;
 5. бессонницей, головными болями, тошнотой, отсутствием аппетита.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

159 Среди женщин, больных алкоголизмом, преобладают лица, занятые в:

- а) торговле, сфере услуг
- б) промышленности
- в) здравоохранении
- г) народном образовании

160 К расстройствам восприятия относятся:

- а) амнезия, абулия, афазия
- б) резонерство, навязчивость
- в) иллюзии, галлюцинации, сенестопатии
- г) амбивалентность, амбитентность

161 Ретроградная амнезия характеризуется:

1. фрагментарной утратой памяти;
 2. выпадением из памяти событий периода, следовавшего непосредственно после выхода из бессознательного состояния;
 3. отсутствием памяти на текущие события;
 4. выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию;
 5. потеря способности запоминать.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4,5
 - г) верно 4

162 Иллюзии – это:

- а) искаженное восприятие реально существующего предмета
- б) действия иллюзиониста
- в) голоса, носящие «приказной» императивный характер
- г) выдумки, вымыслы, не соответствующие действительности

163 В клинической структуре алкогольного абстинентного синдрома наиболее специфичным является:

- а) расстройство сна;
- б) аффективные проявления;
- в) вегетативные расстройства;
- г) вторичные формы влечения к алкоголю

164 Ретроградная амнезия характеризуется:

1. фрагментарной утратой памяти;
 2. выпадением из памяти событий периода, следовавшего непосредственно после выхода из бессознательного состояния;
 3. отсутствием памяти на текущие события;
 4. выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию;
 5. потеря способности запоминать.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4,5
 - г) верно 4

165 Промывание желудка при острых пероральных отравлениях показано:

- а) если прошло не больше двух часов после приема яда
- б) если прошло не более 10 часов после приема яда
- в) при бессознательном состоянии пациента
- г) при любых острых пероральных отравлениях

166 К последствиям хронической интоксикации ПАВ при любой форме зависимости относятся:

1. прогрессирующее падение активности, энергетического потенциала;
 2. угасание влечений, утрата потребностей как в биологическом, так и в социальном смысле;
 3. снижение сопротивляемости организма, прогрессирующее истощение;
 4. развитие миокардиопатий;
 5. угасание интеллекта.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

167 Для алкогольной комы характерно:

1. нарушение сознания;
 2. понижение температуры тела и появление цианоза;
 3. резкое снижение мышечного тонуса;
 4. повышение тонуса сердечно-сосудистой системы;
 5. двигательное возбуждение.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

168 Поддерживающая терапия больных алкоголизмом включает в себя:

- а) проведение длительной индивидуальной терапии, лечение соматических и неврологических нарушений
б) назначение антибиотиков
в) проведение «кодирования»
г) проведение сеансов гипноза

169 Наркотическая эйфория — это изменение в сторону максимально положительного для субъекта значения восприятий:

1. настроения;
 2. мышления;
 3. физического состояния;
 4. психического состояния;
 5. памяти.
- а) верно 1,3,4
б) верно 1,2,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

170 ЛСД относится к:

- а) психостимуляторам
б) производным конопли
в) галлюциногенам
г) опиатам

171 Тяжелая степень острой алкогольной интоксикации определяется:

1. мозжечковой атаксией;
 2. мышечной атонией, амимией;
 3. вестибулярными расстройствами: головокружением, тошнотой, рвотой;
 4. бледностью кожных покровов;
 5. снижением тонуса сердечно-сосудистой системы.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

172 Для клиники алкоголизма у лиц пожилого возраста характерно:

1. относительная невысокая интенсивность влечения к алкоголю;
 2. непродолжительные запои;
 3. преобладание соматических и неврологических расстройств в структуре AAC;
 4. усиление в опьянении эмоциональной лабильности;
 5. относительно невысокая толерантность.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

173 Для синдрома отмены при амфетаминовой наркомании наиболее характерно:

- а) развитие острой депрессии с суициальными тенденциями;
б) повышенная утомляемость, раздражительность;
в) сонливость при отсутствии сна;
г) стойкое отсутствие аппетита

174 К опийной группе наркотиков относится:

- а) морфин
б) гашиш
в) амфетамин
г) ЛСД

175 Для алкогольной энцефалопатии типа Корсаковского психоза характерно:

1. развитие после перенесенного состояния помрачения сознания;
 2. появление невропатии нижних конечностей;
 3. наличие расстройств памяти с преобладанием фиксационной амнезии;
 4. полное отсутствие осознания болезни;
 5. острое начало болезни.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

176 Исходя из сложившихся классификаций, к острым металкогольным психозам относят:

1. алкогольный делирий;
 2. алкогольный галлюциноз;
 3. бредовые психозы;
 4. алкогольную эпилепсию;
 5. дипсоманию.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

177 Абстинентный синдром при наркомании возникает вследствие:

- а) присутствия наркотика в организме
- б) прекращения поступления наркотика в организм
- в) выраженных соматоневрологических нарушений в организме
- г) отсутствия сна и аппетита

178 При малейших признаках наркотической интоксикации человека необходимо:

- а) вызвать бригаду скорой помощи
- б) направить в поликлинику для обследования
- в) направить к наркологу
- г) направить к кардиологу

179 Понятие "токсикомания" применяется как термин для определения болезни, вызванной злоупотреблением:

- а) веществом или лекарственным средством, способным вызывать зависимость, но не входящим в список наркотиков
- б) наркотическим средством
- в) суррогатами алкоголя
- г) алкоголем

180 Для истинных запоев у больных алкоголизмом характерно:

1. отсутствие продрома запоя (изменение физического и психического состояния перед началом запоя);
 2. спонтанное появление интенсивного патологического влечения к алкоголю;
 3. отсутствие каких-либо расстройств в физической и психической сферах больного в динамике запоя;
 4. декомпенсация физического и психического состояния в процессе запоя и, особенно в конце запоя;
 5. появление на этапе 2 ст. заболевания.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

181 Алкогольные амнезии у больных в I стадии алкоголизма:

- а) отсутствуют
- б) носят тотальный характер
- в) носят систематический характер
- г) встречаются крайне редко

182 Проявление судорожного синдрома:

- а) припадок
- б) дереализация
- в) амбивалентность
- г) сенестопатии

183 Состояние отмены при героиновой наркомании характеризуется:

- 1. лавинообразным нарастанием симптомов;
 - 2. алгическими и диспептическими расстройствами;
 - 3. профузным потом, «леденящим ознобом», слезотечением, светобоязнью;
 - 4. подавленным настроением с тревогой, неусидчивостью, приступами отчаяния;
 - 5. быстрой, практически, критической редукцией симптомов.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

184 Повышение толерантности к алкоголю проявляется:

- а) необходимостью принятия более высоких доз алкоголя для достижения состояния эйфории
- б) достижением состояния эйфории при приеме меньших, чем раньше, доз алкоголя
- в) более редким желанием употреблять алкоголь
- г) более частым желанием употреблять алкоголь

185 Для легкой степени алкогольного опьянения характерно:

- а) расстройство поведения
- б) расстройство сознания и ориентировки
- в) нарушение походки
- г) галлюцинации

186 Рекомендуемая длительность диспансерного наблюдения при наркомании:

- а) 1 год
- б) 3 года
- в) 5 лет
- г) пожизненно

187 Наркогенность ПАВ определяется:

- 1. скоростью формирования зависимости;
- 2. высотой толерантности;
- 3. степенью психической и социальной инвалидизации;
- 4. значением субъективного эффекта удовольствия от вещества;
- 5. видом вещества.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно все перечисленное

188 Индивидуальные особенности поведения человека – это:

- а) условия жизни
- б) качество жизни
- в) стиль жизни
- г) уровень жизни

189 Мусситирующий делирий характеризуется:

1. психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах постели;
 2. невнятным, бессвязным бормотанием;
 3. карфологическими нарушениями;
 4. возбуждением с совершением профессиональных действий;
 5. эпизодами кататонического возбуждения.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

190 В задачи наркологии входит:

- а) изучение этиологии и патогенеза различных психических расстройств
б) борьба с незаконным оборотом наркотиков
в) сравнительный анализ распространённости наркологических заболеваний, планирование и организация наркологической помощи населению
г) разработка новых наркотических препаратов

191 Культура речи – это, прежде всего:

- а) владение речевой культурой
б) соблюдение норм русского литературного языка
в) достижение целей коммуникации
г) соблюдение речевого этикета

192 Соотношение компрессий на грудину и искусственных вдохов при проведении реанимации

- а) 2:15
б) 3:6
в) 30:2
г) 1:5

193 Для эксплозивного варианта изменённого простого алкогольного опьянения (острой алкогольной интоксикации) характерно:

1. слабо выраженная и кратковременная эйфория;
 2. вспышки резкого недовольства, раздражения или злобы, неоднократно повторяющиеся в состоянии опьянения;
 3. проявление конфликтности;
 4. состояние тревожно-тоскливого аффекта;
 5. проявление демонстративности.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

194 Полинаркомания – это:

- а) одновременное злоупотребление несколькими наркотиками
б) повышение дозы наркотического вещества
в) алкоголизм
г) токсикомания

195 Объем воды, необходимой для эффективного промывания желудка взрослому человеку, составляет:

- а) 6 литров
- б) 8 литров
- в) 10 литров
- г) 20 литров

196 Морфинизм – это:

- а) хроническое отравление морфием
- б) привыкание нервной ткани к яду
- в) вид наркомании
- г) результат лечения бессонницы

197 Для симптома снижения толерантности у больных алкоголизмом характерно:

1. появление признаков опьянения при употреблении привычных доз алкоголя;
 2. переход на напитки с более низким содержанием алкоголя;
 3. снижения разовой дозы алкоголя при сохранении суточной;
 4. появление на этапе 2-3 ст. заболевания;
 5. появление в картинах опьянения тотальных амнезий.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

198 При выявлении признаков тяжелой наркотической интоксикации человека необходимо:

- а) госпитализировать в ближайшую ЛПО
- б) направить на обследование к психиатру
- в) провести дезинтоксикацию на месте
- г) провести искусственный массаж сердца

199 Формирование состояния отмены свидетельствует о становлении:

1. начальной стадии наркомании;
 2. средней стадии наркомании;
 3. конечной стадии наркомании;
 4. синдрома физической зависимости;
 5. синдрома измененной реактивности.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4

200 Для эксплозивного варианта изменённого простого алкогольного опьянения (острой алкогольной интоксикации) характерно:

1. слабо выраженная и кратковременная эйфория;
 2. вспышки резкого недовольства, раздражения или злобы, неоднократно повторяющиеся в состоянии опьянения;
 3. проявление конфликтности;
 4. состояние тревожно-тоскливого аффекта;
 5. проявление, демонстративности.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

- 201 Легкая степень острой алкогольной интоксикации характеризуется:
1. ощущением психического и физического комфорта;
 2. повышением речедвигательной активности;
 3. легким нарушением координации движений;
 4. замедлением ассоциативного процесса;
 5. появлением психосенсорных расстройств.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 202 Нарушения памяти у больных алкоголизмом III стадии болезни:
- а) необратимы
б) обратимы после купирования антиалкогольными средствами
в) обратимы при условии лечения и воздержания от алкоголя более 1 года
г) обратимы при приёме ноотропов
- 203 Для купирования состояния отмены (алкогольного абстинентного синдрома) обычно используются:
1. витаминные препараты;
 2. ноотропы;
 3. транквилизаторы;
 4. антибиотики;
 5. трихопол, фуразолидон.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4
- 204 Летучие органические соединения (средства бытовой и промышленной химии) имеют ряд общих качеств, к которым относятся:
1. хорошая растворяемость в жирах;
 2. высокая токсичность;
 3. быстрая испаряемость;
 4. высокая наркогенность;
 5. преимущественное поражение ЦНС, сердца, печени и почек при злоупотреблении ими.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 205 Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома II степени тяжести:
- а) до суток
б) 2 – 5 суток
в) 6 – 7 суток
г) до 10 суток
- 206 Острая опийная интоксикация обычно характеризуется:
- а) дисфорией
б) депрессией
в) эйфорией
г) галлюцинациями

- 207 Алкоголизм - это хроническое заболевание, характеризующееся:
- а) наличием бреда
 - б) развитием патологического влечения к спиртным напиткам, формированием абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя
 - в) развитием галлюцинаций
 - г) спастическим параличом конечностей
- 208 Наркология - это самостоятельная отрасль медицины, объединяющая следующие нозологические формы болезней:
- а) алкоголизм, наркомания, токсикомания
 - б) склонность к злоупотреблению алкоголем
 - в) сердечно – сосудистая патология
 - г) психические расстройства
- 209 Профессиональная компетентность – это:
- а) степень развития личности
 - б) степень обученности
 - в) совокупность профессиональных и личностных качеств
 - г) вид профессиональной деятельности
- 210 Пустые ампулы из-под наркотиков уничтожаются:
- а) старшей медсестрой
 - б) специальной комиссией
 - в) главной медицинской сестрой
 - г) заведующим отделением
- 211 К хроническим формам алкогольной энцефалопатии относятся:
- а) бессонница, раздражительность, депрессия
 - б) корсаковский психоз, энцефалопатия Гайе-Верника
 - в) алкогольная эпилепсия, полиневропатия, нейродермит
 - г) деменция, амнезия, афазия
- 212 Наркогенность ПАВ определяется:
1. скоростью формирования зависимости;
 2. высотой толерантности;
 3. степенью психической и социальной инвалидизации;
 4. значением субъективного эффекта удовольствия от вещества;
 5. видом вещества.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 213 Формирование состояния отмены свидетельствует о становлении:
1. начальной стадии наркомании;
 2. средней стадии наркомании;
 3. конечной стадии наркомании;
 4. синдрома физической зависимости;
 5. синдрома изменённой реактивности.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4

214 У больных алкоголизмом поведенческая компонента при актуализации патологического влечения к алкоголю проявляется:

1. затруднениями в профессиональной деятельности;
 2. дисфориями;
 3. неуступчивость и потребностью во всем противоречить окружающим;
 4. размышлениями о неизбежности употребления алкоголя;
 5. раздражительностью.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

215 Факторами риска развития зависимости от алкоголя у подростков являются:

1. тяжёлое материальное положение семьи;
 2. алкоголизм отца или матери;
 3. наличие соматической патологии;
 4. отсутствие эмоциональной привязанности и сплочённости между членами семьи, постоянная конфликтность взаимоотношений;
 5. определённая национальная принадлежность.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

216 Алкогольные амнезии у больных в третьей стадии алкоголизма:

- а) встречаются крайне редко
б) носят тотальный характер
в) носят систематический характер
г) отсутствуют

217 Для симптома снижения толерантности у больных алкоголизмом характерно:

1. появление признаков опьянения при употреблении привычных доз алкоголя;
 2. переход на напитки с более низким содержанием алкоголя;
 3. снижения разовой дозы алкоголя при сохранении суточной;
 4. появление на этапе 2-3 ст. заболевания;
 5. появление в картинах опьянения тотальных амнезий.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

218 Запись о введении наркотических средств необходимо сделать в:

- а) листе назначений
б) журнале учета наркотических средств
в) истории болезни
г) журнале учета наркотических средств и истории болезни

219 О психопатоподобных изменениях личности наркомана свидетельствуют:

- а) колебания эмоционального фона и снижение интеллекта;
б) раздражительность, возбудимость, неспособность критически оценивать свои действия и сужения круга интересов;
в) неспособность критически оценивать свои действия и снижение интеллекта;
г) снижение интеллекта, сужение круга интересов;

220 К биологическим особенностям женщин, влияющим на возникновение у них алкоголизма, относится:

- а) наследственность
- б) предменструальное напряжение
- в) ранняя психическая травматизация
- г) соматические заболевания

221 Для начальных проявлений алкоголизма (1ст. заболевания) характерно;

- 1. 2-3 кратный рост толерантности в сравнении с изначальной;
 - 2. нарушение сна;
 - 3. актуализация влечения к алкоголю в основном в «питейных» ситуациях;
 - 4. выраженные изменения состояний опьянения;
 - 5. появление так называемого «симптома критической дозы».
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

222 В отличие от взрослых, для подростков при становлении зависимости от ПАВ, характерно:

- 1. преобладание группового мотива употребления ПАВ;
 - 2. направленность влечения не на определенные ощущения, а на недифференцированное состояние оглушения («балдение»);
 - 3. предпочтение преимущественно веществ с галлюцинаторным эффектом;
 - 4. выбор дешевых (а отсюда - тяжелодействующих) ПАВ;
 - 5. замедленное формирование влечения вследствие незрелости чувственной сферы.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

223 Клиническая картина развёрнутого делирия характеризуется:

- 1. наплывом парейдоловий, сценоподобных зрительных галлюцинаций;
 - 2. двигательным беспокойством;
 - 3. помрачением сознания;
 - 4. кататоническими нарушениями;
 - 5. массивными псевдогаллюцинациями.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4

224 Принудительное лечение это:

- а) насильственное лечение и кормление больного
- б) лечение, назначенное по приговору суда, в соответствии с существующим законодательством
- в) фиксация больного в период психомоторного возбуждения
- г) лечение больного по заявлению родственников

- 225 Синдром последствий при наркомании у подростков:
1. появляется быстро;
 2. опережает развитие собственно наркологической симптоматики;
 3. проявляется остановкой в психическом развитии уже на этапе систематического потребления наркотика;
 4. характеризуется нарушением закономерности психического и социального созревания;
 5. выражается формированием психоорганического синдрома с очень быстрым исходом в слабоумие.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 226 Журнал наблюдения за больными в отделении заполняется медсестрой:
- а) один раз в сутки
 - б) два раза в сутки
 - в) три раза в сутки
 - г) один раз в неделю
- 227 Состояние отмены при героиновой наркомании характеризуется:
1. лавинообразным нарастанием симптомов;
 2. алгическими и дисспектическими расстройствами;
 3. профузным потом, «леденящим ознобом», слезотечением, светобоязнью;
 4. подавленным настроением с тревогой, неусидчивостью, приступами отчаяния;
 5. быстрой, практически, критической редукцией симптомов.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 228 Реабилитация больных наркологического профиля осуществляется:
1. социальными работниками;
 2. психотерапевтами;
 3. психологами;
 4. врачами;
 5. специалистами по социальной работе.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 229 Для начальной стадии алкоголизма характерно:
- а) отсутствие тяги к алкоголю
 - б) обсессивное влечение к алкоголю
 - в) компульсивное влечение к алкоголю
 - г) абstinентный синдром

230 Острые интоксикационные психозы при злоупотреблении амфетаминами чаще протекают по типу:

1. острого параноида;
 2. острого галлюциноза;
 3. делирия;
 4. онейроиднаподобного состояния;
 5. аменции.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

231 Легкая степень острой алкогольной интоксикации характеризуется:

1. ощущением психического и физического комфорта;
 2. повышением речедвигательной активности;
 3. легким нарушением координации движений;
 4. замедлением ассоциативного процесса;
 5. появлением психосенсорных расстройств.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

232 Клиническими признаками наркоманий при употреблении препаратов стимулирующего ряда являются:

- а) приподнятое настроение
б) повышение работоспособности
в) болтливость
г) острые бредовые состояния

233 К основным клиническим проявлениям алкоголизма относятся:

1. патологическое влечение к алкоголю;
2. синдром отмены (AAC);
3. синдром изменённой реактивности;
4. аффективный синдром;
5. психоорганический синдром.

- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

234 Социальный компонент наркомании означает:

- а) использование наркотиков в немедицинских целях
б) социальные проблемы, связанные с приёмом наркотиков
в) рост преступности
г) улучшение экономического благосостояния

235 Алкогольные амнезии у больных во второй стадии алкоголизма:

- а) встречаются крайне редко
б) носят тотальный характер
в) носят систематический характер
г) отсутствуют

- 236 Медицинская психология – это:
- а) психопатология
 - б) отрасль клинической медицины, изучающая клиническое и душевное состояние пациента
 - в) отрасль психологической науки, изучающая психологические аспекты гигиены, профилактики, диагностики, лечения, экспертизы и реабилитации пациентов
 - г) отрасль медицины, изучающая душевное состояние пациентов при различных заболеваниях
- 237 К неотложным доврачебным мероприятиям при отравлении циклодолом относится:
- а) искусственная вентиляция легких
 - б) дезинтоксикация
 - в) промывание желудка
 - г) внутривенное введение 100 мл 40% глюкозы и витаминотерапия
- 238 Для алкоголизма в подростковом возрасте свойственно:
- 1. недостаточная выраженность и незавершенность специфических симптомов, а иногда и отсутствие некоторых из них;
 - 2. высокая прогредиентность;
 - 3. трудность разграничения стадий алкоголизма и нечеткость стереотипа их развития;
 - 4. формирование алкогольной деградации с эйфорической установкой;
 - 5. высокий риск развития психотических форм алкоголизма.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 239 Эпилептический статус – это:
- а) серия приступов, между которыми пациент не приходит в сознание
 - б) оформление документов на инвалидность больному эпилепсией
 - в) речедвигательная заторможенность больного эпилепсией
 - г) невозможность больному эпилепсией водить автомобиль
- 240 Эфедрон чаще всего употребляется:
- а) внутривенно
 - б) внутримышечно
 - в) перорально
 - г) путем курения
- 241 Для алкогольной комы характерно:
- 1. нарушение сознания;
 - 2. понижение температуры тела и появление цианоза;
 - 3. резкое снижение мышечного тонуса;
 - 4. повышение тонуса сердечно-сосудистой системы;
 - 5. двигательное возбуждение.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

- 242 Индивидуальные особенности поведения человека – это:
- а) условия жизни
 - б) качество жизни
 - в) стиль жизни
 - г) уровень жизни
- 243 Ранним называется алкоголизм, формирующийся в период:
- а) до 18 лет
 - б) до 25 лет
 - в) до 30 лет
 - г) внутриутробного развития плод
- 244 Обсессивное влечение к алкоголю отражает:
- а) психическую зависимость от алкоголя
 - б) физическую зависимость от алкоголя
 - в) генетическую предрасположенность к алкоголю
 - г) социально обусловленное желание
- 245 По медицинским показаниям наркотики назначают:
- а) онкологическим пациентам
 - б) терапевтическим пациентам
 - в) стоматологическим пациентам
 - г) наркологическим пациентам
- 246 Для алкогольной энцефалопатии типа Корсаковского психоза характерно:
1. развитие после перенесённого состояния помрачения сознания;
 2. появление невропатии нижних конечностей;
 3. наличие расстройств памяти с преобладанием фиксационной амнезии;
 4. полное отсутствие осознания болезни;
 5. острое начало болезни.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4
- 247 Соматические расстройства у наркоманов возникают:
- а) в начальной стадии
 - б) в стадии истощения
 - в) постоянно
 - г) в развернутой стадии
- 248 К основным клиническим проявлениям алкогольного абстинентного синдрома относят:
1. влечение к алкоголю с целью опохмеления;
 2. расстройства в сфере памяти
 3. аффективно-вегетативные проявления;
 4. судорожные состояния;
 5. психосенсорные расстройства.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4

249 Для острого алкогольного гепатита характерно:

1. состояние общей интоксикации;
2. диспептические расстройства;
3. увеличение печени;
4. гиперхолестеринемия;
5. паренхиматозная желтуха.

- а) верно 1,2,3
- б) верно 1,3
- в) верно 2,4
- г) верно все перечисленное

250 Самой частой причиной дыхательных расстройств при отравлении снотворными является:

- а) бронхоспазм
- б) аспирация рвотных масс
- в) угнетение дыхательного центра
- г) бронхорея

251 Наркоманы, отказывающиеся от лечения:

- а) подвергаются уголовной ответственности
- б) к ответственности не привлекаются
- в) подвергаются принудительному лечению
- г) привлекаются к поддерживающей терапии транквилизаторами

252 Чаще всего острые токсические энцефалопатии развиваются при передозировке:

1. циклодола;
 2. летучих органических соединений;
 3. гашиша;
 4. эфедрона;
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4
 - д) верно все перечисленное

253 Олигофрения относятся к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия
- в) интеллекта
- г) влечений

254 Все листы журнала учета наркотических препаратов должны быть:

- а) пронумерованы, прошнурованы, опломбированы и заверены подписью руководителя учреждения
- б) заверены подписью руководителя учреждения или его заместителя
- в) заверены подписью главной медсестры
- г) просто пронумерованы

255 Наркоман – это:

- а) больной человек, принимающий наркотические средства
- б) больной человек, имеющий зависимость от употребления наркотиков
- в) здоровый человек, употребляющий наркотические вещества
- г) больной человек, страдающий онкологическим заболеванием

256 Рекомендуемая длительность диспансерного наблюдения при алкоголизме:

- а) 1 год
- б) 3 года
- в) 5 лет
- г) пожизненно

257 Согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» эпидемиологически безопасными отходами являются медицинские отходы:

- а) класса А,
- б) класса Б,
- в) класса В,
- г) класса Г,
- д) класса Д

258 Абстиненция при наркомании – это:

- а) отсутствие наркотика в организме
- б) иллюзорное восприятие окружающего мира
- в) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления наркотика в организм

259 Для первой стадии делирия характерно:

1. наплывы ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях;
 2. развитие псевдогаллюцинаторных расстройств;
 3. расстройства сна, яркие сновидения;
 4. помрачение сознания;
 5. деперсонализация.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно 4

260 Соматоневрологическая патология у больных алкоголизмом обусловлена:

1. преморбидными морфофункциональными особенностями органов и систем индивидуума;
 2. токсическим действием этанола;
 3. токсическим действием ацетальдегида;
 4. длительностью заболевания;
 5. злоупотреблением суррогатами алкоголя.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное

261 Маниакальное состояние включает:

- а) моторную расторможенность
- б) резонерство
- в) сниженный фон настроения
- г) замедление темпа мышления

262 Для первой стадии делирия характерно:

1. наплывы ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях;
 2. развитие псевдогаллюцинаторных расстройств;
 3. расстройства сна, яркие сновидения;
 4. помрачение сознания;
 5. деперсонализация.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

263 Абстинентный синдром – это:

- а) физическая зависимость от психоактивного вещества
- б) психическая зависимость от психоактивного вещества
- в) психическое заболевание
- г) изменение резистентности организма

264 Мотивами потребления наркотиков чаще всего являются:

1. удовлетворение любопытства, желание испытать новые ощущения;
 2. желание отвлечься от будничных трудностей;
 3. гедонистические установки;
 4. необходимость признания «своим» в группе;
 5. желание повысить настроение.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

265 Иллюзии, выражающиеся в восприятии действительно существующих образов изменено, обычно в причудливо – фантастическом виде, называются:

- а) аффективными
б) парэйдемическими
в) вербальными
г) иллюзиями невнимания

266 Узелки по ходу вен свидетельствуют:

- а) о наркотической зависимости
б) о болезненном состоянии
в) о варикозном расширении вен
г) об аллергическом заболевании

267 Лёгкая степень острой алкогольной интоксикации характеризуется:

1. ощущением психического и физического комфорта;
 2. повышением речедвигательной активности;
 3. лёгким нарушением координации движений;
 4. замедлением ассоциативного процесса;
 5. появлением психосенсорных расстройств.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

268 В группу риска входят:

1. подростки, замеченные в употреблении алкоголя или других ПАВ;
 2. подростки, ведущие асоциальный образ жизни;
 3. подростки из неблагополучных семей;
 4. подростки и взрослые, страдающие алкоголизмом;
 5. подростки с пограничной умственной отсталостью.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

269 К транквилизаторам относятся:

1. производные бензамида;
 2. производные бензодиазепина;
 3. производные ГАМК;
 4. производные пропандиола;
 5. ингибиторыmonoаминооксидазы.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

270 Кустарно изготовленный первитин относится к:

- а) опиатам
б) психостимуляторам
в) галлюциногенам
г) барбитуратам

271 Рецидив алкоголизма – это возобновление приёма алкоголя в период ремиссии с:

- а) продолжительностью более одного дня
б) выпивкой более 20 г в пересчёте на чистый алкоголь
в) обострением симптомов влечения к алкоголю
г) появлением признаков повышенной возбудимости

272 Максимальная толерантность к алкоголю развивается при алкоголизме:

- а) в первой стадии заболевания
б) во второй стадии заболевания
в) в третьей стадии заболевания
г) на любой стадии заболевания

273 Острая интоксикация амфетаминами проявляется:

1. ощущением прилива энергии и увеличением активности, переоценкой собственных возможностей;
 2. склонностью к стереотипным однообразным действиям и раздражительностью, тревогой;
 3. нарушениями сердечного ритма и дыхания, повышением АД;
 4. резким снижением аппетита;
 5. повышенной потливостью, гиперрефлексией, tremором, расширением зрачков.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

- 274 Алкогольная абstinенция – это:
- а) присутствие алкоголя в крови
 - б) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления алкоголя в организм
 - в) алкогольное поражение печени
 - г) алкогольная эпилепсия
- 275 В приемном отделении ЛПУ наркотические средства:
- а) сохраняются три дня
 - б) сохраняются пять дней
 - в) нужны для оказания экстренной медицинской помощи
 - г) не используются вообще
- 276 Изменения личности у больных алкоголизмом проявляются:
- 1. заострением преморбидных характерологических особенностей;
 - 2. снижением «энергетического потенциала»;
 - 3. нивелировкой преморбидных характерологических особенностей
 - 4. грубыми расстройствами памяти;
 - 5. патологическим развитием личности.
- а) верно 1,2,3
 - б) верно 1,3
 - в) верно 2,4
 - г) верно все перечисленное
- 277 Депрессия включает в себя:
- а) моторную заторможенность
 - б) повышенный фон настроения
 - в) навязчивости
 - г) ускорение темпа мышления
- 278 Кокаин относится к:
- а) сильнодействующим средствам
 - б) седативным препаратам
 - в) психостимуляторам
 - г) галлюциногенам
- 279 При терапии алкогольных делириев с особой осторожностью следует назначать:
- а) полиионные растворы;
 - б) крово- и плазмозаменители;
 - в) транквилизаторы;
 - г) нейролептики
- 280 Токсикомании, формирующиеся вследствие злоупотребления лекарственными препаратами, чаще всего возникают из-за:
- а) нерационального, неправильного лечения;
 - б) частого приёма бензодиазепинов при бессоннице или других расстройствах;
 - в) частого приёма медикаментов при различных неблагоприятных жизненных ситуациях;
 - г) лечения барбитуратами;
- 281 Тяжелая степень алкогольного опьянения определяется:
- а) мозжечковой атаксией, мышечной атонией, амимией, вестибулярными расстройствами
 - б) дисфорией
 - в) повышенным настроением с дурашливостью
 - г) высоким АД

282 Мусситирующий делирий характеризуется:

1. психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах постели;
 2. невнятным, бессвязным бормотанием;
 3. карфологическими нарушениями;
 4. возбуждением с совершением профессиональных действий;
 5. эпизодами кататонического возбуждения.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

283 При психомоторном возбуждении больному необходимо ввести:

- а) мажептил
б) аминазин
в) седуксен
г) модитец – депо

284 Толерантность к алкоголю в большей степени зависит:

1. от технологии изготовления алкогольной продукции.
 2. от частоты употребления алкоголя;
 - 3 от функционального состояния организма;
 4. от изначальной активности альдегидокисляющих ферментов;
 5. от возраста и пола индивидуума.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4

285 Неврологические расстройства у больных алкоголизмом проявляются;

1. патологическими рефлексами;
 2. полиневропатиями;
 3. нарушением вибрационной чувствительности;
 4. синдромом рассеянного энцефаломиелита;
 5. расширением желудочков мозга.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

286 Навязчивые идеи относятся к расстройствам:

- а) мышления
б) восприятия
в) интеллекта
г) влечений

- 287 Для клиники алкоголизма у лиц пожилого возраста характерно:
1. относительная невысокая интенсивность влечения к алкоголю;
 2. непродолжительные запои;
 3. преобладание соматических и неврологических расстройств в структуре ААС;
 4. усиление в опьянении эмоциональной лабильности;
 5. относительно невысокая толерантность.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 288 Наркогенность ПАВ определяется:
1. скоростью формирования зависимости;
 2. высотой толерантности;
 3. степенью психической и социальной инвалидизации;
 4. значением субъективного эффекта удовольствия от вещества;
 5. видом вещества.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 289 Первая помощь при передозировке опиатов заключается в:
- а) введении реланиума
 - б) введении налоксона
 - в) введении галоперидола
 - г) срочном вызове бригады скорой помощи
- 290 Среди социальных факторов, влияющих на формирование алкоголизма, наиболее значимыми являются:
1. алкогольная политика государства;
 2. социальное положение индивидуума и его экономическая обеспеченность;
 3. устойчивые обычаи ближайшего окружения;
 4. семейное положение
 5. расовая и этническая принадлежность.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное
- 291 Для третьей стадии алкоголизма характерны:
- а) снижение толерантности к алкоголю
 - б) повышение толерантности к алкоголю
 - в) увеличение сроков запоев
 - г) исчезновение толерантности
- 292 Снижение количественного контроля принятого алкоголя во второй стадии заболевания проявляется в:
- а) повышении толерантности к алкоголю
 - б) понижении толерантности к алкоголю
 - в) непреодолимом влечении к последующему приему алкоголя после употребления начальной (критической) дозы
 - г) развитии алкогольного делирия

293 Состояние отмены при барбитуровой наркомании характеризуется:

1. дисфорическим эффектом;
 2. гиперрефлексией с мышечной гипертензией и мелким трепором;
 3. подъемом АД с последующей гипотензией вплоть до коллапсов;
 4. бессонницей;
 5. болями в желудке и крупных суставах.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

294 К основным формам алкогольных психозов относятся:

- а) алкогольная горячка, алкогольное возбуждение, алкогольный озноб
б) алкогольный делирий, галлюциноз, параноид
в) спокойный, похмельный, смешанный
г) бред ревности, бред преследования, бред отрицания болезни

295 Галлюцинации относятся к расстройствам:

- а) мышления
б) восприятия
в) интеллекта
г) влечений

296 Характеристика термина "наркотическое средство" включает следующие критерии:

- а) психологический
б) политический
в) морально – этический
г) медицинский и юридический

297 Острые интоксикационные психозы при злоупотреблении амфетаминами чаще протекают по типу:

1. острого параноида;
 2. острого галлюциноза;
 3. делирия;
 4. онейроидноподобного состояния;
 5. аменции.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно все перечисленное

298 При паркинсонизме, возникшем в результате лечения психотропными препаратами, назначают:

- а) корректоры
б) нейролептики
в) антидепрессанты
г) седативные средства

299 В сомнительных случаях картины алкогольного опьянения следует:

- а) опираться на собственные признания испытуемого о приеме алкоголя
б) ориентироваться на запах алкоголя изо рта испытуемого
в) провести не менее двух проб на алкоголь
г) ориентироваться на утверждение очевидцев

300 Для первой стадии делирия характерно:

1. наплывы ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях;
 2. развитие псевдогаллюцинаторных расстройств;
 3. расстройства сна, яркие сновидения;
 4. помрачение сознания;
 5. деперсонализация.
- а) верно 1,2,3
б) верно 1,3
в) верно 2,4
г) верно 4