

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

**(для медицинских сестёр оториноларингологических отделений и кабинетов,
в т.ч. детских, прошедших обучение
по циклам «Сестринское дело в оториноларингологии»,
профессиональной переподготовки по специальности
«Сестринское дело»)**

- 1 Для обострения хронического гнойного среднего отита характерны признаки:
 - а) отсутствие гноетечения из уха
 - б) наличие стойкой перфорации барабанной перепонки
 - в) снижение слуха
 - г) усиление гноетечения из уха
 - д) появление шума в ушах
- 2 Признаки острого фронтита:
 - а) боль, локализующаяся в области лба
 - б) гнойные выделения из носа
 - в) болезненность при пальпации верхнечелюстных пазух
 - г) снижение пневматизации на R-грамме лобных пазух
 - д) слизистые выделения из носа
- 3 При развитии отогенного менингита общее состояние больного:
 - а) средней тяжести
 - б) очень тяжелое
 - в) удовлетворительное
 - г) не вызывает опасения
- 4 Какая из ангин сопровождается затруднением носового дыхания:
 - а) Ангина язычной миндалины
 - б) Гортанной ангина
 - в) Ангина носоглоточной миндалины
 - г) Фолликулярная ангина
- 5 Отосклероз — это:
 - а) аномалия развития уха
 - б) исход воспалительного заболевания уха
 - в) самостоятельное заболевание
 - г) внутричерепное осложнение
- 6 Группы антибиотиков с ототоксическим эффектом:
 - а) аминогликозиды
 - б) макролиды
 - в) пенициллины
 - г) цефалоспорины
- 7 Симптомы ангины:
 - а) боль при глотании с обеих сторон
 - б) высокая температура и озноб
 - в) налеты на миндалинах
 - г) невозможность глотать пищу
 - д) ларингоспазм

- 8 Решающим признаком болезни Меньера является наличие:
- а) приступов головокружения
 - б) приступов тошноты
 - в) приступов светобоязни
 - г) заложенности носа
- 9 Пищеводный голос -это:
- а) Симптом нарушения голоса
 - б) Навык человека, перенёсшего удаление гортани
 - в) Вредная привычка
 - г) Искусственная голосообразование
- 10 К каким осложнениям может приводить фурункул носа:
- а) дерматит кожи носа
 - б) общий фурункулез
 - в) внутричерепным осложнениям.
- 11 Заболеваемость хроническим ларингитом чаще
- а) у лиц голосо-речевых профессий
 - б) у лиц женского пола
 - в) у лиц мужского пола
 - г) не зависит от пола
- 12 К исследованиям слуховой функции не относится:
- а) импедансометрия
 - б) аудиометрия
 - в) отоакустическая эмиссия
 - г) вестибулометрия
- 13 Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием...
- а) личность;
 - б) индивид;
 - в) человек;
 - г) индивидуальность;
 - д) субъект
- 14 Способность понимания психологических состояний других людей и сопереживание им, умение посмотреть на ситуацию глазами другого - это качество личности
- а) доброжелательность
 - б) открытость
 - в) конфронтация
 - г) эмпатия
 - д) аутентичность
- 15 Рецидивы при оперативном лечении полипов:
- а) часто
 - б) редко
 - в) не бывают
 - г) бывают при отсутствии противорецидивного лечения в послеоперационном периоде

- 16 Какие антибиотики используют при лечении гнойных заболеваний гортани чаще всего:
- а) защищенные полусинтетические пенициллины
 - б) препараты левофлоксацина
 - в) меропенемы
 - г) биопарокс
- 17 Дифтерия лечится:
- а) антибиотиками пенициллинового ряда
 - б) антибиотиками цефалоспоринового ряда
 - в) макролидами
 - г) не лечится антибиотиками
- 18 К осложнениям попадания инородных тел в гортань относится:
- а) аносмия
 - б) тубоотит
 - в) носовое кровотечение
 - г) пневмония
- 19 Остов гортани составляет:
- а) Кости
 - б) Хрящи
 - в) Мышцы
 - г) Связки
- 20 При дифтерии налеты снимаются:
- а) с трудом, с образованием язвы
 - б) легко
 - в) с трудом, с образованием эрозии
 - г) налеты плотно фиксированы на поверхности
- 21 Иннервация гортани осуществляется ветвями:
- а) Языкоглоточного нерва
 - б) Блуждающего нерва
 - в) Кохлеарного нерва
 - г) Варианты А , Б
- 22 Лакунарная и фолликулярная ангины относятся к заболеваниям:
- а) инфекционным
 - б) оториноларингологическим
 - в) терапевтическим
 - г) хирургическим
- 23 Симптомы сенсоневральной тугоухости:
- а) снижение слуха
 - б) снижение разборчивости речи
 - в) наличие костно-воздушного разрыва на аудиограмме
 - г) шум в ухе
 - д) боль в ухе
- 24 Пункция верхнечелюстной пазухи показано:
- а) В случае осложнения
 - б) Во всех случаях
 - в) При затяжном течении
 - г) При рецидиве заболевания

- 25 Метод отоакустической эмиссии используется для диагностики:
- а) в любом возрасте
 - б) в пожилом возрасте
 - в) в раннем детском возрасте
 - г) в зрелом возрасте
- 26 Клинические проявления полипов носа зависит от:
- а) размеров поражения
 - б) от гистологического строения полипов
 - в) от сопутствующих заболеваний
 - г) ни от чего не зависит
- 27 Стремечко состоит из:
- а) головки
 - б) двух ножек
 - в) основания
 - г) короткого отростка
 - д) седла
- 28 С чем сообщаются придаточные пазухи носа:
- а) с глазницей
 - б) друг с другом
 - в) с полостью носа
 - г) ни с чем не сообщаются
- 29 Характерные симптомы для перфорированной стадии острого среднего отита:
- а) гноетечение из уха
 - б) понижение слуха
 - в) повышенная температура
 - г) усиление боли в ухе
 - д) головокружение
- 30 Первая помощь при ложном крупе:
- а) сделать щелочную ингаляцию
 - б) обеспечить приток свежего воздуха
 - в) сделать горячую ножную ванну
 - г) применить холодный компресс на шею
 - д) поставить горчичник на затылок
- 31 Основным симптомом ларингоспазма является:
- а) дыхание Биота
 - б) насморк
 - в) стридорозное дыхание
 - г) обильная мокрота
- 32 Цель санитарного просвещения:
- а) формирование высокой санитарной культуры, сознательного гигиенического поведения граждан
 - б) нетерпимое и критичное отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к условиям окружающей среды, наносящим ущерб здоровью
 - в) правильное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленное на выздоровление
 - г) овладение знаниями, необходимыми для соблюдения правил гигиенического поведения

- 33 При обмороке АД у больных:
- а) резко снижается
 - б) снижается постепенно в течении нескольких часов
 - в) не изменяется
 - г) резко повышается на несколько минут
- 34 Фурункул носа может дать осложнения:
- а) тромбоз пещеристого синуса
 - б) сепсис
 - в) гайморит
 - г) фронтит
 - д) туботит
- 35 Кратковременная, бурно протекающая, чрезвычайно интенсивная эмоциональная реакция:
- а) фрустрация
 - б) аффект
 - в) настроение
 - г) депрессия
 - д) стресс
- 36 Развитию отитов у детей способствует:
- а) особенности анатомии детского возраста
 - б) снижение резистентности организма
 - в) неадекватное лечение
- 37 Носовое кровотечение могут вызвать:
- а) повышение АД
 - б) болезни крови
 - в) перенесенная вирусная инфекция
 - г) хронические заболевания желудочно-кишечного тракта
 - д) варикозная болезнь
- 38 Для лечения наружных отитов используется:
- а) местная терапия
 - б) системная антибиотикотерапия
 - в) оперативная санация очага
 - г) дезинтоксикационная терапия
- 39 С использованием какого прибора проводят тимпанометрию:
- а) аудиометр
 - б) импедансометр
 - в) набор камертонов
 - г) ушной манометр
- 40 В каких случаях гортаноглотку осматривают с использованием местной анестезии:
- а) при неадекватном поведении больного
 - б) при повышенном рвотном рефлекс
 - в) при повышенном болевом рефлекс
 - г) при отеке гортаноглотки
- 41 Кохлеарная имплантация — это:
- а) разновидность слухопротезирования
 - б) метод лечения тугоухости
 - в) система мероприятий, направленных на восстановление слуха

- 42 Симптомы лабиринтита — это:
- а) заложенность в ухе
 - б) гноетечение из уха
 - в) снижение слуха
 - г) головокружение
- 43 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие пульса на:
- а) локтевой артерии
 - б) лучевой артерии
 - в) сонной артерии
 - г) бедренной артерии
- 44 В России трансплантация может проводится без согласия донора, если донор:
- а) особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение
 - б) гражданин страны, находящейся в состоянии войны с Россией
 - в) психически неполноценный
 - г) донор — умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов
- 45 Ротоглотка состоит из следующих анатомических образований:
- а) небная занавеска
 - б) небные миндалины
 - в) надгортанник
 - г) язычок
 - д) гортань
- 46 Пороговым звуком называется звук:
- а) достаточный по громкости, чтобы услышать
 - б) вызывающий неприятные ощущения
 - в) вызывающий комфортные ощущения
 - г) вызывающий болевые ощущения
- 47 Первая помощь при инородном теле глотки на догоспитальном этапе:
- а) в момент кашля произвести короткие удары в межлопаточное пространство
 - б) заесть кусочком хлеба
 - в) попытаться достать инородное тело
 - г) прополоскать горло
- 48 Острые паратонзиллиты являются осложнениями:
- а) фарингита
 - б) ангины
 - в) туберкулеза глотки
 - г) перихондрита гортани
- 49 Для болезни Менъера характерно:
- а) длительное постепенное развитие
 - б) приступообразное течение
 - в) спонтанное выздоровление
- 50 Певческие узелки являются разновидностью:
- а) хронического субатрофического фарингита
 - б) хронического гипертрофического ларингита
 - в) острого ларингита
 - г) перихондрита гортани

- 51 Болезнь Меньера —это:
- а) воспалительное заболевание уха
 - б) разновидность лабиринтопатии
 - в) осложнение отитов
 - г) внутричерепное осложнение
- 52 К симптомам инородного тела гортани относятся:
- а) дисфагия
 - б) дисфония
 - в) кашель
 - г) саливация
 - д) стеноз
- 53 Причиной парезов голосовых складок чаще всего являются:
- а) Оперативные вмешательства
 - б) Травмы, Ушибы
 - в) Нарушение кровообращения центрального характера
 - г) Голосовые перегрузки
- 54 Аллергический ринит проявляется:
- а) Гноетечение из носа
 - б) Боли в полости носа
 - в) Заложенность носа
 - г) Кашель
- 55 Медицинские работники имеют право на:
- а) оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
 - б) совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях;
 - в) соблюдение врачебной тайны;
 - г) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя.
- 56 К носовым кровотечениям может приводить:
- а) заболевания кроветворных органов
 - б) гипертоническая болезнь
 - в) заболевания печени
 - г) все вышеперечисленные заболевания
- 57 Возбудителем наружного отита чаще всего является:
- а) Бактерии
 - б) Вирусы
 - в) Грибы
 - г) Протозои
- 58 Для продувания слуховых труб по Политцеру понадобится:
- а) шпатель
 - б) ушная воронка
 - в) резиновая груша с оливой
 - г) шприц
- 59 Заболевание, при котором нарушается подвижность стремечка:
- а) болезнь Меньера
 - б) острый отит
 - в) хронический средний отит
 - г) отосклероз

- 60 На консультацию к фониатру направляется пациент по поводу:
- а) снижения слуха
 - б) изменений голоса
 - в) нарушения вестибулярного аппарата
 - г) нарушения акта глотания
- 61 Внутричерепные осложнения синуситов вызываются:
- а) вирулентностью возбудителя
 - б) особенностью анатомии пазух
 - в) отсутствием лечения
 - г) аллергизацией слизистых
- 62 Больному, перенесшему паратонзиллярный абсцесс, показана операция:
- а) тонзиллэктомия
 - б) коникотомия
 - в) аденомэктомия
 - г) ларингоэктомия
- 63 Наружный диффузный отит лечится в основном:
- а) Местная терапия
 - б) Системная антибиотика терапия
 - в) Хирургическим путём
 - г) Физиотерапия
- 64 В состав системы среднего уха входит:
- а) барабанная полость
 - б) сосцевидный отросток
 - в) слуховая труба
 - г) сигмовидный синус
 - д) пирамида височной кости
- 65 Ведущий фактор, приводящий к развитию хронических заболеваний гортани:
- а) Экологические факторы
 - б) Курение
 - в) Воспалительные заболевания пазух носа
 - г) Наследственность
- 66 Сенсоневральная тугоухость — это:
- а) патология звукопроводящего аппарата уха
 - б) нарушение цепи слуховых косточек
 - в) нарушение звуковоспринимающего аппарата уха
 - г) нарушение в системе овального и круглого окна
- 67 Седловидный нос является следствием:
- а) туберкулеза
 - б) злоупотребления кокаином
 - в) сифилиса
 - г) ринофимы
 - д) травмы носа
- 68 Абсцессы гортаноглотки могут распространяться:
- а) в мозг
 - б) в придаточные пазухи
 - в) в средостение
 - г) в пищевод

- 69 Парез лицевого нерва при остром среднем отите:
- а) возможен
 - б) не возможен
 - в) возникает только после инструментального вмешательства
- 70 Абсцессы мозга и мозжечка чаще:
- а) самостоятельные заболевания
 - б) осложнения воспалительных заболеваний уха
 - в) последствия вирусных заболеваний уха
- 71 Инородные тела носа удаляются:
- а) шприцем Жане
 - б) пинцетом
 - в) набором крючков
 - г) иглой Куликовского
- 72 Лимфоаденоидное кольцо глотки выполняет функцию:
- а) глотания
 - б) защитную
 - в) дыхательную
 - г) разделительную
- 73 Выберите устные средства санитарного просвещения:
- а) беседа, лекция
 - б) фотография, плакат
 - в) брошюра, журнал
 - г) бюллетень, буклет
- 74 Возбудителем инфекционного мононуклеоза является:
- а) стафилококк
 - б) стрептококк
 - в) вирус Эпштейна-Барра
 - г) веретенообразная палочка
- 75 Основными физиологическими функциями глотки являются:
- а) речеобразовательная
 - б) дыхательная
 - в) защитная
 - г) адаптационная
 - д) пищеварительная
- 76 Отосклероз – это заболевание, связанное с:
- а) гнойным процессом в ухе
 - б) катаральным процессом в ухе
 - в) дистрофическим процессом
 - г) нарушением иннервации
- 77 Хондроперихондрит гортани развивается как:
- а) самостоятельное заболевание
 - б) результат травмы, ушиба
 - в) функциональное заболевание
 - г) воспалительное заболевание
- 78 При оперативном лечении доброкачественных опухолей гортани используется доступ:
- а) через ларингофиссуру
 - б) эндоскопический подход
 - в) подход под местной анестезией
 - г) операция Крайля

- 79 Носовые полипы чаще всего растут из клеток:
- а) решетчатого лабиринта
 - б) обонятельных луковиц
 - в) бокаловидных желез
 - г) соединительной ткани
- 80 Длина свободных концов ниток тампона, предназначенного для задней тампонады носа (в сантиметрах):
- а) 70-100
 - б) 60-80
 - в) 40-50
 - г) 30-40
- 81 Размеры тампона для задней тампонады носа определяются по:
- а) размеру кулака больного
 - б) совмещенным ногтевым фалангам больших пальцев рук больного
 - в) совмещенным фалангам указательного и среднего пальцев рук больного
 - г) длине спинки носа
- 82 Обязательное медицинское страхование - это:
- а) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи;
 - б) страховой риск, связанный с возникновением страхового случая;
 - в) обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи;
 - г) обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, целевым назначением которых является обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения;
- 83 Первая помощь при травме барабанной перепонки:
- а) закапать раствор 3% перекиси водорода
 - б) ввести в слуховой проход стерильный ватный тампон
 - в) промыть ухо
 - г) закапать раствор борной кислоты
- 84 Для голосообразования голосовая щель должна быть:
- а) открыта
 - б) закрыта по всей длине
 - в) закрыта в переднем и среднем отделе
 - г) закрыта в задней трети
- 85 Отёк тканей шеи и увеличение шейных лимфоузлов является симптомом:
- а) Ангины Симановского-Венсана
 - б) Агранулоцитарной ангины
 - в) Дифтерии
 - г) Герпетической ангины
 - д) Всё вышеперечисленное верно
- 86 Ложный круп развивается чаще всего:
- а) Постепенно в течение дня
 - б) Неожиданно ночью
 - в) Независимо от времени суток

- 87 При ударе подбородком часто происходит перелом:
- а) верхней челюсти
 - б) нижней челюсти
 - в) верхней стенки слухового прохода
 - г) передней стенки слухового прохода
- 88 Длительность заболевания острым синуситом у взрослых составляют:
- а) 2-3 Недели
 - б) 1 месяц
 - в) до 12 недель
 - г) свыше 12 недель
- 89 Какой метод обследования наиболее информативен для диагностики заболеваний гортаноглотки:
- а) Диафаноскопия
 - б) Эндоскопия
 - в) Отоскопия
 - г) Импедансометрия
- 90 Показания к кохлеарной имплантации является:
- а) снижение слуха то 20 до 50 Дб
 - б) снижение слуха от 10 до 30 Дб
 - в) односторонняя глухота
 - г) двусторонняя выраженная тугоухость
- 91 Для передней тампонады носа используют:
- а) резиновый жгут
 - б) марлевая турунда длиной 10 см
 - в) марлевая турунда 80-90 см
 - г) гемостатическая губка
- 92 Пресбиакузис – это патология лиц возраста:
- а) детского
 - б) молодого
 - в) среднего
 - г) пожилого
- 93 Онкопатология наиболее часто локализуется в следующих органах:
- а) Уха
 - б) Нос и его пазухи
 - в) Глотка
 - г) Гортань
- 94 Диагноз невриномы слух нерва ставится на основании:
- а) импедансометрии
 - б) аудиометрии
 - в) вестибюлометрии
 - г) КТ, МРТ
- 95 Стеноз гортани вызывается:
- а) Сужением просвета гортани
 - б) Сужением трахеи
 - в) Спазмом бронхов
 - г) Спазмом мышц глотки

- 96 Для современной модели профессиональной морали - биоэтики, основным принципом является:
- а) принцип "соблюдения долга"
 - б) принцип "не навреди"
 - в) принцип приоритета науки
 - г) принцип приоритета прав и уважения достоинства пациента
- 97 Методы исследования слуха:
- а) вестибулометрия
 - б) отоскопия
 - в) аудиометрия
 - г) вращательная проба
- 98 При рецидивирующем папилломатозе гортани показано:
- а) консервативное лечение
 - б) оперативное лечение
 - в) противорецидивное лечение
 - г) физиотерапия
- 99 Острый тубоотит может быть следствием:
- а) ангины
 - б) острого ринита
 - в) аденоидита
 - г) бронхита
 - д) отосклероза
- 100 Больные со стенозом гортани подлежат:
- а) плановой госпитализации в стационар
 - б) амбулаторному лечению
 - в) госпитализации в течение суток
 - г) экстренной госпитализации
- 101 Для купирования приступа стенокардии на доврачебном этапе нитроглицерин можно применять повторно с интервалом:
- а) 20-30 минут
 - б) 10-15 минут
 - в) 5-10 минут
 - г) 5 минут
- 102 Сипота голоса является симптомом:
- а) воспалительного заболевания глотки
 - б) заболевания гортани и трахеи
 - в) заболевания только гортани
 - г) заболевания органов грудной клетки
- 103 Какой путь введения лекарственных препаратов предпочтителен при оказании помощи больным с анафилактическим шоком:
- а) внутривенный
 - б) внутримышечный
 - в) подкожный
 - г) ингаляционный
- 104 Вирус Эпштейна-Барра является возбудителем:
- а) Банальных ангин
 - б) Ангин Симановского-Венсана
 - в) Агранулоцитарной ангины
 - г) Инфекционного мононуклеоза

- 105 Возбудителем ангины Симановского-Венсана является:
- а) стафилококк
 - б) стрептококк
 - в) веретенообразная палочка в симбиозе со спирохетой полости рта
 - г) синегнойная палочка
- 106 Боли в глотке при глотании слюны беспокоят при:
- а) Ангине
 - б) Инфекционном мононуклеозе
 - в) Остром фарингите
 - г) Дифтерии
 - д) Всё вышеперечисленное верно
- 107 Первый приступ болезни Меньера обычно возникает у лиц возраста:
- а) детского
 - б) молодого
 - в) среднего
 - г) пожилого
- 108 Парацентез барабанной перепонки производится:
- а) Без анестезии
 - б) Под наркозом
 - в) Под инфильтрационной анестезией
 - г) Под местной анестезией смазыванием
 - д) Всё вышеперечисленное верно
- 109 Какие заболевания гортани относят к предраковым заболеваниям: .
- а) парез голосовых складок
 - б) фонастения
 - в) гортанная ангина
 - г) пахидермия гортани
- 110 Показанием к наложению окклюзионной повязки является:
- а) ранение груди
 - б) гемоторакс
 - в) закрытые переломы ребер
 - г) ушибы грудной клетки
- 111 Постепенная потеря слуха в обоих ушах, как признак атрофических возрастных изменений, обозначается термином:
- а) пресбиопия
 - б) пресбиакузис
 - в) престариум
 - г) пресбиофрения
- 112 Каким видом ткани является нёбные и глоточные миндалины:
- а) Соединительной тканью
 - б) Лимфоидной тканью
 - в) Мышечной тканью
 - г) Железистой тканью
- 113 Функции гортани:
- а) голосообразование
 - б) дыхательная
 - в) защитная
 - г) адаптационная
 - д) пищепроводная

- 114 Компресс на сосцевидный отросток ставится со спиртом в концентрации:
- а) 96
 - б) 70
 - в) 45
 - г) 10
- 115 Ингаляцию при вирусном крупе проводят раствором:
- а) с лекарственными травами
 - б) с муколитиками
 - в) с бронхолитиками
 - г) со спазмолитиками
- 116 Паратонзиллярный абсцесс является осложнением:
- а) Гортанной ангины
 - б) Ангины язычной миндалины
 - в) Ангины носоглоточной миндалины
 - г) Банальной ангины нёбных миндалин
- 117 Аденоиды расположены в:
- а) полости носа
 - б) носоглотке
 - в) ротоглотке
 - г) Евстахиевой трубе
- 118 Сурдология — раздел отоларингологии, который занимается:
- а) всеми заболеваниями, приводящими к нарушениям слуха
 - б) гнойными заболеваниями слухового аппарата
 - в) сенсоневральными нарушениями слухового аппарата
 - г) только слухопротезированием
- 119 К негнойным заболеваниям уха относят:
- а) лабиринтит
 - б) лабиринтопатию
 - в) заболевания слуховой трубы
 - г) петрозит
- 120 Операция на среднем ухе показана при:
- а) мезотимпаните
 - б) эптитимпаните
 - в) мастоидите
 - г) антрите
- 121 При профессиональной тугоухости преимущественно происходит поражение в системе:
- а) наружного уха
 - б) среднего уха
 - в) внутреннего уха
- 122 Аденоотомия - это удаление:
- а) небных миндалин
 - б) носоглоточной миндалины
 - в) язычной миндалины
 - г) полипов носа
- 123 При остром среднем отите больного беспокоят:
- а) заложенность уха, выделение из слухового прохода.
 - б) Сильные стреляющие боли.
 - в) Шум в голове, звон.
 - г) Тупые ноющие боли в ухе

- 124 Симптомы хронического ларингита:
- а) периодически возникающая охриплость
 - б) затруднение дыхания
 - в) быстрая утомляемость голоса
 - г) боль при глотании
- 125 В первом периоде острого среднего отита звук латерализуется (при обследовании камертоном):
- а) в сторону здорового уха
 - б) в сторону больного уха
 - в) остается посередине
- 126 Для проведения обратной ларингоскопии необходимо приготовить:
- а) гортанное зеркало
 - б) ларингоскоп
 - в) шпатель
 - г) носовое зеркало
- 127 Отогенные внутричерепные осложнения чаще возникают при:
- а) адгезивном среднем отите
 - б) отосклерозе
 - в) хроническом гнойном эпитемпаните и остром среднем отите
 - г) хроническом мезотимпаните
- 128 Возможно ли консервативное лечение полипов носа:
- а) невозможно
 - б) возможно при использовании иммуномодуляторов
 - в) возможно при использовании эндоназальных кортикостероидных препаратов
 - г) возможно при использовании препаратов местной противовоспалительной терапии
- 129 Вестибулярный рефлекс на мышцы глаз выражается в проявлении:
- а) амавроза
 - б) нистагма
 - в) птоза
 - г) экзофтальма
- 130 Понятие “милосердие” включает в себя все, кроме:
- а) чувства и способности сострадания
 - б) готовность оказать помощь тому, кто в ней нуждается
 - в) снисходительность
 - г) готовность выполнить любую просьбу человека
- 131 С целью исключения какого заболевания делается мазок на «BL»:
- а) сифилиса носа
 - б) ангины Симановского
 - в) дифтерии
 - г) лакунарной ангины
- 132 Основным симптомом отомикоза является:
- а) скудное гнойное выделение
 - б) глухота
 - в) зуд слухового прохода
 - г) острая боль

- 133 Какие препараты являются приоритетными в лечении аллергических вазомоторных ринитов:
- а) сосудосуживающие средства
 - б) средства ирригационной терапии
 - в) эндоназальные кортикостероиды
 - г) иммуномодуляторы
- 134 Серная пробка — это:
- а) результат несоблюдения гигиены
 - б) заболевание
 - в) аномалия слухового прохода
 - г) результат манипуляций в слуховом проходе и ношения ушной гарнитуры.
- 135 Первая помощь при носовом кровотечении:
- а) усадить больного
 - б) уложить больного
 - в) холод на переносицу
 - г) ватный шарик с 3% перекисью водорода в полость носа
 - д) тампон с адреналином в полость носа
- 136 Для профилактики ангин рекомендуется:
- а) системное назначение антибиотиков
 - б) промывание лакун небных миндалин
 - в) тубус-кварц глотки
 - г) иммунопрофилактика
- 137 Нарушение обоняния – это:
- а) афония
 - б) атрезия
 - в) аносмия
 - г) амовроз
- 138 Хондропериондрит гортани развивается как:
- а) Самостоятельное заболевание
 - б) Результат травмы, ушиба
 - в) Функциональное заболевание
 - г) Порок развития
- 139 Причиной истинных парезов и параличей гортани являются:
- а) травмы, ушибы
 - б) ятрогенные причины
 - в) функциональные причины
 - г) онкопатология
- 140 Латерализация звука от камертона, поставленного в области темени у больного с перфорацией барабанной перепонки, происходит в:
- а) больное ухо
 - б) здоровое ухо
 - в) оба уха
- 141 Ангиофиброма носоглотки развивается:
- а) в возрасте 20-40 лет
 - б) у девушек 15-20 лет
 - в) у мальчиков 9-15 лет
 - г) в пожилом возрасте

- 142 Хондроперихондриты гортани могут приводить:
- а) к обострению хронического ларингита
 - б) к рубцовой атрезии
 - в) к деформации шеи
 - г) к тиреоидиту
- 143 Острый мастоидит является:
- а) Осложнением острого отита.
 - б) Самостоятельным заболеванием
 - в) Осложнением евстахеита.
 - г) Воспаление структур внутреннего уха.
- 144 Заболевание, характеризующееся пароксизмальным чиханием, обильным прозрачным водянистым отделяемым из носа, заложенностью носа, зудом в области носа, называется:
- а) острый ринит
 - б) острый синусит
 - в) аллергический ринит
 - г) атрофический ринит
- 145 При живом инородном теле слухового прохода следует закапать в ухо:
- а) борный спирт
 - б) масло
 - в) раствор перманганата калия
 - г) раствор фурацилина
- 146 Фурункул слухового прохода обычно развивается:
- а) На нижней стенке
 - б) На верхней стенке
 - в) На передней стенке
 - г) На задней стенке
 - д) Всё вышеперечисленное верно
- 147 Первоочередной эвакуации подлежат пораженные сортировочной группы:
- а) первой
 - б) второй
 - в) третьей
 - г) четвертой
- 148 Причинами сезонного аллергического ринита является:
- а) Шерсть домашних животных
 - б) Пыльца растений и деревьев
 - в) Клещ домашней пыли
 - г) Плесень
- 149 Основные функции носа:
- а) дыхательная
 - б) обонятельная
 - в) защитная
 - г) резонаторная
 - д) вестибулярная
- 150 Сосудосуживающие капли в нос можно применять в течение:
- а) 5 дней
 - б) 7 дней
 - в) 14 дней
 - г) 1 месяц

- 151 Хронический средний отит —это:
- а) мастоидит
 - б) мезотимпанит
 - в) евстахеит
 - г) лабиринтит
- 152 При остром среднем отите возможны осложнения:
- а) гнойный менингит
 - б) абсцесс мозга
 - в) мастоидит
 - г) паратонзиллярный абсцесс
 - д) евстахиит
- 153 Показанием к оперативному лечению является:
- а) Ангины до 2 раз в год
 - б) Рецидивирующие фарингиты
 - в) Ангины Симановского-Венсана
 - г) Постоянные боли в глотке
- 154 Пути проникновения возбудителя инфекции в барабанную полость:
- а) тубогенный
 - б) гематогенный
 - в) из наружного слухового прохода
 - г) лимфогенный
 - д) контактно-бытовой
- 155 Осложнения, наиболее часто встречающиеся при остром среднем отите:
- а) мастоидит
 - б) отосклероз
 - в) парез лицевого нерва
 - г) менингит
- 156 Анатомические отделы органа слуха, участвующие в звуковосприятии:
- а) кортиев орган
 - б) проводящие пути
 - в) зона коры головного мозга
 - г) барабанная перепонка
 - д) слуховая косточка
- 157 Основным в лечении парезов и параличей гортани является:
- а) медикаментозная терапия
 - б) физиотерапия
 - в) фонопедическая коррекция
 - г) иглорефлексотерапия
- 158 Полуспиртовой компресс на ухо ставят на (время в часах):
- а) 2-4
 - б) 4-6
 - в) 6-8
 - г) 8-12
- 159 Вторичный острый средний отит развивается после инфекционных заболеваний, таких как:
- а) скарлатина
 - б) корь
 - в) краснуха
 - г) дифтерия
 - д) коклюш

- 160 Согласно приказу МЗ РФ от 04.03.2003 №73 длительность реанимационных мероприятий составляет:
- а) не менее 15 минут
 - б) не менее 25 минут
 - в) не менее 30 минут
 - г) не менее 1 часа
- 161 Развитие риносинусита вызывается:
- а) плохим носовым дыханием
 - б) неадекватным лечением
 - в) эмпиемой пазухи
 - г) травмой носа
- 162 В этиологии болезни Рейнке первопричиной считается:
- а) фактор экологии
 - б) курение
 - в) профессиональные вредности
 - г) голосовые перегрузки
- 163 Что определяет показания к аденотомии:
- а) размеры аденоидной вегетации
 - б) рецидивирующие отиты в анамнезе
 - в) частые простуды
 - г) другие причины
- 164 Что способствует развитию аллергического ринита:
- а) анатомические особенности строения перегородки носа
 - б) воспалительные заболевания полости носа
 - в) снижение резистентности организма
 - г) неправильное лечение
- 165 При нейросенсорной тугоухости в ушах отмечается шум:
- а) высокой тональности
 - б) низкой тональности
 - в) средней тональности
- 166 При гортанной ангине воспалительный процесс затрагивает:
- а) ткани мягкого неба
 - б) слизистую надгортанника
 - в) слизистую подсвязочной области
 - г) трахею
- 167 Воспалительные заболевания наружного уха — это:
- а) острый средний отит
 - б) фурункул уха
 - в) мастоидит
 - г) лабиринтит
- 168 Задняя тампонада носа выполняется:
- а) При кровотечении передних отделов носа
 - б) Если другие виды остановок кровотечений не состоятельны
 - в) При кровотечении из зоны Киссельбаха
 - г) При кровотечении из ветвей общей сонной артерии

- 169 Основные исходы острого среднего отита:
- а) выздоровление
 - б) адгезивный процесс
 - в) хронический процесс
 - г) осложнения
 - д) атрезия слухового прохода
- 170 Вскрытие фурункула слухового прохода производится на стадии:
- а) Инфильтрации
 - б) Абсцедирование
 - в) Инволюции
- 171 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
- а) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
 - б) лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей,
 - в) в целях проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях;
 - г) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения
- 172 Инфекция в среднее ухо попадает:
- а) со стороны слухового прохода
 - б) воздушно- капельным путем
 - в) через слуховую трубу.
- 173 Симптомы острого насморка (ринита):
- а) зуд в области преддверия носа
 - б) затруднение носового дыхания
 - в) слизистые выделения из носа
 - г) температура 39-40°C
 - д) гнойные выделения из носа
- 174 Придаточные пазухи носа - это:
- а) Бухтообразные полости в костях черепа
 - б) Полости носа
 - в) Носовые раковины
- 175 Положение больного при носовом кровотечении:
- а) лежа на спине
 - б) сидя с запрокинутой назад головой
 - в) сидя с наклоненной вперед головой
 - г) лежа на боку
- 176 Метод отоакустической эмиссии используется:
- а) Для исследования нарушения слуха
 - б) Для экспресс-диагностики в раннем детском возрасте
 - в) Для диагностики сенсоневральной тугоухости
 - г) Для диагностики хронических заболеваний уха
 - д) Всё вышеперечисленное верно

- 177 Папилломатоз гортани вызывается:
- а) онковирусом
 - б) ассоциацией грибов и вирусов
 - в) спирохетой полости рта
 - г) бактериями полости рта
- 178 Биомедицинская этика и медицинское право должны находиться в состоянии:
- а) независимости
 - б) медицинское право - приоритетно
 - в) должен быть выдержан приоритет биомедицинской этики
 - г) биомедицинская этика - критерий корректности медицинского права
- 179 Для временной остановки венозного наружного кровотечения применяют
- а) пальцевое прижатие артерии на протяжении
 - б) наложение жгута
 - в) максимальное сгибание конечности
 - г) наложение давящей повязки
- 180 Трахеотомия выполняется обычно в положении больного:
- а) лежа на спине с валиком в грудном отделе
 - б) сидя
 - в) лежа на спине с валиком в поясничном отделе
 - г) лежа на спине с валиком под лопатками
- 181 Функциональные нарушения голоса вызываются:
- а) Воспалением голос.складок
 - б) Воспалением ложных голосовых складок
 - в) Ограничение подвижности голосовых складок
 - г) Отёком голосовых складок
- 182 К сурдологу направляется пациент с:
- а) тугоухостью
 - б) аллергическими реакциями
 - в) нарушениями дыхания
 - г) изменением голоса
- 183 К каким осложнениям могут приводить абсцессы глотки при не своевременном лечении?
- а) к формированию капсулы абсцесса
 - б) К рецидиву
 - в) К медиастиниту
 - г) К самопроизвольному выздоровлению.
- 184 Основная функция трахеи:
- а) защитная
 - б) дренажная
 - в) дыхательная
 - г) резонансная
- 185 Голосовая щель имеет размеры:
- а) 30 мм
 - б) 20 мм
 - в) меньше 19 мм
 - г) 10 мм

- 186 Исследование вестибулярной функции — это:
- а) импедансометрия
 - б) опыт Вальсальвы
 - в) тональная аудиометрия
 - г) калорическая проба
- 187 Остов гортани образуется:
- а) костями
 - б) хрящами
 - в) соединительной тканью
 - г) мягкими тканями шеи
- 188 Симптомы стеноза гортани:
- а) затрудненный вдох
 - б) затрудненный выдох
 - в) участие в акте вспомогательной мускулатуры
 - г) стридорозное дыхание
 - д) боль при глотании
- 189 Причинами носовых кровотечений являются:
- а) Заболевания слизистой носа
 - б) Анатомические особенности носа
 - в) Соматические заболевания носа
 - г) Опухоли носа
 - д) Всё вышеперечисленное верно
- 190 Мастоидит — это воспаление:
- а) носовой перегородки
 - б) придаточных пазух носа
 - в) сосцевидного отростка височной кости
 - г) лобных пазух носа
- 191 Слои барабанной перепонки:
- а) эпидермальный
 - б) фиброзный
 - в) эндотелиальный
 - г) эпителиальный
 - д) слизистый
- 192 Лейкоцитоз до 30млн в крови характерен:
- а) Фолликулярная ангина
 - б) Агранулоцитарной ангины
 - в) Инфекционного мононуклеоза
 - г) Ангина Симановского-Венсана
- 193 Мастоидит — это:
- а) разновидность острого отита:
 - б) распространение воспалительного процесса на ячейки сосцевидного отростка
 - в) хронизация процесса
 - г) исход процесса
- 194 Серная пробка удаляется из слухового прохода:
- а) Промыванием слухового прохода стерильным физ. раствором.
 - б) Промыванием сл. пр. после предварительного закапывания раствора H_2O_2
 - в) Механическим удалением серной пробки крючком
 - д) Всё вышеперечисленное верно

- 195 Предпочтительным положением грудного ребёнка в кроватке при наличии у него ринита является:
- а) на спине
 - б) на животе
 - в) на боку с возвышенным изголовьем
 - г) коленно-кистевое
- 196 Пункция верхнечелюстной пазухи показана в случае:
- а) затяжного течения заболевания
 - б) при наличии клинических и рентгенологических показаний
 - в) во всех случаях синусита
 - г) при хроническом синусите
- 197 Коникотомия - это:
- а) рассечение трахеи
 - б) вскрытие паратонзиллярного пространства
 - в) рассечение связки между перстневидным и щитовидным хрящами
 - г) рассечение уздечки языка
- 198 Аденоиды I-II степени могут считаться физиологической нормой до возраста:
- а) 3 лет
 - б) 7 лет
 - в) 12 лет
 - г) 16 лет
- 199 Слухопротезирование показано:
- а) при снижении слуха на 30 Дб
 - б) при односторонней стойкой глухоте
 - в) при снижении слуха на 40-60 Дб
 - г) при полной глухоте
- 200 Какие причины вызывают развитие рецидивирующего папилломатоза гортани у детей:
- а) Хим. канцерогены
 - б) Экологические факторы
 - в) Вирусы
 - г) Рентгеновское излучение
- 201 Показанием к оперативному лечению хронического тонзиллита является:
- а) постоянные боли в глотке
 - б) ангины ежегодно 1 раз в год
 - в) ангины 2 раза в год
 - г) выделения из лакун гнойного отделяемого
- 202 У грудного ребёнка при остром отите боль усиливается при:
- а) приёме пищи
 - б) проведении туалета носа
 - в) физической нагрузке
 - г) надавливании на козелок
- 203 Что способствует формированию абсцессов в глотке:
- а) Кариозные зубы
 - б) Инфекционные заболевания
 - в) Рецидивирующие ангины
 - г) Снижение резистентности организма
 - д) Всё вышеперечисленное верно

- 204 Функции уха:
- а) звуковосприятие
 - б) защитная
 - в) сохранение равновесия
 - г) ориентация в пространстве
 - д) резонаторная
- 205 Продувание слуховых труб для восстановления слуха производится при:
- а) воспалении среднего уха
 - б) воспалении внутреннего уха
 - в) аденоидите
 - г) назофарингите
- 206 При лечении синуситов антибиотики:
- а) не показаны
 - б) показаны во всех случаях
 - в) при синуситах средней тяжести и тяжелых
 - г) при безпункционном ведении.
- 207 Какой метод исследования применяется для осмотра гортани на первичном приёме лор-врача:
- а) Непрямая ларингоскопия
 - б) Прямая ларингоскопия
 - в) Фарингоскопия
 - г) Флуометрия
- 208 Профилактика тяжёлой реакции на госпитализацию у ребёнка 1 года жизни включает:
- а) раздельное пребывание матери и ребёнка
 - б) отвлечение игрушкой
 - в) госпитализацию матери с ребёнком
 - г) проведение терапевтической игры
- 209 Юношеская ангиофиброма носоглотки относится к:
- а) Злокачественным опухолям
 - б) Доброкачественным опухолям
 - в) Условно доброкачественным опухолям
 - г) Опухолеподобным заболеваниям
- 210 К аномалиям развития наружного уха относится:
- а) атрезия хоан
 - б) незаращения твердого нёба
 - в) микротия
 - г) анкилоз стремени
- 211 Температура воды, применяемая для промывания уха с целью удаления серной пробки, должна быть (в градусах по Цельсию):
- а) 18
 - б) 20
 - в) 37
 - г) 45
- 212 При каких видах параличей гортани больные страдают от затрудненного дыхания:
- а) при правосторонних парезах
 - б) при левосторонних парезах
 - в) двусторонних
 - г) импатических

- 213 Гортанная ангина является заболеванием, связанным с:
- а) С подслизистым отёком надгортанника
 - б) Отёком подскладочным отд. гортани
 - в) Отёком голосовой щели
 - д) Всё вышеперечисленное верно
- 214 При катаральном ларингите выявляется:
- а) дисфагия
 - б) дисфония
 - в) дыхательная недостаточность
 - г) кашель
 - д) стридорозное дыхание
- 215 Какие отделы носа наиболее часто вызывают носовые кровотечения:
- а) носовые раковины
 - б) дно полости носа
 - в) придаточные пазухи
 - г) зона Киссельбаха
- 216 Интенсивная терапия при стридорозном дыхании предусматривает:
- а) восстановление свободной проходимости дыхательных путей
 - б) введение сердечных гликозидов
 - в) введение диуретиков
 - г) бальнеотерапию
- 217 Здоровый молодой человек воспринимает шепотную речь не менее чем с (в метрах):
- а) 3
 - б) 5
 - в) 6
 - г) 10
- 218 На доврачебном этапе (при отсутствии ЭКГ) можно думать о начавшемся инфаркте миокарда, если приступ стенокардии не купируется приемом нитроглицерина в течение:
- а) 20- 30 минут
 - б) 30 минут — 1 часа
 - в) 1,5-2 часа
 - г) суток
- 219 Фурункул носа опасен:
- а) Рецидивом
 - б) Изменениями тканей наружного носа
 - в) Распространением процесса на придаточные пазухи
 - г) Внутричерепными осложнениями
- 220 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:
- а) две
 - б) три
 - в) четыре
 - г) пять

- 221 Симптомы острого фарингита:
- а) боль при глотании слюны, першение в глотке
 - б) охриплость
 - в) ощущение кома в глотке
 - г) повышение температуры
 - д) ларингоспазм
- 222 К гортани относятся:
- а) щитовидный хрящ
 - б) подъязычная кость
 - в) перстневидный хрящ
 - г) черпаловидный хрящ
 - д) коническая связка
- 223 Анатомические отделы органа слуха, участвующие в проведении звука - это:
- а) наружный слуховой проход
 - б) среднее ухо
 - в) перелимфа лестницы преддверия и барабанной лестницы
 - г) проводящие пути
 - д) ушная раковина
- 224 При остром гнойном лабиринтите показана:
- а) санирующая операция на среднем ухе
 - б) санирующая операция на лабиринте
 - в) мастоидотомия
 - г) консервативное лечение
- 225 Для дифтерии характерно:
- а) слабая выраженность болевых ощущений
 - б) бледный или бледно-синюшный оттенок слизистой носа
 - в) ярко-красная гиперемия зева и слизистой миндалин
 - г) наличие плотных, трудно снимающихся серых налетов
 - д) гной в лагунах миндалин
- 226 Холестеатома —это:
- а) проявление острого экссудативного отита
 - б) проявление хронического эпитимпанита
 - в) проявление хронического мезотимпанита
 - г) проявление лабиринтита
- 227 Остеомы носа развиваются в:
- а) клиновидной пазухе
 - б) лобной пазухе
 - в) полости носа
 - г) в носоглотке
- 228 Тонзиллотом необходим для:
- а) частичного удаления небных миндалин
 - б) удаление носоглоточной миндалины
 - в) удаления язычной миндалины
 - г) прокола гайморовой пазухи
- 229 При лечении риносинуситов используются:
- а) Местная терапия
 - б) Антибиотики и деконгестанты
 - в) Системная антибактериальная терапия
 - г) Сосудосуживающие средства

- 230 Введение лекарственных средств в барабанную полость грудного ребёнка предусматривает применение:
- а) шпателя
 - б) ушной воронки
 - в) шприца
 - г) резиновой груши
- 231 К нарушениям вестибулярного аппарата не относятся:
- а) Нистагм
 - б) Тугоухость
 - в) Головокружение
 - г) Тошнота
- 232 Здоровый образ жизни включает в себя:
- а) благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе поведенческой, гигиенические навыки
 - б) состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
 - в) принятие мер, направленных на снижение влияния вредных факторов на организм человека
 - г) привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом
- 233 При ангине больного госпитализируют в отделение:
- а) ЛОР
 - б) инфекционное
 - в) терапевтическое
 - г) по уходу
- 234 В каких случаях показана экстренная госпитализация пациента:
- а) Абсцесс глотки в стадии инфильтрации
 - б) Абсцесс глотки в стадии абсцедирования
 - в) Абсцесс глотки в стадии разрешения
 - г) Во всех случаях
- 235 Носовые ходы ограничены следующими образованиями:
- а) средней носовой раковиной
 - б) носовой перегородкой
 - в) верхней носовой раковиной
 - г) носоглоточной миндалиной
 - д) Евстахиевой трубой
- 236 В структуре ЛОР-заболеваний онкопатология чаще локализуется:
- а) в ухе
 - б) в носу и в придаточных пазухах
 - в) в глотке
 - г) в гортаноглотке
- 237 Профессиональная тугоухость развивается:
- а) у лиц, длительное время работающих в условиях шума, превышающего ПДУ (предельно допустимый уровень)
 - б) при однократном воздействии интенсивного шума
 - в) в старческом возрасте
 - г) после приема ототоксических антибиотиков

- 238 Гортань иннервируется ветвями:
- а) тройничного нерва
 - б) кохлеарного нерва
 - в) возвратного нерва
 - г) языкоглоточного нерва
- 239 Этиология миопатических парезов гортани следующая:
- а) функциональные причины
 - б) травмы гортани
 - в) соматические заболевания
 - г) медицинские манипуляции
- 240 К отделам глотки относятся:
- а) носоглотка
 - б) ротоглотка
 - в) гортаноглотка
 - г) язычная миндалина
- 241 При эпилептическом припадке:
- а) развитию судорог предшествует аура
 - б) припадок начинается внезапно
 - в) каждый припадок начинается своеобразно
 - г) развитию судорог предшествует психотравмирующая ситуация
- 242 К симптомам поллиноза относятся:
- а) гнойные выделения из носовых ходов
 - б) обильные водянистые выделения из носовых ходов
 - в) повышение температуры тела до 38-40°C
 - г) аллергический конъюнктивит
 - д) многократное чихание
- 243 Прокол барабанной перепонки (парацентез) применяется при:
- а) остром среднем отите
 - б) абсцедирующем фурункуле слухового прохода
 - в) отосклерозе
 - г) лабиринтите
 - д) туботите
- 244 Осложнения острых отитов:
- а) сенсоневральная тугоухость
 - б) тубарная дисфункция
 - в) мастоидит
 - г) диффузный наружный отит
- 245 К околоносовым относятся пазухи (синусы):
- а) верхнечелюстные
 - б) сигмовидная
 - в) лобные
 - г) клиновидная
 - д) пещеристая
- 246 Метод лечения гипертрофического ринита:
- а) медикаментозное (сосудосуживающие капли)
 - б) оперативное лечение
 - в) электрофорез
 - г) лазеротерапия

- 247 Диагноз хронического риносинусита ставится в случае:
- а) длительность заболевания до 12 нед.
 - б) заболевание повторяется 2-4 раза в году
 - в) длительность заболевания свыше 12 нед.
 - г) перерыв между обострениями меньше 12 нед.
- 248 Туалет уха, введение турунд с лекарственными веществами в слуховой проход, применение сосудосуживающих капель в нос, продувание слуховых труб по Политцеру применяется в комплексе для лечения:
- а) отомикоза
 - б) фурункула уха
 - в) острого среднего отита
 - г) мастоидита
- 249 Метод отоакустической эмиссии используется:
- а) для диагностики воспалительных заболеваний уха
 - б) для диагностики нарушений слуха
 - в) для экспресс-диагностики нарушений слуха
 - г) для диагностики вестибулярных нарушений.
- 250 Длительность течения острого риносинусита:
- а) 10-14 дней
 - б) до 1 мес.
 - в) 5-6 нед.
 - г) до 12 нед.
- 251 Радикальная операция на среднем ухе выполняется:
- а) для улучшения слуха
 - б) для улучшения вестибулярной функции
 - в) санации уха
 - г) для профилактики внутричерепных осложнений
- 252 При остром катаральном ларингите рекомендован голосовой режим:
- а) строгий
 - б) шепотная речь
 - в) обычный
- 253 Оперативное лечение на среднем ухе показано:
- а) при наличии выделения из уха
 - б) при снижении слуха
 - в) для профилактики внутричерепных осложнений
 - г) при частых обострениях
- 254 При евстахиите развивается тугоухость:
- а) кондуктивная
 - б) нейросенсорная
 - в) смешанная
- 255 Что приводит к развитию сезонного аллергического ринита:
- а) использование эндоназальных сосудосуживающих средств
 - б) домашняя пыль
 - в) пыльца растений
 - г) шерсть, слюна домашних животных
- 256 Отосклероз проявляется в виде:
- а) склероз всех звукопроводящих структур уха
 - б) склероз барабанной перепонки
 - в) анкилоз стремени
 - г) склероз звуковоспринимающего аппарата

- 257 Осмотр глотки - это:
- а) отоскопия
 - б) риноскопия
 - в) ларингоскопия
 - г) фарингоскопия
- 258 В каких случаях при остром среднем отите показан парацентез:
- а) выпячивание барабанной перепонки
 - б) сильные боли
 - в) высокая температура
 - г) втянутость барабанной перепонки
 - д) нарушение равновесия
- 259 У больного с агранулоцитарной ангиной в крови:
- а) лейкоциты $30 \cdot 10^9/\text{л}$, мононуклеары
 - б) умеренный лейкоцитоз
 - в) лейкопения ниже 1 млн
 - г) эозинофилия
- 260 Негнойные заболевания уха это:
- а) Евстахеит
 - б) Лабиринтит
 - в) Лабиринтопатия
 - г) Мирингит
- 261 При ложном крупе отек тканей развивается на уровне:
- а) голосовых складок
 - б) выше голосовых складок
 - в) в подсвязочной области
 - г) в трахее
- 262 К достоверным признакам внезапной остановки сердечной деятельности не относится:
- а) отсутствие пульса на сонных артериях
 - б) внезапная потеря сознания
 - в) отсутствие самостоятельного дыхания
 - г) отсутствие тонов сердца
- 263 К среднему уху относятся:
- а) барабанная перепонка
 - б) слуховые косточки
 - в) улитка
 - г) слуховая труба
 - д) седло
- 264 Одонтогенный левосторонний гайморит развивается при патологии зубов:
- а) верхней челюсти справа
 - б) верхней челюсти слева
 - в) нижней челюсти справа
 - г) нижней челюсти слева
- 265 Первая помощь при ушибе носа:
- а) троксевазиновая мазь
 - б) холод на место ушиба
 - в) согревающий компресс
 - г) постельный режим
 - д) турунды с адреналином

- 266 При злокачественных опухолях гортани позднее диагностируются опухоли следующих локализаций:
- а) надскладочное пространство
 - б) область голосовых складок
 - в) подсвязочное пространство
 - г) область надгортанника
- 267 Правильным определением этики как науки является:
- а) этика - наука об отношении живых существ между собой
 - б) этика - наука о природе и смысле моральных взаимоотношений и нравственных принципов
 - в) этика - наука о минимизировании зла в человеческих отношениях
 - г) этика - наука об умении правильно себя вести в обществе
- 268 Отогематома — это:
- а) воспаление ушной раковины в результате заболевания
 - б) результат травмы уха
 - в) аномалия развития
 - г) осложнения наружного отита
- 269 Форма хронического гнойного среднего отита, при которой наиболее часто наблюдаются опасные для жизни осложнения:
- а) мезотимпанит
 - б) эпитимпанит
 - в) аллергическая
 - г) адгезивная
- 270 В анатомии трахеи различают:
- а) шейный и грудной отделы
 - б) брюшной отдел
 - в) гортанный отдел
 - г) пищеводный отдел
- 271 Функциональные заболевания гортани характеризуются:
- а) гиперемией тканей гортани
 - б) ограничением подвижности голосовых складок
 - в) отеком тканей гортани
 - г) сужением просвета гортани
- 272 Каким категориям больных показано обучение пищеводному голосу:
- а) больным с двусторонними параличами гортани
 - б) больным с функциональной афонией
 - в) больным, перенесшим операцию ларингэктомию больным с рецидивирующим папилломатозом гортани
- 273 Наиболее частым осложнением ринита у грудных детей является:
- а) отит
 - б) ангина
 - в) гайморит
 - г) плеврит
- 274 В начале приступа бронхиальной астмы у больных отмечается кашель:
- а) с выделением пенистой розовой мокроты
 - б) с выделением «ржавой» мокроты
 - в) сухой
 - г) с выделением стекловидной мокроты

- 275 Истечение ликвора из уха или носа является характерным признаком
- а) сотрясения головного мозга
 - б) сдавления головного мозга
 - в) перелома свода черепа
 - г) перелома основания черепа
- 276 Фонопедическая коррекция-это:
- а) Метод лечения заболевания голоса
 - б) Физиотерапевтическая методика
 - в) ЛФК
 - г) Местная противовоспалительная терапия.
- 277 Коникотомия показана:
- а) если участок асфиксии ниже трахеи
 - б) если участок асфиксии в грудном отделе трахеи
 - в) если нет времени на осуществлении типичной трахеотомии
- 278 Кольцо Пирогова или глоточное кольцо состоит из следующих образований:
- а) глоточные миндалины
 - б) язычные миндалины
 - в) пейеровы бляшки
 - г) носоглоточные миндалины
 - д) трубные миндалины
- 279 Устье слуховой трубы располагается в:
- а) боковой стенке носоглотки
 - б) задней стенке носоглотки
 - в) области хоан
 - г) своде носоглотки
- 280 Ушная ликворея возникает при:
- а) переломе основания черепа и височной кости
 - б) травмах небных миндалин
 - в) травмах носа
 - г) травмах уха
- 281 После удаления небных миндалин пациент состоит на диспансерном учете:
- а) 1 год
 - б) 10 месяцев
 - в) 6 месяцев
 - г) 1 месяц
- 282 Признаки хронического гайморита:
- а) упорные головные боли
 - б) затемнение верхне-челюстных пазух на R-графии
 - в) периодические гнойные выделения из носа
 - г) менингеальные знаки
 - д) обильные водянистые выделения из носа
- 283 Характерные симптомы для начального периода острого среднего отита:
- а) боль в ухе
 - б) снижение слуха
 - в) повышение температуры
 - г) гноетечение
 - д) головокружение

- 284 К развитию сенсоневральной тугоухости приводят:
- а) воспалительные заболевания уха
 - б) осложнения отитов
 - в) внутричерепные осложнения
 - г) гипертоническая болезнь
- 285 Наружное ухо состоит из следующих образований:
- а) наружный слуховой проход
 - б) ушная раковина
 - в) сустав нижней челюсти
 - г) барабанная перепонка
 - д) стремечко
- 286 Число пораженных при территориальных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах):
- а) 10-50 пораженных
 - б) 50-500 пораженных
 - в) свыше 500 пораженных
 - г) до 10 пораженных
- 287 Лимфоаденоидное кольцо Пирогова выполняет функции:
- а) Глотательную
 - б) Дыхательную
 - в) Защитную
 - г) Разделительную
- 288 Приоритетным в лечении аллергических ринитов являются:
- а) Антигистаминные препараты
 - б) Местные сосудосуживающие средства
 - в) Местная кортикостероидная терапия
 - г) Водно-солевые спреи
- 289 Наиболее информативными методами обследования гортаноглотки в настоящее время являются:
- а) непрямая ларингоскопия
 - б) прямая ларингоскопия
 - в) фиброларингоскопия
 - г) рентгенологическое обследование
- 290 Отогенный менингит чаще встречается при:
- а) хронических гнойных средних отитах
 - б) острых синуситах
 - в) наружных отитах
 - г) лабиринтитах (внутренних отитах)
- 291 Симптомы эпитимпанита:
- а) гнойное отделяемое с запахом
 - б) боль в ухе
 - в) центральная перфорация
 - г) перфорация в ненатянутой части перепонки
 - д) повышение температуры
- 292 Изъятие органов и тканей от мертвого донора осуществляется в Российской Федерации:
- а) беспрепятственно в интересах науки и общества
 - б) согласно принципу "презумпция несогласия"
 - в) согласно принципу "презумпция согласия"
 - г) в соответствии с морально-религиозными ценностями

- 293 В каждой половине носа имеется носовых ходов:
- а) три
 - б) два
 - в) четыре
 - г) пять
- 294 Сурдологический кабинет занимается лечением заболеваний:
- а) Лиц, перенёвших радикальную операцию.
 - б) Сенсоневральных нарушений.
 - в) Глухоту детского возраста.
 - г) Все виды нарушения слуха.
- 295 При отосклерозе основными жалобами больного являются:
- а) снижение слуха
 - б) шум в ухе
 - в) головокружение
 - г) улучшение слуха в шумной обстановке (паракузис Визилии)
 - д) боль в ухе
- 296 Субпериостальный абсцесс — это:
- а) абсолютный признак мастоидита
 - б) исход заболевания
 - в) самостоятельное заболевание мягких тканей
 - г) осложнение фурункула слух, прохода
- 297 При среднем отите, кроме барабанной полости, в воспалительный процесс вовлекаются:
- а) костный отдел слухового прохода, слуховая труба
 - б) ячейки сосцевидного отростка, лабиринт
 - в) слуховая труба, ячейки сосцевидного отростка
 - г) лабиринт, костный отдел слухового прохода
- 298 К особым формам мастоидитов относятся:
- а) зигом атицит
 - б) затяжное течение среднего отита
 - в) некротизирующий наружный отит
 - г) гнойный лабиринтит
- 299 Показания к оперативному лечению по поводу искривления перегородки носа определяют:
- а) характер кривизны перегородки носа
 - б) сопутствующие заболевания носа
 - в) сопутствующие соматические заболевания
 - г) аллергические заболевания носа.
- 300 Влечении опухолей гортани используется:
- а) оперативное лечение
 - б) химиотерапия
 - в) рентгенотерапия
 - г) комплексная терапия