

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

(для медицинских сестёр стоматологических отделений (кабинетов),
в т. ч. детских, прошедших обучение по циклам "Сестринское дело в стоматологии",
профессиональной переподготовки по специальности
«Сестринское дело»)

- 1 Материалы для временного пломбирования зубов:
 - а) эвгедент, уницем
 - б) белокор, силицин, силидонт
 - в) унифас-цемент, искусственный дентин, беладонт
 - г) дентин паста, поликарбоксилатный цемент, темпопро
- 2 Соскоб на грибковую флору необходимо брать:
 - а) сразу после еды;
 - б) натощак;
 - в) после полоскания ротовой полости раствором марганца;
 - г) во время принятия пищи
- 3 Для лечения гиперестезии твердых тканей зубов при парадонтозе рекомендуют зубные пасты:
 - а) противовоспалительные
 - б) фторсодержащие
 - в) гигиенические
 - г) кальцийсодержащие
- 4 После в/в введения лазикса диуретический эффект наблюдается через:
 - а) практически сразу
 - б) 25 минут
 - в) 1 час
 - г) сутки
- 5 Ткани, составляющие зуб:
 - а) эмаль
 - б) дентин
 - в) пульпа
 - г) кутикула
- 6 Для исследования слюнных желез применяется
 - а) пантомография
 - б) внеротовая рентгенография
 - в) искусственное контрастирование
- 7 При пародонтите, на фоне сахарного диабета, лечение:
 - а) не проводится;
 - б) не проводится до нормализации сахара в крови;
 - в) только местное;
 - г) одновременно у эндокринолога и стоматолога
- 8 Применение фторидсодержащих зубных паст рекомендуется детям с:
 - а) 2 лет
 - б) 4 лет
 - в) 6 лет
 - г) 10 лет

- 9 Дезинфекции после каждого пациента подлежат все указанные объекты, кроме:
- а)рукоятки осветительной аппаратуры, рукоятка светоотверждающей лампы,
 - б)рабочая поверхность столика врача-стоматолога,
 - в)ручки медицинского шкафа,
 - г)стоматологическое кресло пациента
- 10 Механизм передачи инфекции зависит от:
- а)симптомов заболевания
 - б)локализации возбудителя в организме источника
 - в)условий внешней среды
 - г)условий социальной среды
- 11 К противовирусным средствам относятся:
- а) раствор интерферона
 - б) оксолиновый раствор
 - в) масляный раствор витамина А
 - г) ацикловир
- 12 Стоматологическое кресло следует обрабатывать дезинфицирующим раствором:
- а)после каждого пациента
 - б)в конце рабочей смены
 - в)при наличии следов крови и механических загрязнений
 - г)при загрязнении биологическими жидкостями
- 13 В результате воспаления в периапикальных тканях челюстных костей развивается:
- а)кератокиста;
 - б)радикулярная киста;
 - в)фолликулярная киста;
 - г)назоальвеолярная киста
- 14 К комбинированным искусственным коронкам относятся:
- а) металлокерамические
 - б) фарфоровые
 - в) металлопластмассовые
 - г) штампованные
- 15 Антисептики для медикаментозной обработки каналов:
- а) раствор перекиси водорода 3%
 - б) раствор хлоргексидина
 - в) физиологический раствор
 - г) раствор гипохлорита натрия
- 16 Система государственных социальных, гигиенических и медицинских мер, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья и предупреждения болезней – это:
- а) диспансеризация
 - б) санация полости рта
 - в) профилактика
 - г) ежегодные осмотры
- 17 Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в крафт-пакетах:
- а)до 3 суток
 - б)до 20 суток
 - в)до 3 недель
 - г)до 1 года

- 18 Бельё (перевязочный материал), полученное после стерилизации влажным, считается:
- а)стерильным
 - б)условно-стерильным
 - в)нестерильным
 - г)все выше перечисленное
- 19 Общее обезболивание может осложниться:
- а) обострением хронического гепатита
 - б) обострением заболеваний почек
 - в) остановкой дыхания
 - г) инфарктом миокарда
- 20 Средство общего действия при остром воспалении пульпы зуба:
- а)новокаин
 - б)спазмалгон
 - в)аспирин
 - г)димедрол
- 21 Выбор метода стерилизации зависит от:
- а)особенностей стерилизуемого изделия
 - б)степени загрязнения медицинского изделия
 - в)свойства микроорганизмов
 - г)все выше перечисленное
- 22 Использованные одноразовые инструменты относятся к классу отходов:
- а) класс А
 - б) класс Б
 - в) класс Д
- 23 Какой путь введения лекарственных препаратов предпочтителен при оказании помощи больным с анафилактическим шоком:
- а)внутривенный
 - б)внутримышечный
 - в)подкожный
 - г)ингаляционный
- 24 К большим слюнным железам относятся:
- а) околоушные
 - б) поднижнечелюстные
 - в) подъязычные
 - г) язычные
- 25 Режим стерилизации изделий из металла и стекла паром под давлением:
- а)1,1 атм 120 С - 45 мин;
 - б)1,1 атм 132 С - 30 мин;
 - в)2,2 атм 132 С - 20 мин;
 - г)1,1 атм 120 С – 20 мин
- 26 Главный симптом при повреждении лицевого нерва:
- а)онемение кожи лица, ноющая боль;
 - б)приступообразная боль половины лица;
 - в)асимметрия лица за счет пареза мимической мускулатуры;
 - г)отек и гиперемия кожи

- 27 При попадании биологических жидкостей пациента на слизистые носа и глаза, немедленно промыть:
- а) 30 % р-ром сульфацила натрия;
 - б) 0,025 % р-ром перманганата калия;
 - в) 3 % р-ром хлорамина;
 - г) обильно водой
- 28 В качестве изолирующей прокладки используют:
- а) фосфатные цементы
 - б) стеклоиономерные цементы
 - в) композиты
- 29 Вмешательство в геном человека может быть осуществлено во всех перечисленных целях, кроме:
- а) изменения генома половых клеток
 - б) профилактических целей
 - в) диагностических целей
 - г) терапевтических целей
- 30 Принцип проведения электродиагностики основан на определении:
- а) реакции тканей на надавливание;
 - б) способности тканей излучать свет определённого цвета при действии ультрафиолетовых лучей;
 - в) порогового возбуждения болевых и тактильных рецепторов пульпы при раздражении электрическим током;
 - г) свечения твёрдых тканей под влиянием света зелёного цвета
- 31 Стерильный стол остается стерильным в течение:
- а) 6 часов
 - б) 12 часов
 - в) суток
 - г) весь рабочий день
- 32 К осложнениям, возникающим во время операции удаления зуба, относятся:
- а) гайморит;
 - б) периостит;
 - в) альвеолит;
 - г) перелом коронки или корня удаляемого зуба
- 33 Пломбировочные материалы, применяемые для пломбирования каналов:
- а) пасты
 - б) гуттаперчивые штифты
 - в) лечебные прокладки
 - г) бумажные штифты
- 34 Внутрибольничная инфекция развивается только при наличии:
- а) источника инфекции;
 - б) источника инфекции и восприимчивого человека;
 - в) источника инфекции, факторов передачи и восприимчивого человека;
 - г) восприимчивого человека
- 35 Прилипаемость цемента обеспечивает наличие в составе порошка:
- а) окиси алюминия
 - б) окиси цинка
 - в) окиси кремния
 - г) ортофосфорной кислоты

- 36 Сроки сохранения стерильности медицинских изделий в закрытом биксе с фильтром:
- а) 1 сутки;
 - б) 3 дня;
 - в) 20 суток;
 - г) 1 месяц
- 37 Боли при глубоком кариесе возникают:
- а) от горячего;
 - б) от холодного;
 - в) в ночное время;
 - г) самопроизвольно
- 38 К тканям образующим зуб относятся:
- а) костная, нервная, сосудистая
 - б) дентин, эмаль, пульпа, цемент
- 39 Препараты, обладающие ранозаживляющим действием:
- а) мазь «Ируксол»
 - б) мазь и желе «Солкосерил»
 - в) 1% раствор галаскорбина
- 40 Прорезывание постоянных зубов начинается в:
- а) 10 лет
 - б) 8 лет
 - в) 6 лет
- 41 В комплекс противокариозных мероприятий у взрослых входит:
- а) электрофорез фтористого натрия
 - б) применение фторосодержащих зубных паст
 - в) фтористые таблетки внутрь и местно – фторлак
- 42 К осложнениям во время операции удаления зуба относятся:
- а) перелом корня
 - б) альвеолит
 - в) кровотечение
 - г) перфорация дна гайморовой пазухи
- 43 Ведущий механизм передачи вирусных гепатитов «В», «С», «D»:
- а) фекально-оральный
 - б) трансмиссивный
 - в) контактный
 - г) гемоконтактный
- 44 Количество зубов в молочном прикусе:
- а) 26
 - б) 32
 - в) 20
 - г) 30
- 45 В сухой капле крови на халате ВИЧ сохраняется:
- а) 7 дней
 - б) несколько часов
 - в) 14 дней
 - г) 3 недели
- 46 При наложении силикатной пломбы без прокладки развивается осложнение:
- а) некроз пульпы
 - б) образование заместительного дентина
 - в) никаких изменений

- 47 Для лечения перелома на нижней челюсти применяется:
- а) наложение гипса
 - б) пращевидная повязка
 - в) шинирование
 - г) иммобилизация в три сустава
- 48 Тампоны из марлевой йодоформной турунды при остановке луночкового кровотечения вводят:
- а) на 2 суток
 - б) на 5 суток
 - в) на 4-6 часов
 - г) на 1-2 часа
- 49 Интерпретация результатов постановки азопирамовой пробы проводится:
- а) немедленно или не позднее чем через 2 мин. после контакта реагента с загрязненным участком;
 - б) не позднее чем через 3 мин. после контакта реагента с загрязненным участком;
 - в) не позднее чем через 4 мин. после контакта реагента с загрязненным участком;
 - г) немедленно или не позднее чем через 3 мин. после контакта реагента с загрязненным участком
- 50 Полоскание полости рта растворами фторидов рекомендуется детям с возраста:
- а) 3 лет
 - б) 6 лет
 - в) 12 лет
 - г) 16 лет
- 51 Медикаментозная обработка корневого канала растворами протеолитических ферментов проводится с целью:
- а) воздействия на очаг воспаления в периапикальной области
 - б) растворения распада пульпы
 - в) антисептической обработки
 - г) пломбирования канала
- 52 Первые зубы прорезаются в:
- а) 4-6 месяцев
 - б) 6-7 месяцев
 - в) 8-9 месяцев
 - г) 10-12 месяцев
- 53 Для удаления нижних третьих моляров используются щипцы:
- а) клювовидные, изогнутые по ребру
 - б) прямые
 - в) специальные щипцы, изогнутые по плоскости
 - г) байонетные
- 54 Транспортировка пострадавшего с черепно-мозговой травмой:
- а) в положении сидя;
 - б) самостоятельно;
 - в) на носилках;
 - г) с сопровождающим
- 55 Истечение ликвора из уха или носа является характерным признаком
- а) сотрясения головного мозга
 - б) сдавления головного мозга
 - в) перелома свода черепа
 - г) перелома основания черепа

- 56 Возраст для протезирования у детей:
- а) 5-6 лет
 - б) 12-14 лет
 - в) возрастных ограничений нет
 - г) 6-12 лет
- 57 К стеклоиономерному классу цемента относятся следующие пломбировочные материалы:
- а) силидонт
 - б) Фуджи
 - в) фосфат-цемент
 - г) Витремер
- 58 Согласно Постановлению Правительства РФ № 950 от 20.09.2012 реанимационные мероприятия прекращаются при признании их абсолютно бесперспективными, в частности, при неэффективности таковых:
- а) в течение 15 минут
 - б) в течение 25 минут
 - в) в течение 30 минут
 - г) в течение 1 часа
- 59 Правило наложения жгута при артериальном кровотечении:
- а) наложение на голую кожу выше места кровотечения до прекращения пульсации дистальной артерии;
 - б) наложение на голую кожу ниже места кровотечения до прекращения пульсации;
 - в) наложение на одежду выше места кровотечения до прекращения пульсации дистальной артерии
- 60 Максимальное время нахождения жгута на конечности составляет __ минут :
- а) 240;
 - б) 60;
 - в) 120;
 - г) 30
- 61 С целью снижения риска профессионального заражения на стоматологическом приеме наиболее целесообразно:
- а) лабораторное обследование на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты всех пациентов при обращении за стоматологической помощью
 - б) тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у всех пациентов
 - в) предельно осторожное обращение с колюще-режущим инструментарием после его использования, использование средств индивидуальной защиты, вакцинация медицинского персонала против вирусного гепатита В
 - г) организация стоматологического приема инфицированных пациентов в специализированных учреждениях (кабинетах)
- 62 Аккредитация – это:
- а) определение объема медицинской помощи
 - б) определение соответствия деятельности медицинского учреждения профессиональным стандартам
 - в) выдача государственного разрешения на право заниматься определенным видом деятельности

- 63 Металлический стоматологический инструментарий стерилизуют в воздушном стерилизаторе при:
- а) t 180 C - 45 минут
 - б) t 160 C – 60 минут
 - в) t 180 C – 60 минут
 - г) t 160 C – 90 минут
- 64 Материалы для лечебных прокладок:
- а) цинкфосфатные
 - б) кальцийсодержащие
 - в) поликарбоксилатные
 - г) силикатные
- 65 При попадании биологических жидкостей пациента на кожу, немедленно обработать:
- а) 30 % р-ром сульфацила натрия
 - б) 0,025 % р-ром перманганата калия
 - в) 3 % р-ром хлорамина
 - г) 70% -м спиртом, промыть водой с мылом, повторно обработать 70%-м спиртом
- 66 К общесоматическим осложнениям местного обезболивания относят:
- а) синусит;
 - б) альвеолит;
 - в) остеомиелит;
 - г) анафилактический шок
- 67 Образование зубной бляшки от недостаточной гигиены полости рта:
- а) ускоряется
 - б) замедляется
 - в) не изменяется
 - г) гигиена не влияет на образование зубной бляшки
- 68 К дополнительным средствам гигиены относятся:
- а) эликсиры
 - б) ершики
 - в) зубные щетки
 - г) зубочистки
- 69 При экспираторной одышке:
- а) затруднен вдох
 - б) затруднен выдох
 - в) затруднен и вдох, и выдох
 - г) меняется только частота дыхания
- 70 Режим стерилизации изделий из металла и стекла сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе:
- а) 160C – 120 мин
 - б) 1,1 атм 132C - 30 мин
 - в) 2,2 атм 132C – 20 мин
 - г) 180C – 60 мин
- 71 Виды ответственности за нарушение санитарного законодательства:
- а) моральная, уголовная;
 - б) дисциплинарная, административная, уголовная;
 - в) дисциплинарная, уголовная;
 - г) административная

- 72 Полость рта ограничена:
- а) полостью носа
 - б) губами и щеками
 - в) твердым и мягким небом
 - г) дном полости рта
- 73 Метод витального окрашивания выявляет очаги деминерализации эмали при:
- а) клиновидном дефекте
 - б) кариесе в стадии белого пятна
 - в) гипоплазии эмали
 - г) флюорозе
- 74 Длину и проходимость корневых каналов проверяют:
- а) пульпоэкстрактором
 - б) корневой иглой
 - в) каналонаполнителем
 - г) корневым буровом
- 75 Сроки прорезывания боковых резцов на верхней челюсти (молочные зубы):
- а) 1-2 мес
 - б) 7-11 мес
 - в) 12-16 мес.
 - г) 13-18 мес
- 76 При подозрении на острое заболевание органов брюшной полости неотложная помощь включает в себя:
- а) применение тепла на область наибольшей болезненности
 - б) применение холода на область наибольшей болезненности
 - в) применение анальгетиков по назначению врача
 - г) применение спазмолитиков по назначению врача
- 77 Новокаин дает побочное действие в виде:
- а) шока
 - б) приступа стенокардии
 - в) повышения артериального давления
 - г) все выше перечисленное
- 78 Для проведения миорелаксации при судорожном синдроме применяются:
- а) хлористый кальций, глюконат кальция
 - б) диазепам, реланиум, седуксен
 - в) адреналин, кордиамин
 - г) коргликон, строфантин
- 79 Стерильность изделий в биксе или в упаковке с момента вскрытия сохраняется в течение:
- а) 6 часов
 - б) 8 часов
 - в) 12 часов
 - г) 24 часов
- 80 После сошлифования обязательно покрытие тканей зубов:
- а) коронками
 - б) пломбировочным материалом
 - в) фторсодержащими препаратами
 - г) вкладкой-накладкой
- 81 Последовательность появления симптомов при острой остановке кровообращения:
- а) выключение сознания, появление судорог, расширение зрачков
 - б) расширение зрачков, появление судорог, выключение сознания
 - в) появление судорог, расширение зрачков, отключения сознания

- 82 При внешнем осмотре пациента медицинская сестра должна обращать внимание на:
- а) углы рта
 - б) вид прикуса
 - в) наличие отпечатков зубов
 - г) наличие асимметрии лица
- 83 К некариозным повреждениям твердых тканей зуба относятся:
- а) флюороз
 - б) пульпит
 - в) перелом зуба
 - г) пародонтит
- 84 Ценность человеческой жизни в биомедицинской этике определяется:
- а) возрастом (количество прожитых лет)
 - б) расовой и национальной принадлежностью
 - в) финансовой состоятельностью
 - г) уникальностью и неповторимостью личности
- 85 Для медикаментозной обработки кариозной полости применяются:
- а) хлоргексидин 0,05%
 - б) перекись водорода 3%
 - в) спирт 70%
 - г) ферменты
- 86 Не минерализованные зубные отложения это:
- а) зубная бляшка
 - б) мягкий зубной налет
 - в) пищевые остатки
 - г) все выше перечисленное
- 87 Глоссалгией чаще болеют:
- а) мужчины
 - б) женщины
 - в) дети
 - г) подростки
- 88 Пародонт – это:
- а) зуб, десна, периодонт
 - б) десна, периодонт, кость альвеолы
 - в) зуб, десна, периодонт, кость альвеолы, цемент корня зуба
 - г) зуб, связки, кость альвеолы
- 89 Для постоянного пломбирования каналов используют штифты:
- а) бумажные
 - б) гуттаперчивые
 - в) парапульпарные
 - г) анкерные
- 90 Стерилизация инструментов осуществляется способом:
- а) сухожаровым
 - б) автоклавированием
 - в) ультразвуковым
 - г) замачиванием в дезинфицирующем растворе
- 91 Методами забора материала для цитологического исследования являются:
- а) пункционный;
 - б) аспирационный;
 - в) соскоб;
 - г) все вышеперечисленное

- 92 При пломбировании корневого канала могут применяться штифты:
- а) гуттаперчивые
 - б) термофил
 - в) бумажные
 - г) анкерные
- 93 Кариес – профилактическим действием обладают:
- а) гигиенические пасты
 - б) противовоспалительные пасты
 - в) фторсодержащие пасты
 - г) отбеливающие пасты
- 94 Важные минералы, необходимые для прочности костей и зубов – это:
- а) железо
 - б) фосфор
 - в) кальций
 - г) натрий
- 95 Концентрация раствора хлоргексидина для орошения полости рта:
- а) 0,006%
 - б) 0,1%
 - в) 2%
- 96 Генеральную уборку помещений с асептическими условиями осуществляют с частотой:
- а) не реже одного раза в неделю
 - б) один раз в десять дней
 - в) один раз в месяц
 - г) один раз в 3 месяца
- 97 Основная причина внутрибольничного заражения гепатитом В и ВИЧ связана с нарушением:
- а) режима дезинфекции
 - б) режима дезинфекции и стерилизации инструментария
 - в) режима дезинфекции, стерилизации и правил пользования инструментами
 - г) правил пользования инструментарием
- 98 Дезинфекция – это уничтожение:
- а) патогенных и условно-патогенных микроорганизмов во внешней среде
 - б) всех форм живых микроорганизмов
 - в) споровых форм микроорганизмов
 - г) все выше перечисленное
- 99 Срок хранения стерильных изделий на стерильном столе:
- а) 6 часов
 - б) 3 суток
 - в) 7 дней
 - г) 12 часов
- 100 Типичным клиническим признаком флегмоны щечной области является:
- а) асимметрия лица;
 - б) гиперемия и инфильтрат щеки;
 - в) затрудненное открывание рта;
 - г) отек крыловидно-нижнечелюстной складки
- 101 Флюороз возникает при концентрации фтора в питьевой воде более:
- а) 1 мг/л;
 - б) 1,5 мг/л;
 - в) 2 мг/л;
 - г) 4 мг/л

- 102 Основные отличительные особенности композиционных материалов от других полимеров:
- а) прозрачность, цветостойкость
 - б) прочность, химическая стойкость
 - в) наличие минерального наполнителя менее 15% по массе
 - г) наличие минерального наполнителя более 30% по массе
- 103 В каком возрасте медперсонал может выполнять дезинфекционные работы:
- а) старше 18 лет;
 - б) старше 21 года;
 - в) старше 19 лет;
 - г) независимо от возраста, после инструктажа
- 104 Вирусное заболевание, проявляющееся на кайме губ:
- а) лишай;
 - б) простой герпес;
 - в) грипп;
 - г) глоссит
- 105 К эпителизирующим средствам относятся:
- а) облепиховое масло
 - б) бутадионовая мазь
 - в) Солкосерил-дентальная адгезивная паста
 - г) масляный раствор витамина А
- 106 Сестринское обследование в стоматологии включает:
- а) осмотр, термодиагностику, опрос
 - б) опрос, осмотр, перкуссию, пальпацию
 - в) рентгенографию, электроодонтометрию, биопсию
 - г) пальпацию, биопсию, электроодонтометрию
- 107 Перед бактериологическим исследованием, пациенту запрещается
- а) есть и пить
 - б) проводить другие исследования
 - в) чистить зубы и применять антибиотики
- 108 Сбор отходов класса А осуществляются в:
- а) многоразовые емкости
 - б) одноразовые пакеты белого цвета
 - в) одноразовые пакеты желтого цвета
 - г) одноразовые пакеты красного цвета
- 109 Слюноотсосы должны быть:
- а) чистые
 - б) продезинфицированные
 - в) стерильные
 - г) из упаковки
- 110 Комбинированной травмой называется:
- а) повреждение одной анатомической области в нескольких местах
 - б) повреждение разных анатомических областей одним поражающим фактором
 - в) повреждения, вызванные двумя и более факторами
 - г) лучевое поражение
- 111 Наибольшее количество кальция содержат:
- а) рыба, мясо, птица
 - б) желток яйца, печень, хлеб
 - в) молоко, сыр, зеленые овощи
 - г) молоко, рыба, фрукты

- 112 К зависимым сестринским вмешательствам при обмороке относится введение подкожно:
- а) 0,5 мл адреналина
 - б) 1 мл кордиамина
 - в) 2 мл димедрола
 - г) 2 мл эуфиллина
- 113 Гидроксид кальция входит в состав паст для пломбирования каналов с целью:
- а) стимуляции дентиногенеза
 - б) стимуляции остеогенеза
 - в) рентгеноконтрастности
 - г) снятия воспалительных явлений
- 114 Наиболее характерный клинический симптом при кариесе разных стадий – боль:
- а) самопроизвольная
 - б) сохраняющаяся, после устранения раздражителя
 - в) только в присутствии раздражителя
 - г) ночная боль
- 115 Назовите пломбировочные материалы для постоянного пломбирования кариозной полости:
- а) композиты светового отверждения
 - б) стеклоиономерный цемент
 - в) цинк-оксидэвгеноловая паста
 - г) масляный дентин
- 116 При подозрении на острое заболевание органов брюшной полости неотложная помощь включает в себя
- а) применение тепла на область наибольшей болезненности
 - б) применение холода на область наибольшей болезненности
 - в) применение анальгетиков по назначению врача
 - г) применение спазмолитиков по назначению врача
- 117 Дополнительное исследование при диагнозе кариеса:
- а) не применяется
 - б) рентгенологическое
 - в) цитологическое
 - г) функциональные пробы
- 118 Стоматологическое зеркало закреплено в оправе под углом:
- а) 150-170 градусов
 - б) 140-150 градусов
 - в) 130-140 градусов
 - г) 110-120 градусов
- 119 К минерализованным зубным отложениям относят:
- а) пелликулу
 - б) зубную бляшку
 - в) зубной камень
 - г) мягкий зубной налет
- 120 Азопирам выявляет на исследуемых изделиях наличие:
- а) крови
 - б) моющих средств
 - в) хлорсодержащих дезинфектантов
 - г) ржавчины

- 121 Дезинфекции подлежат:
- а) только изделия медицинского назначения со следами крови
 - б) все изделия медицинского назначения и предметы ухода после их применения
 - в) только изделия однократного применения со следами крови
 - г) только изделия после применения их у пациента с биологическими загрязнениями
- 122 Перечислите признаки гипергликемической комы:
- а) кожа и видимые слизистые влажные
 - б) кожа и видимые слизистые сухие
 - в) повышен тонус глазных яблок
 - г) повышен тургор кожи
- 123 Основные недостатки амальгамы:
- а) образование микроканалов в полости рта, твердость
 - б) отсутствие механической прочности и эстетики
 - в) отсутствие адгезии, теплопроводимость, амальгамирование золотых протезов
 - г) способность вызвать аллергические реакции со стороны слизистой полости рта
- 124 Пародонтит различают:
- а) локализованный
 - б) генерализованный
 - в) развившийся
 - г) в стадии обострения
- 125 Все отходы ЛПУ по степени опасности делят на:
- а) 2 класса
 - б) 3 класса
 - в) 4 класса
 - г) 5 классов
- 126 Оптимальная нормальная доза фтора в питьевой воде (в мг/л):
- а) 0,1-0,2
 - б) до 0,5
 - в) 6-7
 - г) 1
- 127 Нитроглицерин применяют в положении пациента:
- а) сидя
 - б) лежа
 - в) стоя
 - г) не имеет значение
- 128 Документ, разрешающий медицинскому учреждению осуществлять указанный в нем вид деятельности:
- а) лицензия
 - б) приказ
- 129 Профилактика флюороза включает:
- а) реминерализирующую терапию
 - б) использование герметиков
 - в) замену водоисточника
 - г) фторсодержащие таблетки
- 130 При кариесе дентина возникает боль от:
- а) температурных раздражителей
 - б) химических раздражителей (кислое, сладкое и т.д.)
 - в) постоянная
 - г) ночная боль

- 131 К местным факторам, способствующим возникновению кариеса, относится все, кроме:
- а) нарушение состава и свойств ротовой жидкости
 - б) содержание фтора в питьевой воде
 - в) углеводистых пищевых остатков
 - г) микроорганизмов зубного налета
- 132 Для временной остановки венозного наружного кровотечения применяют
- а) пальцевое прижатие артерии на протяжении
 - б) наложение жгута
 - в) максимальное сгибание конечности
 - г) наложение давящей повязки
- 133 Реминерализующую терапию проводят в виде:
- а) инъекций;
 - б) полосканий, аппликаций;
 - в) ротовых ванночек;
 - г) все выше перечисленное
- 134 Обработка рук медицинского персонала перед осмотром пациента или выполнением процедур:
- а) мытье рук с мылом
 - б) дезинфекция рук
 - в) мытье и дезинфекция рук
- 135 Наличие сообщения кариозной полости с полостью зуба определяют с помощью:
- а) бора
 - б) зонда
 - в) пинцета
 - г) экскаватора
- 136 При отсутствии одного или нескольких зубов показано протезирование:
- а) несъемным протезом
 - б) изготовлением вкладки
 - в) съемным протезом
 - г) изготовлением шинирующего протеза
- 137 Порядок обработки рук врача-стоматолога (зубного врача) после окончания приема пациента:
- а) мытье перчаток с мылом или обработка их антисептиком на руках, использование одной пары перчаток не более, чем на 5 пациентов
 - б) мытье рук с мылом и последующая обработка рук спиртосодержащим кожным антисептиком после каждого пациента
 - в) обработка рук спиртосодержащим антисептиком
 - г) если стоматолог (зубной врач) ведет прием пациента в перчатках и меняет их после каждого пациента, то руки обрабатывать не обязательно
- 138 Основным симптомом перелома нижней челюсти является:
- а) головная боль;
 - б) носовое кровотечение;
 - в) патологическая подвижность нижней челюсти;
 - г) патологическая подвижность верхнечелюстных костей
- 139 Количество инструментов для контроля качества предстерилизационной очистки:
- а) 3% от обработанной партии
 - б) 5 % от обработанной партии
 - в) 1 % от обработанной партии, но не менее 3-5 единиц
 - г) 1 инструмент

- 140 Острая дыхательная недостаточность при истинном (альвеолярном) отеке легких возникает в результате:
- а)пропотевания плазмы крови в альвеолы
 - б)попадания жидкости в альвеолы (аспирация жидкости)
 - в)пропотевания форменных элементов крови в альвеолы
 - г)бронхоспазма
- 141 К дистрофическим процессам относится:
- а)пародонтит;
 - б)пародонтоз;
 - в)гипертрофический гангивит;
 - г)десмодонтоз
- 142 Гласперленовый метод обработки боров обеспечивает:
- а)стерилизацию,
 - б)дезинфекцию,
 - в)предстерилизационную очистку,
 - г)снижение контаминации
- 143 К достоверным признакам внезапной остановки сердечной деятельности не относится:
- а)отсутствие пульса на сонных артериях
 - б)внезапная потеря сознания
 - в)отсутствие самостоятельного дыхания
 - г)отсутствие тонов сердца
- 144 Самое важное для медицинского работника в предупреждении профессионального заражения ВИЧ, гепатитами:
- а)оценить факторы риска в своей работе;
 - б)ежегодное обследование;
 - в)обследование всех пациентов;
 - г)обследование группы риска
- 145 Инфекционные заболевания, которым пациент заражается в результате получения медицинской по-мощи, а персонал в процессе профессиональной деятельности, называется:
- а)внутрибольничными
 - б)карантинными
 - в)особо опасными
 - г)конвекционными
- 146 Проницаемость эмали повышена при:
- а) кариесе эмали
 - б) флюорозе
 - в) гипоплазии
 - г) пародонтите
- 147 Использование реанимационного оборудования для пациента, находящегося в критическом состоянии, является:
- а)злоупотреблением терапевтическими средствами
 - б)реализацией принципа " борьбы за человеческую жизнь до конца"
 - в)признаком низкой квалификации специалиста
 - г)отсутствием у врача нравственного чувства и этической культуры
- 148 Резиновые перчатки стерилизуют в автоклаве при:
- а) 132° С – 2,0 кг/см – 20 мин
 - б) 120° С – 2,0 кг/см – 20 мин
 - в) 132° С – 1,1 кг/см – 45 мин
 - г) 120° С – 1,1 кг/см – 45 мин.

- 149 Гигиеническая дезинфекция рук медицинского персонала проводится раствором:
- а) хлорамина 1%
 - б) хлорамина 3%
 - в) перекиси водорода 6%
 - г) этилового спирта 70%
- 150 Протеолитические ферменты используются при:
- а) гноетечении
 - б) некрозе десны
 - в) кровоточивости десны
 - г) ретракции десны
- 151 К композитным пломбировочным материалам химического отверждения относятся:
- а) Белокор, Уницем
 - б) Консайз, Дегуфил
 - в) Лайф, Кавалайт
 - г) Силицин, силидонт
- 152 Чувствительность организма пожилых людей к лекарствам:
- а) повышается
 - б) снижается
 - в) увеличивается
 - г) не изменяется
- 153 Воспаление надкостницы альвеолярных отростков верхней или нижней челюсти инфекционного или травматического происхождения сопровождающееся сильной болью и опуханием десны - это:
- а) периостит
 - б) периодонтит
 - в) кариес
 - г) пульпит
- 154 К эндодонтическим инструментам относятся:
- а) зонд
 - б) файлы
 - в) гладилка
 - г) каналонаполнитель
- 155 Наконечники стоматологической установки:
- а) обрабатывают двукратно, дезинфицирующим раствором разрешенным для этой цели
 - б) стерилизуют в растворе «Сайдекс»
 - в) обрабатывают моющим раствором на основе перекиси водорода
 - г) протирают хлоргексидином
- 156 Микротвердость эмали при кариесе в стадии пятна:
- а) снижается
 - б) повышается
 - в) не изменяется
 - г) зависит от распространенности процесса
- 157 Эндодонтическим инструментарием не является:
- а) бор
 - б) дрельбор
 - в) пульпоэкстрактор
 - г) рашпиль

- 158 После генеральной уборки хирургического кабинета бактерицидный облучатель включается:
- а) на 30 минут;
 - б) на 1 час;
 - в) на 2 часа;
 - г) на 45 минут
- 159 От раствора глюконата кальция проницаемость эмали:
- а) повышается
 - б) понижается
 - в) не изменяется
 - г) зависит от дозировки
- 160 Для лечения гиперестезии твердых тканей зуба при пародонтозе используют:
- а) противовоспалительные зубные пасты;
 - б) фтор и кальцийсодержащие зубные пасты;
 - в) солевые зубные пасты;
 - г) отбеливающие пасты
- 161 Особенности стоматологического пинцета:
- а) на рабочей поверхности имеются продольные насечки
 - б) рабочая часть изогнута под углом к оси пинцета
- 162 Сестринское обследование пациента начинают с выяснения:
- а) жалоб
 - б) причины потери зубов
 - в) наличия системных профессиональных вредностей
 - г) наличия системных заболеваний
- 163 Обязательно пальпируется бимануально:
- а) щечная область
 - б) дно полости рта
 - в) уздечка языка
 - г) преддверие полости рта
- 164 Процессы ионного обмена, минерализацию и реминерализацию в эмали обеспечивает:
- а) микротвердость
 - б) проницаемость
 - в) растворимость
 - г) разрушенность
- 165 Мазок со слизистой зева для посева на дифтерию берется с участков:
- а) свободных от налета;
 - б) покрытых налетом;
 - в) граничащих между налетом и свободной от него тканью;
 - г) со всей слизистой
- 166 Инструментарий однократного применения перед утилизацией:
- а) стерилизуют
 - б) дезинфицируют
 - в) промывают водой
 - г) протирают спиртом
- 167 Рабочий раствор азопирама пригоден в течение:
- а) 30 минут;
 - б) 2-х часов;
 - в) 5-6 часов;
 - г) 12 часов

- 168 Длительность болевого синдрома при типичном инфаркте миокарда:
- а) не более 5-10 минут
 - б) не более 30 минут
 - в) не более 1 часа
 - г) от 30 минут до нескольких часов и даже суток
- 169 На первом этапе предстерилизационной обработки медицинских изделий производят:
- а) ополаскивание инструментов под струей воды
 - б) замачивание инструментов в дезинфицирующем растворе
 - в) сушку инструментов на воздухе
 - г) ополаскивание дистиллированной водой
- 170 Показатели гемодинамики у пациентов с травматическим шоком
- а) брадикардия, АД снижено
 - б) тахикардия, АД снижено
 - в) аритмия, АД снижено
 - г) тахикардия, АД повышено
- 171 Классификация острых травм зубов:
- а) ушиб зуба
 - б) вывих зуба
 - в) перелом зуба
 - г) все выше перечисленное
- 172 Возникает ли флюороз у взрослых людей, употребляющих длительное время питьевую воду с повышенным содержанием фтора:
- а) да
 - б) нет
 - в) иногда
 - г) все выше перечисленное
- 173 Гипергликемическая и гипогликемическая кома развивается при:
- а) сердечно-легочной недостаточности
 - б) при сахарном диабете
 - в) при острой почечной недостаточности
 - г) при острой печеночной недостаточности
- 174 Герметизация фиссур проводится после прорезывания зубов:
- а) в течение года
 - б) через 2 года
 - в) через 5 лет
 - г) возраст не зависит
- 175 Неотложная помощь при вывихе сустава:
- а) вправить сустав
 - б) иммобилизовать сустав
 - в) наложить тугую повязку
- 176 Уровень минерализации эмали зубов с возрастом:
- а) увеличивается
 - б) снижается
 - в) остается без изменения
 - г) возраст и минерализация не связаны между собой
- 177 Осмотр полости рта медицинская сестра должна начинать с:
- а) осмотра языка
 - б) собственно с полости рта
 - в) преддверия полости рта
 - г) осмотра дна полости рта

- 178 Ранняя первичная хирургическая обработка производится:
- а) до 24 часов с момента нанесения раны
 - б) в течение 24-48 часов
 - в) до 48 часов
 - г) до 12 часов
- 179 Реминерализующую терапию следует проводить при:
- а) кариесе дентина
 - б) кариесе эмали
 - в) кариесе цемента
 - г) кариесе корня
- 180 Генеральная уборка терапевтических кабинетов проводится в:
- а) 1 раз в 3 дня
 - б) 1 раз в 7 дней
 - в) 1 раз в 10 дней
 - г) 1 раз в месяц
- 181 В России трансплантация может проводиться без согласия донора, если донор:
- а) особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение
 - б) гражданин страны, находящейся в состоянии войны с Россией
 - в) психически неполноценный
 - г) донор — умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов
- 182 Метод витального окрашивания выявляет очаги деминерализации эмали при:
- а) эрозии эмали
 - б) кариесе эмали
 - в) гипоплазии
 - г) флюорозе
- 183 Правильным определением этики как науки является:
- а) этика - наука об отношении живых существ между собой
 - б) этика - наука о природе и смысле моральных взаимоотношений и нравственных принципов
 - в) этика - наука о минимизировании зла в человеческих отношениях
 - г) этика - наука об умении правильно себя вести в обществе
- 184 Метод удаления зубных отложений:
- а) механический;
 - б) аппаратный;
 - в) химический;
 - г) все вышеперечисленное
- 185 Препарат для ингаляционного наркоза
- а) новокаин
 - б) сомбревин
 - в) тримексин
 - г) фторотан
- 186 При заболеваниях пульпы или периодонта проводят:
- а) удаление зуба
 - б) реминерализацию
 - в) реставрацию
 - г) эндодонтическое лечение

- 187 Десна состоит из:
- а) эпителия и надкостницы
 - б) собственного слоя (пластинки) слизистой оболочки
 - в) многослойного плоского эпителия
 - г) эпителия и собственного слоя (пластинки) слизистой оболочки
- 188 Стоматологические зеркала стерилизуют при комнатной температуре в:
- а) 6% растворе перекиси водорода, 180 мин
 - б) 6% растворе перекиси водорода, 360 мин
 - в) 3% растворе перекиси водорода, 360 мин.
 - г) 70% спирте, 180 мин.
- 189 Бессимптомное течение наиболее характерно для кариеса:
- а) в стадии пятна
 - б) поверхностного кариеса
 - в) среднего кариеса
 - г) глубокого кариеса
- 190 При недостатке витамина А наблюдается:
- а) пародонтоз
 - б) цинга
 - в) невриты
 - г) куриная слепота
- 191 Эффективность стоматологического просвещения зависит от:
- а) уровня здоровья населения
 - б) распространенности и интенсивности заболеваний пародонта среди населения
 - в) мотивации индивидуумов к сохранению стоматологического здоровья
 - г) распространенности и интенсивности кариеса среди населения
- 192 Подбородок при одностороннем вывихе височно-нижнечелюстного сустава смещается:
- а) в противоположную сторону
 - б) не смещается
 - в) в одноименную сторону
 - г) вперед
- 193 Для осмотра полости рта используют:
- а) зеркало
 - б) зонд
 - в) пинцет
 - г) экскаватор
- 194 Материалам для пломбирования каналов антисептические свойства придает:
- а) оксид бария
 - б) белая глина
 - в) йодоформ
 - г) оксид цинка
- 195 Система мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей заболеваний во внешней среде, называется:
- а) антисептика;
 - б) асептика;
 - в) дезинфекция;
 - г) дератизация
- 196 Эмалевая призма основным структурным элементом:
- а) является
 - б) не является

- 197 С помощью экскаватора:
- а) вносят в полость лекарственные вещества
 - б) уплотняют пломбировочный материал, удаляют временные пломбы
 - в) удаляют размягченный дентин, зубной камень, временные пломбы
 - г) формируют пломбировочный материал, удаляют размягченный дентин
- 198 Для изолирующих прокладок используют цементы:
- а) бактерицидные, силикофосфатные, эвгенатные
 - б) цинкоксиэвгенольные, бактерицидные, силикатные
 - в) цинкофосфатные, силикатные, поликарбоксилатные
 - г) поликарбоксилатные, цинк-фосфатные, стеклоиономерные
- 199 Обработка инъекционного поля проводится раствором:
- а) перекиси водорода 3%
 - б) хлорамина 3%
 - в) фурациллина
 - г) этилового спирта 70%
- 200 К некариозным поражениям зубов, возникших после прорезывания, относятся:
- а) патологическое истирание
 - б) флюороз
 - в) клиновидный дефект
 - г) гипоплазия
 - д) все перечисленное верно
- 201 Многоразовый медицинский инструментарий после использования должен пройти следующие этапы обработки:
- а) дезинфекцию
 - б) предстерилизационную очистку
 - в) стерилизацию
 - г) все перечисленное выше
- 202 Причины, провоцирующие рак языка:
- а) курение и злоупотребление алкогольными напитками
 - б) механические травмы, раздражение
 - в) вирусные заболевания и дисбактериоз ротовой полости
 - г) все выше перечисленное
- 203 Анестетики, применяемые у пациентов с артериальной гипертензией:
- а) лидокаин 2% без адреналина
 - б) Ультракаин DS forte
 - в) Ультракаин DS
 - г) Скандонест
- 204 Главные пути передачи ВБИ в амбулаторно–поликлинических учреждениях:
- а) пищевой
 - б) контактно – бытовой
 - в) инструментальный
 - г) водный
- 205 При двустороннем вывихе височно-нижнечелюстного сустава положение нижней челюсти смещено:
- а) вперед;
 - б) в сторону повреждения;
 - в) в здоровую сторону;
 - г) не смещен

- 206 Кариозные полости выявляются с помощью:
- а) пинцета
 - б) гладилки
 - в) зонда
 - г) экскаватора
- 207 Текущая уборка кабинета проводится не менее:
- а) 1 раз в день перед началом работы
 - б) 2 раза в день
 - в) 2 раза в смену
 - г) 3 раза в сутки
- 208 Пациента с кровопотерей транспортируют в положении
- а) лежа на спине
 - б) лежа на боку
 - в) лежа с приподнятым ножным концом
 - г) лежа с приподнятым головным концом
- 209 Для остановки кровотечения из канала после экстирпации пульпы медицинская сестра должна подготовить:
- а) ваготил
 - б) 21% сульфатное железо
 - в) жидкость фасфат-цемента
- 210 Диагностическим инструментарием не является:
- а) зеркало;
 - б) зонд;
 - в) пинцет;
 - г) карборундовая головка
- 211 Основные недостатки акриловых пластмасс:
- а) трудность делирования, хорошая адгезия
 - б) химическая неустойчивость, большая водопоглощаемость
 - в) недостаточная механическая прозрачность, остаточный мономер
 - г) несовпадение коэффициентов термического расширения пластмасс и тканей зуба, значительная усадка, остаточный мономер
- 212 Вирус простого герпеса 1 типа вызывает:
- а) генитальный герпес
 - б) инфекционный мононуклеоз
 - в) герпес на губах и коже лица
 - г) опоясывающий лишай у взрослых
- 213 Корень зуба – это:
- а) часть зуба, покрытая эмалью
 - б) часть зуба, покрытая цементом
- 214 При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины взрослого должна быть:
- а) 1-2 см;
 - б) 6-8 см;
 - в) 2-4 см;
 - г) 4-5 см
- 215 Для работы в корневых каналах используется инструментарий:
- а) внутриканальный
 - б) эндодонтический
 - в) хирургический

- 216 На доврачебном этапе (при отсутствии ЭКГ) можно думать о начавшемся инфаркте миокарда, если приступ стенокардии не купируется приемом нитроглицерина в течение:
- а) 20 - 30 минут
 - б) 30 минут – 1 часа
 - в) 1,5 – 2 часа
 - г) суток
- 217 Частота искусственных вдохов при ИВЛ у взрослых должна быть:
- а) 4-5 в минут
 - б) 30-40 в минуту
 - в) 50-70 в минуту
- 218 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие пульса на:
- а) локтевой артерии
 - б) лучевой артерии
 - в) сонной артерии
 - г) бедренной артерии
- 219 После стерилизации боры и инструменты для эндодонтии хранят в предварительно стерилизованных боксах в течении (время в часах):
- а) 6
 - б) 12
 - в) 24
 - г) 48
- 220 Эталонным фоном в стоматологии принято считать:
- а) белый;
 - б) зелёный;
 - в) голубой;
 - г) серый
- 221 Металлический стоматологический инструментарий стерилизуют в сухожаровом шкафу при:
- а) $t\ 180^{\circ}\text{C} - 45\text{ мин}$
 - б) $t\ 160^{\circ}\text{C} - 60\text{ мин}$
 - в) $t\ 180^{\circ}\text{C} - 60\text{ мин}$
 - г) $t\ 160^{\circ}\text{C} - 90\text{ мин.}$
- 222 Ототоксическими антибиотиками являются:
- а) пеницилин
 - б) эритромицин
 - в) стрептомицин
 - г) мономицин
- 223 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:
- а) две
 - б) три
 - в) четыре
 - г) пять
- 224 Сроки прорезывания нижних клыков (постоянные зубы):
- а) 5-7 лет
 - б) 8-10 лет
 - в) 10-12 лет

- 225 Противовирусные препараты и мази назначают:
- а) в первые 2-4 дня заболевания
 - б) на 5-7 день заболевания
 - в) в период ремиссии
 - г) на всем протяжении заболевания
- 226 Для лечения молочницы применяются препараты:
- а) антибиотики
 - б) противогрибковые
 - в) гормональные
 - г) сульфаниламиды
- 227 Предметы ухода за пациентом и оборудование подлежат:
- а) дезинфекции
 - б) предстерилизационной очистке
 - в) стерилизации
 - г) все выше перечисленное
- 228 Помощь при обмороке включает:
- а) подачу кислорода и покой
 - б) уложить с приподнятым головным концом, дать нашатырный спирт
 - в) уложить с приподнятым ножным концом, обеспечить приток свежего воздуха
 - г) прием настойки пустырника
- 229 Уровень гигиены полости рта пациента определяется индексом:
- а) КПУ – интенсивность кариеса постоянных зубов
 - б) индексом гигиены
 - в) ПМА индекс гингивита
 - г) стоматологический эстетический индекс
- 230 Пасты, применяемые для пломбирования проходных корневых каналов зубов:
- а) цинкфосфатно-эвгеноловая
 - б) эндаметазонозная
 - в) силеры
 - г) стеклоиономерный цемент
- 231 Диета, рекомендуемая при остром кариесе:
- а) богатая углеводами пища
 - б) однородная мясная пища
 - в) с достаточным содержанием белков, солей, витаминов
 - г) богатая белками пища
- 232 Подвижности зубов определяют:
- а) зондом
 - б) пинцетом
 - в) зеркалом
 - г) гладилкой
- 233 С помощью зубной щетки и зубной пасты удаляют:
- а) пелликулу
 - б) зубной налет
 - в) зубной камень
 - г) налет «курильщика»
- 234 Расстояние между центральными резцами при нормальном открывании рта:
- а) 1 см
 - б) 5 см
 - в) 8 см

- 235 Столкновение интересов двух или нескольких людей называется:
- а) конфликтом
 - б) стрессом
 - в) переговорами
- 236 Причина эндемического флюороза:
- а) недостаток кальция в организме ребенка
 - б) инфекционное заболевание ребенка
 - в) повышенное содержание фтора в питьевой воде
 - г) недостаток фтора в организме матери
- 237 Для костной ткани детей характерно:
- а) бедность минеральными веществами
 - б) большое количество эластических волокон
 - в) бедность кровеносными сосудами
 - г) большое количество нервных волокон
- 238 Антигистаминными препаратами являются все, кроме:
- а) диазолина;
 - б) пипольфена;
 - в) супрастина;
 - г) азатиоприна
- 239 Ведущие факторы передачи ВИЧ-инфекции и гепатита «В», «С» - это:
- а) слезы и слюна;
 - б) кровь и инструменты;
 - в) руки персонала;
 - г) предметы ухода
- 240 Для стадии СПИД ВИЧ-инфекции наиболее характерны заболевания:
- а) висцеральный кандидоз пищевода, трахеи, легких;
 - б) пневмоцистная пневмония;
 - в) ангина;
 - г) бронхит
- 241 Прижизненное иссечение тканей или органов для микроскопического исследования с диагностической целью:
- а) перкуссия
 - б) биопсия
 - в) диатермокоагуляция
 - г) пальпация
- 242 Материал для гистологического исследования помещается в раствор:
- а) 40% р-р формалина;
 - б) 15% р-р формалина;
 - в) 96% р-р этилового спирта;
 - г) 70% р-р этилового спирта
- 243 К осложнениям, возникающим непосредственно после операции удаления зуба, относятся:
- а) паротит;
 - б) кровотечение;
 - в) невралгия тройничного нерва;
 - г) артрит височно-нижнечелюстного сустава

- 244 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта в условиях поликлиники с момента обращения пациента до полного выздоровления возможно в течении:
- а) 14 дней
 - б) 21 день
 - в) 1 месяц
 - г) 10 дней
- 245 Пломбировочные материалы, применяемые для заполнения корневых каналов совместно с гуттаперчей:
- а) АН-26
 - б) Сиалапекс
 - в) АН-плюс
 - г) эндометазоновая паста
- 246 В состав стеклоиономерных цементах входят
- а) малеиновая кислота, стекло, красители
 - б) ортофосфатная кислота, окись цинка, красители
 - в) полиакриловые кислоты, стекло, ионы серебра, золота
 - г) полиакриловая кислота, порошок цинк-фосфатных цементах, ионы платины
- 247 Изолирующие материалы готовятся из цементах:
- а) цинкфосфатного
 - б) стеклоиономерного
 - в) силикатного
 - г) силикофосфатного
- 248 Все молочные зубы должны прорезаться к:
- а) 1,5 годам
 - б) 2 годам
 - в) 3 годам
 - г) 4 годам
- 249 Гипогликемическая кома развивается при:
- а) нормальной концентрации сахара в крови;
 - б) значительном повышении нормы сахара в крови;
 - в) значительном снижении нормы сахара в крови;
 - г) нормальной концентрации сахара в крови и повышении концентрации калия
- 250 Для детей 6 лет в качестве средства гигиены следует рекомендовать:
- а) зубной порошок
 - б) фторидсодержащие зубные пасты
 - в) гигиенические зубные пасты
 - г) гелевые пасты
- 251 Карпульные шприцы (в конце рабочей смены):
- а) только дезинфицируют
 - б) только дезинфицируют и стерилизуют
 - в) проводят дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию
 - г) не обрабатывают
- 252 Ведущим фактором передачи гнойно-септической инфекции является:
- а) кровь
 - б) инструменты
 - в) предметы ухода
 - г) руки персонала

- 253 Показанием к наложению окклюзионной повязки является
- а) ранение груди
 - б) гемоторакс
 - в) закрытые переломы ребер
 - г) ушибы грудной клетки
- 254 Время замешивания цинкофосфатных цемента не должно превышать:
- а) 30-40 сек
 - б) 50-60 сек.
 - в) 60-90 сек.
 - г) 100-120 сек
- 255 К осложнениям, возникающим непосредственно после операции удаления зуба, относятся:
- а) паротит
 - б) кровотечение
 - в) невралгия тройничного нерва
 - г) артрит височно-нижнечелюстного сустава
- 256 При влажных поверхностях помещения эффективность УФО:
- а) возрастает
 - б) не изменяется
 - в) снижается
 - г) увеличивается
- 257 Антидоты мышьяка:
- а) бром
 - б) йодинол
 - в) метронидазол
 - г) унитиол
- 258 Подготовка к операции цистэктомии включает пломбирование канала зуба:
- а) "причинного" зуба;
 - б) всех зубов челюсти;
 - в) зубов-антагонистов;
 - г) всех зубов, корни которых обращены в полость кисты
- 259 Время экспозиции медицинского инструментария в моющем растворе для предотвращения фиксации белковых загрязнений:
- а) 30 минут
 - б) 20 минут
 - в) 15 минут
 - г) 60 минут
- 260 Генеральная уборка стоматологических кабинетов хирургического профиля проводится:
- а) раз в 7 дней
 - б) раз в 14 дней
 - в) раз в месяц
 - г) раз в 3 месяца
- 261 Полное уничтожение микроорганизмов и их спор на инструментарии и белье достигается при:
- а) дезинфекции
 - б) предстерилизационной очистке
 - в) стерилизации
 - г) все выше перечисленное

- 262 При лечении глубокого кариеса применяют:
- а) фосфат-цемент
 - б) пасту с антибиотиками
 - в) пасты с гидратом окиси кальция
- 263 ПРО-Файлы относятся к инструментам:
- а) хирургическим
 - б) эндодонтическим
 - в) пародонтологическим
 - г) для препарирования кариозных полостей
- 264 После химической стерилизации изделие следует промыть водой:
- а) кипячёной
 - б) стерильной
 - в) водопроводной
 - г) дистиллированной
- 265 Пародонт включает следующие ткани:
- а) десну;
 - б) надкостницу и костную ткань альвеолы;
 - в) периодонт;
 - г) все вышеперечисленное
- 266 Частота смены маски при карантине по гриппу в учреждениях здравоохранения каждые:
- а) 1 час
 - б) 2-3 часа
 - в) 3-4 часа
 - г) 6 часов
- 267 Реминерализующая терапия, предполагает поступление в очаг деминерализации веществ:
- а) минеральных
 - б) органических
 - в) химических
 - г) неорганических
- 268 Для обнаружения наличия щелочных компонентов моющего раствора на изделиях медицинского назначения после предстерилизационной очистки используется проба:
- а) фенолфталеиновая
 - б) азопирамовая
 - в) амидопириновая
 - г) все выше перечисленное
- 269 После изготовления и наложения съёмного протеза проведение коррекции протеза:
- а) обязательно
 - б) не обязательно
 - в) по желанию пациента
 - г) через 1 месяц
- 270 Для заполнения корневых каналов с помощью гуттаперчевых штифтов используются пасты:
- а) фосфат - цемент
 - б) эндометамоновая
 - в) цинкэвгеноловая

- 271 При экспираторной одышке:
- а) затруднен вдох
 - б) затруднен выдох
 - в) затруднен и вдох, и выдох
 - г) меняется только частота дыхания
- 272 Один из ведущих симптомов перелома челюсти:
- а) нарушение прикуса
 - б) кровотечение из десны
 - в) околочелюстная гематома
 - г) смещение подбородка
- 273 Гладилки бывают:
- а) только односторонние
 - б) только двусторонние
 - в) односторонние, двусторонние
 - г) односторонние, двусторонние и комбинированные со штопфером
- 274 Сроки закладки зачатков молочных зубов:
- а) 5-6 неделя внутриутробного развития
 - б) 6-7 неделя внутриутробного развития
 - в) конец второй половины беременности
 - г) сразу после рождения
- 275 Клинические признаки хронического катарального гингивита:
- а) кровоточивость дёсен
 - б) гиперемия дёсен
 - в) наддесневой зубной камень
 - г) пародонтальные карманы до 5 мм
- 276 Частота проведения генеральной уборки в процедурных и перевязочных кабинетах:
- а) 1 раз в 3 дня;
 - б) 1 раз в 7 дней;
 - в) 1 раз в 10 дней;
 - г) 1 раз в месяц
- 277 Генеральная уборка в стоматологическом кабинете проводится: а) ежедневно:
- а) ежедневно
 - б) 1 раз в неделю
 - в) 1 раз в месяц
 - г) 1 раз в квартал
- 278 Дезинфекция – это комплекс мер направленных на:
- а) уничтожение возбудителей инфекционных болезней в окружающей человека среде
 - б) уменьшение количества возбудителей во внешней среде
 - в) уничтожение членистоногих
 - г) уничтожение грызунов
- 279 Характеристика состояния при гипергликемической коме:
- а) кожа влажная, гиперемирована, зрачки умеренно расширены (или в норме), глазные яблоки нормальные;
 - б) кожные покровы обычного цвета, сухие, зрачки узкие, глазные яблоки мягкие;
 - в) кожные покровы обычные, зрачки расширены, глазные яблоки обычные, влажность обычная;
 - г) кожа влажная, зрачки расширены

- 280 Необоснованность эвтаназии с медицинской точки зрения определяется:
- а) шансом на выздоровление и возможностью изменения решения пациента
 - б) нарушением предназначения спасать и сохранять человеческую жизнь
 - в) нарушением моральной заповеди “не убий”
 - г) всеми перечисленными факторами
- 281 Растворы эритрозина, фуксина, Люголя применяют для:
- а) определения индекса гигиены
 - б) определения пародонтологического индекса (СРІТN)
 - в) контроля чистки зубов
 - г) определения КПУ
- 282 Традиционно используемые дезинфектанты уничтожают ВИЧ через:
- а) 1 минуту
 - б) 5 минут
 - в) 10 минут
 - г) 30 минут
- 283 Укажите максимальное время наложения артериального жгута летом:
- а) 30 минут – 1 час
 - б) 1,5 часа – 3 часа
 - в) 1,5 – 2 часа, при необходимости через 2 минуты ещё 30 минут
 - г) 1 час – 1,5 часа
- 284 Для воздействия на воспалительный очаг в области корня зуба в каналы вносят:
- а) гуттаперчу
 - б) колласепт
- 285 Суточная потребность человека в фосфоре составляет:
- а) 1,5 -2 гр
 - б) 3- 4 гр
 - в) 5 мкг
 - г) 10 гр
- 286 Дефект слизистой оболочки полости рта в пределах эпителиального слоя - это:
- а) эрозия;
 - б) язва;
 - в) фистула;
 - г) везикула
- 287 Предстерилизационная очистка проводится с целью удаления:
- а) белковых, жировых и лекарственных загрязнений
 - б) микроорганизмов
 - в) крови
 - г) дезинфектанта
- 288 Стоматит- это:
- а) заболевание десны
 - б) заболевание корня
 - в) воспаление слизистой оболочки полости рта
- 289 Перед цитологическим исследованием медицинская сестра рекомендует:
- а) тщательно почистить зубы
 - б) санировать полость рта
 - в) обильно прополоскать рот водой

- 290 Первичная доврачебная помощь при ожогах II степени:
- а)наложение мажевой повязки
 - б)наложение сухой асептической повязки
 - в)обработки спиртом и наложение мажевой повязки
 - г)вскрытие пузыря и наложение асептической повязки
- 291 При коллапсе давление:
- а)снижается систолическое до 80-50 мм рт.ст.
 - б)кратковременно повышается с последующим прогрессивным его снижением
 - в)не изменяется
 - г)снижается систолическое до 90 мм рт. ст.
- 292 Протравливание эмали проводится для усиления:
- а) бактерицидных свойств композита
 - б) краевого прилегания композитов
 - в) антисептического воздействия композита на пульпу
 - г) связи «пломба-зуб»
- 293 Источником инфекции может быть:
- а)больной человек
 - б)пищевые продукты
 - в)предметы ухода
 - г)санитарно-гигиеническое оборудование
- 294 При попадании биологических жидкостей пациента на слизистые рта, немедленно прополоскать:
- а)30 % р-ром сульфацила натрия
 - б)0,025 % р-ром перманганата калия
 - в)3 % р-ром хлорамина
 - г)обильно водой, потом 70%-м спиртом
- 295 Клиническая коронка зуба – это:
- а) часть зуба, покрытая эмалью
 - б) часть зуба, которая выступает над десной
- 296 Сроки прорезывания центральных резцов на нижней челюсти (молочные зубы):
- а) 1-2 мес
 - б) 3-9 мес
 - в) 7-11 мес
 - г) 10-14 мес
- 297 Рабочий раствор азопирама предназначен для контроля качества:
- а)дезинфекции изделий медицинского назначения
 - б)стерильности изделий медицинского назначения
 - в)предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения
 - г)обработки рук персонала
- 298 Концентрация этилового спирта для обработки инъекционного поля на коже:
- а)96%
 - б)50%
 - в)70%
 - г)40%
- 299 Виды обезболивания, применяемые в стоматологической поликлинической практике:
- а)аппликационный
 - б)инфильтрационный
 - в)проводниковый
 - г)все выше перечисленные

300 При подозрении на злокачественную опухоль челюстно-лицевой области пациента необходимо направить:

- а) к районному онкологу
- б) к специалисту-радиологу
- в) к участковому терапевту
- г) к хирургу общего профиля