

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

**(для медицинских сестёр палатных терапевтических отделений, прошедших обучение
по циклам «Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование»,
профессиональной переподготовки по специальности «Сестринское дело»)**

- 1 К диспепсическому синдрому относятся:
 - а) изжога, тошнота, рвота
 - б) метеоризм
 - в) запор, диарея
 - г) боль в эпигастрии
 - д) икота
 - е) боль внизу живота
- 2 Основным симптомом анафилактического шока является:
 - а) аллергические высыпания на коже
 - б) нарушение дыхания
 - в) падение АД
 - г) отсутствие пульсации на периферических артериях
- 3 Кашель с розовой мокротой, kloкочущее дыхание развиваются при:
 - а) легочном кровотечении
 - б) отеке легких
 - в) сердечной астме
 - г) бронхиальной астме
- 4 Признаками какого состояния будут симптомы: кинжальная боль в животе, резкая слабость, падение АД:
 - а) желудочного кровотечения
 - б) прободной язвы
 - в) острого гастрита
 - г) острого холецистита
- 5 Препарат из группы ингибиторов протонной помпы обкладочных клеток
 - а) гастроцепин
 - б) ранитидин
 - в) фамотидин
 - г) омепразол
- 6 Правильное положение пациента с носовым кровотечением:
 - а) сидя, запрокинув голову
 - б) горизонтальное положение на спине
 - в) сидя, слегка наклонив голову вперед
 - г) лежа с валиком под лопатки
- 7 Гломерулонефрит – заболевание:
 - а) аллергической природы
 - б) инфекционной природы
 - в) инфекционно-аллергической природы
 - г) врожденное с наследственной предрасположенностью

- 8 По цели постановки различают следующие виды клизм:
- а) очистительные
 - б) лечебные
 - в) питательные
 - г) капельные
 - д) масляные
 - е) послабляющие
- 9 Сестринское вмешательство при острой сердечной недостаточности:
- а) наложить венозные жгуты на конечности
 - б) ввести сердечные гликозиды
 - в) создать положение сидя или полусидя с опорой на спину
 - г) дать увлажненный кислород
 - д) наложить артериальные жгуты на конечности е) придать положение лежа на спине с приподнятым ножным концом
- 10 На первом месте по частоте смертности среди заболеваний стоят:
- а) болезни почек
 - б) онкологические заболевания
 - в) сердечно-сосудистые заболевания
 - г) нервные заболевания
- 11 Забор растворов лекарственных препаратов в шприц для «лежачих» больных должен производиться:
- а) в процедурном кабинете
 - б) на посту медицинской сестры
 - в) у постели больного
 - г) там, где удобно медицинской сестре
- 12 Все отходы ЛПУ по степени опасности делят на:
- а) 2 класса
 - б) 3 класса
 - в) 4 класса
- 13 К общим аллергическим реакциям относят:
- а) крапивницу
 - б) ангионевротический отек
 - в) анафилактический шок
 - г) синдром Лайелла
 - д) поллиноз
- 14 Приступ печеночной колики является клиническим проявлением:
- а) острого холецистита
 - б) хронического холецистита
 - в) хронического калькулезного холецистита
 - г) гепатита
- 15 Для анализа мочи на глюкозурию моча собирается:
- а) утром 100 – 150 мл
 - б) утром 50 – 100 мл моча из средней порции струи
 - в) 24 часа, перемешивается, измеряется, отливается 150 - 200 мл на анализ
 - г) за 24 часа, 8 порций

- 16 При исследовании кала на копрологию рекомендуют:
- а) ограничить мясную пищу, рыбу
 - б) ограничить грубую клетчатку
 - в) максимально разнообразную диету
 - г) брать кал на анализ из разных мест каловых масс
 - д) достаточно взять кал с одного места каловых масс
- 17 Что характерно для кишечного кровотечения:
- а) частая рвота с прожилками неизмененной крови
 - б) рвота цвета «кофейной гущи»
 - в) дегтеобразный стул
 - г) редкий пульс
- 18 Симптомы, характерные для декомпенсации сахарного диабета:
- а) боли в коленных суставах, лихорадка, озноб
 - б) потливость, мелькание мушек перед глазами, головокружение в) сухость во рту, жажда, полиурия, высокий уровень сахара в крови
 - г) тремор мышц, низкий уровень сахара в крови
- 19 При одновременном приеме 2-х и более пероральных лекарств пациент должен принять их:
- а) сразу все вместе
 - б) с интервалом в 1 минуту
 - в) с интервалом в 5 минут
 - г) с интервалом в 15 минут
- 20 Хранить в холодильнике необходимо следующие лекарственные вещества:
- а) препараты инсулина
 - б) 0,1% раствор адреналина гидрохлорида
 - в) интерферон
 - г) церукал
 - д) баралгин
 - е) кларитин
- 21 Типы физиологического дыхания:
- а) везикулярное
 - б) поверхностное
 - в) грудное
 - г) брюшное
 - д) диафрагмальное
 - е) смешанное
- 22 Продолжительность гигиенической ванны должна быть (время в минутах):
- а) 10
 - б) 15
 - в) 20–25
 - г) 25–30
- 23 Основным методом обследования, позволяющий подтвердить диагноз пневмонии:
- а) бронхоскопия
 - б) рентгенография
 - в) томография
 - г) спирометрия

- 24 Причина развития эндемического зоба
- а) вирусная инфекция
 - б) переохлаждение
 - в) инсоляция
 - г) недостаточное количество йода в пище
- 25 Пиелонефрит – это:
- а) воспаление мочеиспускательного канала
 - б) инфекционно – воспалительный процесс чашечно-лоханочной системы
 - в) воспалительный процесс в почечных клубочках
 - г) воспалительный процесс мочевого пузыря
- 26 После ингаляции бронхоспазмолитического средства из баллончика - ингалятора следует
- а) резко выдохнуть
 - б) медленно выдохнуть
 - в) задержать дыхание на 10 с, затем выдохнуть
 - г) задержать дыхание на 5 с
- 27 Осложнение бронхиальной астмы:
- а) пневмосклероз
 - б) эмфизема легких
 - в) хронический обструктивный бронхит
 - г) крупозная пневмония
- 28 При составлении плана ухода за пациентами с ИБС, медсестра должна порекомендовать:
- а) соблюдать диету
 - б) отказаться от курения
 - в) принимать сердечные гликозиды, нитросорбит
 - г) прогулки на свежем воздухе
 - д) интенсивную физическую нагрузку
 - е) сан-кур лечение в летний период
- 29 К проявлениям гипогликемического состояния относится все, кроме
- а) влажных кожных покровов
 - б) резкой слабости, тремора конечностей
 - в) сухости кожи
 - г) чувства голода
- 30 Сестринское вмешательство при остром панкреатите:
- а) сделать анальгетики и вызвать врача
 - б) положить холод на живот, вызвать врача
 - в) ввести газоотводную трубку, вызвать врача
 - г) поставить очистительную клизму, вызвать врача
- 31 При классической форме ревматоидного полиартрита чаще поражаются суставы:
- а) коленные
 - б) тазобедренные
 - в) плечевые
 - г) мелкие суставы кистей и стоп
- 32 При остром гломерулонефрите постельный режим назначают
- а) до нормализации температуры тела
 - б) до исчезновения боли в поясничной области
 - в) до нормализации анализов мочи
 - г) до исчезновения отеков и нормализации АД

- 33 Сыпь, характерная для крапивницы:
- а) буллезная
 - б) папулезная
 - в) уртикарная
 - г) мелкоточечная
- 34 Приоритетная проблема пациента при хроническом энтерите:
- а) боль в околопупочной области
 - б) снижение аппетита;
 - в) похудание
 - г) метеоризм
- 35 Желтуха развивается вследствие:
- а) увеличения в крови билирубина
 - б) употребления большого количества моркови
 - в) терапии акрихином
 - г) уменьшения в крови гемоглобина
- 36 Возбудителем туберкулёза является:
- а) пневмококк
 - б) палочка Коха
 - в) палочка Леффлера
 - г) стрептококк
- 37 Фармакотерапия, направленная на устранение отдельных признаков болезни называется:
- а) патогенетическая
 - б) этиотропная
 - в) симптоматическая
 - г) заместительная
- 38 Патологические типы дыхания:
- а) Квинке
 - б) Куссмауля
 - в) Чейна – Стокса
 - г) Джексона
 - д) Потена
 - е) Биота
- 39 К триаде симптомов, наиболее характерных для ХОБЛ, относятся:
- а) выделение мокроты, кашель, одышка
 - б) кашель, боли в грудной клетке, одышка
 - в) выделение мокроты, боли в грудной клетке, одышка
 - г) легочная гипертензия, кашель, выделение мокроты
- 40 При измерении артериального давления необходимо соблюдать следующие условия:
- а) положение сидя с упором, в покое, после 5 минут отдыха
 - б) манжета на уровне сердца, не курить за 15 минут до исследования
 - в) положение сидя с упором, в покое, измеряется сразу
 - г) положение сидя с упором, можно отвечать на вопросы, после 3-х минут отдыха д) манжета на уровне сердца, не курить за 5 минут до исследования

- 41 Разница между частотой сердечных сокращений и частотой периферического пульса называется:
- а) аритмией
 - б) пульсовым давлением
 - в) дефицитом пульса
 - г) тахикардией
- 42 Расстройство мочеиспускания обозначается термином:
- а) анурия
 - б) ишурия
 - в) дизурия
 - г) олигурия
- 43 Для общего анемического синдрома характерны следующие симптомы:
- а) бледность, брадикардия, снижение АД
 - б) головокружение, брадикардия, снижение АД
 - в) бледность, головокружение, слабость, тахикардия
 - г) гиперемия кожи, повышение АД
- 44 Основные права пациента указаны в:
- а) уголовном кодексе
 - б) гражданском кодексе
 - в) трудовом кодексе
 - г) Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- 45 Грудная клетка бочкообразной формы характерна для:
- а) очагового пневмосклероза
 - б) диффузного пневмосклероза
 - в) эмфиземы легких
 - г) экссудативного плеврита
- 46 Целью стерилизации является уничтожение на изделиях медицинского назначения:
- а) всех микробов и их спор
 - б) только патогенных микробов
 - в) только условно-патогенных микробов
 - г) и патогенных, и условно-патогенных микробов
- 47 Дозы инсулина измеряются в
- а) хлебных единицах
 - б) единицах действия
 - в) миллилитрах
 - г) миллиграммах
- 48 Максимальное время наложения полуспиртового компресса (в часах):
- а) два
 - б) четыре
 - в) шесть
 - г) восемь
- 49 Рентгенологическое контрастное исследование почек и мочевыводящих путей:
- а) ирригоскопия
 - б) томография
 - в) хромоцистоскопия
 - г) экскреторная урография

- 50 Основная причина развития диабетической кетоацидотической комы:
- а) недостаток инсулина в организме
 - б) избыток инсулина в организме
 - в) избыток сахароснижающих препаратов
 - г) избыточное потребление жидкости
- 51 Раздача лекарственных пероральных препаратов пациентам производится медицинской сестрой:
- а) накануне вечером на следующий день
 - б) утром на весь день
 - в) непосредственно перед приёмом
 - г) на целую неделю
- 52 Самая тяжелая клиника при локализации отека Квинке:
- а) на лице
 - б) на наружных половых органах
 - в) на слизистой верхних дыхательных путей
 - г) степень тяжести при всех локализациях одинаковая
- 53 Лекарства, которые нельзя долго принимать, так как вызывают токсикоманию:
- а) тазепам
 - б) димедрол
 - в) валидол
 - г) валокордин
 - д) валериана
 - е) фенкарол
- 54 Запас лекарственных препаратов на посту палатной медицинской сестры на (количество дней):
- а) один
 - б) три
 - в) семь
 - г) десять
- 55 Проветривание палат должно производиться:
- а) 6 раз по 15 минут
 - б) 4 раза по 30 минут
 - в) 2 раза по 60 минут
 - г) 3 раза по 40 минут
- 56 Увеличение частоты сердечных сокращений:
- а) брадикардия
 - б) экстрасистолия
 - в) аритмия
 - г) тахикардия
- 57 Документация медицинской сестры терапевтического отделения стационара:
- а) журнал передачи дежурств
 - б) тетрадь врачебных назначений
 - в) порционник
 - г) карта выбывшего из стационара
 - д) талон амбулаторного пациента
 - е) журнал учета приема больных и отказов в госпитализации

- 58 Примесь неизменной крови в каловых массах характерна для кровотечения:
- а) массивного желудочного
 - б) капиллярного желудочного
 - в) из тонкой кишки
 - г) из толстой кишки
- 59 В основе инфаркта миокарда лежит:
- а) спазм коронарных артерий
 - б) тромбоз коронарной артерии
 - в) уменьшение скорости кровообращения
 - г) увеличение скорости кровообращения
- 60 Ирригоскопия - это:
- а) рентгенологическое исследование толстой кишки
 - б) эндоскопическое исследование толстой кишки
 - в) рентгенологическое исследование тонкой кишки
 - г) УЗИ брюшной полости
- 61 Все медицинские отходы по степени опасности делят на:
- а) 2 класса
 - б) 3 класса
 - в) 4 класса
 - г) 5 классов
- 62 Для определения соотношения между дневным и ночным диурезом назначают анализ мочи по:
- а) Нечипоренко
 - б) Зимницкому
 - в) Ребергу
 - г) Аддис-Каковскому
- 63 Потенциальная проблема пациента при язве желудка:
- а) изжога
 - б) запор
 - в) кровотечение
 - г) отрыжка кислым
- 64 Действия медицинского работника при уколах и порезах с целью профилактики ВИЧ-инфицирования заключаются в следующем:
- а) вымыть руки с мылом, не снимая перчаток, обработать перчатки 70% спиртом
 - б) снять перчатки, вымыть руки с мылом, выдавить кровь, обработать руки 70% спиртом
 - в) снять перчатки, вымыть руки и обработать ранку 5% спиртовым раствором йода
 - г) снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70% спиртом, смазать ранку 5% спиртовым раствором йода
- 65 Максимально допустимы сроки начала постконтактной профилактики антиретровирусными препаратами при риске инфицирования ВИЧ:
- а) не позднее 24 часов
 - б) не позднее 36 часов
 - в) не позднее 72 часов
 - г) не позднее 12 часов

- 66 Подготовка пациентов к УЗИ брюшной полости включает:
- а) 3-е суток безшлаковая диета, при метеоризме – активированный уголь
 - б) максимально разнообразная диета, очистительная клизма накануне вечером
 - в) очистительная клизма накануне вечером и за 2 часа до исследования
 - г) промывание желудка за 2 часа до исследования, очистительная клизма накануне вечером
- 67 При ожирении назначается вариант диеты:
- а) основной стандартной
 - б) с пониженным количеством белка
 - в) с пониженной калорийностью
 - г) с механическим и химическим щажением
- 68 Заподозрить инфаркт миокарда от начала приступа стенокардии можно через:
- а) 15 минут
 - б) 20-30 минут
 - в) 1 час
 - г) 2 часа
- 69 При патологии желудочно-кишечного тракта препараты железа целесообразно вводить:
- а) энтерально
 - б) парентерально
 - в) ингаляционно
 - г) сублингвально
- 70 При отсутствии в организме антианемического фактора развивается анемия:
- а) железодефицитная
 - б) гемолитическая
 - в) фолиеводефицитная
 - г) В12 – дефицитная
- 71 Цель проведения инфузионной терапии:
- а) переливание эритроцитарной массы
 - б) обезболивание
 - в) поддержание водно-электролитного баланса
 - г) переливание плазмы
- 72 Основным симптомом язвенной болезни:
- а) рвота
 - б) боль
 - в) снижение аппетита
 - г) неустойчивый стул
- 73 Какой из перечисленных Законов имеет высшую юридическую силу:
- а) Конституция Российской Федерации
 - б) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
 - в) Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
- 74 Ранним проявлением развивающихся скрытых отеков является:
- а) гидроторакс
 - б) гидроперикард
 - в) увеличение живота
 - г) увеличение массы тела и уменьшение суточного диуреза

- 75 Приоритетные проблемы пациента при остром гломерулонефрите
- а) слабость, недомогание
 - б) повышенная утомляемость, лихорадка
 - в) снижение работоспособности и аппетита
 - г) головная боль, отеки
- 76 Для исследования мочи на содержание сахара необходимо собрать:
- а) утреннюю мочу
 - б) суточную мочу
 - в) среднюю порцию первого мочеиспускания
 - г) любую порцию в течение суток
- 77 При лечении ожирения медсестра рекомендует пациенту:
- а) голодание
 - б) прием пищи 1 раз в день
 - в) прием пищи 2 раза в день
 - г) разгрузочные дни
- 78 Уремия – это:
- а) повышенное содержание в моче уратов
 - б) накопление в крови продуктов распада белка (мочевины, креатинина)
 - в) повышенное содержание в моче белка
 - г) повышенное содержание в моче эритроцитов
- 79 Что из нижеперечисленного НЕ относится к гипертоническому кризу:
- а) острый подъем АД до 180/120 мм рт.ст. в сочетании с отечностью лица и рвотой
 - б) острый подъем АД до 230/130 мм рт.ст., сопровождающийся сильной головной болью
 - в) острый подъем АД до 170/100 мм рт.ст., сопровождающийся выраженной одышкой
 - г) острый подъем АД до 200/120 мм рт.ст. без клинических проявлений
- 80 Для промывания желудка при помощи толстого зонда используют воду в объеме:
- а) 250–500 мл
 - б) 10–12 л
 - в) 5–6 л
 - г) 1–1,5 л
- 81 Клиническими проявлениями гипертиреоза являются:
- а) раздражительность, потливость, повышенная масса тела, снижение температуры
 - б) вялость, заторможенность, сонливость
 - в) снижение массы тела, снижение температуры, брадикардия
 - г) снижение массы тела, тахикардия, повышение температуры тела, раздражительность,
- 82 Осложнение хронического гастрита В:
- а) гепатит
 - б) холецистит
 - в) рефлюкс-эзофагит
 - г) язвенная болезнь
- 83 Действия медицинской сестры в случае продолжительности острой коронарной боли у пациента более 10 минут вне лечебно-профилактического учреждения:
- а) рекомендовать увеличение суточной дозы нитратов
 - б) рекомендовать амбулаторно консультацию врача – терапевта
 - в) рекомендовать амбулаторно консультацию врача – кардиолога
 - г) вызов «03»

- 84 При экспираторной одышке:
- а) затруднён вдох
 - б) затруднён выдох
 - в) затруднён вдох и выдох
 - г) меняется только частота дыхания
- 85 Мероприятия по изменению образа жизни при гипертонической болезни включают в себя:
- а) снижение АД
 - б) снижение смертности
 - в) отказ от курения
 - г) снижение массы тела
 - д) увеличение физических нагрузок
 - е) уменьшение физических нагрузок
- 86 Никтурия – это:
- а) уменьшение суточного количества мочи менее 500 мл
 - б) увеличение суточного количества мочи более 2000 мл
 - в) преобладание ночного диуреза над дневным
 - г) болезненное мочеиспускание
- 87 Обморок – это форма острой недостаточности:
- а) коронарной
 - б) левожелудочковой
 - в) правожелудочковой
 - г) сосудистой
- 88 Игла при подкожной инъекции вводится под углом (в градусах):
- а) 60
 - б) 90
 - в) 30
 - г) 45
- 89 К отходам класса В относят:
- а) материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекционными болезнями
 - б) пищевые отходы неинфекционных отделений
 - в) органические операционные отходы
 - г) пищевые отходы инфекционных отделений
- 90 При исследовании мочи по методу Зимницкого:
- а) рекомендуется ограничить потребление жидкости
 - б) рекомендуется соблюдать обычный питьевой режим
 - в) рекомендуется повышенное потребление жидкости
 - г) не дают никаких рекомендаций
- 91 Отеки сердечного происхождения появляются:
- а) утром на лице
 - б) утром на ногах
 - в) вечером на лице
 - г) вечером на ногах
- 92 Признак передозировки гепарина:
- а) никтурия
 - б) гематурия
 - в) полиурия
 - г) дизурия

- 93 Для ревматического артрита характерно:
- а) поражение мелких суставов
 - б) поражение крупных суставов
 - в) «летучий» характер боли
 - г) деформация и анкилозирование суставов
 - д) постоянный характер болей
- 94 При дуоденальном зондировании необходимо получить 3 порции содержимого А, В, С из:
- а) желудка
 - б) 12-ти перстной кишки
 - в) желчного пузыря
 - г) желчных протоков
 - д) печени
- 95 Снижение уровня тромбоцитов в крови:
- а) тромбоз
 - б) тромбоцитоз
 - в) тромбоцитопения
 - г) анемия
- 96 Признаки сердечной недостаточности:
- а) акроцианоз
 - б) одышка, отеки
 - в) цианоз лица
 - г) боль в области сердца
 - д) ортопноэ
 - е) повышение АД
- 97 Приступ печеночной колики является клиническим проявлением:
- а) острого холецистита
 - б) хронического холецистита
 - в) хронического калькулезного холецистита
- 98 Основной причиной развития диффузного и узлового зоба является:
- а) недостаточное содержание йода в пищевых продуктах, воде, воздухе
 - б) недостаточное употребление углеводов
 - в) низкое АД
 - г) только недостаточное содержание йода в воде
- 99 Ректороманоскопия - эндоскопическое исследование:
- а) прямой кишки
 - б) тонкой кишки
 - в) 12-ти перстной кишки
 - г) прямой и сигмовидной кишки
- 100 У тяжелобольных, прикованных к постели, наиболее часто развивается пневмония:
- а) крупозная
 - б) инфарктная
 - в) гипостатическая
 - г) гриппозная
- 101 Действие инсулина:
- а) снижает уровень холестерина в крови
 - б) обеспечивает усвоение глюкозы клетками организма
 - в) стимулирует деятельность клеток поджелудочной железы
 - г) способствует выведению лишнего сахара из организма

- 102 Инфаркт миокарда – это:
- а) ишемический некроз участка сердечной мышцы
 - б) диффузное воспаление сердечной мышцы
 - в) хроническая ишемия миокарда
 - г) дистрофические изменения части миокарда
- 103 Осложнением очаговой пневмонии является:
- а) плеврит
 - б) абсцесс легкого
 - в) дыхательная недостаточность
 - г) бронхиальная астма
- 104 Вакцинация против гепатита В проводится:
- а) однократно
 - б) трехкратно по схеме 0,1,6 мес.
 - в) четырехкратно по схеме 0,1,2,12 мес.
 - г) двукратно по схеме 0,6 мес.
- 105 Различают следующие виды желтухи:
- а) механическая
 - б) паренхиматозная (печеночная)
 - в) гемолитическая
 - г) пищевая
 - д) анемическая
 - е) производственная
- 106 Осложнения внутримышечных инъекций:
- а) гематома, некроз, сепсис
 - б) флебит, тромбофлебит
 - в) инфильтрат, абсцесс, флегмона
 - г) воздушная эмболия, липодистрофия
- 107 Разжижающим мокроту действием обладают:
- а) либексин
 - б) ацетилцистеин
 - в) мукалтин
 - г) эуфилин
 - д) фенкарол
 - е) синекод
- 108 Микседема – тяжелая форма:
- а) гипотиреоза
 - б) тиреотоксикоза
 - в) сахарного диабета
 - г) акромегалии
- 109 Колоноскопия - это исследование толстой кишки:
- а) рентгенологическое
 - б) ультразвуковое
 - в) эндоскопическое
 - г) томографическое
- 110 При отеке легких оксигенотерапия:
- а) проводится увлажненным кислородом
 - б) проводится кислородом, обогащенным углекислым газом
 - в) проводится кислородом, пропущенным через этиловый спирт
 - г) не проводится

- 111 Помощь при повышенном потоотделении:
- а) протереть тело сухим полотенцем
 - б) протереть тело полотенцем, смоченным спиртом
 - в) поменять постельное, нательное белье
 - г) теплое питье
 - д) теплые грелки к ногам
 - е) пузырь со льдом
- 112 Температура воды для постановки очистительной клизмы должна быть (в градусах по Цельсию):
- а) 10–12
 - б) 18–20
 - в) 30–35
 - г) 38–40
- 113 Плевральная жидкость невоспалительного генеза:
- а) экссудат
 - б) транссудат
 - в) ликвор
 - г) синовиальная жидкость
- 114 К развитию пороков сердца при ревматизме приводит:
- а) перикардит
 - б) миокардит
 - в) эндокардит
 - г) только перикардит
- 115 Преимущественным способом введения лекарственных препаратов при оказании неотложной помощи пациенту является:
- а) внутривенный
 - б) сублингвальный
 - в) внутримышечный
 - г) ингаляционный
- 116 Соотношение количества выпитой и выделенной жидкости называется:
- а) суточным диурезом
 - б) водным балансом
 - в) анурезом
 - г) дневным диурезом
- 117 Первичная профилактика ревматизма включает:
- а) прием аспирина весной и осенью в течение 2-х недель
 - б) своевременное лечение инфекций и санация хронических очагов
 - в) введение бициллина весной и осенью
 - г) введение бициллина круглогодично на протяжении 5 лет
- 118 Минимальной морфологической структурой легких является
- а) доля
 - б) ацинус
 - в) сегмент
 - г) долька
- 119 Анурия характерна для:
- а) острого пиелонефрита
 - б) фимоза
 - в) острой почечной недостаточности
 - г) хронического простатита

- 120 К категориям медицинской этики относятся:
- а) облегчение страданий больных, соблюдение субординации
 - б) долг, достоинство, совесть
 - в) информированное согласие, профессионализм, аттестация
 - г) квалификация, делать «добро»
- 121 Нижним пределом нормального АД считаются цифры (в мм рт. ст.):
- а) 100/60
 - б) 90/60
 - в) 110/65
 - г) 119/79
- 122 Анкилоз – это:
- а) деформация суставов
 - б) утренняя скованность суставов
 - в) неподвижность сустава вследствие сращения суставных поверхностей
 - г) боли в суставах
- 123 Выделение «ржавой мокроты» отмечается при:
- а) хроническом бронхите
 - б) крупозной пневмонии
 - в) кавернозном туберкулезе легких
 - г) бронхиальной астме
- 124 Грелку заполняют водой на (часть объема):
- а) 3/4
 - б) 2/3
 - в) 1/2
 - г) 1/3
- 125 Если явления анафилактического шока развивались на фоне внутривенного введения лекарственного препарата, то в первую очередь необходимо:
- а) введение препарата прекратить, иглу из места инъекции убрать
 - б) введение препарата прекратить, из вены не выходить
 - в) введение препарата прекратить, иглу из места инъекции убрать, пунктировать другую вену
 - г) введение препарата прекратить, иглу из места инъекции убрать, приложить холод
- 126 Желтуха развивается вследствие:
- а) увеличения в крови билирубина
 - б) употребления большого количества моркови
 - в) терапии акрихином
 - г) уменьшения в крови гемоглобина
- 127 Смена нательного и постельного белья пациента проводится:
- а) по мере загрязнения
 - б) через каждые 7 дней
 - в) по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 10 дней
 - г) по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 дней
- 128 Латентная форма сахарного диабета выявляется при помощи:
- а) анализа мочи на сахар
 - б) анализа крови на сахар
 - в) «сахарной кривой»
 - г) клинических признаков

- 129 Бактериурия – характерна для:
- а) пиелонефрита
 - б) гломерулонефрита
 - в) мочекаменной болезни
 - г) амилоидоза почек
- 130 Наиболее частыми осложнениями язвенной болезни являются:
- а) кровотечение
 - б) перфорация
 - в) пенетрация
 - г) малигнизация
 - д) стеноз привратника
- 131 Эмпиема плевры - это
- а)растяжение и перерастяжение плевры
 - б)скопление гноя в плевральной полости
 - в)скопление крови в плевральной полости
 - г)скопление воздуха в плевральной полости
- 132 Независимым сестринским вмешательством при гипертензивном кризе является:
- а) внутривенное введение дибазола и магнeзии
 - б) горчичники на затылок и икроножные мышцы
 - в) таблетка клофелина под язык
 - г) измерение температуры
- 133 Появление крови в моче – это:
- а) уремия
 - б) гематурия
 - в) альбуминурия
 - г) протеинурия
- 134 Реанимация пациенту показана
- а) только при внезапной смерти у пожилых больных
 - б) только при внезапной смерти молодых пациентов и детей
 - в) при появлении признаков клинической смерти
 - г) при появлении признаков биологической смерти
- 135 Срок повторного осмотра пациента после обнаружения педикулеза и обработки волосистой части головы (в днях):
- а) 3
 - б) 5
 - в) 7
 - г) 14
- 136 Продолжительность загрудинной боли при инфаркте миокарда:
- а) менее 5 минут
 - б) 5 – 10 минут
 - в) 15 – 20 минут
 - г) 30 минут и более
- 137 При назначении мочегонных препаратов (салуретиков) отмечается следующий электролитный сдвиг:
- а)развивается гипокальциемия
 - б)развивается гипокалиемия
 - в)развивается гиперкальциемия
 - г)развивается гиперкалиемия

- 138 Инсулин дозируется в:
- а) хлебных единицах
 - б) единицах действия
 - в) миллилитрах
 - г) миллиграммах
- 139 Неотложное состояние, часто развивающееся, при пневмонии:
- а) инфекционно-токсический шок
 - б) кишечная непроходимость
 - в) астматическое состояние
 - г) кровотечение
- 140 После выписки, смерти или перевода пациента в другое отделение проводят:
- а) текущую дезинфекцию
 - б) предварительную дезинфекцию
 - в) заключительную очаговую дезинфекцию
 - г) профилактическую дезинфекцию
- 141 За три дня до проведения ультразвукового исследования органов брюшной полости из рациона питания необходимо исключить:
- а) молоко, овощи, фрукты, черный хлеб
 - б) яйца, белый хлеб, сладости
 - в) гречневую кашу, помидоры, гранаты
 - г) мясо, рыбу, консервы
- 142 Грелка необходима после подкожного введения:
- а) водного раствора
 - б) масляного раствора
 - в) вакцины
 - г) триггер
- 143 Температура воды для смачивания горчичников (в градусах по Цельсию):
- а) 20–24
 - б) 36–37
 - в) 40–45
 - г) 50–60
- 144 Приоритетная проблема пациента при хроническом гастрите с сохраненной секреторной функцией
- а) изжога
 - б) плохой сон
 - в) запор
 - г) боль в эпигастральной области
- 145 Объективные симптомы воспаления суставов:
- а) припухлость
 - б) контрактура
 - в) гиперемия
 - г) местное повышение температуры
 - д) цианоз
 - е) побледнение
- 146 Латентная форма сахарного диабета выявляется при помощи:
- а) анализа мочи на сахар
 - б) анализа крови на сахар
 - в) «сахарной кривой»
 - г) клинических признаков

- 147 Возможное осложнение третьего периода лихорадки:
- а) озноб
 - б) повышенная потливость
 - в) бред
 - г) коллапс
- 148 Дуоденальное зондирование проводится с помощью:
- а) назального зонда
 - б) тонкого зонда с оливой
 - в) толстого зонда
 - г) тонкого зонд
- 149 Здоровый образ жизни – это:
- а) борьба за чистоту среды обитания
 - б) творчество как источник положительных эмоций
 - в) активная жизнедеятельность, направленная на укрепление и сохранение здоровья
 - г) правильное поведение в случае болезни
- 150 Особенности течения крупозной пневмонии:
- а) температура тела повышается внезапно, высоко, сопровождается ознобом
 - б) во 2-ом периоде лихорадки могут развиваться бред, галлюцинации
 - в) снижение температуры происходит литически
 - г) снижение температуры происходит критически
 - д) температура тела повышается до субфебрильных цифр
 - е) интоксикация выражена слабо
- 151 Особенности введения инсулина:
- а) вводится подкожно за 20-30 минут до еды, необходимо менять места инъекции
 - б) место инъекции обработать антисептиком, не содержащим спирт
 - в) нельзя вводить вблизи крупных сосудов
 - г) вводить подогретым до 38°С
 - е) ввести как обычную подкожную инъекцию
- 152 Условия сбора мокроты на бактериологический анализ:
- а) перед сбором мокроты пациент должен прополоскать рот слабым раствором фурацилина
 - б) мокрота собирается натощак утром
 - в) перед сбором мокроты пациент должен прополоскать рот кипяченой водой
 - г) мокрота собирается в стерильную посуду
 - д) мокрота собирается после завтрака
 - е) перед сбором мокроты пациент должен прополоскать рот слабым раствором перманганата калия
- 153 При атоническом запоре температура воды при постановке очистительной клизмы должна быть (в градусах по Цельсию):
- а) 12–15
 - б) 18–20
 - в) 30–35
 - г) 38–40
- 154 К основным симптомам СПИДА относятся:
- а) гепатоспленомегалия, слабость, головная боль
 - б) лимфаденопатия, диарея более месяца, лихорадка более месяца
 - в) потеря массы тела, желтушность кожных покровов
 - г) ночные поты, слабость

- 155 Перед лапароцентезом пациент должен:
- а) дать письменное согласие на процедуру, опорожнить мочевой пузырь
 - б) дать устное согласие на процедуру, измерить температуру тела
 - в) дать письменное согласие на процедуру, снять съемные зубные протезы
 - г) снять съемные зубные протезы, прополоскать рот
- 156 Продолжительность процедуры при постановке пиявок с целью получения гирудина (в минутах):
- а) 15
 - б) 20
 - в) 30
 - г) 45 - 60
- 157 Смена спецодежды в отделениях терапевтического профиля осуществляется ___раз (а) в неделю и по мере загрязнения:
- а) 1
 - б) 7
 - в) 3
 - г) 2
- 158 В анализе мокроты при atopической бронхиальной астме обнаруживают:
- а) большое количество лейкоцитов
 - б) большое количество эритроцитов
 - в) большое количество эозинофилов
 - г) большое количество цилиндров
- 159 Анурия - это понятие, означающее:
- а) прекращение поступления мочи в мочевой пузырь
 - б) отсутствие мочеиспускания
 - в) острая задержка мочеиспускания
 - г) расстройство мочеиспускания
- 160 Особенности лечебного питания при язвенной болезни:
- а) механически, химически и термически щадящая пища
 - б) обязательное введение разгрузочных дней
 - в) прием пищи 5–6 раз в сутки, малыми порциями
 - г) ограничение жиров животного происхождения, молочных продуктов
 - д) прием пищи 3 раза в день, большими порциями
- 161 Для разведения антибиотиков используется раствор новокаина (в %):
- а) 0,5
 - б) 0,25
 - в) 2
 - г) 1
 - д) 10
- 162 Ревматизм поражает
- а) суставы
 - б) сердце
 - в) кожу
 - г) все перечисленное
- 163 Верхним пределом нормального АД считаются цифры (в мм рт. ст.):
- а) 120/80
 - б) 135/ 85
 - в) 139/89
 - г) 159/89

- 164 Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения:
- а) острых заболеваний
 - б) инфекционных заболеваний
 - в) несчастных случаев
 - г) хронических заболеваний
- 165 Газоотводную трубку ставят максимально на время (в часах):
- а) двадцать четыре
 - б) двенадцать
 - в) три
 - г) один
- 166 Клинические формы ИБС (ишемической болезни сердца):
- а) атеросклероз
 - б) стенокардия
 - в) инфаркт миокарда
 - г) гипертоническая болезнь
 - д) кардиосклероз
 - е) пневмосклероз
- 167 Печеночная желтуха окрашивает кожу и слизистые в:
- а) желтый цвет
 - б) лимонный цвет
 - в) желтый цвет с красноватым оттенком
 - г) цвет кожи остается неизменным
- 168 Потенциальная проблема пациента при ожирении:
- а) изжога
 - б) отрыжка
 - в) обморок
 - г) сердечная недостаточность
- 169 Профилактика масляной эмболии при внутримышечном введении масляных растворов предусматривает соблюдение следующих условий:
- а) раствор подогреть до температуры 60°C
 - б) раствор должен быть комнатной температуры
 - в) убедиться в отсутствии крови в игле (двухэтапное введение)
 - г) охладить раствор до 12-15°C
- 170 У взрослых к первому этапу сердечно-легочной реанимации относится:
- а) обеспечение проходимости верхних дыхательных путей
 - б) контроль показателей кровообращения
 - в) проведение искусственной вентиляции легких
 - г) проведение закрытого массажа сердца
- 171 В типичных случаях боль в эпигастральной области у пациентов с язвой желудка возникает после еды:
- а) сразу
 - б) через 1–1,5 часа
 - в) через 2–3 часа
 - г) через 5–6 часов
 - д) ночью, натощак
- 172 Для приступа сердечной астмы характерна одышка:
- а) инспираторного типа
 - б) экспираторного типа
 - в) смешанного типа
 - г) дыхание типа Куссмауля

- 173 Возможные осложнения II периода лихорадки:
- а) озноб
 - б) повышенная потливость
 - в) бред
 - г) коллапс
 - д) галлюцинации
- 174 Моча цвета мясных помоев – признак:
- а) протеинурии
 - б) лейкоцитурии
 - в) микрогематурии
 - г) макрогематурии
- 175 Потенциальная проблема пациента с бронхоэктатической болезнью
- а) лихорадка
 - б) снижение аппетита
 - в) кашель с гнойной мокротой
 - г) кровохарканье
- 176 Осложнением ревматизма может быть:
- а) хроническая недостаточность кровообращения
 - б) хроническая функциональная недостаточность суставов
 - в) только острая недостаточность кровообращения
 - г) острая сосудистая недостаточность
- 177 Основным симптомом гастрита:
- а) диспепсия
 - б) боли голодные в эпигастрии
 - в) боли в эпигастрии после приема пищи
 - г) опоясывающие боли
- 178 Тахикардия – это число сердечных сокращений в минуту:
- а) менее 60
 - б) 60–70
 - в) 70–80
 - г) более 90
- 179 Для сахарного диабета первого типа характерно:
- а) бессимптомное начало заболевания
 - б) сухость во рту, жажда, полиурия, потеря в массе тела в начальный период болезни
 - в) увеличение массы тела
 - г) снижение уровня сахара в крови
- 180 Положение при транспортировке пациента с симптомами шока:
- а) лёжа с возвышенным головным концом
 - б) лёжа с возвышенным ножным концом
 - в) положение сидя
 - г) любое положение, удобное для пациента
- 181 Экспираторная одышка, вынужденное положение, сухие, свистящие хрипы характерны для:
- а) сердечной астмы
 - б) тромбоэмболии легочной артерии
 - в) пневмоторакса
 - г) приступа бронхиальной астмы

- 182 При атеросклерозе поражаются:
- а) артерии
 - б) вены
 - в) капилляры
 - г) мышцы
- 183 Местное противосвертывающее действие пиявок основано на содержащемся в ее слюне:
- а) гепарина
 - б) гентомицина
 - в) гирудина
 - г) гиалуроновой кислоты
- 184 Отек всего тела называется:
- а) асцит
 - б) анурия
 - в) анасарка
 - г) отек Квинке
- 185 Мочу для общего клинического анализа надо доставить в лабораторию в течение (время в часах):
- а) один
 - б) три
 - в) пять
 - г) семь
- 186 К факторам риска в развитии ИБС (ишемической болезни сердца) относят:
- а) ревматизм
 - б) сахарный диабет
 - в) ожирение
 - г) кардиосклероз
 - д) пневмосклероз
- 187 При инфаркте миокарда в сердечной мышце развивается:
- а) резкий спазм сердечной мышцы
 - б) некроз
 - в) резкое расслабление сердечной мышцы
 - г) аневризма
- 188 Наука, изучающая профессиональное поведение медицинских работников – это:
- а) этика
 - б) сестринское дело
 - в) деонтология
 - г) валеолог
- 189 Выделение большого количества гнойной мокроты («полным ртом») характерно для:
- а) бронхита
 - б) первого периода абсцесса легких
 - в) второго периода абсцесса легких
 - г) очагового туберкулеза легких
- 190 Для острого холецистита характерно:
- а) температура тела нормальная, рвота, боль в эпигастрии
 - б) повышение температуры, диспепсия, боль в правом подреберье
 - в) желтуха, тошнота, рвота, лихорадка
 - г) боль внизу живота, тошнота, рвота

- 191 При почечной колике боль:
- а) симметричная в поясничной области
 - б) приступообразная в области поясницы, односторонняя
 - в) уменьшается в состоянии покоя, лежа
 - г) уменьшается при воздействии тепла
 - д) уменьшается в определенном положении
- 192 Осложнения, связанные с нарушением асептики при проведении инъекции:
- а) инфильтрат
 - б) вирусный гепатит
 - в) аллергическая реакция
 - г) воздушная эмболия
 - д) масляная эмболия
- 193 Препарат, относящийся к группе β – блокаторов:
- а) капотен
 - б) энап
 - в) атенолол
 - г) аллопуринол
- 194 Ятрогенное заболевание – это:
- а) нозокомиальное заболевание
 - б) наследственное заболевание
 - в) осложнение основного заболевания
 - г) заболевание, развившееся в результате действий медицинского работника
- 195 При отравлении кислотами и щелочами для промывания желудка рекомендуется использовать:
- а) нейтрализующие растворы
 - б) воду
 - в) раствор фурацилина
 - г) масляный раствор
- 196 Перед взятием кала для исследования на скрытую кровь пациентам рекомендуют за 3 дня до анализа исключить из диеты:
- а) свеклу, морковь
 - б) мясо, зелень
 - в) кефир, простокваша
 - г) препараты железа
 - д) гречневую кашу
 - е) творог, картофель
- 197 Цель сестринского вмешательства при подготовке пациента к внутривенной урографии:
- а) опорожнение мочевого пузыря
 - б) устранение метеоризма
 - в) очищение кишечника от каловых масс
 - г) заполнение мочевого пузыря
 - д) очищение бронхов от мокроты
- 198 Согласно статье Трудового кодекса РФ квалификация работника – это:
- а) степень и вид профессиональной обученности
 - б) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника
 - в) степень профессиональной подготовленности к выполнению какого-либо вида работы
 - г) характеристика данного вида работы, устанавливаемая по степени ее сложности, точности и ответственности

- 199 При остром лейкозе в анализе крови наблюдается:
- а) лейкоцитоз, появление бластных форм
 - б) эритроцитоз, уменьшение соэ
 - в) тромбоцитоз, ускорение соэ
 - г) эритроцитоз, тромбоцитоз
- 200 Причины развития язвенной болезни:
- а) длительное нервное напряжение
 - б) алкоголь, курение
 - в) нарушение питания
 - г) наследственность
 - е) физические нагрузки
- 201 Преимущественный путь введения лекарственных препаратов при приступе бронхиальной астмы:
- а) парэнтеральный
 - б) энтеральный
 - в) ингаляционный
 - г) сублингвальный
- 202 Пациенты после купирования анафилактического шока:
- а) должны быть обязательно госпитализированы
 - б) госпитализации не подлежат
 - в) при полном купировании явлений шока могут быть оставлены под наблюдение участкового врача
 - г) направляются в дневной стационар
- 203 Понятие «острый коронарный синдром» включает в себя:
- а) нестабильную стенокардию
 - б) стабильную стенокардию
 - в) инфаркт миокарда
 - г) кардиосклероз д) миокардит
- 204 Больного для постановки очистительной клизмы нужно уложить на:
- а) левый бок
 - б) правый бок
 - в) живот
 - г) спину
- 205 Побочный эффект приема нитроглицерина:
- а) брадикардия
 - б) коллапс
 - в) гипертензивный криз
 - г) носовое кровотечение
- 206 Пульсовое давление в норме колеблется в интервале
- а) 10 - 20 мм рт.ст.
 - б) 20 - 30 мм рт.ст.
 - в) 30 - 50 мм рт.ст
 - г) 50 - 70 мм рт.ст
- 207 К клиническим проявлениям крапивницы относится все, кроме
- а) гиперемии кожи
 - б) уртикарной сыпи
 - в) зуда
 - г) резкого снижения давления

- 208 Анализ мочи по методу Нечипоренко проводится для определения в единице объема:
- а) белка, глюкозы
 - б) солей, билирубина
 - в) ацетона, глюкозы
 - г) лейкоцитов, эритроцитов
- 209 Сестринское вмешательство при метеоризме у больного с хроническим колитом:
- а) рекомендации по приему пищи малыми порциями, ограничение в рационе питания белка
 - б) ограничение продуктов богатых клетчаткой, введение газоотводной трубки
 - в) применение активированного угля, постановка масляной клизмы
 - г) постановка очистительной клизмы утром и вечером
- 210 Закапывание глазных капель производят:
- а) в наружный угол глаза
 - б) во внутренний угол глаза
 - в) в нижнюю конъюнктивальную складку
 - г) под верхнее веко
- 211 Принципы постановки лечебной клизмы:
- а) за 30 минут - очистительная клизма
 - б) температура 38-40°C, объем 50-100 мл
 - в) очистительная клизма не ставится,
 - г) комнатная температура, объем 50-100 мл
 - д) комнатная температура, объем 1,0-1,5 л
- 212 Сведения, составляющие врачебную тайну:
- а) информация о состоянии пациента в период его болезни
 - б) информация о факте обращения за медицинской помощью
 - в) информация о состоянии здоровья пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении
 - г) все вышеперечисленное
- 213 Типы нарушения ритма сердца:
- а) экстрасистолия
 - б) дефибрилляция
 - в) тахикардия
 - г) фибрилляция
 - д) брадикардия
- 214 Цель плевральной пункции:
- а) лечебная
 - б) диагностическая
 - в) введение лекарств
 - г) промывание бронхов
 - д) удаление плевральной жидкости
- 215 Назначена доза препарата 0,08г, доза одной таблетки 160мг. Пациенту следует дать:
- а) 4 таблетки
 - б) 2 таблетки
 - в) 1 таблетку
 - г) 0,5 таблетки

- 216 Пузырь со льдом прикладывают к голове максимально на:
- а) 10 минут
 - б) 15 минут
 - в) 30 минут
 - г) 2 часа
- 217 Наиболее информативный метод диагностики язвенной болезни желудка:
- а) желудочное зондирование
 - б) рентгеноскопия
 - в) ультрозвуковое исследование
 - г) гастроскопия
- 218 Сахарный диабет - заболевание, обусловленное недостаточностью в крови:
- а) гирудина
 - б) глюкозы
 - в) инсулина
 - г) пепсина
- 219 Сестринское вмешательство при остром гастрите:
- а) назначение диеты
 - б) введение обезболивающих средств
 - в) промывание желудка
 - г) введение спазмолитиков
 - д) назначение консультаций узких специалистов
- 220 Экспираторная одышка развивается при:
- а) спазме мелких бронхов
 - б) спазме средних бронхов
 - в) спазме крупных бронхов
 - г) отеке гортани
- 221 Потенциально устранимые факторы риска развития атеросклероза:
- а) прием алкоголя, курение, наследственность
 - б) курение, гиподинамия, избыточная масса тела
 - в) наследственность, возраст, гиподинамия
 - г) постменопауза, ожирение, артериальная гипертензия
- 222 Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируют:
- а) экологические
 - б) биологические
 - в) образ жизни
 - г) уровень организации медицинской помощи
- 223 Температура воды для промывания уха с целью удаления серной пробки должна быть (в градусах по Цельсию):
- а) 20
 - б) 25
 - в) 37
 - г) 45
- 224 При ХОБЛ лечение больного должно проводиться:
- а) непрерывно
 - б) в период обострения заболевания
 - в) в период обострения заболевания в виде профилактических курсов весной и осенью
 - г) проводить не обязательно

- 225 Обработка участка кожи, где предполагается постановка пиявок, производится с помощью:
- а) спирта
 - б) теплой воды
 - в) хозяйственного мыла
 - г) туалетного мыла
- 226 Частота перестилания постели тяжелому пациенту для предупреждения образования пролежней:
- а) 1 раз в день
 - б) 2-3 раза в день
 - в) через день
 - г) 1 раз в неделю
- 227 При крупозной пневмонии в воспалительный процесс вовлекаются:
- а) бронхи
 - б) плевра
 - в) межреберные мышцы
 - г) стенки альвеол
 - д) трахея
 - е) глотка
- 228 Симптомы желудочного кровотечения:
- а) выделение желеобразного содержимого малинового цвета
 - б) рвота цвета «кофейной гущи»
 - в) мелена
 - г) выделение алой крови д) прожилки крови в мокроте
- 229 Анемия - это:
- а) изменение цветового показателя
 - б) уменьшение гемоглобина
 - в) уменьшение эритроцитов
 - г) уменьшение количества крови
- 230 Пациентам с туберкулезом рекомендуется диета:
- а) ЩД
 - б) НКД
 - в) ОВД
 - г) ВБД
- 231 Для исследования суточной глюкозурии мочу собирают за:
- а) 4 часа
 - б) 9 часов
 - в) 24 часа
 - г) 8 порций, каждая за 3 часа
- 232 Соотношение компрессий на грудину и искусственных вдохов при проведении реанимации
- а) 2:15
 - б) 3:6
 - в) 30:2
 - г) 1:5
- 233 Осложнения внутривенных инъекций:
- а) гематома
 - б) инфильтрат
 - в) флебит
 - г) масляная эмболия

- 234 Оптимальные этапы реабилитации пациентов, перенёсших острый инфаркт миокарда:
- а) стационар – поликлиника
 - б) стационар - кардиологический санаторий - центр реабилитации
 - в) стационар - кардиологический санаторий – центр реабилитации – поликлиника
 - г) стационар - кардиологический санаторий – поликлиника - стационар
- 235 Критическое снижение температуры характерно для:
- а) мелкоочаговой пневмонии
 - б) крупноочаговой пневмонии
 - в) любой бронхопневмонии
 - г) долевого или крупозной пневмонии
- 236 Преимущественный путь введения лекарственных препаратов при приступе бронхиальной астмы:
- а) внутривенный
 - б) ингаляционный
 - в) наружный
 - г) внутримышечный
- 237 Второй период лихорадки – это:
- а) подъем температуры с ознобом
 - б) стабилизация температуры на высоком уровне
 - в) критическое снижение температуры
 - г) литическое снижение температуры
- 238 Гормоном щитовидной железы является
- а) адреналин
 - б) тироксин
 - в) тиреотропный гормон
 - г) инсулин
- 239 Дефицит пульса – это термин, обозначающий:
- а) урежение пульса
 - б) учащение пульса
 - в) учащение пульса на вдохе и урежение его на выдохе
 - г) разницу между частотой сердечных сокращений и периферическим пульсом
- 240 Ранние осложнения инфаркта миокарда:
- а) хроническая левожелудочковая недостаточность
 - б) кардиогенный шок
 - в) хроническая аневризма сердца
 - г) постинфарктный кардиосклероз
- 241 При возникновении пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста редко наблюдается:
- а) слабость, недомогание
 - б) одышка
 - в) выраженная лихорадка
 - г) кашель
- 242 Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан РФ, регулируются
- а) программой развития здравоохранения
 - б) Трудовым Кодексом РФ
 - в) ФЗ «О кооперации»
 - г) ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и Конституцией РФ

- 243 Внутрибольничной принято называть пневмонию, возникшую:
- а) у ранее нелеченного пациента
 - б) ранее 48 ч после госпитализации пациента
 - в) позднее 48 ч после госпитализации пациента
 - г) у пациента, лечившегося в домашних условиях от другого заболевания
- 244 Независимое сестринское вмешательство для улучшения отхождения мокроты:
- а) дать бромгексин
 - б) постучать ребром ладони по грудной клетке со стороны спины
 - в) создать пациенту дренажное положение
 - г) провести ингаляцию с фитопрепаратом
 - д) придать удобное положение
- 245 Отек всего тела называется:
- а) асцит
 - б) анурия
 - в) анасарка
 - г) отек Квинке
- 246 Появление на ЭКГ широкого и глубокого зубца Q характерно для:
- а) стенокардии
 - б) тромбоэмболии легочной артерии
 - в) инфаркта миокарда
 - г) мерцательной аритмии
- 247 Для профилактики лекарственной аллергии медсестре следует:
- а) выбрать другой препарат из этой же группы
 - б) собрать тщательно анамнез, информировать врача
 - в) заменить на препарат из другой группы с аналогичным действием
 - г) ввести антигистаминный препара
- 248 Прорыв абсцесса лёгких может произойти в:
- а) полость плевры
 - б) брюшную полость
 - в) дренирующий бронхит
 - г) полость перикарда
 - д) полость желудка
- 249 Острая задержка мочеиспускания определяется термином:
- а) анурия
 - б) олигурия
 - в) ишурия
 - г) дизурия
- 250 При позыве у тяжелобольного на дефекацию необходимо:
- а) ополоснуть судно холодной водой
 - б) подложить клеенку
 - в) отгородить пациента ширмой
 - г) ополоснуть судно теплой водой
 - д) попросить освободить палату присутствующих
 - е) судно поставить на простынь
- 251 Концентрация этилового спирта, применяемая для обработки инъекционного поля (в %):
- а) 95
 - б) 40
 - в) 70
 - г) 33

- 252 При ревматизме чаще всего поражается клапан:
- а) аортальный
 - б) легочной артерии
 - в) митральный
 - г) двухстворчатый
- 253 Текущая влажная уборка процедурного кабинета проводится:
- а) 2 раза в неделю
 - б) 1 раз в месяц
 - в) 2 раза в сутки
 - г) 1 раз в неделю
- 254 Время наложения венозных жгутов при сердечной недостаточности составляет:
- а) 10-15 минут
 - б) 15-20 минут
 - в) 20-30 минут
 - г) 30 мин – 1 час
- 255 Потенциальная проблема пациента при циррозе печени:
- а) желтуха
 - б) снижение аппетита
 - в) кожный зуд
 - г) кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода
- 256 Лечение сахарного диабета второго типа проводится:
- а) только инсулином
 - б) только сахароснижающими препаратами
 - в) соблюдением диеты
 - г) возможны все варианты в зависимости от тяжести заболевания
- 257 Сестринское вмешательство при сахарном диабете:
- а) уход за кожей, рекомендации по диете
 - б) проведение инъекций инсулина по назначению врача
 - в) рекомендации по выбору инъекционных препаратов инсулина
 - г) рекомендации по выбору таблетированных препаратов инсулина
 - д) назначение консультаций врачей и дополнительного обследования
- 258 Для бронхоэктатической болезни характерно:
- а) лихорадка
 - б) отхождение мокроты «полным ртом»
 - в) кровохарканье
 - г) незначительное количество мокроты
 - д) изменение концевых фаланг в виде барабанных палочек и появление ногтей Гиппократ («часовые стёкла»)
 - е) температура тела нормальная
- 259 Право граждан на охрану здоровья гарантируется:
- а) Трудовым кодексом РФ
 - б) Конституцией РФ
 - в) Гражданским кодексом РФ
 - г) Программой развития здравоохранения
- 260 При сердечно-лёгочной реанимации в тройной приём Сафара не входит:
- а) запрокидывание головы
 - б) положение на боку
 - в) выдвижение нижней челюсти вверх
 - г) открывание рта

- 261 Ранним симптомом ревматоидного артрита является
- а) болезненность при пальпации ахиллова сухожилия
 - б) подкожные узелки
 - в) утренняя скованность
 - г) латеральная девиация суставов кистей
- 262 Для катетеризации мочевого пузыря медицинская сестра может использовать катетер из:
- а) металла
 - б) поливинилхлорида
 - в) латекса с силиконовым покрытием
 - г) резины
 - д) любой из выше перечисленных
- 263 Побочный нежелательный эффект при приеме нитроглицерина:
- а) остеопороз
 - б) олигурия
 - в) затруднение дыхания
 - г) снижение артериального давления
- 264 Оптимальное положение пациента при коллапсе:
- а) приподнятый головной конец
 - б) сидя на стуле
 - в) приподнятый ножной конец
 - г) полусидя на кушетке
- 265 При подготовке кожи в месте инъекции ее протирают ватным тампоном со спиртом:
- а) в одном направлении несколько раз
 - б) от места инъекции к периферии (радиально)
 - в) от периф
- 266 Способы фиксации иглы к коже при внутривенных капельных вливаниях:
- а) стерильным бинтом
 - б) лейкопластырем
 - в) стерильной салфеткой и лейкопластырем
 - г) ватным тампоном и лейкопластырем
- 267 Артериальное давление необходимо измерять:
- а) 1 раз
 - б) 2 раза с интервалом 1 -2 минуты
 - в) 3 раза с интервалом 1-2 минуты
 - г) количество раз и интервал не имеют значения
- 268 Для определения соотношения между дневным и ночным диурезом назначают анализ мочи по:
- а) Нечипоренко
 - б) Зимницкому
 - в) Ребергу
 - г) Аддис-Каковскому
- 269 Подготовка пациента ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) включает:
- а) голод в течение суток перед обследованием, накануне прием слабительных
 - б) строго натошак, накануне вечером – очистительная клизма
 - в) строго натошак, вечером накануне легкий ужин (до 20 часов), не курить
 - г) строго натошак, накануне прием слабительных, не курить

- 270 При острых лихорадочных состояниях назначается вариант диеты: а) с механическим и химическим щажением
б) с повышенным количеством белка
в) с пониженным количеством белка
г) основной стандартной диеты
- 271 Задержка мочи называется
а) анурией
б) полиурией
в) олигурией
г) ишурией
- 272 Симптомы острого бронхита:
а) кашель
б) одышка
в) кровохарканье
г) лихорадка
д) боль в груди
е) ночной проливной пот
- 273 Пикфлоуметрия – это определение:
а) дыхательного объема
б) жизненной емкости легких
в) остаточного объема
г) пиковой скорости выдоха
- 274 У пациентов с тиреотоксикозом отмечаются проблемы:
а) похудание, экзофтальм, тахикардия
б) увеличение массы тела, гипотония, брадикардия
в) одышка, отеки, цианоз, слабость
г) снижение аппетита, похудание, снижение АД
- 275 Для того чтобы дифференцировать желтуху от окрашивания кожи продуктами питания или лекарственными препаратами надо обратить внимание на цвет:
а) ладоней
б) стоп
в) кожи
г) слизистых оболочек
- 276 Сахарный диабет - заболевание, обусловленное недостаточностью в крови:
а) гирудина
б) глюкозы
в) инсулина
г) пепсина
- 277 Ортопноэ – это одышка, которая возникает в
а) положении лежа и уменьшается в положении сидя
б) положении лежа и не уменьшается в положении сидя
в) положении сидя и уменьшается в положении лежа
г) горизонтальном положении, уменьшается лежа
- 278 В основе приступа бронхиальной астмы лежит:
а) спазм крупных бронхов
б) спазм мелких и средних бронхов
в) паралич дыхательной мускулатуры
г) отек гортани

- 279 Самым частым осложнением инсулинотерапии является:
- а) крапивница
 - б) отеки
 - в) гипогликемия
 - г) липодистрофия
- 280 Колоноскопия - это исследование толстой кишки:
- а) рентгенологическое
 - б) ультразвуковое
 - в) эндоскопическое
 - г) томографическое
- 281 Глюкозотолерантный тест проводится для диагностики
- а) гипертонической болезни
 - б) хронического гепатита
 - в) сахарного диабета
 - г) несахарного диабета
- 282 Типичная форма инфаркта миокарда:
- а) ангинозная
 - б) церебральная
 - в) периферическая
 - г) абдоминальная
- 283 Наука, изучающая вопросы нравственного поведения медицинских работников:
- а) медицинская деонтология
 - б) медицинская этика
 - в) медицинская педагогика
 - г) медицинская психология
- 284 При экспираторной одышке
- а) затруднен вдох
 - б) затруднен выдох
 - в) затруднен и вдох, и выдох
 - г) меняется только частота дыхания
- 285 Нефролитиаз – это:
- а) опущение почки
 - б) почечнокаменная болезнь
 - в) сморщивание почки
 - г) инфекционно-воспалительный процесс в паренхиме почек
- 286 К психосоматическим болезням относится:
- а) бронхиальная астма
 - б) гипертоническая болезнь
 - в) сексуальные расстройства
 - г) всё вышеперечисленное
- 287 При повышении температуры тела на 1 градус пульс учащается на (количество ударов):
- а) один
 - б) четыре
 - в) восемь
 - г) десять

288 Анасарка – это:

- а) общий отёк
- б) накопление отёчной жидкости в брюшной полости
- в) накопление отёчной жидкости в полости плевры
- г) накопление отёчной жидкости в подкожной клетчатке

289 Предметом изучения этики является:

- а) этикет
- б) мораль и нравственность
- в) общественные отношения
- г) развитие обрядов, традиций социума

290 Анурия - это понятие, означающее:

- а) прекращение поступления мочи в мочевого пузырь
- б) отсутствие мочевыделения
- в) острая задержка мочеиспускания
- г) расстройство мочеиспускания

291 Метод временной остановки наружного венозного кровотечения:

- а) наложение жгута
- б) максимальное сгибание конечности
- в) наложение давящей повязки
- г) наложение герметичной повязки

292 Альбуминурия – это:

- а) повышенное содержание белка в моче
- б) повышенное содержание белка в крови
- в) примесь крови в моче
- г) гной в моче

293 Азотистые шлаки образуются в организме при распаде:

- а) белков
- б) витаминов
- в) жиров
- г) углеводов

294 Продолжительность гирудотерапии с кровоизвлекающей целью составляет (в минутах):

- а) 15
- б) 20
- в) 30
- г) 45-60

295 Один из симптомов нефролитиаза:

- а) острые или тупые боли в области почек
- б) тошнота
- в) головокружение
- г) повышение АД

296 При первом обследовании пульс надо считать в течение (в секундах):

- а) 10
- б) 15
- в) 30
- г) 6

297 При исследовании мочи по методу Нечипоренко определяют:

- а) количество мочи
- б) количество эритроцитов и лейкоцитов в 1 мл
- в) преобладание ночного или дневного диуреза
- г) удельный вес

298 Причины развития анемии:

- а) кровопотеря, глистные инвазии
- б) заболевания желудочно-кишечного тракта
- в) злокачественные заболевания
- г) атеросклероз, гипертоническая болезнь
- д) тиреотоксикоз, диффузный токсический зоб
- е) бронхиальная астма, острый бронхит
- ё) выбор способа обработки значения не имеет

299 Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью, относятся к классу:

- а) А
- б) Б
- в) В
- г) Г

300 Какой путь введения адреналина предпочтителен при оказании неотложной помощи пациентам с анафилактическим шоком:

- а) внутривенный
- б) внутримышечный
- в) подкожный
- г) ингаляционный