

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

**(для медицинских сестёр урологических отделений и кабинетов, прошедших
обучение по циклам «Сестринское дело в урологии»,
профессиональной переподготовки по специальности
«Сестринское дело»)**

- 1 Прогноз хронического пиелонефрита:
 - а)благоприятный
 - б)неблагоприятный
 - в)крайне неблагоприятный
- 2 Мочеточник – это:
 - а) Парный трубчатый орган, расположенный между почками и мочевым пузырем
 - б) Непарный губчатый орган, соединяющий почки и мочевой пузырь
 - в) Паренхиматозный орган, предназначенный для выведения мочи из мочевого пузыря
- 3 При разрыве мочевого пузыря:
 - а) Лечение консервативное
 - б) Лечение оперативное
 - в) Дренирование
- 4 С целью предупреждения повреждения мочевого пузыря женщин перед гинекологической операцией:
 - а) Устанавливается уретральный катетер
 - б) Собирается моча на бактериологическое исследование
 - в) Проводится ультразвуковое исследование
- 5 Первая помощь при острой задержке мочеиспускания:
 - а)тепло
 - б) опорожнение мочевого пузыря путём катетеризации
 - в)гормональная терапия
- 6 Травма уретры диагностируется с помощью метода:
 - а) Ультразвуковое исследование
 - б) Ректальное обследование
 - в) Ретроградная рентгенография
- 7 Мозговое вещество почки представлено следующей структурой:
 - а) Столб
 - б) Пирамида
 - в) Артерия
- 8 Клинические проявления острого простатита:
 - а) повышение АД
 - б) повышение температуры тела
- 9 Консервативное лечение варикоцеле:
 - а) борьба с запорами
 - б) занятия спортом
 - в) достаточный отдых
 - г) противовоспалительные препараты

10 К развитию ХПН не приводит:

- а) хронический пиелонефрит
- б) острый простатит
- в) поликистоз почек
- г) все ответы верны

11 Грозные осложнения перitoneального диализа:

- а) пневмония
- б) кишечная инфекция
- в) перитонит
- г) остеомиелит

12 Оперативное лечение варикоцеле:

- а) нефрэктомия
- б) удаление тромба
- в) перевязка и пересечение яичковой вены в подвздошной области
- г) всё перечисленное верно

13 Стенокардические боли носят характер:

- а) колючих
- б) сжимающих, давящих за грудиной
- в) постоянных ноющих в левой половине грудной клетки
- г) интенсивных болей за грудиной, более 20 минут, не купирующихся приемом нитроглицерина

14 Участниками обязательного медицинского страхования являются:

- а) застрахованные лица;
- б) страховые медицинские организации;
- в) страхователи;
- г) федеральный фонд

15 Возбудители микотических уретритов:

- а) гонококки
- б) дрожжеподобные грибы
- в) стафилококки
- г) бактерии

16 Самый частый признак поражения почек по анализам мочи:

- а) цилиндрuria
- б) эритроцитурия
- в) протеинурия
- г) глюкозурия

17 Острая почечная недостаточность бывает:

- а) преренальная
- б) постренальная
- в) ренальная
- г) все ответы верны

18 Первоочередной эвакуации подлежат пораженные сортировочной группы:

- а) первой
- б) второй
- в) третьей
- г) четвертой

- 19 Олигурия —это:
- а)недержание мочи
 - б)отсутствие мочи
 - в)стойкое уменьшение количества мочи
 - г)стойкое увеличение количества мочи
- 20 Специфический туберкулёзный процесс поражает:
- а)мочевые пути
 - б)предстательную железу
 - в)придатки яичка
 - г)яичко
- 21 Методы диагностики нефротуберкулёза:
- а)лабораторные
 - б)эндоскопические
 - в)рентгенологические
 - г)всё перечисленное верно
 - д)нет правильного ответа
- 22 Медицинская сестра имеет право вводить катетер:
- а) Жесткий
 - б) Полужесткий
 - в) Мягкий
- 23 Сколько сегментов в почке:
- а) 10
 - б) 5
 - в) 2
- 24 Фимоз — это:
- а)отсутствие яичка в мошонке
 - б)сужение крайней плоти
 - в)деформация полового члена
 - г)добавочное яичко
- 25 Медицинские работники имеют право на:
- а)оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
 - б)совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях;
 - в)соблюдение врачебной тайны;
 - г)профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя
- 26 Наиболее ранний симптом острого пиелонефрита:
- а)гематурия
 - б)бактериурия
 - в)цилиндрурия
- 27 Специальные кабинеты, которые должны быть в урологическом отделении:
- а) процедурный, перевязочный, эндоскопический, R-кабинет
 - б) процедурный, перевязочный, эндоскопический
 - в) процедурный, перевязочный, R-кабинет
 - г) процедурный, перевязочный

- 28 Особенности диеты больных с нефрогенной гипертензией:
- а) ограничение поваренной соли
 - б) увеличение калорийности пищи
 - в) исключение алкоголя
 - г) ограничение белка
- 29 Инфекция проникает в почку путями:
- а) воздушно-капельным
 - б) восходящим
 - в) гематогенным
 - г) лимфогенным
- 30 Анурия — это:
- а) непроизвольное мочеиспускание при неудержимом порыве
 - б) прекращение поступления мочи из почек в мочевой пузырь
- 31 Биомедицинская этика и медицинское право должны находиться в состоянии:
- а) независимости
 - б) медицинское право - приоритетно
 - в) должен быть выдержан приоритет биомедицинской этики
 - г) биомедицинская этика - критерий корректности медицинского права
- 32 Тромбоз почечной артерии приводит к:
- а) сепсису
 - б) инфаркту почки
 - в) аневризме почечной артерии
 - г) циститу
- 33 Причины инфекционного неспецифического уретрита:
- а) стафилококковая инфекция
 - б) цистоскопия
 - в) катетеризация мочевого пузыря
 - г) опухоли уретры
- 34 У больного суточный диурез составил 350 мл. этот симптом называется:
- а) олигурия
 - б) полиурия
 - в) никтурия
 - г) анурия
- 35 Анурия характерна для:
- а) острого пиелонефрита
 - б) фимоза
 - в) острой почечной недостаточности
 - г) хронического простатита
- 36 Правильным определением этики как науки является:
- а) этика - наука об отношении живых существ между собой
 - б) этика - наука о природе и смысле моральных взаимоотношений и нравственных принципов
 - в) этика - наука о минимизации зла в человеческих отношениях
 - г) этика - наука об умении правильно себя вести в обществе
- 37 Первая помощь при анурии проводится:
- а) в амбулаторных условиях
 - б) только в урологическом отделении

- 38 Перевязки урологическим больным после операции проводятся:
- а) ежедневно
 - б) несколько раз в день
 - в) 1 раз в 2-3 дня
 - г) 1 раз в неделю
- 39 Частый симптом нефролитиаза:
- а) острые и тупые боли в почечной области, тошнота
 - б) головокружение
 - в) повышение АД, тошнота
- 40 Частый симптом нефролитиаза:
- а)острые и тупые боли в почечной области, тошнота
 - б)головокружение
 - в)повышение АД, тошнота
- 41 Необоснованность эвтаназии с медицинской точки зрения определяется:
- а)шансом на выздоровление и возможность изменения решения пациента
 - б)нарушением предназначения спасать и сохранять человеческую жизнь
 - в)нарушением моральной заповеди "не убий "
 - г)всеми перечисленными факторами
- 42 Какой путь введения лекарственных препаратов предпочтителен при оказании помощи больным с анафилактическим шоком:
- а) внутривенный
 - б) внутримышечный
 - в) подкожный
 - г) ингаляционный
- 43 Формами оказания медицинской помощи являются:
- а)экстренная, неотложная и плановая медицинская помощь;
 - б)первичная медико-санитарная помощь;
 - в) palliativnaya медицинская помощь;
 - г)скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
- 44 Способность понимания психологических состояний других людей и сопереживание им, умение посмотреть на ситуацию глазами другого - это качество личности:
- а)доброжелательность
 - б)открытость
 - в)конfrontация
 - г)эмпатия
 - д)аутентичность
- 45 Цистит — это:
- а) воспаление яичка
 - б) воспаление мочевого пузыря
 - в) мочекаменная болезнь
 - г) малый мочевой пузырь
- 46 Изъятие органов и тканей от мертвого донора осуществляется в Российской Федерации:
- а)беспрепятственно в интересах науки и общества
 - б)согласно принципу "презумпция несогласия"
 - в)согласно принципу "презумпция согласия "
 - г)в соответствии с морально-религиозными ценностями

- 47 Понятие “информированное согласие” включает в себя все, кроме:
- а) информации о цели предполагаемого вмешательства
 - б) информации о характере предполагаемого вмешательства
 - в) информации о несомненном приоритете пользы вмешательства по сравнению с возможным риском
 - г) информации о связанном с вмешательством риске
- 48 Профилактика хронического пиелонефрита включает всё перечисленное, кроме:
- а) аппендэктомия
 - б) своевременное лечение острого инфекционного процесса в почках
 - в) полноценное лечение острого пиелонефрита
 - г) санация очагов хронической инфекции
- 49 Правильным определением этики как науки является:
- а) этика - наука об отношении живых существ между собой
 - б) этика - наука о природе и смысле моральных взаимоотношений и нравственных принципов
 - в) этика - наука о минимировании зла в человеческих отношениях
 - г) этика - наука об умении правильно себя вести в обществе
- 50 Понятие “милосердие” включает в себя все, кроме:
- а) чувства и способности сострадания
 - б) готовность оказать помощь тому, кто в ней нуждается
 - в) снисходительность
 - г) готовность выполнить любую просьбу человека
- 51 При эктопии яичко находится в:
- а) брюшной полости
 - б) паховом канале
 - в) подкожной клетчатке
- 52 Этичность изъятия органов от мертвого донора предполагает:
- а) отсутствие моральных и законодательных ограничений
 - б) условие высказанного при жизни и юридически оформленного согласия донора
 - в) условие отсутствия высказанных донором при жизни возражений против забора органов у его трупа
 - г) условие согласия родственников
- 53 Отсутствие в мошонке обоих яичек:
- в) монархизм
 - г) анархизм
- 54 Нефроптоз чаще наблюдается у:
- а) мужчин
 - б) женщин
- 55 Цилиндрурия — это:
- а) эритроциты в моче
 - б) гной в моче
 - в) наличие цилиндров в моче
 - г) недержание мочи
- 56 Для определения соотношения между дневным и ночным диурезом назначают пробу по:
- а) Нечипоренко
 - б) Зимницкому
 - в) Ребергу
 - г) Аддис-Каковскому

57 Осложнением внутрибрюшинных ранений мочевого пузыря не является:

- а)аппендицит
- б)перитонит
- в)мочевая флегмона
- г)уросепсис

58 Диагностика нефроптоза:

- а) изотопное сканирование
- б) выделительная урография
- в) общий анализ мочи
- г) почечная артериография

59 Для современной модели профессиональной морали - биоэтики, основным принципом является:

- а) принцип "соблюдения долга"
- б) принцип "не навреди "
- в) принцип приоритета науки
- г) принцип приоритета прав и уважения достоинства пациента

60 Инфекция проникает в почку всеми перечисленными путями, кроме:

- а) воздушно-капельного
- б) восходящего
- в) гематогенного
- г) лимфогенного

61 Назовите ведущий фактор передачи госпитальных гнойно-септических инфекций в медицинских учреждениях:

- а) кровь,
- б) хирургические инструменты,
- в) предметы ухода,
- г) воздух,
- д) руки медицинского персонала

62 К ятрогенным относятся заболевания:

- а)обусловленные вредными факторами производства
- б)обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
- в)с неблагоприятным прогнозом
- г)наследственного генеза

63 Формами оказания медицинской помощи являются:

- а) экстренная, неотложная и плановая медицинская помощь;
- б) первичная медико-санитарная помощь;
- в) паллиативная медицинская помощь;
- г) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь.

64 Крипторихиэм — аномалия внутриутробного развития, при которой к моменту рождения плода:

- а) одно или оба яичка не опустились из забрюшинного пространства через паховый канал в мошонку
- б) недоразвито одно яичко
- в) недоразвиты оба яичка

65 При экспираторной одышке:

- а) затруднен вдох
- б) затруднен выдох
- в) затруднен и вдох, и выдох
- г) меняется только частота дыхания

- 66 Перевязки урологическим больным после операции проводятся:
- а)один раз в 2-3 дня
 - б)ежедневно
 - в)несколько раз в день
- 67 Парадоксальная ишуря – это:
- а) Небольшое выделение мочи на фоне переполненного мочевого пузыря
 - б) Болезненное мочеиспускание
 - в) Большое выделение мочи
- 68 Рентгенологическое исследование почек выявляет всё перечисленное, кроме:
- а) положение почек
 - б) наличие бактерий
 - в) величина почек
 - г) наличие, локализация конкрементов
- 69 Циститом чаще заболевают:
- а) Женщины
 - б) Мужчины
 - в) Встречается одинаково часто у женщин и мужчи
- 70 При эпилептическом припадке:
- а)развитию судорог предшествует аура
 - б)припадок начинается внезапно
 - в)каждый припадок начинается своеобразно
 - г)развитию судорог предшествует психотравмирующая ситуация
- 71 Мужские внутренние половые органы формируются:
- а) на первом году жизни ребёнка
 - б) в эмбриональном периоде
 - в) в подростковом возрасте
- 72 Положение, которое необходимо придать пациенту с явлениями отека легких:
- а)сидя с упором на руки
 - б)с приподнятым головным концом кровати
 - в)лежа на боку
 - г)ортопноэ
- 73 Какой из симптомов при успешной антибактериальной терапии исчезает в первую очередь:
- а) Гематурия
 - б) Дизурия
 - в) Пиурия
- 74 Острая задержка мочи обозначается термином:
- а) анурия
 - б) полиурия
 - в) олигурия
 - г) ишуря
- 75 К внутрибольничным не относят инфекционные заболевания, возникающие у:
- а) пациентов в результате оказания им помощи в стационаре,
 - б) пациентов в результате оказания им помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении,
 - в) медицинских работников в результате их профессиональной деятельности,
 - г) пациентов в сроки, не превышающие минимального инкубационного периода с момента поступления в стационар

- 76 Давящие повязки на органах мошонки необходимы для:
- а)профилактики отёка
 - б)профилактики гематомы в рыхлых тканях мошонки
 - в)все ответы верны
- 77 Основные признаки сужения мочеиспускательного канала:
- а) затрудненное, тонкой вялой струей мочеиспускание
 - б) затрудненное, с режущими болями мочеиспускание
 - в) затрудненное мочеиспускание, частые и болезненные эрекции полового члена
 - г) затрудненное прерывистое мочеиспускание
- 78 Пациент имеет право на:
- а) на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья;
 - б) соблюдение режима лечения, в том числе определенного на период временной нетрудоспособности;
 - в) выбор врача и выбор медицинской организации;
 - г) осуществление рекламы лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания.
- 79 Длина женского мочеиспускательного канала:
- а) 1-2 см
 - б) 10-15 см
 - в) от 3 до 5 см
- 80 Постоянный признак повреждения почек:
- а)цилиндрурия
 - б)лейкоцитурия
 - в)повышение АД
 - г)гематурия
- 81 Способность понимания психологических состояний других людей и сопереживание им, умение посмотреть на ситуацию глазами другого - это качество личности:
- а)доброжелательность
 - б)открытость
 - в)конфронтация
 - г)эмпатия
 - д)аутентичность
- 82 Проба Зимницкого — это:
- а)общий анализ мочи 1 раз утром
 - б)определение количества и плотности мочи за каждые 3 часа в течение суток
 - в)определение глюкозы в моче
- 83 Анатомические структуры, которые находятся в почечной пазухе:
- а) Нижняя полая вена
 - б) Большие чашечки
 - в) Грудная часть аорты
- 84 Выбрать причину закрытого повреждения мочевого пузыря:
- а) ножевое ранение
 - б) пулевое ранение
 - в) все верно
 - г) сильный удар в живот
- 85 Анорхизм — это:
- а)добавочное яичко
 - б)врождённое отсутствие яичек
 - в)задержка миграции яичек в мошонку

- 86 Лучшее запоминание предметов, изображений, звука, цвета и т.п. свидетельствует о преобладании у человека:
- а)наглядно-образной памяти
 - б)словесно-абстрактной памяти
 - в)кратковременной памяти
 - г)промежуточной памяти
 - д)долговременной памяти
- 87 Признаки травмы мочеточника все, кроме:
- а) боль в паху
 - б) Боль в области поясницы
 - в) Гематурия
- 88 Исследование мочи по Амбурже, Ничепоренко проводится с целью:
- а) Определения плотности мочи;
 - б) Определения форменных элементов;
 - в) Выявления микрофлоры
- 89 Сперматорея — это:
- а)непроизвольное мочеиспускание
 - б)наличие крови в моче
 - в)отсутствие семязвержения
 - г)выделение семенной жидкости
 - д)прекращение поступления мочи и почек в мочевой пузырь
- 90 Хроническая почечная недостаточность развивается:
- а)постепенно
 - б)быстро
 - в)молниеносно
- 91 Самостоятельное опущение яичек при крипторхизме можно ожидать:
- а)до 1 года
 - б)до 3-4 лет
 - в)в старших возрастных группах
- 92 Цель санитарного просвещения:
- а)формирование высокой санитарной культуры, сознательного гигиенического поведения граждан
 - б)нетерпимое и критичное отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к условиям окружающей среды, наносящим ущерб здоровью
 - в)правильное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленное на выздоровление
 - г)овладение знаниями, необходимыми для соблюдения правил гигиенического поведения
- 93 Причиной, приводящей к развитию ОПН, не является:
- а) острый гломерулонефрит
 - б) цистит
 - в) отравление нефротоксическими ядами
 - г) гидронефроз
- 94 Признаки хронической почечной недостаточности:
- а) сухость, гиподинамия, мочевина сыворотки крови 5,6 ммоль/л
 - б) сухость, гиподинамия, мочевина сыворотки крови 16,5 ммоль/л
 - в) полиурия
 - г) олигурия

95 Осложнения острого пиелонефрита включают всё перечисленное, кроме:

- а) сепсис
- б) пневмония
- в) хронический пиелонефрит
- г) бактериемический шок
- д) остшая почечная недостаточность

96 При обмороке АД у больных:

- а)резко снижается
- б)снижается постепенно в течении нескольких часов
- в)не изменяется
- г)резко повышается на несколько минут

97 Основной метод лечения опухоли почки:

- а)антибиотикотерапия
- б)удаление почки (нефрэктомия)
- в)гормональная терапия
- г)назначение спазмолитиков

98 После операции на мочевом пузыре при наличии цистостомы накладывают

повязку:

- а)продолговатой формы
- б) в виде «штанишек»
- в) не накладывают
- г) обычную стерильную

99 При проведении инъекций:

- а)одна пара перчаток используется не более, чем на 3 пациентов с обязательной обработкой перчаток антисептиком после каждой инъекции,
- б)одна пара перчаток используется не более, чем на 5 пациентов с обязательной обработкой перчаток антисептиком после каждого инъекции,
- в)пара перчаток используется до первого разрыва видимого или загрязнения кровью,
- г)каждая пара перчаток используется строго индивидуально для каждого пациента

100 Рентгенологическое исследование почек выявляет всё перечисленное, кроме:

- а)положение почек
- б)наличие бактерий
- в)величина почек
- г)наличие, локализация конкрементов

101 Сроки повторного осмотра по педикулезу (в днях):

- а) 3
- б) 10
- в) 5
- г) 7

102 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и

прогноза исхода пораженные выделяются в группы:

- а)две
- б)три
- в)четыре
- г)пять

- 103 На доврачебном этапе (при отсутствии ЭКГ) можно думать о начавшемся инфаркте миокарда,
если приступ стенокардии не купируется приемом нитроглицерина в течение:
а)20-30 минут
б)30 минут — 1 часа
в)1,5 -2 часа
г)суток
- 104 Внурибрюшинный разрыв мочевого пузыря приводит к попаданию мочи:
а) В мочевой пузырь
б) Через уретру во внешнюю среду
в) В брюшную полость
- 105 При выявлении наследственного заболевания у развивающегося плода судьбу этого плода (продолжение беременности или аборт) вправе решать:
а)только врачи-профессионалы
б)только родители
в)только мать
г)государственные органы здравоохранения
- 106 Обязательный симптом острого пиелонефрита:
а) гематурия
б) лейкоцитурия
в) цилиндртурия
г) повышение АД
- 107 Катетеризация мочевого пузыря – это:
а) Процесс введения специальной системы в кровяное русло
б) Введение катетера в мочевой пузырь с целью выведения мочи или взятия ее для исследования
в) Введение зонда в уретру
- 108 Уросепсис — это:
а)воспаление мочевого пузыря
б)сепсис с источником в мочеполовых органах
в)сепсис с источником в бронхолёгочной системе
- 109 Для сложного волевого действия не характерны:
а)борьба мотивов и выбор
б)осознание цели и стремление достичь ее
в)осознание ряда возможностей достижения цели
г)проявление мотивов, утверждающих или отрицающих возможности
- 110 Для современной модели профессиональной морали - биоэтики, основным принципом является:
а)принцип "соблюдения долга"
б)принцип "не навреди"
в)принцип приоритета науки
г)принцип приоритета прав и уважения достоинства пациента
- 111 Для сложного волевого действия не характерны:
а)борьба мотивов и выбор
б)осознание цели и стремление достичь ее
в)осознание ряда возможностей достижения цели
г)проявление мотивов, утверждающих или отрицающих возможности
д)ясная цель и выполнение

- 112 Диагностика нефроптоза:
а)изотопное сканирование
б)общий анализ мочи
в)почечная артериография
г)всё перечисленное верно
- 113 Профилактика хронического пиелонефрита включает всё перечисленное, кроме:
а)аппендэктомия
б)своевременное лечение острого инфекционного процесса в почках
в)полноценное лечение острого пиелонефрита
г)санация очагов хронической инфекции
- 114 Осложнения острого пиелонефрита включают всё перечисленное, кроме:
а)сепсис
б)пневмония
в)хронический пиелонефрит
г)бактериемический шок
д)острая почечная недостаточность
- 115 Признаки острого цистита:
а)боли в пояснице, дизурия, повышение температуры до 39°C
б)боли в пояснице с иррадиацией в пазовую область, наружные половые органы, дизурия
в)режущие боли при мочеиспускании, боли в области крестца, выделение нескольких капель крови в самом конце мочеиспускания
г)боли в надлобковой области, острая задержка мочеиспускания
- 116 Варикоцеле может привести к следующим осложнениям, кроме:
а)острой почечной недостаточности
б)нарушению сперматогенеза
в)импотенции
- 117 Гематурия — это:
а)наличие эритроцитов в моче
б)наличие цилиндов в моче
в)лейкоциты в моче
г)недержание мочи
- 118 Основным симптомом анафилактического шока является:
а)аллергические высыпания на коже
б)нарушение дыхания
в)падение АД
г)отсутствие пульсации на периферических артериях
- 119 Высокий риск возникновения госпитальных гнойно-септических инфекций мочевыводящих путей сопряжен со всеми условиями, кроме:
а)с применением постоянного мочевого катетера,
б)с применением открытых дренажных систем,
в)с применением закрытых герметичных дренажных систем,
г)с нарушением правил асептики и антисептики при постановке и уходе за постоянным мочевым катетером
- 120 Гемосорбция - это:
а)экстракорпоральный диализ
б)метод внеклеточного очищения крови
в)оперативный метод лечения
г)переливание крови

- 121 Врожденная аномалия расположения обеих почек слева, а мочеточники впадают в мочевой пузырь в обычном месте, называется:
- а) S или L - образная почка
 - б) перекрестная дистопия почек
 - в) поясничная дистопия почек
 - г) торакальная дистопия почек
- 122 К психическим процессам относятся:
- а) воля
 - б) память
 - в) характер
 - г) темперамент
 - д) способности
- 123 Ночной энурез — это:
- а) расстройство мочеиспускания
 - б) ночное недержание мочи
 - в) стойкое уменьшение количества мочи
 - г) стойкое увеличение количества мочи
- 124 Понятие “милосердие” включает в себя все, кроме:
- а) чувства и способности сострадания
 - б) готовность оказать помощь тому, кто в ней нуждается
 - в) снисходительность
 - г) готовность выполнить любую просьбу человека
- 125 Мужские внутренние половые органы формируются:
- а) на первом году жизни ребёнка
 - б) в эмбриональном периоде
 - в) в подростковом возрасте
- 126 Уросепсис — это:
- а) воспаление мочевого пузыря
 - б) сепсис с источником в мочеполовых органах
 - в) сепсис с источником в бронхолёгочной системе
- 127 Варикоцеле чаще встречается:
- а) справа
 - б) слева
- 128 Оперативное лечение варикоцеле:
- а) нефрэктомия
 - б) удаление тромба
 - в) перевязка и пересечение яичковой вены в подвздошной области
 - г) всё перечисленное верно
- 129 Асперматизм — это:
- а) отсутствие семяизвержения
 - б) отсутствие спермиев в эякуляте
 - в) наличие лейкоцитов в эякуляте
- 130 Длина женского мочеиспускательного канала:
- а) 1-2 см
 - б) 10-15 см
 - в) от 3 до 5 см

131 Выберите устные средства санитарного просвещения:

- а) беседа, лекция
- б) фотография, плакат
- в) брошюра, журнал
- г) бюллетень, буклеть

132 Хроническая почестная недостаточность в конечном итоге приводит к развитию:

- а) Уремической комы
- б) Нефроптозу
- в) Нефросклерозу

133 Основной симптом при нефроптозе:

- а) повышение температуры тела
- б) протеинурия
- в) боли в области поясницы в вертикальном положении и при ходьбе
- г) потеря аппетита, тошнота

134 Современный метод изучения секрета предстательной железы:

- а) лейкоцитарная формула
- б) люминесцентное цитологическое исследование
- в) тест кристаллизации

135 Кратковременная, бурно протекающая, чрезвычайно интенсивная эмоциональная реакция:

- а) фрустрация
- б) аффект
- в) настроение
- г) депрессия
- д) стресс

136 Масляные стерильные растворы вводят только:

- а) внутривенно
- б) внутримышечно
- в) подкожно
- г) внутрикожно

137 Мозговое вещество почки представлено следующей структурой:

- б) Столб
- б) Пирамида
- в) Артерия

138 Нарушение диуреза называется никтурией, если:

- а) уменьшается количество суточной мочи менее 500 мл
- б) учащается мочеиспускание
- в) преобладает ночной диурез над дневным

139 Осложнения нефроптоза:

- а) гидронефроз
- б) пиелонефрит
- в) эктопия яичка

140 Нефроптоз чаще наблюдается у:

- а) мужчин
- б) женщин

141 Самостоятельное опущение яичек при крипторхизме можно ожидать:

- а) до 1 года
- б) до 3-4 лет
- в) в старших возрастных группах

- 142 Стенокардические боли носят характер:
- а) колючих
 - б) сжимающих, давящих за грудиной
 - в) постоянных ноющих в левой половине грудной клетки
 - г) интенсивных болей за грудиной, более 20 минут, не купирующихся приемом нитроглицерина
- 143 Медицину и этику объединяет:
- а) человек как предмет изучения
 - б) методы исследования
 - в) овладение приемами преодоления конфликтов в человеческих взаимоотношениях
 - г) стремление к знанию механизмов человеческого поведения и к управлению им
- 144 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие пульса на:
- а) локтевой артерии
 - б) лучевой артерии
 - в) сонной артерии
 - г) бедренной артерии
- 145 Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться:
- а) на основании свободного, осознанного и информированного согласия больного
 - б) на основании медицинских показаний
 - в) на основании редкости картины заболевания и его познавательной ценности
 - г) на основании требования родственников
- 146 Диагностическим признаком остановки сердечной деятельности является отсутствие пульса на:
- а) локтевой артерии
 - б) лучевой артерии
 - в) сонной артерии
 - г) бедренной артерии
- 147 Чаще страдают острым пиелонефритом:
- а) женщины
 - б) мужчины
- 148 Разделение целого на части, выделение отдельных признаков, сторон целого:
- а) анализ
 - б) классификация
 - в) сравнение
 - г) синтез
 - д) систематизация
- 149 Карбункул почки — это:
- а) воспаление мочеиспускательного канала
 - б) очаговое гнойно-некротическое поражение почки
 - в) воспаление почки
- 150 Развитие мужских внутренних и наружных половых органов заканчивается:
- а) в 30-35 лет
 - б) к 10-12 годам
 - в) к 18-20 годам
 - г) в 50-55 лет

- 151 Цель сестринского ухода за пациентом с цистостомой:
- а) сохранение привычного режима физиологических отправлений
 - б) отсутствие дискомфорта у пациента
 - в) восстановление функции мочевого пузыря
 - г) обучение правилам пользования внешним катетером
- 152 Использование реанимационного оборудования для пациента, находящегося в критическом состоянии, является:
- а) злоупотреблением терапевтическими средствами
 - б) реализацией принципа "борьбы за человеческую жизнь до конца"
 - в) признаком низкой квалификации специалиста
 - г) отсутствием у врача нравственного чувства и этической культуры
- 153 Консервативное лечение повреждения почек:
- а) накладывание швов на паренхиму
 - б) холод на область почек
 - в) гемостатическая, антибактериальная терапия
 - г) постельный режим на 10-14 дней
- 154 Анурия характерна для:
- а) острого пиелонефрита
 - б) фимоза
 - в) острой почечной недостаточности
 - г) хронического простатита
- 155 Правила сбора мочи включают всё перечисленное, кроме:
- а) обмывание наружных половых органов перед сдачей мочи
 - б) берётся средняя порция струи
 - в) берётся остаточная порция струи
 - г) анализ мочи собирают утром
- 156 Форма целостного психического отражения предметов или явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств - это:
- а) ощущение;
 - б) восприятие;
 - в) внимание;
 - г) правильного ответа нет;
 - д) все ответы верны
- 157 Мочевой пузырь формируется из:
- а) мочевой щели
 - б) мочеточников
 - в) почечной лоханки
 - г) мезенхимы
- 158 Цилиндрурия - это:
- а) гной в моче
 - б) эритроциты в моче
 - в) недержание мочи
 - г) наличие цилиндров в моче
- 159 Сердечная недостаточность обусловлена нарушением следующей функцией сердца:
- а) автоматизма
 - б) проводимости
 - в) сократимости
 - г) возбудимости

- 160 Перечислите признаки гипергликемической комы:
- а) кожа и видимые слизистые влажные
 - б) кожа и видимые слизистые сухие
 - в) повышен тонус глазных яблок
 - г) повышен тургор кожи
- 161 Манипуляции, способствующие развитию острого пиелонефрита:
- а) рентгенография почек
 - б) катетеризация мочевого пузыря
 - в) восходящая пиелография
 - г) цистоскопия
- 162 Пациент имеет право на:
- а)на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья;
 - б)соблюдение режима лечения, в том числе определенного на период временной нетрудоспособности;
 - в)выбор врача и выбор медицинской организации;
 - г) осуществление рекламы лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания
- 163 Выберите печатные средства санитарного просвещения:
- а) муляж
 - б) брошюра
 - в) беседа
 - г) инструктаж
- 164 Анализ мочи по Нечипоренко подсчитывает:
- а)количество эритроцитов
 - б)количество глюкозы в моче
 - в)количество эритроцитов и лейкоцитов, содержащихся в 1 мл мочи
- 165 При инфаркте миокарда в сердечной мышце развивается:
- а)резкий спазм сердечной мышцы
 - б)некроз
 - в)резкое расслабление сердечной мышцы
 - г)аневризма
- 166 Необоснованность эвтаназии с медицинской точки зрения определяется:
- а) шансом на выздоровление и возможность изменения решения пациента
 - б) нарушением предназначения спасать и сохранять человеческую жизнь
 - в) нарушением моральной заповеди "не убий "
 - г) всеми перечисленными факторами
- 167 Высокий риск возникновения госпитальных гнойно-септических инфекций мочевыводящих путей сопряжен со всеми условиями, кроме:
- а) с применением постоянного мочевого катетера,
 - б) с применением открытых дренажных систем,
 - в) с применением закрытых герметичных дренажных систем,
 - г) с нарушением правил асептики и антисептики при постановке и уходе за постоянным мочевым катетером
- 168 Лечение острого пиелонефрита проводится:
- а)амбулаторно
 - б)стационарно

- 169 Повреждение мочеиспускательного канала часто сочетается:
- а) С повреждением костей таза
 - б) С повреждением позвоночника
 - в) С повреждение ребер
- 170 Количественные методы анализа мочи устанавливают всё перечисленное, кроме:
- а) степень лейкоцитурии
 - б) степень эритроцитурии
 - в) глюкозурия
 - г) степень цилиндрурии
- 171 Первая помощь при почечной колике:
- а) тепло, спазмолитики, антибиотикотерапия
 - б) обезболивающие средства, витаминотерапия, тепло
 - в) спазмолитики, тепло, обезболивающие средства
- 172 При ОПН у больного:
- а) полиурия
 - б) никтурия
 - в) анурия
 - г) олигурия
- 173 Ценность человеческой жизни в биомедицинской этике определяется:
- а) возрастом (количество прожитых лет)
 - б) расовой и национальной принадлежностью
 - в) финансовой состоятельностью
 - г) уникальностью и неповторимостью личности
- 174 При ХПН плотность мочи:
- а) низкая
 - б) высокая
 - в) нормальная
- 175 При заболевании почек рекомендуется вариант диеты:
- а) основной
 - б) с пониженным количеством белка
 - в) с повышенным количеством белка
 - г) с пониженной калорийностью
- 176 Оценка функционального состояния почек осуществляется с помощью анализа:
- а) По Ничипоренко
 - б) Общий анализ
 - в) По Земницкому
- 177 Эндогенные причины камнеобразования:
- а) особенности минерального состава воды и почвы
 - б) повышение функции околощитовидных желез
- 178 Острая задержка мочеиспускания при остром простатите возможна:
- а) да
 - б) нет
 - в) только в начальной стадии процесса
 - г) как исход заболевания
- 179 Аномалии почек включают:
- а) аплазию, гипоплазию
 - б) удвоение
 - в) дистопию
 - г) наличие камней в почках

- 180 Пиелонефрит — это:
- а)воспаление предстательной железы
 - б)инфекционно-воспалительный процесс в чашечно-лоханочной системе
 - в)воспаление мочеиспускательного канала
- 181 Активная эвтаназия отличается от пассивной:
- а)отсутствием согласия или просьбы пациента о лишении жизни
 - б)приоритетностью решения врача перед решением пациента о прекращении жизни пациента
 - в)активным, деятельным, вмешательством врача в процесс прекращения жизни по просьбе пациента
 - г)умышленным или преднамеренным лишением жизни человека
- 182 Наиболее опасное время для развития пиелонефрита у женщин:
- а)20 лет
 - б)пожилой возраст
 - в)беременность
 - г)не имеет значения
- 183 Обязательное медицинское страхование - это:
- а)предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи;
 - б)страховой риск, связанный с возникновением страхового случая;
 - в)обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи;
 - г)обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, целевым назначением которых является обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения
- 184 К достоверным признакам внезапной остановки сердечной деятельности не относится:
- а)отсутствие пульса на сонных артериях
 - б)внезапная потеря сознания
 - в)отсутствие самостоятельного дыхания
 - г)отсутствие тонов сердца
- 185 Клиника острого уретрита включает все перечисленные симптомы, кроме:
- а)жжение
 - б)боли в правом подреберье
 - в)выделения из уретры
 - г)боли при мочеиспускании
- 186 Возбудитель гонорейного уретрита:
- а)пневмококк
 - б)стафилококк
 - в)гонококк
 - г)любая бактериальная флора
- 187 Азооспермия — это:
- а)отсутствие спермиев в эякуляте
 - б)отсутствие спермиев в эякуляте при наличии клеток сперматогенеза
 - в)наличие эритроцитов в сперме
 - г)лейкоциты в эякуляте

- 188 Варикоцеле — это:
- а) добавочное яичко
 - б) расширение вен семенного канатика
 - в) врождённое отсутствие яичек
 - г) врождённая водянка яичек
- 189 Больные с обострением хронического пиелонефрита лечатся:
- а) амбулаторно
 - б) стационарно
- 190 Количественные методы анализа мочи устанавливают всё перечисленное, кроме:
- а) степень лейкоцитурии
 - б) степень эритроцитурии
 - в) глюкозурия
 - г) степень цилиндрурии
- 191 Кратковременная, бурно протекающая, чрезвычайно интенсивная эмоциональная реакция:
- а) фрустрация
 - б) аффект
 - в) настроение
 - г) депрессия
 - д) стресс
- 192 При экспираторной одышке:
- а) затруднен вдох
 - б) затруднен выдох
 - в) затруднен и вдох, и выдох
 - г) меняется только частота дыхания
- 193 Число пораженных при территориальных (региональных) чрезвычайных ситуациях (катастрофах):
- а) 10-50 пораженных
 - б) 50-500 пораженных
 - в) свыше 500 пораженных
 - г) до 10 пораженных
- 194 Причина варикоцеле:
- а) нарушение венозной циркуляции в почечной вене
 - б) острый пиелонефрит
 - в) цистит
 - г) фимоз
- 195 Парауретральные железы заканчивают своё развитие:
- а) к моменту рождения
 - б) к моменту полового созревания
 - в) в возрасте 25-30 лет
- 196 Ёмкость мочевого пузыря у взрослого:
- а) 100-150 мл
 - б) от 200 до 500 мл
 - в) 1 л — 1 л 500 мл
- 197 Лечение крипторхизма может быть:
- а) консервативное
 - б) оперативное
 - в) при надкостных переломах
 - г) всё перечисленное верное

- 198 В первые послеоперационные часы при нефрэктомии:
- а) исключаются резкие повороты туловища
 - б) не напрягать брюшной пресс
 - в) можно вставать и ходить
 - г) нужно пить много жидкости
- 199 Этическая неприемлемость “аномальной техники деторождения” связана:
- а)с нарушением права ребенка быть рожденным в традиционном браке естественным путем
 - б)с уничтожением “лишних” человеческих эмбрионов
 - в)с обесцениванием ценности и значения материнства и материнской любви в случаях легализации “суррогатного материнства”
 - г)со всеми перечисленными факторами
- 200 Фимоз — это:
- а)воспаление яичка
 - б)воспаление семенного канатика
 - в)узость крайней плоти полового члена
- 201 Здоровый образ жизни включает в себя:
- а)благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе поведенческой, гигиенические навыки
 - б)состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
 - в)принятие мер, направленных на снижение влияния вредных факторов на организм человека
 - г)привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом
- 202 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
- а)в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
 - б)лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей,
 - в)в целях проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях;
 - г)организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения
- 203 Больные с обострением хронического пиелонефрита лечатся:
- а)амбулаторно
 - б)стационарно
- 204 Мочевой пузырь у мужчин:
- а)овальной формы
 - б)шарообразный
 - в)конусообразный
- 205 Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться:
- а)на основании свободного, осознанного и информированного согласия больного
 - б)на основании медицинских показаний
 - в)на основании редкости картины заболевания и его познавательной ценности
 - г)на основании требования родственников

- 206 Какой путь введения лекарственных препаратов предпочтителен при оказании помощи больным с анафилактическим шоком:
- а)внутривенный
 - б)внутримышечный
 - в)подкожный
 - г)ингаляционный
- 207 Понятие «здоровья»:
- а)состояние полного физического, душевного и социального благополучия, отсутствие болезней и физических дефектов
 - б)состояние полного физического, психического и социального благополучия
 - в)состояние, сопровождающееся получением удовольствия от жизни
- 208 При коллапсе давление:
- а)снижается систолическое до 80-50 мм рт.ст.
 - б)кратковременно повышается с последующим прогрессивным его снижением
 - в)не изменяется
 - г)снижается систолическое до 90 мм рт. ст.
- 209 Обмороку может предшествовать:
- а)период дурноты
 - б)потемнение в глазах или мелькание «мушек»
 - в)онемение конечностей
 - г)потеря сознания
- 210 Консервативное лечение варикоцеле включает:
- а)борьба с запорами
 - б) занятия спортом
 - в)достаточный отдых
 - г)натуральные витамины
 - д)всё перечисленное верно
- 211 Для диагностики хронического цистита применяют:
- а) цистографию
 - б) изотопную сцинтиграфию
 - в) цистоскопию
 - г) функциональную биопсию почек
- 212 Перевязки урологическим больным после операции проводятся:
- а) 1 раз в неделю
 - б) ежедневно
 - в) несколько раз в день
 - г) 1 раз в 2-3 дня
- 213 Ценность человеческой жизни в биомедицинской этике определяется:
- а)возрастом (количество прожитых лет)
 - б)расовой и национальной принадлежностью
 - в)финансовой состоятельностью
 - г)的独特ностью и неповторимостью личности
- 214 Нефроптоз — это:
- а)опущение почки
 - б)почечнокаменная болезнь
 - в)сморщивание почки

215 В начале приступа бронхиальной астмы у больных отмечается кашель:
а)с выделением пенистой розовой мокроты
б)с выделением «ржавой» мокроты
в)сухой
г)с выделением стекловидной мокроты

216 Полиурия — это:
а)стойкое увеличение количества мочи
б)недержание мочи
в)задержка мочеиспускания

217 Развитие мужских внутренних и наружных половых органов заканчивается:
а)в 30-35 лет
б)к 10-12 годам
в)к 18-20 годам
г)в 50-55 лет

218 Действующим агентом при паровом методе стерилизации является:
а)водяной пар,
б)насыщенный водяной пар,
в)насыщенный водяной пар под давлением,
г)газ

219 Экзогенные причины камнеобразования:
а)авитаминоз
б)повышение функции околощитовидных желез
в)особенности минерального состава воды и почвы

220 Травма мочеиспускательного канала чаще встречается:
а) У детей
б) У женщин
в) У мужчин

221 Постельное белье пациенту меняют 1 раз (в днях):
а) 1
б) 7
в) 14
г) 10

222 Форма целостного психического отражения предметов или явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств - это:
а)ощущение;
б)восприятие;
в)внимание;
г)правильного ответа нет;
д)все ответы верны

223 Уретрорагия — это:
а)выделение семенной жидкости
б)недержание мочи
в)выделение из уретры вне мочеиспускания крови
г)расстройства мочеиспускания

- 224 Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием:
- а)личность;
 - б)индивидуид;
 - в)человек;
 - г)индивидуальность;
 - д)субъект
- 225 Полоски лейкопластиря для фиксации повязки накладывают:
- а)поперечно
 - б)поперечно
 - в)не имеет значения
- 226 Прогноз хронического пиелонефрита:
- а)благоприятный
 - б)неблагоприятный
 - в)крайне неблагоприятный
- 227 Состояние, не требующее неотложной помощи в урологии:
- а)почечная колика
 - б)крипторхизм
 - в)анурия
 - г)острая задержка мочеиспускания
- 228 Дизурия — это:
- а)ночное недержание мочи
 - б)гной в моче
 - в)расстройства мочеиспускания
 - г)кровь в моче
- 229 Моча должна исследоваться:
- а)в течение суток
 - б)сразу после сбора
 - в)время не имеет значения
- 230 Клинические проявления почечной гипертонии исключают:
- а)изменения глазного дна
 - б)высокое диастолическое АД
 - в)боли в животе
 - г)головная боль, слабость
- 231 Современный метод изучения секрета предстательной железы:
- а)лейкоцитарная формула
 - б)люминесцентное цитологическое исследование
 - в)тест кристаллизации
- 232 Инкубационный период трихомонадного уретрита:
- а)6 месяцев
 - б)около 10 дней
 - в)1 месяц
- 233 Выберите устные средства санитарного просвещения:
- а) беседа, лекция
 - б) фотография, плакат
 - в) брошюра, журнал
 - г) бюллетень, буклет
- 234 Дренажные трубки при урологических операциях:
- а)не требуют фиксации
 - б)требуют фиксации

235 Выберите печатные средства санитарного просвещения:

- а)муляж
- б)брошюра
- в)беседа
- г)инструктаж

236 Перечислите признаки гипергликемической комы:

- а)кожа и видимые слизистые влажные
- б)кожа и видимые слизистые сухие
- в)повышен тонус глазных яблок
- г)повышен тургор кожи

237 Азотистые шлаки образуются в организме при распаде:

- а) белков
- б) витаминов
- в) жиров
- г) углеводов

238 Туберкулёт почек — это:

- а)неспецифический процесс
- б)специфический процесс

239 Острый пиелонефрит чаще развивается в:

- а)одной почке
- б)обеих почках
- в)укорочение конечности
- г)ущемление мягких тканей между отломками костей

240 Вмешательство в геном человека может быть осуществлено во всех перечисленных целях, кроме:

- а)изменения генома половых клеток
- б)профилактических целей
- в)диагностических целей
- г)терапевтических целей

241 К основным симптомам цистита относятся все, кроме:

- а)Резь при мочеиспускании
- б) Частое мочеиспускание
- в) Полиурия

242 Мочеприёмные сосуды должны быть:

- а)из тёмного стекла
- б)из бесцветного, прозрачного стекла
- в)не имеет значения

243 К закрытым повреждениям почек относится всё перечисленное, кроме:

- а)подкапсульные разрывы паренхимы
- б)ушибы
- в)размозжения
- г)отрывы от сосудов
- д)слепые ранения почек

- 244 Лучшее запоминание предметов, изображений, звука, цвета и т.п. свидетельствует о преобладании у человека:
- а)наглядно-образной памяти
 - б)словесно-абстрактной памяти
 - в)кратковременной памяти
 - г)промежуточной памяти
 - д)долговременной памяти
- 245 К психическим процессам относятся:
- а) воля
 - б) память
 - в) характер
 - г) темперамент
 - д) способности
- 246 В гиппократовской модели биомедицинской этики основным принципом является:
- а)не навреди
 - б)не убий
 - в)приоритет интересов науки
 - г)принцип автономии личности
- 247 Структура сознательной деятельности включает в себя:
- а)получение и переработку информации;
 - б)постановку задачи и создание ее образа;
 - в)выбор нужного способа решения задачи;
 - г)сличение результатов решения и коррекция ошибок;
 - д)все ответы верны
- 248 Спазмолитиками являются:
- а)омнопон, атропин, папаверин
 - б)платифиллин, омнопон, адельфан
 - в)атропин, папаверин, адельфан
 - г)платифиллин, атропин, папаверин
- 249 Клиника острого эпидидимита:
- а) боль в яичке
 - б) боль в паховой области
 - в) повышение АД
 - г) повышение температуры тела
- 250 Одним из показаний для пересадки почки является:
- а) Гломерулонефрит
 - б) Гипертоническая болезнь
 - в) Терминальная стадия хронической почечной недостаточности
- 251 Гематурия - это:
- а) лейкоциты в моче
 - б) наличие эритроцитов в моче
 - в) цилиндры в моче
 - г) недержание мочи
- 252 Крипторихзм — аномалия внутриутробного развития, при которой к моменту рождения плода:
- а)одно или оба яичка не опустились из забрюшинного пространства через паховый канал в мошонку
 - б)недоразвито одно яичко
 - в)недоразвиты оба яичка

- 253 Боли при нефроптозе не усиливаются:
- а) в лежачем положении
 - б) во время работы
 - в) при ходьбе
- 254 Первые три признака закрытого разрыва мочевого пузыря:
- а) снижение АД, боли в низу живота, бесплодные позывы на мочеиспускание
 - б) боли в низу живота, моча, окрашенная кровью, бесплодные позывы на мочеиспускание
 - в) мутный цвет мочи, боли в низу живота, снижение АД
- 255 При эктопии яичко находится в:
- а) брюшной полости
 - б) паховом канале
 - в) в подкожной клетчатке
- 256 Полиорхизм — это:
- а) добавочное яичко
 - б) задержка миграции яичка в мошонку
 - в) врождённое отсутствие яичек
- 257 Классическая триада рака почки:
- а) гематурия
 - б) пальпируемая опухоль в подреберье
 - в) повышение температуры
 - г) боль
- 258 При ХПН плотность мочи:
- а) высокая
 - б) низкая
 - в) в норме
- 259 Признаками, характерными для «госпитальных штаммов» возбудителей гноино-септических инфекций являются все указанные, кроме:
- а) ~~Полирезистентность к антибиотикам,~~
 - б) ~~Учувствительность к антибиотикам,~~
 - в) ~~Устойчивость к дезинфектантам и антисептикам,~~
 - г) ~~способность вызывать связанные заболевания~~
- 260 Клиника острого уретрита:
- а) чувство жжения в мочеиспускательном канале
 - б) боли в паховой области
 - в) выделения из уретры
 - г) боли при мочеиспускании
- 261 Физиологическое число мочеиспусканий в норме составляет (раз в сутки):
- а) 2-3
 - б) 4-5
 - в) 6-7
 - г) 8-9
- 262 Азооспермия — это:
- а) отсутствие спермиев в эякуляте
 - б) отсутствие спермиев в эякуляте при наличии клеток сперматогенеза
 - в) наличие эритроцитов в сперме
 - г) лейкоциты в эякуляте
- 263 Отсутствие в мошонке одного яичка:
- а) монархизм
 - б) анархизм

- 264 При сортировке на основании оценки общего состояния, характера повреждений и прогноза исхода пораженные выделяются в группы:
- а) две
 - б) три
 - в) четыре
 - г) пять
- 265 Согласно приказу МЗ РФ от 04.03.2003 №73 длительность реанимационных мероприятий составляет:
- а) не менее 15 минут
 - б) не менее 25 минут
 - в) не менее 30 минут
 - г) не менее 1 часа
- 266 Специфический туберкулёзный процесс поражает:
- а) мочевые пути
 - б) предстательную железу
 - в) придатки яичка
 - г) яичко
 - д) семявыносящий проток
 - е) всё перечисленное
- 267 Клиника острого уретрита включает все перечисленные симптомы, кроме:
- а) жжение
 - б) боли в правом подреберье
 - в) выделения из уретры
 - г) боли при мочеиспускании
- 268 Инкубационный период трихомонадного уретрита:
- а) 7 дней
 - б) 10 дней
 - в) 1 месяц
 - г) 6 месяцев
- 269 Нефроптоз — это:
- а) опущение почки
 - б) почечнокаменная болезнь
 - в) сморщивание почки
- 270 Структура, входящая в состав ворот почек:
- а) Почечная артерия
 - б) Жировая капсула почки
 - в) Лоханка
- 271 Причиной, приводящей к развитию ОПН, не является:
- а) острый гломерулонефрит
 - б) цистит
 - в) отравление нефротоксическими ядами
 - г) гидронефроз
- 272 Положение, которое необходимо придать пациенту с явлениями отека легких:
- а) сидя с упором на руки
 - б) с приподнятым головным концом кровати
 - в) лежа на боку
 - г) ортопноэ

- 273 Дополнительное исследование, подтверждающее повреждение мочевого пузыря:
- а) общий анализ мочи
 - б) цистография
 - в) проба по Зимницкому
 - г) экскреторная урография
- 274 Для терминальной фазы хронической почечной недостаточности характерна:
- а) полиурия
 - б) олигоанурия
 - в) ишурия
 - г) поллакиурия
- 275 Внутримышечные инъекции делают в область квадранта ягодицы:
- а) верхневнутренний
 - б) верхненаружный
 - в) нижневнутренний
 - г) нижненаружный
- 276 Прогноз острого пиелонефрита:
- а) неблагоприятный
 - б) крайне неблагоприятный
 - в) чаще всего благоприятный
- 277 Согласно приказу МЗ РФ от 04.03.2003 №73 длительность реанимационных мероприятий составляет:
- а) не менее 15 минут
 - б) не менее 25 минут
 - в) не менее 30 минут
 - г) не менее 1 часа
- 278 Для купирования приступа стенокардии на доврачебном этапе нитроглицерин можно применять повторно с интервалом:
- а) 20-30 минут
 - б) 10-15 минут
 - в) 5-10 минут
 - г) 5 минут
- 279 Пациента в состоянии гипергликемической комы:
- а) необходимо госпитализировать
 - б) не госпитализируют
 - в) необходимо активно наблюдать на дому
 - г) госпитализировать только после выведения из комы
- 280 Олигурия — это:
- а) недержание мочи
 - б) отсутствие мочи
 - в) стойкое уменьшение количества мочи
 - г) стойкое увеличение количества мочи
- 281 При нарушении правил асептики во время катетеризации мочевого пузыря может возникнуть следующее осложнение:
- а) Разрыв уретры
 - б) Инфицирование с развитием уретрита, цистита
 - в) Гидронефроз

- 282 Острый пиелонефрит обязательно сопровождается:
- а) гематурией
 - б) лейкоцитурией
 - в) цилиндруроией
 - г) повышением АД
- 283 Характер дыхания пациента при альвеолярном отеке легких:
- а) клоночущее
 - б) грубое сухое
 - в) слабое поверхностное
 - г) везикулярное
- 284 Инфекция проникает в почку всеми перечисленными путями, кроме:
- а) воздушно-капельного
 - б) восходящего
 - в) гематогенного
 - г) лимфогенного
- 285 Обязательный симптом острого пиелонефрита:
- а) гематурия
 - б) лейкоцитурия
 - в) цилиндруроия
 - г) повышение АД
- 286 Прогноз у больных нефрогенной гипертонией:
- а) благоприятный
 - б) неблагоприятный
 - в) крайне неблагоприятный
- 287 Триада симптомов, которые характерны для повреждения почки:
- а) Боль в области поясницы, припухлость, появление крови в моче
 - б) Появление гноя в моче, малое выделение мочи, боль
 - в) Отеки, боль, резь при мочеиспускании
- 288 Принцип гипотензивного лекарственного лечения при нефрогенной гипертонии:
- а) большие дозы коротким курсом
 - б) длительное, непрерывное применение в малых дозах
- 289 Необходимое количество растительного масла для постановки масляной клизмы (в мл):
- а) 10
 - б) 100
 - в) 1000
 - г) 500
- 290 Клинические проявления почечной гипертензии:
- а) изменения глазного дна
 - б) высокое диастолическое давление
 - в) боли в животе
 - г) головная боль, слабость
- 291 Методы диагностики нефротуберкулёза:
- а) лабораторные
 - б) эндоскопические
 - в) рентгенологические
 - г) всё перечисленное верно
 - д) нет правильного ответа

- 292 Основными клиническими проявлениями специфического туберкулёзного поражения почек является всё перечисленное, кроме:
- а)макрогематурия
 - б)лейкоцитурия
 - в)бактериурия
 - г)тупые боли в пояснице
 - д)наличие туберкулёзного поражения других органов давностью 5-12 лет
- 293 В России трансплантация может проводиться без согласия донора, если донор:
- а)особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение
 - б)гражданин страны, находящейся в состоянии войны с Россией
 - в)психически неполноценный
 - г)донор — умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов
- 294 Аномалии почек включают всё перечисленное, кроме:
- а)аплазия, гипоплазия
 - б)удвоение
 - в)дистапия
 - г)поликистозы
 - д)мочекаменная болезнь
- 295 Крипторхизм — это:
- а)врождённое отсутствие яичек
 - б)задержка миграции яичек в мошонку
 - в)добавочное яичко
 - г)врождённая водянка яичка
- 296 Самочувствие больных с варикоцеле:
- а)особо не страдает
 - б)тяжёлое
 - в)крайне тяжёлое
- 297 Апостематозный нефрит, абсцесс, карбункул почки являются вариантами:
- а)острого гнойного пиелонефрита
 - б)острого серозного пиелонефрита
 - в)гломерулонефрита
- 298 Оперативное лечение варикоцеле:
- а)должно быть проведено как можно раньше
 - б)не важно, в какие сроки проводится
 - в)вообще не проводится
- 299 10-12 см – длина уретры:
- а) У мужчины
 - б) У женщины
 - в) У детей
- 300 Острая дыхательная недостаточность при истинном (альвеолярном) отеке легких возникает в результате:
- а)пропотевания плазмы крови в альвеолы
 - б)попадания жидкости в альвеолы (аспирация жидкости)
 - в)пропотевания форменных элементов крови в альвеолы
 - г)бронхоспазма