

**БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
(ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ, ВЫСШАЯ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»**

**(для медицинских сестёр лабораторий радиоизотопной диагностики, отделений
лучевой терапии, прошедших обучение по циклам "Радиоизотопная диагностика,
лучевая терапия", профессиональной переподготовки по специальности
«Сестринское дело»)**

- 1 На принципе ионизационного эффекта и способности отрицательных и положительных ионов под действием электрического поля перемещаться к электродам противоположного знака устроены дозиметры с:
 - а) газоразрядными счетчиками;
 - б) термolumинесцентными детекторами;
 - в) фотolumинесцентными детекторами;
 - г) сцинтилляционными детекторами
- 2 Какая активность ^{99m}Tc -пертехнетата вводится больным при исследовании функции щитовидной железы?
 - а) 30 МБк
 - б) 50 МБк
 - в) 150-200 МБк
 - г) 1000 МБк
- 3 Суммарный эффект облучения для всего организма с учетом радиочувствительности отдельных органов и тканей отражает:
 - а) экспозиционная доза;
 - б) поглощенная доза;
 - в) эквивалентная доза;
 - г) эффективная эквивалентная доза
- 4 Что необходимо сделать при асфиксии вследствие инородного тела верхних дыхательных путей и невозможности его удаления?
 - а) ингаляцию кислорода
 - б) коникотомию
 - в) ИВЛ рот в рот
 - г) все перечисленное верно
- 5 Внесистемной единицей измерения мощности поглощенной дозы является:
 - а) рентген в час;
 - б) рад в минуту;
 - в) грэй в минуту;
 - г) бэр в час
- 6 Показания к секторному облучению опухолей:
 - а) Поверхностно расположенные опухоли.
 - б) Глубоко расположенные опухоли.
 - в) Центрально и глубоко расположенные опухоли.
 - г) Глубоко и асимметрично расположенные опухоли

- 7 Какой основной документ устанавливает критерии безопасности радиационных факторов среды обитания?
- а) ОСПОРБ
 - б) НРБ
 - в) санитарный паспорт
 - г) приказ по лечебному учреждению
- 8 На принципе ионизационного эффекта и способности отрицательных и положительных ионов под действием электрического поля перемещаться к электродам противоположного знака устроены дозиметры с:
- а) ионизационными камерами;
 - б) термolumинесцентными детекторами;
 - в) фотolumинесцентными детекторами;
 - г) сцинтилляционными детекторами
- 9 При эксплуатации гамма-терапевтических аппаратов опасными производственными факторами являются:
- а) опасный уровень напряжения в электрических сильноточных цепях, заземление которых может пройти через тело человека и повышенная ионизация в воздухе рабочих помещений;
 - б) повышенная ионизация в воздухе рабочих помещений и повышенная концентрация токсических компонентов защитных материалов на рабочих поверхностях и в воздухе рабочих помещений;
 - в) лазерное излучение и повышенная концентрация озона и окислов азота от воздушных электрических разрядов в высоковольтных устройствах;
 - г) ионизирующее излучение и опасный уровень напряжения в электрических сильноточных цепях, за-земление которых может пройти через тело человека
- 10 Внесистемной единицей измерения эквивалентной дозы является:
- а) бэр;
 - б) рад;
 - в) грэй;
 - г) зиверт
- 11 Каковы способы временной остановки венозного и капиллярного кровотечения?
- а) наложение жгута и закрутки
 - б) максимальное сгибание в суставах
 - в) введение аминокапроновой кислоты
 - г) наложение давящей повязки
- 12 Какова должна быть частота нажатий при непрямом массаже сердца?
- а) 20 в минуту
 - б) 55 в минуту
 - в) 60 в минуту
 - г) 100 в минуту
- 13 Четыре слоя половинного ослабления ослабляют излучение:
- а) в 4 раза;
 - б) в 8 раз;
 - в) в 16 раз;
 - г) в 32 раза

- 14 Что такое толерантная доза:
- а) Величина энергии поглощенная единицей массы или объема облучаемого вещества.
 - б) Отношение дозы на глубине к дозе в свободном воздухе.
 - в) Величина энергии, подведенная за весь курс лечения.
 - г) Предельно допустимая величина энергии поглощенная жизненно важными органами и тканями, через которые проводится облучение
- 15 Беккерель - это:
- а) единица измерения энергии излучения;
 - б) единица измерения активности радиоактивного вещества;
 - в) единица измерения мощности дозы;
 - г) единица измерения удельной активности
- 16 Различное биологическое действие, оказываемое различными видами ионизирующих излучений, отражает:
- а) экспозиционная доза;
 - б) поглощенная доза;
 - в) эквивалентная доза
 - г) эффективная эквивалентная доза
- 17 К индивидуальным средствам защиты от ионизирующего излучения при работе на гамма-аппаратах относятся:
- а) медицинские халаты, шапочки, бахилы, марлевые повязки и маски;
 - б) индивидуальные дозиметры;
 - в) системы блокировок и световой сигнализации аппаратов;
 - г) системы биологической защиты аппаратов и помещений
- 18 Что такое расщепленный курс лучевой терапии:
- а) Перерыв курса лучевой терапии на 4 дня.
 - б) Перерыв курса лучевой терапии на 4 месяца.
 - в) Перерыв курса лучевой терапии на несколько недель.
 - г) Перерыв курса лучевой терапии на несколько часов
- 19 Какую цель преследует радикальный курс лучевой терапии:
- а) Излечить больного.
 - б) Облегчить состояние больного.
 - в) Снять болевые симптомы.
 - г) Продлить жизнь больного
- 20 Какова техника подготовки кожи в месте инъекции при протирании спиртовым тампоном?
- а) в одном направлении несколько раз
 - б) от места инъекции к периферии (радиально)
 - в) в одном направлении без наслоения последующих мазков
 - г) правильно – б и в
- 21 Показания к лучевой терапии:
- а) Злокачественные опухоли.
 - б) Доброположительные опухоли костно-суставного аппарата.
 - в) Воспалительные заболевания органов дыхания.
 - г) Язва желудка
- 22 Масло в рентгенотерапевтическом аппарате Рентген ТА охлаждается:
- а) жидким азотом;
 - б) кислородом;
 - в) водой;
 - г) за счет перерывом в работе аппарата

- 23 Какие радиоизотопные исследования можно проводить беременным?
- а) *in vitro*
 - б) *in vivo*
 - в) с короткоживущими РФП
 - г) с ультракороткоживущими РФП
- 24 Требуется ли дозиметрический контроль перед выбрасыванием флаконов из-под изотопов?
- а) требуется
 - б) не требуется
 - в) не обязательно
 - г) зависит от того, куда выбрасывается
- 25 Какой период полураспада ^{131}I :
- а) 6,5 часов
 - б) 8,5 дня
 - в) 3 минуты
 - г) 1 год
- 26 Во время работы облучения пациентов на гамма-терапевтических аппаратах средней медицинский персонал обязан находиться:
- а) в радиологическом отделении;
 - б) за пультом управления аппарата;
 - в) в процедурном помещении рядом с пациентом;
 - г) место нахождения не имеет значения
- 27 Сколько периодов полураспада выдерживаются радиоактивные отходы перед списанием и выбрасыванием?
- а) один период
 - б) десять периодов
 - в) 50 периодов
 - г) выбрасывать нельзя
- 28 Непосредственно ионизирующее излучение может состоять из:
- а) альфа-частиц;
 - б) фотонов;
 - в) нейтронов;
 - г) гамма-квантов
- 29 С какой периодичностью персонал группы А должен проходить медицинский осмотр?
- а) раз в месяц
 - б) раз в квартал
 - в) раз в полгода
 - г) раз в год
- 30 В каком положении пациента следует вводить РФП при перфузационной сцинтиграфии легких?
- а) сидя
 - б) лежа на боку
 - в) лежа на спине
 - г) правильно – а и в

- 31 Кто не допускается к работе с открытыми источниками излучения?
- а) лица до 18 лет
 - б) беременные
 - в) лица, не имеющие допуска к работе по медицинским показаниям
 - г)все перечисленное
- 32 Косвенно ионизирующее излучение может состоять из:
- а) электронов;
 - б) протонов;
 - в) альфа-частиц;
 - г) фотонов
- 33 Периодом полураспада называется:
- а)время, за которое масса радионуклида уменьшается вдвое;
 - б)время, за которое распадается половина атомов радионуклида;
 - в) время, за которое объем радионуклида уменьшается вдвое;
 - г) вероятность распада атома в единицу времени
- 34 Величина области геометрической полутени пучка излучения источника Кобальт-60 не зависит от:
- а) размера поля облучения;
 - б) размера источника;
 - в) конструкции головки гамма-аппарата;
 - г) расстояния от источника
- 35 К какой категории пациентов относятся больные злокачественными заболеваниями?
- а) АД
 - б) БД
 - в) ВД
 - г) ЕД
- 36 Что такое период полураспада:
- а) Время, в течение которого активность элемента уменьшается на 25 %.
 - б) Время, в течение которого ядро теряет 50 % нейтронов.
 - в) Время, в течение которого с внешней орбиты теряется 50 % электронов
 - г) Время, в течение которого активность элемента уменьшается на 50 %
- 37 Что является местом приложения силы при непрямом массаже сердца?
- а) правая половина груди
 - б) левая половина груди
 - в) средняя треть грудины
 - г) нижняя треть грудины
- 38 Какой вид излучения используется в радионуклидной диагностике:
- а) световое
 - б)ионизирующее
 - в) инфракрасное
 - г) ионизирующее рентгеновское
- 39 Диаграмма дистанционного гамма-аппарата обеспечивает:
- а) визуальную центрацию пучка излучения на пациенте;
 - б) плановую регулировку размера поля облучения;
 - в) выпуск рабочего пучка излучения;
 - г) формирование фигурного поля облучения

- 40 Во внутривенном аппарате для формирования дозового поля не используются:
- а)принцип дискретного перемещения источников излучения;
 - б)система электромеханических тросовых транспортеров;
 - в) варьирование времени облучения в заданных позициях;
 - г) система коллимации пучка излучения
- 41 Какие осложнения внутриенной инъекции приводят к моментальной смерти?
- а) воздушная эмболия
 - б) гематома
 - в) некроз
 - г) сепсис
- 42 Для дозиметрии защиты используют дозиметры типа:
- а)UNIDOS;
 - б)ТЛД;
 - в)ДТЛ;
 - г)ДРГ-01-Т1
- 43 Какие из лекарств вызывают токсикоманию при длительном приеме?
- а) тазепам
 - б) димедрол
 - в) валокордин
 - г) все перечисленное
- 44 Чем определяется заряд ядра атома (атомный номер в таблице Менделеева)?
- А) количеством протонов
 - б) количеством нейтронов
 - в) количеством электронов
 - г) суммой протонов и нейтронов
- 45 Что предотвращает введение воздуховода?
- а)регургитацию
 - б) аспирацию
 - в)остановку дыхания
 - г)западение языка
- 46 Какой характер имеет закон радиоактивного распада?
- а) вероятностный
 - б) невероятностный
 - в) хаотический
 - г) неизвестный
- 47 Каковы признаки правильного наложения венозного жгута?
- а) исчезновение пульса ниже жгута
 - б) сохранение пульса ниже жгута
 - в) конечность синюшная, отечная, теплая на ощупь
 - г) конечность бледная, холодная
- 48 Тренировка рентгеновской трубки на Рентген ТА проводится:
- а) при минимальном значении напряжения на трубке;
 - б) при номинальном значении напряжения на трубке;
 - в) при постепенном повышении напряжения на трубке;
 - г) при номинальном значении анодного тока на трубке

- 49 Сдвигом максимума ионизации с поверхности облучаемого тела в глубину характеризуется:
- а) рентгеновское излучение низких энергий;
 - б) гамма-излучение;
 - в) рентгеновское излучение высоких энергий;
 - г) пучки нейтронов
- 50 Что необходимо сделать, если при выполнении внутривенной инъекции медицинской сестре попала на руку кровь больного?
- а) вытереть салфеткой
 - б) обработать спиртом
 - в) вымыть руки под краном
 - г) выполнить все перечисленное
- 51 Какой РФП используется для радиометрии щитовидной железы?
- а) р-р натрия бромида
 - б) р-р натрия иодида, меченный ^{131}I
 - в) р-р гиппурата
 - г) р-р таллия
- 52 К какой группе критических органов относится костный мозг?
- а) 1-ой
 - б) 2-ой
 - в) 3-ой
 - г) в зависимости от заболевания
- 53 Что необходимо провести больному для профилактики травматического шока?
- а) выполнить транспортную иммобилизацию
 - б) сделать прививку от столбняка
 - в) ввести обезболивающие вещества
 - г) ввести обезболивающие вещества и выполнить транспортную иммобилизацию
- 54 Радиоактивный распад - это:
- а) отрыв электрона от атома;
 - б) химическая реакция разложения (диссоциации);
 - в) самопроизвольный распад нестабильного нуклида;
 - г) процесс взаимодействия излучения с веществом
- 55 Косвенно ионизирующее излучение может состоять из:
- а) электронов;
 - б) протонов;
 - в) альфа-частиц;
 - г) нейтронов
- 56 Какие биологические жидкости, содержащие ВИЧ, представляют эпидемиологическую опасность?
- а) кровь
 - б) сперма
 - в) влагалищное отделяемое
 - г) все перечисленные жидкости

- 57 Что в первую очередь необходимо сделать при отеке легких?
- а) больного усадить в постели, дать кислород, ввести коргликон
 - б) больного уложить на спину, дать эуфиллин
 - в) больного усадить со спущенными ногами, наложить жгуты на конечности, дать нитроглицерин
 - г) больного уложить на спину, дать мочегонные
- 58 Каковы сцинтиграфические признаки цирроза печени?
- а) горячий очаг в печени
 - б) увеличение селезенки
 - в) накопление в костном мозге
 - г) правильно – б и в
- 59 Какие отеки характерны для заболеваний сердца?
- а) более выраженные с утра на лице, бледные, мягкие
 - б) усиливающиеся к вечеру на ногах, сочетающиеся с акроцианозом
 - в) плотные, не оставляющие ямку при надавливании
 - г) мягкие, появляются вечером на лице
- 60 Какие клетки поражает ВИЧ?
- а) клетки головного мозга
 - б) клетки слизистой кишечника
 - в) клетки костного мозга
 - г) все перечисленные клетки
- 61 К нерадиационным аварийным ситуациям относятся:
- а) потеря и хищение источников;
 - б) подведение к опухоли и к окружающим нормальным тканям доз излучения, значительно превосходящих запланированные;
 - в) замыкание электрической цепи через тело человека, короткое замыкание и обрыв в системе электропитания;
 - г) нарушение технологического цикла использования радиоактивного источника
- 62 Абсолютное значение мощности экспозиционной дозы в воздухе не зависит от:
- а) активности источника;
 - б) расстояния от источника;
 - в) размера поля облучения;
 - г) времени облучения
- 63 Предельно допустимые дозы для персонала группы «А»:
- а) 5 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 20 мЗв в год;
 - б) 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год;
 - в) 50 мЗв в год;
 - г) 20 мЗв в год
- 64 В каком положении пациента проводится гепатобилисцинтиграфия?
- а) лежа
 - б) сидя
 - в) стоя
 - г) лежа на правом боку

- 65 Каковы способы остановки артериального кровотечения?
- а) максимальное сгибание в суставах
 - б) пальцевое прижатие артерии
 - в) наложение жгута и закрутки
 - г) все перечисленное верно
- 66 Показания для ротационного облучения:
- а) Поверхностно расположенные опухоли.
 - б) Глубоко и центрально расположенные опухоли.
 - в) Опухоли занимающие большую площадь.
 - г) Рак губы
- 67 Внесистемной единицей измерения мощности поглощенной дозы является:
- а) рентген в час;
 - б) рад в минуту;
 - в) грей в минуту;
 - г) бэр в час
- 68 Какой вид накопления остеотропного РФП наблюдается при остеобластном метастатическом поражении скелета?
- а) гипофиксация препарата в костях скелета
 - б) гиперфиксация препарата в костях скелета
 - в) равномерное распределение РФП в костях скелета
 - г) отсутствие визуализации скелета
- 69 Для ротационно-конвергентного облучения может использоваться аппарат:
- а) Рокус-М;
 - б) Агат-С;
 - в) Агат-ВУ;
 - г) Терабалт
- 70 Что относится к физическим методам дозиметрии:
- а) Калориметрический метод.
 - б) Ионизационный метод.
 - в) Люминесцентный метод.
 - г) Верно все перечисленное
- 71 Какая активность вводится при исследовании костей с препаратами на основе ^{99m}Tc взрослым пациентам?
- а) Менее 50 МБк
 - б) 400-1000 МБк
 - в) 200 МБк
 - г) 50-100 МБк
- 72 К группе Б облучаемых лиц при проведении лучевой терапии относятся:
- а) пациенты, проходящие лучевую терапию;
 - б) все сотрудники, находящиеся в сфере действия ИИИ;
 - в) все сотрудники, находящиеся в сфере действия ИИИ, но не участвующие в проведении лучевой терапии;
 - г) все физические лица, находящиеся в отделении во время работы гамма-аппаратов
- 73 Что такое поле облучения:
- а) Участок поверхности тела больного, через который входит излучение.
 - б) Участок органа, где располагается облучаемая опухоль.
 - в) Ткани и органы наиболее чувствительные к ионизирующему излучению.
 - г) Весь организм

74 Каков период полураспада ^{99m}Tc ?

- а) 6,5 часов
- б) 13 часов
- в) 3 дня
- г) 8 дней

75 Что в первую очередь необходимо выполнить при бессознательном состоянии у больного сахарным диабетом и диагностированной гипогликемической комой?

- а) взять кровь на сахар
- б) ввести внутривенно 16 ЕД инсулина
- в) ввести внутривенно 20 мл 40% раствора глюкозы
- г) измерить артериальное давление

76 Какой набор используется для оценки перфузии миокарда?

- а) технетрил
- б) макротех
- в) теоксим
- г) бромезида

77 Чем определяется массовое число?

- а) количеством протонов
- б) количеством нейтронов
- в) количеством электронов
- г) суммой протонов и нейтронов

78 Какой вид ионизирующего излучения обладает наиболее выраженным биологическим эффектом:

- а) Гамма излучение.
- б) Бета излучение
- в) Альфа излучение.
- г) Рентгеновское излучение

79 Косвенно ионизирующее излучение может состоять из:

- а) электронов;
- б) протонов;
- в) альфа-частиц;
- г) гамма-квантов

80 В каких случаях показано использование свинцовых блоков:

- а) Для создания фигурных полей и экранизации жизненно важных органов.
- б) Для увеличения дозы в очаге поражения.
- в) При больших размерах опухоли.
- г) Для снижения местных лучевых реакций

81 Какой должна быть минимальная частота вдуваний при ИВЛ?

- а) 10 в минуту
- б) 16 в минуту
- в) 20 в минуту
- г) 12 в минуту

82 Один распад в секунду - это:

- а) 1 Кюри;
- б) 1 килокюри;
- в) 1 милликюри;
- г) 1 Бекерель

- 83 Что необходимо сделать при черепно-мозговой травме с потерей сознания в первую очередь?
- а) придать возвышенное положение голове
 - б) измерить артериальное давление и сосчитать пульс
 - в) сделать рентгенограмму черепа
 - г) обеспечить проходимость дыхательных путей
- 84 Какая предельно допустимая эффективная доза облучения для персонала (группа А) в год?
- а) 20 мЗв в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год
 - б) 1 мЗв в среднем за любые последовательно 5 лет, но не более 50 мЗв в год
 - в) 100 мЗв
 - г) такой дозы не существует
- 85 Предельно допустимые дозы для персонала группы Б:
- а) 5 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 20 мЗв в год;
 - б) $\frac{1}{4}$ значения эффективной дозы для персонала группы «А»;
 - в) $\frac{1}{2}$ значения эффективной дозы для персонала группы «А»;
 - г) 5 мЗв в год
- 86 В чем заключается эффект взаимодействия излучения с веществом?
- а) ионизация среды
 - б) термический эффект
 - в) физический
 - г) резонансный
- 87 Какой вид излучения регистрируется при сцинтиграфии ?
- а) альфа-частицы
 - б) бета-частицы
 - в) гамма-излучение
 - г) рентгеновское излучение
- 88 Определите абсолютные противопоказания к лучевой терапии:
- а) Генерализация злокачественного процесса.
 - б) Прорастание опухоли в рядом лежащие органы.
 - в) Инфицирование злокачественного процесса.
 - г) Верно все перечисленное
- 89 Какие патологические состояния относятся к соматическим радиационным эффектам?
- а) лучевые мутации
 - б) сокращение продолжительности жизни
 - в) лучевые ожоги кожи
 - г) развитие злокачественных новообразований
- 90 Непосредственно ионизирующее излучение может состоять из:
- а) альфа-частиц;
 - б) фотонов;
 - в) нейтронов;
 - г) гамма-квантов
- 91 Назовите единицу поглощенной дозы:
- а) Рентген.
 - б) Кюри.
 - в) Грэй.
 - г) Беккерель

- 92 Методы лучевой терапии рака волосистой части головы:
а) Короткодистанционная рентгенотерапия.
б) Дистанционная гамма-терапия.
в) Внутритканевая гамма-терапия, аппликационная терапия.
г) Нет терапии
- 93 Относительно глубинная доза - это:
а) Отношение экспозиционной дозы к дозе на глубине к глубине.
б) Отношение абсолютной дозы на глубине к экспозиционной дозе.
в) Отношение экспозиционной дозы к поверхности.
г) Отношение дозы на заданной глубине к дозе на поверхности
- 94 Излучение сильнее ослабляется в:
а)мышечной ткани;
б)легочной ткани;
в)костной ткани;
г) подкожной жировой ткани
- 95 К каким факторам внешнего воздействия неустойчив ВИЧ?
а) кипячение
б) воздействие кислот и щелочей
в) действие дезинфицирующих средств
г) ко всем перечисленным факторам
- 96 Выберите источник гамма-излучения, используемый для дальне-дистанционной гамма-терапии:
а) Ra-226.
б) Со-60.
в) Cs-137.
г) I-131
- 97 Наибольшее значение относительной биологической эффективности (ОБЭ) у:
а)нейтронов;
б)рентгеновского излучения;
в) гамма-излучения;
г) электронов
- 98 Косвенно ионизирующее излучение может состоять из:
а)электронов;
б) протонов;
в)альфа-частиц;
г) нейтронов
- 99 В какой фазе лучевого повреждения химические изменения трансформируются в клеточные?
а) в начальной фазе
б) в физико-химической фазе
в) в биологической фазе
г) во всех фазах
- 100 Что подходит в качестве «метки» для проведения сцинтиграфии?
а) чистый бета-излучатель
б) источник позитронов
в) источник электронного захвата
г) чистый гамма-излучатель

101 Какова последовательность ваших действий при остановке сердца у больного?

- а) приступить к непрямому массажу сердца и искусственному дыханию, вызвать реанимационную бригаду
- б) внутрисердечно ввести адреналин, вызвать реанимационную бригаду
- в) вызвать реанимационную бригаду, приступить к непрямому массажу сердца и искусственному дыханию

102 Цель многопольного облучения:

- а) Равномерное распределение энергии излучения в патологическом очаге (опухоли).
- б) Подведение минимальной дозы.
- в) Уменьшить дозу на выходе пучка излучения.
- г) Увеличить дозу на выходе пучка излучения

103 Какие заболевания щитовидной железы являются показанием к исследованию уровня гормонов щитовидной железы *in vitro*?

- а) тиреотоксикоз
- б) гипотиреоз
- в) тиреоидит
- г) все перечисленное

104 Затвор радиационной головки гамма-аппарата обеспечивает:

- а) регулировку размера поля облучения;
- б) выпуск рабочего пучка излучения;
- в) предотвращение столкновения с пациентами;
- г) визуальную центрацию пучка излучения на пациенте

105 Коллимирующая система аппарата РОКУС-М позволяет создать максимальные размеры полей облучения на расстоянии 75 см от источника:

- а) 16 см x 16 см;
- б) 18 см x 18 см;
- в) 20 см x 20 см;
- г) 22 см x 26 см

106 Что можно измерить дозиметром типа ТЛД?

- а) эффективную дозу
- б) эквивалентную дозу
- в) поглощенную дозу
- г) все вышеперечисленное

107 Что является первым мероприятием при проведении сердечно-легочной реанимации?

- а) обеспечение проходимости дыхательных путей
- б) непрямой массаж сердца
- в) дефибрилляция
- г) внутрисердечная инъекция адреналина

108 Каковы характерные зоны локализации пролежней?

- а) крестец
- б) лопатки
- в) затылок
- г) все перечисленное

109 Колиматор радиационной головки гамма-аппарату Рокус-М необходим для:

- а) перемещение радиационной головки;
- б) плавной регулировки размера поля облучения;
- в) первичной коллимации пучка излучения;
- г) визуальной центрации пучка излучения на пациенте

110 Каковы принципы транспортной иммобилизации?

- а) конечность выпрямляют по оси, а
затем проводят иммобилизацию
- б) шины накладывают, фиксируя только место перелома
- в) при накладывании шины стараются максимально ограничить манипуляции с поврежденной конечностью
- г) все перечисленное неверно

111 Где вводится РФП при гепатобилисцинтиграфии?

- а) в процедурной однократно
- б) под детектором гамма-камеры однократно
- в) под детектором гамма-камеры многократно
- г) по усмотрению врача

112 Каковы действия медицинской сестры при условии, что пациент болен СПИД?

- а) работа в защитном костюме
- б) работа в обычных условиях, соблюдая меры предосторожности
(избегать повреждения перчаток и кожных покровов)
- в) не предпринимать никаких мер
- г) не оказывать помощь

113 Количество энергии излучения, поглощенное единицей массы облучаемого тела это:

- а) экспозиционная доза;
- б) поглощенная доза;
- в) эквивалентная доза;
- г) эффективная эквивалентная доза

114 Какой структурный элемент клетки обладает наибольшей радиочувствительностью?

- а) митохондрии
- б) аппарат Гольджи
- в) ядро
- г) цитоплазма

115 Внесистемной единицей измерения экспозиционной дозы является:

- а) рентген;
- б) рад;
- в) бэр;
- г) грэй.

116 К фотонному относится излучение, состоящее из:

- а) электронов;
- б) нейtronов;
- в) гамма-квантов;
- г) протонов

117 Каким должно быть соотношение частоты нажатий на грудину и частоты вдохов при проведении сердечно-легочной реанимации одним человеком?

- а) 12:1
- б) 5:1
- в) 25:1
- г) 15:2

118 Для клинической дозиметрии используют дозиметры типа:

- а) UNIDOS;
- б) ТЛД;
- в) ДТЛ;
- г) ДРГ-01-Т1

119 Что такое дефицит пульса?

- а) урежение пульса
- б) учащение пульса
- в) учащение пульса на вдохе и урежение его на выдохе
- г) разница между частотой сердечных сокращений и периферическим пульсом

120 Какие свойства РФП учитывают при определении лучевой нагрузки на пациента?

- а) период полураспада изотопа
- б) пути выведения из организма
- в) состояние печени/почек
- г) все перечисленное

121 Приступить к работе на рентгенотерапевтических аппаратах можно:

- а) сразу после включения аппарата;
- б) через 10 минут после включения аппарата;
- в) через 15 минут после включения аппарата;
- г) после тренировки рентгеновской трубки

122 Величина области геометрической полутени пучка излучения источника Кобальт-60 не зависит от:

- а) размера поля облучения;
- б) размера источника;
- в) конструкции головки гамма-аппарата;
- г) расстояния от источника

123 Сочетанный метод лучевой терапии включает в себя:

- а) Два и более видов лучевого лечения.
- б) Лучевое и лекарственное лечение.
- в) Лучевое и хирургическое лечение.
- г) Лучевое и химиотерапевтическое лечение

124 Какая минимальная активность вводится больным при динамическом или статическом исследовании печени и почек с 99m Tc?

- а) 10 МБк
- б) 100 МБк
- в) 500 МБк
- г) 1000 МБк

125 В какой период беременности имеет место наибольший риск повреждения эмбриона от облучения?

- а) на первую половину беременности
- б) на первые два месяца беременности
- в) в течение всей беременности
- г) риска нет

126 Чем характеризуется артериальное кровотечение?

- а) ярко-алым цветом крови
- б) ярко-алым цветом крови и фонтанирующей струей
- в) темно-вишневым цветом крови
- г) фонтанирующей струей

- 127 За радиационную безопасность в радиологическом отделении МООД отвечает:
- а) главный врач;
 - б) главный инженер;
 - в) заведующий радиологическим отделением;
 - г) инженер по охране труда
- 128 Основной характеристикой клиновидных фильтров является:
- а) угол поворота плато изодозы;
 - б) угол между образующими плоскостями клина;
 - в) толщина клина;
 - г) ширина клина
- 129 Какие клетки наиболее чувствительны к действию ионизирующего излучения?
- а) мышечные
 - б) костные
 - в) нервные
 - г) клетки крови
- 130 Какой метод дозиметрии используется при планировании лучевой терапии:
- а) Физический.
 - б) Photoхимический.
 - в) Математический.
 - г) Биологический
- 131 Пациенту установлен диагноз рак в/з пищевода с центром опухоли на уровне 1 грудного позвонка II А стадии. Выберите метод лечения:
- а) Хирургический.
 - б) Предоперационная лучевая терапия с резекцией и пластикой пищевода.
 - в) Резекция и пластика пищевода с последующей послеоперационной лучевой терапией.
- 132 При каких состояниях выполняют сцинтиграфию печени с коллоидом ?
- а) при циррозе печени
 - б) при очаговых поражениях печени
 - в) при холецистите
 - г) правильно – а и б
- 133 Наименьший поражающий эффект обуславливается облучением:
- а) всего организма;
 - б) области живота;
 - в) грудной клетки и головы;
 - г) конечностей
- 134 К какой категории облучаемых лиц относится персонал лаборатории радионуклидной диагностики?
- а)Б
 - б) В
 - в) А
 - г) Г
- 135 Что оценивают при перфузционной сцинтиграфии легких?
- а) нарушение вентиляции легких
 - б) нарушение бронхиальной проходимости
 - в) нарушение вентиляции и бронхиальной проходимости
 - г) нарушение легочного кровотока

- 136 Какой вид ионизирующего излучения применяется при контактных методах лучевой терапии:
- а) Тормозное излучение высоких энергий.
 - б) Нейтронное излучение.
 - в) Гамма-излучение.
 - г) Рентгеновское излучение
- 137 Какова удельная активность, если в 5 мл физиологического раствора содержится 3500 МБк ^{99m}Tc ?
- а) 90 МБк/мл
 - б) 700 МБк/мл
 - в) 35 МБк/мл
 - г) 3,5 МБк/мл
- 138 Показания к близкофокусной рентгенотерапии:
- а) Поверхностно расположенные злокачественные новообразования.
 - б) Предраковые заболевания кожи.
 - в) Глубоко расположенные злокачественные новообразования.
 - г) Верно все перечисленное
- 139 Какой вид ионизирующего излучения, используемого в медицине, обладает наибольшей проникающей способностью:
- а) Альфа-излучение.
 - б) Бета-излучение.
 - в) Протонное излучение.
 - г) Гамма-излучение
- 140 К корпускулярному относится излучение:
- а) состоящее из частиц;
 - б) тормозное;
 - в) рентгеновское;
 - г) характеристическое
- 141 Внесистемной единицей измерения эффективной эквивалентной дозы является:
- а) бэр;
 - б) рад;
 - в) грей;
 - г) зиверт
- 142 Два слоя половинного ослабления ослабляют излучение:
- а) в 2 раза;
 - б) в 4 раза;
 - в) в 8 раз;
 - г) в 16 раз
- 143 Что означает термин «ятрогения»?
- а) психическое заболевание
 - б) заболевание с неблагоприятным прогнозом
 - в) заболевание, вызванное действиями медицинского работника
 - г) разглашение врачебной тайны
- 144 Классическое фракционирование в дистанционной лучевой терапии – это подведение дозы в режиме:
- а) 2Гр x 4 раза в неделю;
 - б) 5Гр x 2 раза в неделю;
 - в) 2Гр x 5 раз в неделю;
 - г) 2Гр через день

- 145 При эксплуатации гамма-терапевтических аппаратов опасными производственными факторами являются:
- а) опасный уровень напряжения в электрических сильноточных цепях, заземление которых может пройти через тело человека и повышенная ионизация в воздухе рабочих помещений;
 - б) повышенная ионизация в воздухе рабочих помещений и повышенная концентрация токсических компонентов защитных материалов на рабочих поверхностях и в воздухе рабочих помещений;
 - в) лазерное излучение и повышенная концентрация озона и окислов азота от воздушных электрических разрядов в высоковольтных устройствах;
 - г) ионизирующее излучение и опасный уровень напряжения в электрических сильноточных цепях, заземление которых может пройти через тело человека
- 146 Основными санитарными документами, регламентирующими обеспечение безопасности человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего излучения, являются:
- а) Положение о государственном санитарном надзоре в РФ;
 - б) Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010;
 - в) Отраслевые стандарты ОСТ-81 и ОСТ-82, ССБТ/Системы стандартов безопасности труда/и Типовые инструкции по радиационной безопасности при работе с ИИИ;
 - г) Федеральные законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 147 Какой величине соответствует поглощенная доза рентгеновского и гамма-излучения в 1 Грэй?
- а) 0,1 Зв
 - б) 1 Зв
 - в) 10 Зв
 - г) 100 Зв
- 148 Укажите период полураспада Со-60:
- а) 5,3 года
 - б) 74 дня
 - в) 22,6 года
 - г) 16 лет
- 149 Что относится к стационарным видам защиты:
- а) Просвинцованные резиновые перчатки.
 - б) Фартуки из просвинцованной резины.
 - в) Передвижные ширмы.
 - г) Разграничительные стены и перекрытия
- 150 Единицей измерения эквивалентной дозы в системе СИ является:
- а) бэр;
 - б) рад;
 - в) грей;
 - г) зиверт
- 151 На оценке реакций, которые возникают в некоторых тканях при облучении их определенной дозой ионизирующих излучений, основан метод дозиметрии:
- а) фотографический;
 - б) биологический;
 - в) химический;
 - г) термolumинесцентный

152 Когда накладывают жгут или закрутку?

- а) при капиллярном кровотечении
- б) при венозном кровотечении
- в) при артериальном кровотечении
- г) при любом виде кровотечения

153 На основе принципа ионизационного эффекта и способности отрицательных и положительных ионов под действием электрического поля перемещаться к электродам противоположного знака устроены дозиметры с:

- а) ионизационными камерами;
- б) термolumинесцентными детекторами;
- в) фотolumинесцентными детекторами;
- г) сцинтилляционными детекторами

154 Каким путем определяют дозу при использовании расчетного метода дозиметрии:

- а) Путем математических вычислений.
- б) Путем определения измерений в химических растворах.
- в) Путем использования ионизационного действия излучения.
- г) Путем использования световозбуждающего действия излучения

155 Линейки изодоз из дозиметрических атласов описывают:

- а) относительное распределение дозы в пучке излучения в облучаемом объекте;
- б) относительное распределение глубинной дозы в облучаемом объекте вдоль оси пучка излучения;
- в) относительное распределение дозы вдоль оси пучка излучения в воздухе;
- г) относительное распределение дозы в поперечном сечении пучка излучения в воздухе

156 Внесистемной единицей измерения поглощенной дозы является:

- а) рентген;
- б) рад;
- в) грей;
- г) бэр

157 Что необходимо сделать при переломе бедра,

осуществляя транспортную иммобилизацию?

- а) обездвижить тазобедренный сустав
- б) обездвижить голеностопный, коленный и тазобедренный суставы
- в) обездвижить голеностопный и коленный суставы
- г) обездвижить коленный сустав

158 Основными санитарными документами, регламентирующими обеспечение

безопасности человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего излучения, являются:

- а) Положение о государственном санитарном надзоре в РФ;
- б) Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010;
- в) Отраслевые стандарты ОСТ-81 и ОСТ-82, ССБТ/Системы стандартов безопасности труда/ и Типовые инструкции по радиационной безопасности при работе с ИИИ;
- г) Федеральные законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и

159 Что такая относительная доза:

- а) Отношение дозы на глубине к дозе в свободном воздухе, выраженное в процентах.
- б) Доза поглощенная всем организмом.
- в) Доза поглощенная в определенной массе.
- г) Доза подведенная за весь курс

160 Что такое водный баланс?

- а) равенство дневного и ночного диуреза
- б) преобладание дневного диуреза
- в) соотношение потребленной за сутки жидкости и суточного диуреза
- г) преобладание ночного диуреза

161 Различное биологическое действие, оказываемое различными видами ионизирующих излучений, отражает:

- а) экспозиционная доза;
- б) поглощенная доза;
- в) эквивалентная доза;
- г) эффективная эквивалентная доза

162 К работе с источниками ионизирующих излучений допускаются лица не моложе:

- а) 16 лет;
- б) 18 лет;
- в) 20 лет;
- г) 21 год

163 Дайте формулировку дозы излучения:

- а) Количество пар ионов, возникающих в единицу времени.
- б) Количество распадов в единицу времени.
- в) Количество распадов в определенном объекте вещества.
- г) Величина энергии поглощенная единицей массы облученного вещества

164 Сколько ЕД может содержаться в 1 мл инсулина (в соответствии с мировыми стандартами)?

- а) только 40 ЕД
- б) 20 ЕД, 40 ЕД, 60 ЕД
- в) 40 ЕД, 80 ЕД, 100 ЕД
- г) 40 ЕД, 60 ЕД, 80 ЕД

165 Персонал, относящийся к группе А, должен проходить обязательный медицинский осмотр:

- а) периодически 2 раза в год;
- б) периодически 1 раз в год;
- в) при поступлении на работу и периодически 2 раза в год;
- г) при поступлении на работу и периодически 1 раз в год

166 Что такое сочетанное лечение:

- а) Использование двух методов лучевой терапии
- б) Использование хирургического лечения и гормонотерапии.
- в) Использование хирургического и лучевого лечения.
- г) Использование гормонов и химиотерапии

167 Частицы, из которых построены молекулы, и которые не могут быть разложены на более мелкие частицы с помощью химических реакций:

- а) ядро;
- б) атом;
- в) нуклон;
- г) нуклид

- 168 Суммарный электрический заряд ионов одного знака, образованных в единице объема воздуха в условиях электронного равновесия это:
- а) экспозиционная доза;
 - б) поглощенная доза;
 - в) эквивалентная доза;
 - г) эффективная эквивалентная доза
- 169 Для контроля за дозами излучения на рабочих местах персонала радиологических отделений проводят:
- а) клиническую дозиметрию;
 - б) индивидуальную дозиметрию;
 - в) дозиметрию защиты;
 - г) абсолютную дозиметрию в пучках излучения
- 170 От работ с источниками ионизирующих излучений должны освобождаться женщины:
- а) на весь период беременности с момента установления беременности;
 - б) в возрасте после 45 лет;
 - в) не имеющие детей;
 - г) с момента установления беременности и на период грудного вскармливания ребенка
- 171 Интенсивность фотонного и рентгеновского излучения точечного источника в воздухе изменяется:
- а) обратно пропорционально расстоянию до источника;
 - б) обратно пропорционально квадрату расстояния до источника;
 - в) пропорционально расстоянию до источника;
 - г) пропорционально квадрату расстояния до источника
- 172 Что является наиболее важным в профилактике пролежней?
- а) частая смена положения пациента
 - б) обработка кожи камфорным спиртом
 - в) антибиотикотерапия
 - г) ЛФК, УФО
- 173 Наибольшее значение относительной биологической эффективности (ОБЭ) у:
- а) альфа-частиц;
 - б) рентгеновского излучения;
 - в) гамма-излучения;
 - г) электронов
- 174 К какой группе критических органов относится щитовидная железа?
- а) 1-ой
 - б) 2-ой
 - в) 3-ой
 - г) в зависимости от заболевания
- 175 Для контроля за индивидуальным облучением лиц, работающих или находящихся в сфере действия ионизирующих излучений, проводят:
- а) клиническую дозиметрию;
 - б) индивидуальную дозиметрию;
 - в) дозиметрию защиты;
 - г) абсолютную дозиметрию в пучках излучения

- 176 Соблюдение требований радиационной безопасности в учреждении и создание условий работы с ИИИ, соответствующих нормам и правилам, обеспечивает:
- а) служба радиационной безопасности учреждения или лицо, отвечающее за радиационный контроль;
 - б) администрация учреждения;
 - в) Управление Роспотребнадзора по Мурманской области;
 - г) Мурманский отдел инспекции за радиационно опасными объектами
- 177 В аппаратах дистанционной гамма-терапии источник Кобольт-60 может создавать мощность экс-позиционной дозы в опорной точке в воздухе:
- а) до 400 Р/мин;
 - б) до 200 Р/час;
 - в) свыше 50 Р/сек;
 - г) около 1Р/мин
- 178 Линейки изодоз из дозиметрических атласов описывают:
- а) относительное распределение дозы в пучке излучения в облучаемом объекте;
 - б) относительное распределение глубинной дозы в облучаемом объекте вдоль оси пучка излучения;
 - в) относительное распределение дозы вдоль оси пучка излучения в воздухе;
 - г) относительное распределение дозы в поперечном сечении пучка излучения
- 179 Какой набор используется для перфузионной сцинтиграфии легких?
- а) технефит
 - б) технефор
 - в) пентатех
 - г) макротех
- 180 Что используют для дубления ожоговой поверхности?
- а) гусиный жир, растительное масло
 - б) раствор марганца
 - в) спирт
 - г) спирт и раствор марганца
- 181 Единицей измерения мощности экспозиционной дозы в системе СИ является:
- а) кулон на килограмм;
 - б) ампер на килограмм;
 - в) джоуль на килограмм;
 - г) беккерель на килограмм
- 182 Для глубоко расположенных новообразований целесообразно применять:
- а) рентгеновское излучение низких энергий;
 - б) гамма-излучение;
 - в) рентгеновское излучение высоких энергий;
 - г) тормозное излучение ускорителя высоких энергий
- 183 Единицы измерения энергии ионизирующего излучения:
- а) Эрг.
 - б) Джоуль.
 - в) Кулон/кг.
 - г) Электрон-вольт

- 184 К какой группе критических органов относятся щитовидная железа, печень, почки, селезенка?
- а) 3-й
 - б) 2-ой
 - в) 1-ой
 - г) к особой группе
- 185 Какие признаки отмечаются у больного в торpidной фазе тяжелого шока?
- а) безучастен, адинамичен
 - б) сознание сохранено, правильно отвечает на вопросы, легко вступает
 - в) контакт
 - в) без сознания
 - г) возбужден, требует помощи
- 186 Какой набор используется для оценки состояния перфузии головного мозга?
- а) технефит
 - б) технефор
 - в) теоксим
 - г) технетрил
- 187 Влажная уборка кабинета рентгенотерапии должна проводиться:
- а) непосредственно перед работой аппарата;
 - б) после окончания работы аппарата;
 - в) во время аппарата;
 - г) в любое время
- 188 С какой максимальной периодичностью необходимо менять положение пациента с целью профилактики пролежней по стандарту?
- а) каждый час
 - б) каждые 2 часа
 - в) каждые 3 часа
 - г) каждые 12 часов
- 189 При поступлении на работу перед началом работ с ИИИ проводятся инструктажи:
- а) вводный, внеплановый;
 - б) первичный, внеплановый;
 - в) вводный, первичный;
 - г) вводный, повторный
- 190 Отмечены очаги повышенного накопления остеотропного РФП в пяти ребрах у пациента, попавшего в автоаварию семь месяцев назад. О чем следует подумать?
- а) травматическое повреждение ребер
 - б) метастазы в ребра
 - в) воспалительный процесс в ребрах
 - г) характерно для всех процессов
- 191 Назовите ранние лучевые реакции:
- а) Эритема и эпителилит.
 - б) Индуративный отек.
 - в) Лучевая язва.
 - г) Пульмонит

- 192 Какое приспособление применяют в дистанционной гамма терапии, чтобы «спрямить» дозное поле:
а) Компенсаторы.
б) Клиновидные фильтры.
в) Решетчатые фильтры.
г) Ионизирующую камеру
- 193 Какие методы клинического обследования помогают в построении эскиза поперечного среза боль-ного на уровне расположения опухоли:
а) Лабораторная диагностика.
б) Эндоскопия.
в) Рентгенологическая диагностика и компьютерная томография.
г) Ультразвуковая диагностика
- 194 Самой значительной проникающей способностью обладает:
а) излучение из в-частиц;
б) излучение из а-частиц;
в) у -излучение;
г) рентгеновское излучение
- 195 Какие наборы используют для остеосцинтиграфии?
а) бромезида
б) технефор
в) пирфотех
г) правильно – б и в
- 196 Наибольшее значение относительной биологической эффективности (ОБЭ) у:
а) нейтронов;
б) рентгеновского излучения;
в) гамма-излучения;
г) электронов
- 197 Коллективную эффективную эквивалентную дозу измеряют в:
а) зивертах;
б) греях;
в) человека-зивертах;
г) человека-греях
- 198 Какой первый признак появления пролежней?
а) бледная кожа
б) гиперемия кожи, исчезающая при осмотре за 1 – 2 минуты
в) стойкая неисчезающая гиперемия
г) некроз кожи
- 199 Для внутритканевого облучения может использоваться аппарат:
а) Гаммамед-12i;
б) Агат-ВУ;
в) Агат-С;
г) Рентген-ТА
- 200 Назовите вид ионизирующего излучения линейного ускорителя, используемого в лучевой терапии:
а) Рентгеновское излучение.
б) Гамма-излучение.
в) Электроны высоких энергий.
г) Ультрафиолетовое излучение

- 201 Наибольшей чувствительностью к облучению обладает:
- а) жировая ткань;
 - б) мышечная ткань;
 - в) эпителий кожи;
 - г) капсула хрусталика глаза
- 202 На регистрации световых вспышек, возникающих при облучении некоторых веществ основан метод дозиметрии:
- а) фотографический;
 - б) химический;
 - в) биологический;
 - г) сцинтилляционный
- 203 Какой набор используется для гепатобилисцинтиграфии?
- а) теоксим
 - б) бромезида
 - в) пирфотех
 - г) технефит
- 204 В каких подразделениях лаборатории радионуклидной диагностики нужна дополнительная одежда?
- а) блок радионуклидного обеспечения
 - б) кабинеты, где проводятся исследования
 - в) при уборке кабинетов
 - г) при приеме РФП
- 205 Как называется доля радионуклида по отношению к общей активности?
- а) радиоизотопная чистота
 - б) радионуклидная чистота
 - в) радиохимическая чистота
 - г) радиофармакологическая чистота
- 206 Что характерно для типичной клинической картины острого аппендицита?
- а) повышение температуры до 39 град, с ознобом
 - б) субфебрильная температура
 - в) субфебрильная температура и появление болей в эпигастральной области с последующим перемещением в правую подвздошную область
 - г) все перечисленное неверно
- 207 Единицы измерения интегральной поглощенной дозы:
- а) Рентген.
 - б) Грэй.
 - в) Грэй х кг (+).
 - г) Электрон-вольт
- 208 Что входит в понятие «Сестринское дело»?
- а) укрепление здоровья
 - б) профилактику заболевания
 - в) реабилитацию пациентов
 - г) все перечисленное

209 Что такое лучевая реакция:

- а) Изменения, развивающиеся на участке тела (кожи, слизистой оболочки) сразу после однократного или многократного воздействия излучения.
- б) Патологические изменения, развивающиеся на участке тела через 6 лет после многократного воздействия ионизирующего излучения.
- в) Патологические изменения, развивающиеся в различные отдаленные сроки после окончания лу-чевой терапии в виде пневмосклероза, бронхоэктазов.
- г) Патологические изменения, развивающиеся в коже после лучевой терапии в виде индуративно-го отека в сроки от 5 до 7 лет

210 Какие осложнения наблюдаются при антибактериальной терапии?

- а) кандидоз ротовой полости
- б) дисбактериоз
- в) аллергические реакции
- г) все перечисленное

211 Четыре слоя половинного ослабления ослабляют излучение:

- а) в 4 раза;
- б) в 8 раз;
- в) в 16 раз;
- г) в 32 раза

212 Назовите общие лучевые реакции:

- а) Лейкопения.
- б) Тахикардия.
- в) Извращение вкуса.
- г) Верно все перечисленное

213 Является ли радиоактивным флакон из набора после приготовления в нем РФП для исследований *in vivo*?

- а) является
- б) не является
- в) зависит от РФП
- г) зависит от времени приготовлен

214 Соблюдение требований радиационной безопасности в учреждении и создание условий работы с ИИИ, соответствующих нормам и правилам, обеспечивает:

- а) служба радиационной безопасности учреждения или лицо, отвечающее за радиационный контроль;
- б) администрация учреждения;
- в) Управление Роспотребнадзора по Мурманской области;
- г) Мурманский отдел инспекции за радиационно опасными объектами

215 Для клинической дозиметрии используют дозиметры типа:

- а) UNIDOS;
- б) ТЛД;
- в) ДТЛ;
- г) ДРГ-01-Т1

216 Проверка знаний по ТБ и РБ персонала для работы с ИИИ производится:

- а) перед началом работ и после нарушений инструкций;
- б) перед началом работ и периодически 1 раз в год;
- в) перед началом работ, после нарушений инструкций и периодически 1 раз в год

217 Методы лечения рака языка боковой поверхности первой стадии:

- а) Дистанционная терапия.
- б) Хирургический.
- в) Аппликационная гамма-терапия.
- г) Внутритканевая гамма-терапия

218 Какой механизм взаимодействия ионизирующего излучения со средой играет существенную роль при рентгенотерапии:

- а) эффект образования электронно-позитронных пар;
- б) эффект аннигиляции электронов и позитронов;
- в) фотоэффект;
- г) эффект Комptonа

219 На способности почернения фотопленки в разной степени пропорционально поглощенной энергии излучения основан метод дозиметрии:

- а) химический;
- б) фотографический;
- в) термolumинесцентный;
- г) биологический

220 Вид корпускулярного излучения:

- а) Рентгеновское излучение.
- б) Альфа излучение.
- в) Гамма излучение
- г) Тормозное излучение высокой энергии

221 От чего зависит интенсивность воздействия излучения на пациента и персонал?

- а) от вида излучения
- б) от расстояния от источника излучения
- в) от состояния пациента
- г) правильно – а и б

222 Дозиметрическая карта это-:

- а) Пространственное распределение энергии излучения в опухоли.
- б) Пространственное распределение энергии излучения в здоровых тканях.
- в) Шаблонное применение изодозных линеек.
- г) Пространственное распределение энергии излучения в опухоли и здоровых тканях

223 Суммарный электрический заряд ионов одного знака, образованных в единице объема воздуха в условиях электронного равновесия это:

- а) экспозиционная доза;
- б) поглощенная доза;
- в) эквивалентная доза;
- г) эффективная эквивалентная доза

224 При отключении электропитания затвор дистанционного аппарата закрывается при помощи:

- а) аварийных аккумуляторов;
- б) аварийной кнопки;
- в) аварийной пружины;
- г) аварийной рукоятки

225 Для гамма-излучения Кобальт-60 максимум ионизации находится:

- а) на поверхности облучаемого объекта;
- б) на глубине 5 мм в облучаемом объекте;
- в) на глубине 1-2 см в облучаемом объекте;
- г) на глубине нескольких сантиметров в облучаемом объекте

226 Для глубоко расположенных новообразований целесообразно применять:

- а)рентгеновское излучение низких энергий;
- б)гамма-излучение;
- в)рентгеновское излучение высоких энергий;
- г) тормозное излучение ускорителя высоких энергий

227 Вид квантового излучения:

- а) Гамма-излучение.
- б) Альфа-излучение.
- в) Нейтронное излучение.
- г) Протонное излучение

228 Наибольшей чувствительностью к облучению обладает:

- а)жировая ткань;
- б)мышечная ткань;
- в)эпителий кожи;
- г) капсула хрусталика глаза

229 Частицы, из которых построены молекулы, и которые не могут быть разложены на более мелкие частицы с помощью химических реакций:

- а) ядро;
- б) атом;
- в) нуклон;
- г) нуклид

230 Один распад в секунду - это:

- а) 1 Кюри;
- б) 1 килокюри;
- в) 1 милликюри;
- г) 1 Бекерель

231 Неподвижность каких суставов необходимо обеспечить при шинировании переломов костей конечностей?

- а) всех суставов поврежденной конечности
- б) сустава выше и сустава ниже места перелома
- в) места перелома
- г) все перечисленное неверно

232 Единицей измерения мощности экспозиционной дозы в системе СИ является:

- а)кулон на килограмм;
- б)ампер на килограмм;
- в)джоуль на килограмм;
- г)беккерель на килограмм

233 Назовите задачи клинической дозиметрии:

- а) Качественная и количественная характеристика источника излучения.
- б) Контроль надежности защитных средств и приспособлений, предназначенных для радиационной безопасности персонала.
- в) Определение величины дозы излучения, полученной пациентом при лучевой диагностике и при лучевой терапии.
- г) Верно все перечисленное

234 Каков сцинтиграфический признак опухоли печени больших размеров?

- а) диффузное снижение накопления РФП
- б) дефект накопления РФП
- в) накопление РФП в смежных органах
- г) признака нет

235 Повторный инструктаж по РБ персонала, работающего с ИИИ, проводится:

- а)1 раз в неделю;
- б)1 раз в квартал;
- в)1 раз в год;
- г)1 раз в полугода

236 При прохождении ионизирующего излучения через один слой половинного ослабления вещества происходит:

- а) уменьшение интенсивности излучения в два раза;
- б) увеличение интенсивности излучения в два раза;
- в) распад половины атомов этого вещества;
- г) увеличение числа фотонов в пучке излучения в два раза

237 Что относится к средствам индивидуальной радиационной защиты?

- а) ширма
- б) халат
- в) перчатки
- г) правильно – б и в

238 Изотопы химического элемента - это:

- а) атомы с одинаковым числом протонов в ядре, но отличающиеся по числу нейтронов;
- б) атомы, отличающиеся количеством и протонов и нейтронов в ядре;
- в) атомы, отличающиеся количеством протонов в ядре;
- г) атомы, отличающиеся количеством электронов на орбите

239 Неоднородное облучение формируется с помощью:

- а) клиновидных фильтров;
- б) растров и решетчатых диафрагм;
- в) набора блоков;
- г) дополнительных коллиматоров

240 Периодом полураспада называется:

- а) время, за которое масса радионуклида уменьшается вдвое;
- б) время, за которое распадается половина атомов радионуклида;
- в) время, за которое объем радионуклида уменьшается вдвое;
- г) вероятность распада атома в единицу времени

241 Для индивидуальной дозиметрии используют дозиметры типа:

- а) UNIDOS;
- б) ТЛД;
- в) ДРГЗ-02;
- г) ДРГ-01-Т1

242 Для чего используется индивидуальный дозиметрический контроль?

- а) для оценки облучения пациента
- б) для оценки облучения сотрудника
- в) для оценки облучения помещения
- г) для оценки фона

243 К какой группе критических органов относятся гонады и костный мозг?

- А) 1-ой
- б) 3-й
- в) 2-ой
- г) к особой группе

- 244 Интенсивность фотонного и рентгеновского излучения точечного источника в воздухе изменяется:
- а) обратно пропорционально расстоянию до источника;
 - б) обратно пропорционально квадрату расстояния до источника;
 - в) пропорционально расстоянию до источника;
 - г) пропорционально квадрату расстояния до источника
- 245 К каким источникам излучения относятся РФП?
- а) к открытым источникам излучения
 - б) к закрытым источникам излучения
 - в) к источникам без излучения
 - г) к источникам свет
- 246 Излучение сильнее ослабляется в:
- а) мышечной ткани;
 - б) легочной ткани;
 - в) костной ткани;
 - г) подкожной жировой ткани
- 247 Единицей измерения экспозиционной дозы в системе СИ является:
- а) кулон на килограмм;
 - б) ампер на килограмм;
 - в) джоуль на килограмм;
 - г) беккерель на килограмм
- 248 Эффект щажения кожи при облучении фотонными пучками высокой энергии увеличивается за счёт:
- а) расположения защитных и формирующих блоков как можно ближе к облучаемой поверхности;
 - б) использования одеяла, одежды или каких-либо защитных материалов в пределах поля облучения;
 - в) использования расстояния от края диафрагмы или блоков до облучаемой поверхности не менее 10 см;
 - г) использование наименьшего расстояния РИП от края диафрагмы до облучаемой поверхности
- 249 Эффект щажения кожи при облучении фотонными пучками высокой энергии увеличивается за счёт:
- а) расположения защитных и формирующих блоков как можно ближе к облучаемой поверхности;
 - б) использования одеяла, одежды или каких-либо защитных материалов в пределах поля облучения;
 - в) использования расстояния от края диафрагмы или блоков до облучаемой поверхности не менее 10 см;
 - г) использование наименьшего расстояния РИП от края диафрагмы до облучаемой поверхности
- 250 К группе А облучаемых лиц при проведении лучевой терапии относятся:
- а) сотрудники, непосредственно занятые проведением лучевой терапии;
 - б) все физические лица, находящиеся в отделении во время работы гамма-аппаратов;
 - в) все сотрудники, находящиеся в сфере действия ИИИ;
 - г) пациенты, проходящие лучевую терапию

251 Единицей измерения эффективной эквивалентной дозы в системе СИ является:

- а) бэр;
- б) рад;
- в) грей;
- г) зиверт

252 Что такое радионуклид без носителя?

- а) со стабильным изотопом
- б) без стабильного изотопа
- в) с примесью других веществ
- г) не существует

253 Кто открыл явление естественной радиоактивности:

- а) Беккерель.
- б) Рентген.
- в) Резерфорд.
- г) Курчатов

254 С помощью каких принадлежностей можно сформировать фигурное дозное поле:

- а) решетчатые диафрагмы;
- б) клиновидные фильтры;
- в) набор блоков;
- г) растры

255 Какие документы являются регламентирующими для деятельности лаборатории радиоизотопной диагностики?

- а) санэпидзаключение
- б) лицензия Ростехнадзора
- в) лицензии Роспотребнадзора на деятельность с генерирующими ИИИ
- г) правильно – а и б

256 В каких единицах измеряется активность изотопа?

- а) Кюри
- б) Беккерель
- в) Рентген
- г) правильно - а и б

257 Что необходимо предпринять при быстром ухудшении состояния пострадавшего с напряженным пневмотораксом?

- а) ввести камфару и кордиамин
- б) начать ИВЛ
- в) сделать прокол плевральной полости во II межреберье
- г) измерить артериальное давление и сосчитать пульс

258 Какой препарат необходимо ввести, если приступ бронхиальной астмы не купируется эуфиллином?

- а) димедрол
- б) коргликон
- в) супрастин
- г) преднизолон

259 Наибольший поражающий эффект обуславливается облучением:

- а) области живота;
- б) грудной клетки и головы;
- в) конечностей;
- г) всего организма

260 Какая активность ^{99m}Tc -тексима (церетека) вводится при перфузационной сцинтиграфии мозга взрослому пациенту?

- а) 10-100 МБк
- б) 300 МБк
- в) 700-900 МБк
- г) Более 2000 МБк

261 Какие отеки характерны для заболеваний почек?

- а) более выраженные с утра на лице, бледные, мягкие
- б) усиливающиеся к вечеру на ногах, сочетающиеся с акроцианозом
- в) плотные, не оставляющие ямку при надавливании
- г) мягкие, появляются вечером на лице

262 Какой должна быть температура воды для наполнения грелки?

- а) 36 – 37°C
- б) 38 – 40°C
- в) 60 – 65°C
- г) 80 – 90°C

263 Основной характеристикой клиновидных фильтров является:

- а) угол поворота плато изодозы;
- б) угол между образующими плоскостями клина;
- в) толщина клина;
- г) ширина клина

264 Что такое изотопы? Химические элементы имеющие одинаковые:

- а) физические свойства
- б) химические свойства
- в) биологические свойства
- г) физиологические свойства

265 В каких единицах в международной системе СИ измеряется эквивалентная доза?

- а) Грэй
- б) Рад
- в) Зиверт
- г) Рентген

266 Является ли противопоказанием к радионуклидным исследованиям *in vivo* беременность?

- а) да
- б) нет
- в) зависит от РФП
- г) зависит от исследуемого органа

267 Через какое время после введения ^{99m}Tc -спирофотеха следует проводить сцинтиграфию костей?

- а) через 30 мин
- б) через 60 мин
- в) через 120-180 мин
- г) на следующий день

268 Какой коллиматор оптимально использовать для сцинтиграфии щитовидной железы?

- а) высокого разрешения
- б) пин-хол
- в) низкоэнергетический
- г) не имеет значения

- 269 На способности некоторых твердых кристаллических веществ накапливать поглощенную энергию излучения в виде светосуммы и высвечивать при ультрафиолетовом облучении, основан метод дозиметрии:
- а) фотографический;
 - б) химический;
 - в) фотолюминесцентный;
 - г) биологический
- 270 Разовьется ли лучевая болезнь и какой степени, если пациент получил дозу облучения 300 рад?
- а) не разовьется
 - б) легкая степень
 - в) средняя степень
 - г) тяжелая степень
- 271 Три слоя половинного ослабления ослабляют излучение:
- а) в 3 раза;
 - б) в 4 раза;
 - в) в 8 раз;
 - г) в 16 раз
- 272 Какие наборы используются для сцинтиграфии почек?
- а) технемек
 - б) бромезида
 - в) пентатех
 - г) правильно – а и в
- 273 Какой период полураспада ^{99m}Tc ?
- А) 8,5 дней
 - б) 6,5 часов
 - в) 3 дня
 - г) не распадается
- 274 Что относится к комбинированному лечению:
- а) Использование двух методов лучевой терапии
 - б) Использование хирургического и лучевого лечения.
 - в) Использование хирургического и химиотерапевтического лечения.
 - г) Использование лучевого и гормонального лечения
- 275 В чем суть явлений радиоактивности:
- а) В самопроизвольном распаде ядра некоторых элементов с выделением энергии в виде корпускулярного и квантового излучений.
 - б) В потере электрона с внутренней электронной оболочки.
 - в) В потере электрона с наружной электронной оболочки.
 - г) В потере суммы электронов с внешней и внутренней электронных оболочек
- 276 Для контроля за индивидуальным облучением лиц, работающих или находящихся в сфере действия ионизирующих излучений, проводят:
- а) клиническую дозиметрию;
 - б) индивидуальную дозиметрию;
 - в) дозиметрию защиты;
 - г) абсолютную дозиметрию в пучках излучения

- 277 Что необходимо нанести на область ожоговой поверхности после прекращения действия огня, горячей жидкости?
- а) обработать спиртом
 - б) смазать гусиным жиром,
 - растительным маслом
 - в) охладить под струей холодной воды и обработать спиртом
 - г) все перечисленное неверно
- 278 Какой набор используется для гепатобилисцинтиграфии?
- а) теоксим
 - б) пирфотех
 - в) бромезида
 - г) технефит
- 279 Для рентгенотерапии используется аппарат:
- а) Рентген-ТА;
 - б) Агат-ВУ;
 - в) Агат-С;
 - г) Рокус-М
- 280 Назовите источник тормозного излучения высоких энергий:
- а) Линейный ускоритель.
 - б) Синхрофазotron.
 - в) Гамма-установка.
 - г) Ядерный реактор
- 281 Где желательно находиться пациенту после введения в организм РФП с диагностической целью?
- а) в специальном помещении отделения радионуклидной диагностики
 - б) на улице
 - в) в любом месте по желанию пациента
 - г) не имеет значения
- 282 Ионизацией атома называется:
- а) процесс перехода электрона на другую орбиту;
 - б) распад ядра атома;
 - в) изменение числа электронов на орбитах атома;
 - г) испускание ядром атома ионизирующего излучения
- 283 Наименьший поражающий эффект обуславливается облучением:
- а) всего организма;
 - б) области живота;
 - в) грудной клетки и головы;
 - г) конечностей
- 284 Единица измерения активности радиоактивного вещества в системе СИ:
- а) кюри;
 - б) беккерель;
 - в) грей;
 - г) рентген
- 285 Что оценивает динамическая сцинтиграфия почек?
- а) функциональное состояние почек
 - б) структурные изменения почек
 - в) морфологические изменения почек
 - г) водный обмен

- 286 Основные принципы лучевой терапии злокачественных новообразований:
- а) Своевременное начало лечения при ранних стадиях злокачественного процесса.
 - б) Максимальное воздействие на опухоль.
 - в) Одновременное воздействие на первичную опухоль и пути регионарного метастазирования.
 - г) Верно все перечисленное
- 287 В чем заключается подготовка пациента к динамической сцинтиграфии почек?
- А) не требуется
 - б) требуется водная нагрузка и опорожнение мочевого пузыря
 - в) проводится натощак
 - г) проводится после физической нагрузки
- 288 На регистрации световых вспышек, возникающих при облучении некоторых веществ основан метод дозиметрии:
- а) фотографический;
 - б) химический
 - в) биологический;
 - г) сцинтилляционный
- 289 Брахитерапия это-:
- а) Один из методов дистанционного облучения.
 - б) Один из методов контактного облучения.
 - в) Контактный метод с использованием открытых источников излучения.
 - г) Контактный метод с использованием закрытых источников излучения
- 290 Как передается ВИЧ-инфекция?
- а) от инфицированной матери плоду
 - б) при использовании нестерильных игл, шприцов
 - в) при переливании крови и кровезаменителей
 - г) всеми указанными путями
- 291 Каковы сцинтиграфические признаки нормального строения щитовидной железы?
- а) форма бабочки (двухдолевое строение)
 - б) отсутствие одной доли
 - в) размер каждой доли 4x1,5 см
 - г) правильно – а и в
- 292 В каких единицах измеряется эквивалентная доза?
- а) Бэр
 - б) Зиверт
 - в) Рентген
 - г) правильно – а и б
- 293 Что является показанием к сцинтиграфии щитовидной железы без оценки ее функции?
- а) очаговое изменение железы
 - б) диффузные изменения железы без узла в гипотиреоз
 - в) заболевание других эндокринных органов
- 294 Пациенту установлен мелкоклеточный рак в/д правого легкого, локализованная форма.
Выберите метод лечения:
- а) Хирургический (лобэктомия).
 - б) ПХТ
 - в) Дистанционная гамма-терапия.
 - г) Комбинированный химио-лучевой

295 Сдвигом максимума ионизации с поверхности облучаемого тела в глубину характеризуется:

- а) рентгеновское излучение низких энергий;
- б) гамма-излучение;
- в) рентгеновское излучение высоких энергий;
- г) пучки нейтронов

296 Ионизацией атома называется:

- а) процесс перехода электрона на другую орбиту;
- б) распад ядра атома;
- в) изменение числа электронов на орбитах атома;
- г) испускание ядром атома ионизирующего излучения

297 В чем суть основных требований к РФП?

- а) биологическое поведение
- б) физические свойства
- в) фармацевтические характеристики
- г) все перечисленное

298 Какие мероприятия доврачебной помощи необходимы при обмороке?

- а) обеспечить доступ свежего воздуха
- б) применить нашатырный спирт
- в) придать больному горизонтальное положение
- г) все перечисленное

299 Изотопы химического элемента - это:

- а) атомы с одинаковым числом протонов в ядре, но отличающиеся по числу нейтронов;
- б) атомы, отличающиеся количеством и протонов и нейтронов в ядре;
- в) атомы, отличающиеся количеством протонов в ядре;
- г) атомы, отличающиеся количеством электронов на орбите

300 Самые высокие показатели ЛПЭ (линейной передачи энергии) у:

- а) β -частиц;
- б) α -частиц;
- в) γ - излучения;
- г) рентгеновского излучения