

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА



Внезапно возникающие давящие, сжимающие, жгучие, ломящие ощущения в грудной клетке, продолжающиеся более 5 минут.



Аналогичные ощущения часто наблюдаются в области левого плеча (предплечья), левой лопатки, левой половины шеи и нижней челюсти, обоих плеч, обеих рук, нижней части груди вместе с верхней частью живота.



Дискомфорт/боли в грудной клетке часто сопровождаются нехваткой воздуха и холодным потом.

АЛГОРИТМ НЕОТЛОЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ СЕРДЕЧНОМ ПРИСТУПЕ



Сесть или лечь. Принять следующие препараты:

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ (АСПИРИН) – 0,25 г.

НИТРОГЛИЦЕРИН (ТАБЛЕТКУ ИЛИ СПРЕЙ) – 0,5 мг. Таблетку раскусить, положить под язык, не глотать.

ЕСЛИ БОЛЬ СОХРАНЯЕТСЯ:

- через 5 минут второй раз принять нитроглицерин в положении лежа или сидя;
- не ждите, что боль пройдет, – в такой ситуации это опасно для жизни!



Если после приема нитроглицерина появилась резкая слабость, необходимо лечь и положить ноги на возвышение. **Следует знать, что нитроглицерин может вызвать сильную головную боль.**

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается вставать, ходить, курить и принимать пищу до особого разрешения врача.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ без консультации с врачом:

ацетилсалициловую кислоту при ее непереносимости, недавнем внутреннем кровотечении, а также при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

нитроглицерин при резкой слабости, а также при выраженной головной боли, головокружении.

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО СО СТАЦИОНАРНОГО ТЕЛЕФОНА ПО НОМЕРУ **03** ИЛИ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ПО НОМЕРАМ **003** ИЛИ **112**.