

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №16 г. КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИКАЗ**

09.03.2021

Красноармейск

№20

**О назначении ответственного
за витаминизацию третьих блюд**

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Козинец Н.В., медицинскую сестру МБДОУ №16, назначить ответственным за проведение «С» - витаминизации третьих блюд в соответствии с инструкцией проведения витаминизации (Приложение №1).
2. Медицинской сестре заносить данные о витаминизации блюд в «Журнал проведения витаминизации третьих блюд», который хранится один год.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №16

С приказом ознакомлена:

Козинец Н.В.



Л.С. Талагаева

Инструкция

ПРОВЕДЕНИЕ С-ВИТАМИНИЗАЦИИ ТРЕТЬИХ БЛЮД В МБДОУ «Детский сад № 16 г. Красноармейска»

1. Настоящая Инструкция «Проведение С-витаминизации третьих блюд» (далее-Инструкция) устанавливает требования к проведению С-витаминизации третьих блюд в МБДОУ «Детский сад № 16 г. Красноармейска», где это предусмотрено действующими нормативными правовыми актами (постановлениями, приказами министерств и ведомств, санитарными правилами и нормами, нормами питания или другими документами).
2. Настоящая Инструкция предназначена для использования в МБДОУ «Детский сад № 16 г. Красноармейска», в котором проводится С-витаминизация третьих блюд.
3. С-витаминизация третьих блюд проводится путём ежедневной однократной витаминизации третьих блюд или молока. Предпочтительно витаминизировать в первую половину дня третьи блюда.
4. С-витаминизация проводится на пищеблоке медицинской сестрой или уполномоченным лицом, назначенным соответствующим приказом руководителя ДОУ
5. С-витаминизация проводится непосредственно перед их раздачей. Время между проведением С-витаминизации и приемом пищи должно быть не более 1 часа. Подогрев витаминизированных блюд не допускается.
6. При С-витаминизации аскорбиновая кислота вводится в количествах, соответствующих рекомендуемой величине потребления витамина С («норма физиологической потребности») для ребенка:
35 мг для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
50 мг для детей в возрасте от 3 до 7 лет
Вводить аскорбиновую кислоту в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения до температуры 15 С (для компота) и 35 С (для киселя) непосредственно перед реализацией.
7. Способ С-витаминизации третьих блюд: таблетки (порошок) аскорбиновой кислоты, рассчитанные по числу порций, помещают в чистую посуду (не металлическую), в которую предварительно налито небольшое количество (100-200 мл) жидкой части блюда, и растворяют при помешивании ложкой, после чего выливают в общую массу блюда, перемешивая половником; посуду ополаскивают жидкой частью витаминизируемого блюда, которую также выливают в общую массу блюда
При С-витаминизации киселей аскорбиновую кислоту вводят в жидкость, в которой размешивают картофельный крахмал.
При С-витаминизации молока аскорбиновую кислоту добавляют непосредственно после закипания молока из расчета не более 175 мг аскорбиновой кислоты на 1 л молока
8. Медицинская сестра или уполномоченное лицо ежедневно вносит сведения о проводимой С-витаминизации в журнал С-витаминизации) третьих блюд, где указывает наименование витаминизированного блюда, число витаминизированных порций, количество аскорбиновой кислоты (в миллиграммах), введенной в общую массу блюда. При применении таблеток указывается количество таблеток, используемых для витаминизации, содержание аскорбиновой кислоты в таблетке.
8. Аскорбиновую кислоту (таблетки или порошок), следует хранить в защищенном от света сухом, прохладном месте, в плотно закрытой таре. Ответственность за хранение аскорбиновой кислоты несет медицинская сестра или уполномоченное лицо.

С инструкцией ознакомлены:



Козинец Н.В.