

**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Республики Карелия «Сортавальский колледж»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ РК  
«Сортавальский колледж»  
Г.Е. Петрова  
09 июня 2017 года

**Инструкция № 85**

**По охране труда и технике безопасности по действиям работников  
при возникновении несчастных случаев и оказанию доврачебной помощи пострадавшим.**

**I. Общие требования**

- 1.1. Требования настоящей инструкции обязательны для выполнения всеми работниками колледжа;
- 1.2. Работник обязан знать, в в случае необходимости применять правила и приемы оказания первой доврачебной помощи работникам и обучающимся, получившим травму или при резком ухудшении здоровья (отравление, обморок и т.д.);
- 1.3. О каждом случае травмирования и несчастном случае работник обязан НЕМЕДЛЕННО сообщать администрации, медицинскому работнику или находящемуся вблизи сотруднику;

**II. Действия работников при возникновении несчастных случаев и травмирования обучающихся и работников**

**2.1. Электротравмы:**

- Освободить пострадавшего от действия электрического тока, используя подручные диэлектрические средства (лоска, палка, щетка для пола, одежда и другое);
- Отключить с помощью выключателя, рубильника, автомата напряжение на оборудовании, приборе, электрической розетке;
- Вызвать врача, медсестру или «Скорую помощь», позвать на помощь сотрудников;
- Если пострадавший не дышит, провести искусственное дыхание методом «изо рта в рот»;
- При остановке сердечной деятельности делать наружный массаж сердца;
- Оказание первой помощи проводиться до прихода врача или медсестры;

**2.2. Отравление бытовым газом, дымом:**

- Удалить пострадавшего из загазованной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха;
- Уложить пострадавшего, приподняв его ноги, растиреть тело, укрыть потеплее, дать понюхать нашатырный спирт;
- Если у пострадавшего началась рвота, повернуть его тело и голову набок;
- При остановке дыхания приступить к проведению искусственного дыхания;
- Вызвать врача, медсестру или «Скорую помощь», позвать на помощь сотрудников;
- Дать пострадавшему выпить большое количество молока, если он находится в сознании;

**2.3. Пищевое отравление:**

- Вызвать врача, медсестру или «Скорую помощь»;
- Сделать пострадавшему промывание желудка 2-3 раза. Дать 3-4 стакана воды или розового раствора марганцовокислого калия, чтобы вызвать рвоту;
- Затем дать 2-4 столовых ложки активированного угля, растворенного в стакане воды;
- Напоить теплым чаем, уложить и укрыть потеплее до прибытия медицинского работника;

**2.4. Ожоги термические и электрические первой степени:**

- Ликвидировать воздействие на тело человека опасного фактора;
- При ожогах нельзя поливать обожженные участки тела водой;
- Вызвать врача, медсестру или «Скорую помощь»;
- Наложить на обожженный участок тела сухую стерильную повязку;
- Завернуть пострадавшего в чистую простыню, укрыть потеплее, дать выпить теплого чая и 1-2 таблетки анальгина ли амидопирина, создать покой;
- При ожогах глаз сделайте холодные примочки из раствора борной кислоты ( $\frac{1}{2}$  чайной ложки на стакан воды);

**2.5. Ожоги химические:**

- Промыть пораженное место большим количеством воды;
- Вызвать врача, медсестру или «Скорую помощь»;
- Обработать пораженное место нейтрализующими растворами (при ожоге кислотой – раствором пищевой соды, 1 ч/л на стакан воды; при ожоге щелочью – раствором борной кислоты (1 ч/л на стакан воды));

**2.6. Помощь при ранениях, кровотечениях:**

- СРОЧНО вызвать врача, медсестру или «Скорую помощь»;
- ДО прибытия врача наложить на рану стерильную повязку, предварительно обработав рану йодом, спиртом, перекисью водорода или одеколоном. Не промывать рану;
- Для уменьшения боли дать пострадавшему анальгин, амидопирин;

- При наружном кровотечении: наложить тугую давящую повязку и приподнять кровоточащую часть тела, зажать пальцами артерию или наложить жгут;
- При внутреннем кровотечении: обеспечить покой, приложить «холод». Если повреждена брюшная полость – не давать пить;
- При сильном артериальном кровотечении: наложить жгут ВЫШЕ раны и затянуть его до полной остановки кровотечения. Положить под жгут записку с указанием времени его наложения (не более чем на 2 часа);

#### 2.7. Помощь при переломах:

- Обеспечить покой места перелома конечностей или костей другой части тела;
- Вызвать врача, медсестру или «Скорую помощь»;
- При открытом переломе и наличии кровотечения остановить его при помощи жгута или давящей повязки;

#### 2.8. Помощь при потере сознания, обмороке:

- Уложить пострадавшего, приподняв нижние конечности и запрокинуть голову вниз. Обеспечить приток свежего воздуха;
- Расстегнуть одежду, ремень, похлопать по щекам, обрызгать холодной водой, дать понюхать ватку с нашатырным спиртом. **ВНИМАНИЕ!** Следить, чтобы не произошло западания языка;
- Вызвать врача, медсестру или «Скорую помощь»;

#### 2.9. Помощь при утоплении:

- Быстро извлечь пострадавшего из воды;
- Принять меры до вызова врача или медсестры, «Скорой помощи»;
- Удалить из рта грязь, ил и прочее;
- Уложить пострадавшего на живот, затем обеими руками приподнять и трясти его так, чтобы из дыхательных путей и желудка вытекла вода. Ребенка просто поднять за ноги;
- После удаления воды приступить к проведению искусственного дыхания и продолжать до прихода медицинского работника;
- После появления у пострадавшего самостоятельного дыхания напоить горячим чаем, укутать в одеяло и отправить в лечебное учреждение;

#### 2.10. Помощь при обморожении:

- Вызвать врача, медсестру или «Скорую помощь»;
- Доставить пострадавшего в теплое помещение, снять верхнюю одежду и обувь;
- Дать обильное горячее питье, анальгин, лекарство, уменьшающее спазм сосудов (ношпа), димедрол или супрастин;
- Наложить на область обморожения стерильные сухие салфетки, сверху толстый слой ваты, затем обернуть kleenкой, брезентом или фольгой, зафиксировать бинтом;
- При обморожении ушей, щек и носа – растирать их рукой до покраснения, затем обработать спиртом;
- **ВНИМАНИЕ!** Недопустимо растирание обмороженных участков снегом.

#### 2.11. Помощь при эпилептическом припадке:

- Нельзя насиленно прерывать судороги и приводить больного в чувства;
- Уложить больного в тени, приподнять голову, расстегнуть одежду на шее, груди, между зубами просунуть палочку диаметром 1-1,5 см, чтобы не произошло прикусывания языка;
- Вызвать врача, медсестру или «Скорую помощь»;
- **ВНИМАНИЕ!** После приступа больной сразу же засыпает, будить его НЕЛЬЗЯ!

Ведущий специалист (по охране труда)

А.А. Бровко