

Слушатель _____
Фамилия, имя, отчество полностью, разборчиво!

Место работы _____

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
«ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ»

1		11		21		31	
2		12		22		32	
3		13		23		33	
4		14		24		34	
5		15		25		35	
6		16		26			
7		17		27			
8		18		28			
9		19		29			
10		20		30			

Заполненный от руки бланк тестов необходимо сфотографировать и прислать на адрес электронной почты: kokoeva-elena@mail.ru

или

прислать фото в мобильное приложение WhatsApp

на номер 8-938-861-14-14

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

«ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ»

Выберите один правильный ответ

1. Основным видом биоматериала для лабораторного исследования при коронавирусной инфекции является:

- а) кал
- б) цельная кровь
- в) материал, полученный при заборе мазка из носоглотки и /или ротоглотки
- г) сыворотка крови

2. Проведение компьютерной томографии органов грудной клетки рекомендуется:

- а) в качестве теста первой линии воспалительных изменений органов грудной клетки, обусловленные вирусной этиологией в амбулаторных и стационарных условиях
- б) для диагностики, дифференциальной диагностики, оценки динамических изменений в стационарных условиях
- в) для скрининга в амбулаторных условиях

3. Случай коронаровирусной инфекции считается подтвержденной при:

- а) клинических проявлениях тяжелой пневмонии
- б) положительном результате лабораторного исследования на наличие РНК коронавируса с применением методов амплификации нуклеиновых кислот вне зависимости от клинических проявлений
- в) наличии острого респираторного дистресс – синдрома

4. Актуальный источник инфекции при коронавирусной инфекции:

- а) грызуны
- б) птицы
- в) люди

5. Жаропонижающим препаратом первого выбора является:

- а) ибупрофен
- б) парацетамол
- в) ацетилсалициловая кислота

6. Исследования газов артериальной крови рекомендуется:

- а) всем пациентам с подтвержденным диагнозом COVID -19
- б) пациентам с SaO_2 в пределах 90-95% по данным пульсоксиметрии
- в) пациентам с SaO_2 менее 90% по данным пульсоксиметрии

7. Использованные медицинские маски в период пандемии коронавирусной инфекции в медицинской организации:

- а) подлежат обеззараживанию и удалению, как отходы класса В
- б) не подлежат обеззараживанию и удаляются, как отходы класса Д
- в) подлежат обеззараживанию и удалению, как отходы класса Б
- г) не подлежат обеззараживанию и удаляются, как отходы класса А

8. Основным методом лабораторной диагностики коронавирусной инфекции является:

- а) иммунохроматографический
- б) вирусологический
- в) амплификации нуклеиновых кислот (без накопления возбудителя)
- г) серологический

9. Одежда больного коронавирусной инфекции в стационаре должна храниться:

- а) в баках в индивидуальных мешках в кладовой
- б) в коробках в месте пребывания больного
- в) в корзинах для белья в специальном складском помещении
- г) на стеллажах в специально отведенных складских помещениях

10. Предметы, использованные при транспортировке больного с подозрением на COVID -19 подвергаются:

- а) утилизации без предварительного обеззараживания

- б) сжиганию
- в) обеззараживанию в медицинской организации
- г) обеззараживанию на дезинфекционных станциях

11. После выписки или смерти больного с COVID -19 постельные принадлежности должны подвергаться:

- а) кипячению
- б) замачиванию в дезинфицирующем растворе
- в) камерной дезинфекции
- г) стирке

12. Медицинский персонал, осуществляющий уход за больными с коронавирусной инфекцией должен подвергаться ежедневным осмотрам с измерением температуры тела 2 раза в день в течение:

- а) 14 дней
- б) 3 недель
- в) 7 дней
- г) 1 месяца

13. При попадании биологического материала, содержащего коронавирус на слизистые оболочки рта рекомендуется немедленно прополоскать рот:

- а) настоем ромашки
- б) 70 ° этиловым спиртом
- в) раствором фурациллина
- г) водой

14. Смена маски должна производиться:

- а) один раз в день
- б) каждые 3 – 4 часа
- в) каждый час
- г) каждые 2 – 3 часа

15. Основными симптомами, характерными для коронавирусной инфекции являются:

- а) боль при глотании, сыпь, бледный носогубный треугольник
- б) гиперемия лица, боль в горле, тремор
- в) сыть, повышение артериального давления, боль за грудиной
- г) повышение температуры, сухой кашель, одышка

16. К средствам индивидуальной защиты для водителя и персонала, которые транспортируют больного с подозрением на COVID -19 относятся:

- а) маска, одноразовый халат, антисептик для рук
- б) шапочка, противочумный халат, респиратор
- в) одноразовый халат, бахилы, сапоги
- г) фартук, маска, антисептик для рук, бахилы

17. В случае отсутствия средств индивидуальной защиты у медицинского персонала и попадания биологического материала, содержащего коронавирус на кожные покровы и слизистые оболочки, рекомендуется:

- а) 70 ° этиловым спиртом
- б) покинуть рабочее место и сообщить руководству
- в) промыть холодной водой с мылом
- г) протереть влажной салфеткой

18. Для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением в присутствии людей могут использоваться:

- а) импульсные установки
- б) закрытые бактерицидные облучатели
- в) открытые бактерицидные облучатели
- г) комбинированные бактерицидные облучатели

19. Обработка белья больного и предметов ухода осуществляется с помощью:

- а) камерной дезинфекции
- б) кипячения
- в) погружения в дезинфицирующее средство

г) стирки

20. Пути передачи коронавирусной инфекции:

- а) контактный, воздушно – капельный, аспирационный
- б) трансмиссивный, половой, контактный
- в) контактный, пищевой, трансмиссивный
- г) водный, пищевой, трансмиссивный

21. Геном коронавируса SARS-CoV-2 представляет собой:

- а) одноцепочечную РНК
- б) двуцепочечную ДНК
- в) одноцепочечную ДНК
- г) двуцепочечную РНК

22. Максимальный инкубационный период при коронавирусной инфекции составляет:

- а) 10 дней
- б) 14 дней
- в) 21 день
- г) 30 дней

23. В медицинских организациях использованные одноразовые средства индивидуальной защиты:

- а) утилизируются без обеззараживания
- б) подлежат обеззараживанию и утилизации, как отходы класса В
- в) подлежат обеззараживанию и утилизации, как отходы класса Б
- г) не подлежат обеззараживанию и утилизации, как отходы класса А

24. Медицинский персонал бригады скорой медицинской помощи, выполняющий вызов к больным с подозрением на коронавирус меняет средства индивидуальной защиты:

- а) после каждого больного
- б) каждые 8 часов

в) один раз в смену

г) каждые 2-3 часа

25. По степени распространения болезни эпидемический процесс новой коронавирусной инфекции COVID -19 проявляется в виде:

а) единичных очагов

б) эпидемии

в) пандемии

г) вспышки

26. В медицинской организации, в которой был выявлен пациент, обследованию на COVID -19 подлежат:

а) лица, контактировавшие с больным

б) все лица, работающие в медицинской организации

в) только санитары

г) только сотрудники гардероба

27. Одним из осложнений коронавирусной инфекции является:

а) гайморит

б) менингит

в) пневмония

г) сердечная недостаточность

28. При соблюдении алгоритма снятия средств индивидуальной защиты, в первую очередь необходимо снять:

а) бахилы

б) перчатки

в) перчатки/халат

г) шапочку

29. Использование медицинских перчаток:

- а) позволяет пренебречь требованиями к рукам медицинского персонала
- б) позволяет не проводить обработку рук антисептиком
- в) заменяет мытье рук с мылом
- г) не отменяет гигиену рук посредством антисептика или мытья рук

Выберите несколько правильных ответов

30. Индивидуальные антисептические мероприятия, осуществляемые медицинским работником, выявившим больного с подозрением на коронавирус:

- а) в нос и в глаза закапать 20% сульфацил натрия
- б) рот и горло прополоскать 70% этиловым спиртом
- в) обработать открытые части тела кожным антисептиком
- г) в нос и в глаза закапать 2% раствор борной кислоты

31. Медицинский персонал, оказывающий помощь пациентам с COVID -19 в «красной» зоне должен использовать:

- а) медицинские маски
- б) противочумный костюм
- в) респираторы класса PFF2 и выше
- г) перчатки

32. Медицинский персонал, работающий в «чистой» зоне должен использовать:

- а) медицинские маски
- б) респираторы класса PFF2 и выше
- в) медицинский халат

33. Для обеззараживания воздуха УФ излучателей в отсутствии людей могут использоваться:

- а) открытый бактерицидный облучатель
- б) комбинированный бактерицидный облучатель
- в) импульсные установки

г) закрытые бактерицидные облучатели

34. Правила оснащения стационарного места для обработки рук включает:

- а) наличие крана с локтевым/кистевым управлением
- б) доступное расположение
- в) наличие крана с закручивающимися элементами
- г) размещение флакона с мылом над раковиной

35. При прямом контакте с пациентом, основными требованиями к рукам медицинского работника являются:

- а) отсутствие колец
- б) отсутствие наращенных ногтей
- в) короткие ногти
- г) наличие лака на ногтях