




Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
территориальный отдел в городе Урай и Кондинском районе

Энтеровирусные инфекции



Начальник ТО Роспотребнадзора
в г.Урае и Кондинском районе
Пилявская С.В.

2017г.

Энтеровирусные болезни

- – это группа инфекционных болезней, вызываемых энтеровирусами группы Коксаки и ЕСНО.
- Энтеровирус входит в группу кишечных вирусов.
- Среди заболевших ЭВИ преобладают дети и лица молодого возраста.
- Максимальная заболеваемость регистрируется в летне-осенние месяцы.

Источник инфекции:

- Источником инфекции является человек (больной или носитель).

Вирусоносительство у здоровых лиц составляет от 17 до 46%. У вирусоносителей нет никаких проявлений заболеваний, однако вирусы находятся в кишечнике и выделяются в окружающую среду с калом.

Устойчивость энтеровируса

- Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении.


Пути передачи

- водный (при поливе овощей и фруктов зараженными сточными водами, а также при купании в открытых зараженных водоемах)
- пищевой (через загрязненные пищевые продукты)
- контактно-бытовой (через предметы быта, загрязненные руки, при несоблюдении личной гигиены)
- воздушно-капельный (при кашле, чиханье).



Факторы передачи инфекции

- контаминированная энтеровирусами вода, овощи, руки, игрушки и другие объекты внешней среды.



Основные клинические симптомы

- Инкубационный (скрытый) период составляет в среднем от 1 до 10 дней.
- Обычно спектр симптомов очень большой, но в большинстве случаев он практически всегда включает: лихорадку (повышение температуры тела до 39-40°C), общая слабость, головная боль, мышечная боль и желудочно-кишечные симптомы. Иногда наблюдается увеличение лимфоузлов, в основном подчелюстных и шейных. Еще одним симптомом болезни является экзантема или высыпания, которые появляются одновременно на голове, груди и руках.

- При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного т.к. он является источником заражения, для окружающих, и обратиться к врачу.

Частые формы энтеровирусной инфекции

- Респираторные заболевания, герпангина
- **Энтеровирусный менингит** и другие формы энтеровирусных инфекций центральной нервной системы
 - Энтеровирусная экзантема (сыпь) полости рта и конечностей (ящуроподобный синдром)
 - Плевродиния (эпидемическая миалгия, болезнь Борнхольма)
- Миокардит (воспаление мышечного слоя сердца)
- Генерализованная болезнь новорожденных
- Острый геморрагический конъюнктивит
- Энтеровирусная лихорадка (малая болезнь)
- Энтеровирусная диарея (гастроэнтерит)
- Диабет

Энтеровирусная экзантема



Герпангина




Острый геморрагический конъюнктивит



- Одними из самых тяжелых осложнений энтеровирусной инфекции по праву считаются поражения нервной системы в виде энцефалитов и менингитов. Такие состояния создают угрозу не только здоровью, но и жизни пострадавшего.
- Менингит – это воспаление оболочек мозга. Для менингита характерны сильнейшая головная боль, свето- и звукобоязнь, тошнота и рвота, повышение температуры тела до 39 С и выше, затруднения при попытках наклонить голову вперед.

Энтеровирусный менингит



- Характерная поза при менингите: голова слегка запрокинута, живот подтянут, ноги полностью согнуты в коленях, а руки прижаты к груди.

Профилактика ЭВИ

- Учитывая возможные пути передачи, меры личной профилактики должны заключаться в соблюдении правил личной гигиены, соблюдении питьевого режима (кипяченая вода, бутилированная вода), тщательная обработка употребляемых фруктов, овощей с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком.

Профилактика ЭВИ

- Рекомендуется влажная уборка жилых помещений не реже 2 раз в день, проветривание помещений.
- В целях раннего выявления заболевания необходимо наблюдение за детьми, бывшими в контакте с больным» с термометрией не реже 2 раз в день в течение 20 дней

Профилактика ЭВИ

- Следует избегать посещения массовых мероприятий, мест с большим количеством людей (общественный транспорт, кинотеатры и т.д.).
- Ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива (летний лагерь, дошкольные образовательные организации, клубы, секции и т.п.) с любыми проявлениями заболевания.